

Processus empiriques des rapports de m -espacements uniformes disjoints

(Non-overlapping uniform m -spacings-ratio empirical processes)

Moïse JEREMIE

L.S.T.A., Université de Paris VI, Jussieu

Résumé

Nous considérons un processus empirique basé sur des paires sélectionnées de rapports de m -espacements disjoints, engendrés par des échantillons indépendants de tailles arbitraires. Comme résultat principal, nous montrons que lorsque les deux échantillons sont uniformément distribués sur des intervalles de même longueur, ce processus empirique converge vers un pont Brownien centré sur une moyenne de la forme $(B \circ H_m)_C(v) = B(H_m(v)) - 2(2m + 1)C \frac{(2m - 1)!}{m((m - 1)!)^2}(v(1 - v))^m \int_0^1 B(H_m(s))ds$, pour $0 \leq v \leq 1$, où $B(\cdot)$ désigne un pont Brownien, H_m , la f.r. de la loi bêta de paramètres m et m , et C , une constante.

Abstract

We consider an empirical process based upon ratio of selected pair of the non-overlapping m -spacings generated by independent samples of arbitrary sizes. As a main result, we show that when both samples are uniformly distributed on intervals of equal lengths, this empirical process converges to a mean-centered Brownian bridge of the form $(B \circ H_m)_C(v) = B(H_m(v)) - 2(2m + 1)C \frac{(2m - 1)!}{m((m - 1)!)^2}(v(1 - v))^m \int_0^1 B(H_m(s))ds$, for $0 \leq v \leq 1$, where $B(\cdot)$ denotes a Brownian bridge, H_m , the distribution function of the Beta distribution with parameters m and m , and C , a constant.

AMS 2010 Subject Classification : 60F05, 60F17, 60G15.

Keys words and phrases : processus empiriques, processus Gaussiens, principes d'invariance faibles, lois limites, espacements, statistiques d'ordre, lois faibles.

1 Introduction et résultats

Deheuvels et Derzko [11] ont étudié un processus empirique basé sur les rapports d'espacements de deux échantillons indépendants. Dans le cas d'une loi uniforme sur $(0, 1)$, ils ont montré que ce processus empirique convergeait vers une limite gaussienne de la forme

$$B(t) - 6Ct(1 - t) \int_0^1 B(s)ds, \quad \text{pour } 0 \leq t \leq 1,$$

où $\{B(t) : 0 \leq t \leq 1\}$ est un pont Brownien, C , une constante dépendant du comportement limite des tailles des deux échantillons. Dans cet article,

nous généralisons leurs résultats aux m -espacements. Nous adopterons les notations suivantes. Sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, $\{X_n : n \geq 1\}$ et $\{Y_n : n \geq 1\}$ deux suites indépendantes, de variables aléatoires indépendantes de loi uniforme sur $(0, 1)$, et de fonctions de répartition $F_X(t) = P(X_1 \leq t) = F_Y(t) = P(Y_1 \leq t) = t$, pour $0 \leq t \leq 1$. Pour tout couple d'entiers, $n_1 \geq 1$ et $n_2 \geq 1$, soient respectivement $X_{1,n_1} < \dots < X_{n_1,n_1}$ et $Y_{1,n_2} < \dots < Y_{n_2,n_2}$ les statistiques d'ordre de X_1, \dots, X_{n_1} et Y_1, \dots, Y_{n_2} . Nous posons $X_{0,n_1} = 0$, $X_{n_1+1,n_1} = 1$ et $Y_{0,n_2} = 0$, $Y_{n_2+1,n_2} = 1$, pour $n_1, n_2 \geq 0$. Puisque ces statistiques d'ordre sont distinctes presque sûrement, nous travaillerons, sans perte de généralité, sur l'événement de probabilité 1 correspondant. Pour tout $1 \leq m \leq (n_1 \wedge n_2) + 1$, nous considérons les m -espacements engendrés par chacune de ces suites, et définis par

$$D_{i,n_1;X}^{(m)} = X_{i+m,n_1} - X_{i,n_1} \quad \text{et} \quad D_{j,n_2;Y}^{(m)} = Y_{j+m,n_2} - Y_{j,n_2},$$

pour $0 \leq i \leq n_1 - m + 1$, et $0 \leq j \leq n_2 - m + 1$. L'objet de notre étude est l'ensemble des rapports d'espacements de la forme

$$R_{i,j,n_1,n_2} = \frac{(n_1 - m + 2)D_{i,n_1;X}^{(m)}}{(n_1 - m + 2)D_{i,n_1;X}^{(m)} + (n_2 - m + 2)D_{j,n_2;Y}^{(m)}}.$$

La loi de R_{i,j,n_1,n_2} est indépendante de i, j , et satisfait, lorsque $n_1 \wedge n_2 \rightarrow \infty$,

$$R_{i,j,n_1,n_2} \xrightarrow{d} \beta_{m,m},$$

(voir (1.7) ci-dessous pour la définition de $\beta_{m,m}$). Nous allons considérer un processus empirique basé sur une collection de ces rapports, choisis de telle sorte que les espacements qui y interviennent soient disjoints au sens que les intervalles ouverts correspondants sont d'intersection vide. Cette propriété est toujours satisfaite pour $m = 1$, cas étudié par Deheuvels et Derzko [10, 11]. A cet effet, nous introduisons des indices $0 \leq i_{0,n_1} < \dots < i_{N,n_1} \leq n_1 - m + 1$, et $0 \leq j_{0,n_2} < \dots < j_{N,n_2} \leq n_2 - m + 1$, tels que $i_{k+1,n_1} - i_{k,n_1} \geq m$ et $j_{k+1,n_2} - j_{k,n_2} \geq m$, pour $0 \leq k \leq N \leq N_1 \wedge N_2$, où

$$(1.1) \quad N_1 := \left\lfloor \frac{n_1 + 1}{m} \right\rfloor - 1 \quad \text{et} \quad N_2 := \left\lfloor \frac{n_2 + 1}{m} \right\rfloor - 1,$$

et $\lfloor u \rfloor$ désigne la partie entière inférieure de $u \in \mathbb{R}$.

Nous considérons donc les paires de m -espacements disjoints définies par

$$(1.2) \quad \begin{aligned} S_{k,N;X}^{(m)} &= D_{i_{k,n_1},n_1;X}^{(m)} = X_{i_{k,n_1}+m,n_1} - X_{i_{k,n_1},n_1} \quad \text{et} \\ S_{k,N;Y}^{(m)} &= D_{j_{k,n_2},n_2;Y}^{(m)} = Y_{j_{k,n_2}+m,n_2} - Y_{j_{k,n_2},n_2}, \quad \text{pour } k = 0, \dots, N. \end{aligned}$$

Par convention, nous posons

$$(1.3) \quad P = P(N) = N_1 - N \geq 0 \quad \text{et} \quad Q = Q(N) = N_2 - N \geq 0,$$

et supposons que N , $P = P(N)$ et $Q = Q(N)$ vérifient les conditions limites, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(1.4) \quad \frac{P}{N+1} \rightarrow c \in [0, \infty], \quad \text{et} \quad \frac{Q}{N+1} \rightarrow d \in [0, \infty],$$

où c et d sont des constantes (éventuellement infinies). Pour $0 \leq k \leq N \leq N_1 \wedge N_2$, les rapports de m -espacements disjoints sont définis par

$$(1.5) \quad R_{k;n_1,n_2} = R_{i_{k,n_1}, j_{k,n_2}, n_1, n_2} = \frac{(N+P+1) S_{k,N;X}^{(m)}}{(N+P+1) S_{k,N;X}^{(m)} + (N+Q+1) S_{k,N;Y}^{(m)}} \\ = \frac{(N_1+1) S_{k,N;X}^{(m)}}{(N_1+1) S_{k,N;X}^{(m)} + (N_2+1) S_{k,N;Y}^{(m)}},$$

La loi de $\{R_{k;n_1,n_2} : 0 \leq k \leq N\}$ ne dépend pas de $\{i_{k,n_1}, j_{k,n_2} : 0 \leq k \leq N\}$. Nous notons la fonction de répartition [f.r.] empirique correspondante par

$$(1.6) \quad H_{N;n_1,n_2}(x) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N \mathbb{I}_{\{R_{k;n_1,n_2} \leq x\}}, \quad \text{pour } x \in \mathbb{R}.$$

Notons H_m , la f.r. de la loi $\beta_{m,m}$, définie, pour $m > 0$, par

$$(1.7) \quad H_m(x) = \frac{1}{\beta(m,m)} \int_0^x t^{m-1} (1-t)^{m-1} dt, \quad \text{pour } 0 \leq x \leq 1.$$

Notons aussi, H_m^{-1} , la fonction de quantile de la loi $\beta_{m,m}$, définie, pour $m > 0$, par

$$(1.8) \quad H_m^{-1}(t) = \inf \{x : H_m(x) \geq t\}, \quad \text{pour tout } 0 < t < 1.$$

Nous abordons dans ce qui suit l'étude du processus empirique

$$(1.9) \quad \gamma_{N;n_1,n_2}(x) = (N+1)^{1/2} (H_{N;n_1,n_2}(x) - H_m(x)), \quad \text{pour } 0 \leq x \leq 1,$$

dont nous étudions le comportement sous les conditions (1.4).

Comme résultat principal, nous montrons que lorsque les v.a. $\{X_n : n \geq 1\}$ et $\{Y_n : n \geq 1\}$ suivent des lois uniformes sur des intervalles de \mathbb{R} , $\{\gamma_{N;n_1,n_2}(v) : 0 \leq v \leq 1\}$ peut être approché asymptotiquement par *des processus Gaussiens centrés* (voir Deheuvels 2007[9]) de la forme

$$(1.10) \quad (B \circ H_m)_C(v) = B(H_m(v)) - 2(2m+1)C \frac{(2m-1)!}{m((m-1)!)^2} (v(1-v))^m \\ \times \int_0^1 B(H_m(s)) ds, \quad 0 \leq v \leq 1.$$

Ici $\{B(v) : 0 \leq v \leq 1\}$ désigne un pont Brownien et $C \in \mathbb{R}$, une constante. Cette catégorie de processus dont nous rappellerons les propriétés au paragraphe 2 ont été introduites par Deheuvels et Derzko [11]. Nous établirons, en particulier l'identité en loi

$$(1.11) \quad \{(B \circ H_m)(t) : 0 \leq t \leq 1\} \stackrel{d}{=} \{(B \circ H_m)(t) - 4(2m+1) \frac{(2m-1)!}{m((m-1)!)^2} (t(1-t))^m \int_0^1 B(H_m(s)) ds : 0 \leq t \leq 1\}.$$

Dans le cas suivant, la structure limite de $\gamma_{N;n_1,n_2}^{(m)}(\cdot)$ est simple.

Exemple 1.1. Si $N = o(N_1)$ et $N = o(N_2)$, lorsque $N_1 \wedge N_2 \rightarrow \infty$, de sorte que $c = d = \infty$ dans (1.4), il existe, pour un choix convenable de $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, une suite $\{B'_N(\cdot) : N \geq 1\}$ de ponts Browniens, telle que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(1.12) \quad \sup_{0 \leq v \leq 1} |\gamma_{N;n_1,n_2}(v) - B'_N(H_m(v))| = o_{\mathbb{P}}(1).$$

La démonstration de (1.12) sera précisée, plus loin, dans la remarque 2.1.

L'exemple 1.1 laisse entendre que le processus empirique $\gamma_{N;n_1,n_2}(\cdot)$ pourrait converger faiblement (relativement à la topologie de Skorohod, Billingsley [2]) vers un pont Brownien. Tel n'est pas le cas en général comme l'ont établi Deheuvels et Derzko [11] pour $m = 1$. Le théorème 1.1 suivant généralise leur résultat à $m \geq 1$.

Théorème 1.1. Lorsque $c = d = 0$, pour un choix convenable de $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, il existe deux suites $\{\mathcal{B}_N^+(v) : 0 \leq v \leq 1\}$ et $\{\mathcal{B}_N^-(v) : 0 \leq v \leq 1\}$, $N = 1, 2, \dots$, de ponts Browniens, liés par les relations réciproques,

$$(1.13) \quad \mathcal{B}_N^\pm \circ H_m(v) \stackrel{d}{=} \mathcal{B}_N^\pm \circ H_m(v) - 8(2m+1) \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} (v(1-v))^m \times \int_0^1 \mathcal{B}_N^\pm \circ H_m(s) ds, \text{ pour } 0 \leq v \leq 1,$$

et vérifiant les relations, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(1.14) \quad \sup_{0 \leq v \leq 1} \left| \gamma_{N;n_1,n_2}(v) - \left\{ \mathcal{B}_N^+ \circ H_m(v) - 4(2m+1) \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} \times \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2m+1}}\right) (v(1-v))^m \int_0^1 \mathcal{B}_N^+ \circ H_m(s) ds \right\} \right| = o_{\mathbb{P}}(1),$$

et

$$(1.15) \quad \sup_{0 \leq v \leq 1} \left| \gamma_{N;n_1,n_2}(v) - \left\{ \mathcal{B}_N^- \circ H_m(v) - 4(2m+1) \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} \times \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2m+1}}\right) (v(1-v))^m \int_0^1 \mathcal{B}_N^- \circ H_m(s) ds \right\} \right| = o_{\mathbb{P}}(1).$$

La preuve du théorème 1.1 est exposée dans le paragraphe 5.3.

Remarque 1.1. Soit $(B \circ H_m)_C(\cdot)$ comme dans (1.10). Il est facile de montrer (voir par exemple (2.21) ci-dessous) que

$$(1.16) \quad (B \circ H_m)_{C_1}(\cdot) \stackrel{d}{=} (B \circ H_m)_{C_2}(\cdot) \iff C_1(C_1 - 2) = C_2(C_2 - 2).$$

Ceci implique, en particulier que les versions des processus gaussiens $(B \circ H_m) \left\{ 1 + \frac{1}{\sqrt{2m+1}} \right\}(\cdot)$ et $(B \circ H_m) \left\{ 1 - \frac{1}{\sqrt{2m+1}} \right\}(\cdot)$ approchant $\gamma_{N;n_1,n_2}(\cdot)$ dans (1.14) et (1.15), respectivement, sont identiquement distribués (voir le paragraphe 2).

Le théorème 1.1 peut être généralisé comme suit.

Théorème 1.2. Sur un espace $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ de probabilité convenable, il existe deux suites $\{\mathcal{B}_N^+(v) : 0 \leq v \leq 1\}$ et $\{\mathcal{B}_N^-(v) : 0 \leq v \leq 1\}$, $N = 1, 2, \dots$, de ponts Browniens, liés par les relations réciproques,

$$(1.17) \quad \mathcal{B}_N^\pm \circ H_m(v) \stackrel{d}{=} \mathcal{B}_N^\pm \circ H_m(v) - 8(2m+1) \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} (v(1-v))^m \times \int_0^1 \mathcal{B}_N^\pm \circ H_m(s) ds, \text{ pour } 0 \leq v \leq 1,$$

et vérifiant les relations, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(1.18) \quad \sup_{0 \leq v \leq 1} \left| \gamma_{N;n_1,n_2}(v) - \left\{ \mathcal{B}_N^+ \circ H_m(v) - 4(2m+1) \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} (1 + \sqrt{R_{N,m}}) \times (v(1-v))^m \int_0^1 \mathcal{B}_N^+ \circ H_m(s) ds \right\} \right| = O_{\mathbb{P}} \left(N^{-1/4} (\log N)^{1/2} \right),$$

et

$$(1.19) \quad \sup_{0 \leq v \leq 1} \left| \gamma_{N;n_1,n_2}(v) - \left\{ \mathcal{B}_N^- \circ H_m(v) - 4(2m+1) \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} (1 - \sqrt{R_{N,m}}) \times (v(1-v))^m \int_0^1 \mathcal{B}_N^- \circ H_m(s) ds \right\} \right| = O_{\mathbb{P}} \left(N^{-1/4} (\log N)^{1/2} \right),$$

$$(1.20) \quad \text{où } R_{N,m} = 1 - \frac{m}{2m+1} \left[\frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right] = 1 - \frac{m}{2m+1} \left[\frac{N+1}{N_1+1} + \frac{N+1}{N_2+1} \right].$$

Dans le théorème 1.3 suivant, nous considérons le cas où $\{X_n : n \geq 1\}$ et $\{Y_n : n \geq 1\}$ sont des suites indépendantes de v.a. i.i.d. de lois uniformes respectivement sur $(a, a+e)$ et sur $(b, b+h)$.

Théorème 1.3. Si $X \stackrel{d}{=} \mathcal{U}(a, a+e)$ et $Y \stackrel{d}{=} \mathcal{U}(b, b+h)$. Alors, sur un espace $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ de probabilité convenable, il existe deux suites $\{\mathcal{B}_N^+(v) : 0 \leq v \leq 1\}$

et $\{\mathcal{B}_N^-(v) : 0 \leq v \leq 1\}$, $N = 1, 2, \dots$, de ponts Browniens, liés par les relations réciproques,

$$(1.21) \quad \mathcal{B}_N^\pm \circ H_m \left(\frac{vh}{vh + (1-v)e} \right) \stackrel{d}{=} \mathcal{B}_N^\pm \circ H_m \left(\frac{vh}{vh + (1-v)e} \right) - 8(2m+1) \times \\ \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} \left(\frac{vh(1-v)e}{(vh + (1-v)e)^2} \right)^m \int_0^1 \mathcal{B}_N^\pm \circ H_m(s) \, ds,$$

pour $0 \leq v \leq 1$, et vérifiant les relations, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(1.22) \quad \sup_{0 \leq v \leq 1} \left| \gamma_{N;n_1,n_2} \left(\frac{vh}{vh + (1-v)e} \right) - \left\{ \mathcal{B}_N^+ \circ H_m \left(\frac{vh}{vh + (1-v)e} \right) - 4(2m+1) \times \right. \right. \\ \left. \left. \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} (1 + \sqrt{R_{N,m}}) \left(\frac{vh(1-v)e}{(vh + (1-v)e)^2} \right)^m \int_0^1 \mathcal{B}_N^+ \circ H_m(s) \, ds \right\} \right| \\ = O_{\mathbb{P}}(N^{-1/4} (\log N)^{1/2}),$$

et

$$(1.23) \quad \sup_{0 \leq v \leq 1} \left| \gamma_{N;n_1,n_2} \left(\frac{vh}{vh + (1-v)e} \right) - \left\{ \mathcal{B}_N^- \circ H_m \left(\frac{vh}{vh + (1-v)e} \right) - 4(2m+1) \times \right. \right. \\ \left. \left. \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} (1 - \sqrt{R_{N,m}}) \left(\frac{vh(1-v)e}{(vh + (1-v)e)^2} \right)^m \int_0^1 \mathcal{B}_N^- \circ H_m(s) \, ds \right\} \right| \\ = O_{\mathbb{P}}(N^{-1/4} (\log N)^{1/2}),$$

où

$$(1.24) \quad R_{N,m} = 1 - \frac{m}{2m+1} \left[\frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right] \\ = 1 - \frac{m}{2m+1} \left[\frac{N+1}{N_1+1} + \frac{N+1}{N_2+1} \right].$$

Remarque 1.2. 1°) En posant, comme dans (1.4), $P/(N+1) \rightarrow c$ et $Q/(N+1) \rightarrow d$, lorsque $N \rightarrow \infty$, nous obtenons que

$$R_{N,m} \rightarrow R_{\infty,m} := 1 - \frac{m}{2m+1} \left[\frac{1}{1+c} + \frac{1}{1+d} \right],$$

avec la convention $1/\infty = 0$. Sous cette hypothèse, nous pouvons remplacer $R_{N,m}$ par $R_{\infty,m}$ dans (1.18) et (1.19) au prix du remplacement du terme $O_{\mathbb{P}}(N^{-1/4}(\log N)^{1/2})$ par $o_{\mathbb{P}}(1)$. Lorsque $c = d = 0$, ce dernier résultat coïncide avec le théorème 1.1. De même, nous obtenons (1.12), pour $c = d = \infty$.

2°) Nous avons toujours $1 - \frac{2m}{2m+1} < R_{N,m} < 1$, et de même, $R_{\infty,m}$ peut être pris pour chaque valeur possible dans $\left[1 - \frac{2m}{2m+1}, 1 \right]$. Le seul cas où le processus limite de $\gamma_{N;n_1,n_2}(\cdot)$, lorsque $N \rightarrow \infty$, est un pont Brownien est obtenu pour $R_{\infty,m} = 1$, ou équivalent, lorsque $c = d = \infty$.

3°) Lorsque $m = 1$, les théorèmes 1.1 et 1.2 précisent les théorèmes 1.1 et 1.2 de Deheuvels et Derzko[11] comme suit.

Théorème 1.4 (Deheuvels et Derzko 2011). *Lorsque $c = d = 0$, pour un choix convenable de $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, il existe deux suites $\{\mathcal{B}_N^+(v) : 0 \leq v \leq 1\}$ et $\{\mathcal{B}_N^-(v) : 0 \leq v \leq 1\}$, $N = 1, 2, \dots$, de ponts Browniens, liés par les relations réciproques,*

$$(1.25) \quad \mathcal{B}_N^\pm(v) \stackrel{d}{=} \mathcal{B}_N^\pm(v) - 12v(1-v) \int_0^1 \mathcal{B}_N^\pm(s) \, ds, \quad \text{pour } 0 \leq v \leq 1,$$

et vérifiant les relations, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(1.26) \quad \sup_{0 \leq v \leq 1} \left| \gamma_{N;n_1,n_2}(v) - \left\{ \mathcal{B}_N^+(v) - 2(3 + \sqrt{3})v(1-v) \int_0^1 \mathcal{B}_N^+(s) \, ds \right\} \right| = o_{\mathbb{P}}(1),$$

et

$$(1.27) \quad \sup_{0 \leq v \leq 1} \left| \gamma_{N;n_1,n_2}(v) - \left\{ \mathcal{B}_N^-(v) - 2(3 - \sqrt{3})v(1-v) \int_0^1 \mathcal{B}_N^-(s) \, ds \right\} \right| = o_{\mathbb{P}}(1).$$

Théorème 1.5 (Deheuvels et Derzko 2011). *Sur un espace $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ de probabilité convenable, il existe deux suites $\{\mathcal{B}_N^+(v) : 0 \leq v \leq 1\}$ et $\{\mathcal{B}_N^-(v) : 0 \leq v \leq 1\}$, $N = 1, 2, \dots$, de ponts Browniens, liés par les relations réciproques,*

$$(1.28) \quad \mathcal{B}_N^\pm(v) \stackrel{d}{=} \mathcal{B}_N^\pm(v) - 12v(1-v) \int_0^1 \mathcal{B}_N^\pm(s) \, ds, \quad \text{pour } 0 \leq v \leq 1,$$

et vérifiant les relations, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(1.29) \quad \sup_{0 \leq v \leq 1} \left| \gamma_{N;n_1,n_2}(v) - \left\{ \mathcal{B}_N^+(v) - 6(1 + \sqrt{R_{N,1}})v(1-v) \int_0^1 \mathcal{B}_N^+(s) \, ds \right\} \right| = O_{\mathbb{P}}\left(N^{-1/4} (\log N)^{1/2}\right),$$

et

$$(1.30) \quad \sup_{0 \leq v \leq 1} \left| \gamma_{N;n_1,n_2}(v) - \left\{ \mathcal{B}_N^-(v) - 6(1 - \sqrt{R_{N,1}})v(1-v) \int_0^1 \mathcal{B}_N^-(s) \, ds \right\} \right| = O_{\mathbb{P}}\left(N^{-1/4} (\log N)^{1/2}\right),$$

$$(1.31) \quad R_{N,1} = 1 - \frac{1}{3} \left[\frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right] = 1 - \frac{1}{3} \left[\frac{N+1}{N_1+1} + \frac{N+1}{N_2+1} \right].$$

4°) Nous notons que, pour $e = h$, le théorème 1.3 se réduit au théorème 1.2.

Dans le paragraphe 2 qui suit, nous rappelons des résultats sur la classe des processus gaussiens centrés étudiée par Deheuvels et Derzko[11], qui inclut les processus limites des théorèmes 1.1, 1.2 et 1.3. Dans le paragraphe 3, nous présentons les arguments principaux de nos démonstrations. Le paragraphe 4 est consacré à l'approximation forte des processus empiriques étudiés. Enfin, au paragraphe 5, nous assemblons les résultats précédents pour établir les théorèmes 1.1, 1.2 et 1.3.

2 Processus gaussiens centrés sur une moyenne

Pour $d \geq 1$, considérons un processus gaussien $\{\mathfrak{X}(t) : t \in [0, 1]^d\}$, avec des trajectoires continues et une fonction de covariance $K(s, t) = \mathbb{E}(\mathfrak{X}(s) \times \mathfrak{X}(t))$, vérifiant la condition

$$(2.1) \quad 0 < \sigma_{\mathfrak{X}}^2 := \int_{[0,1]^d \times [0,1]^d} K(s, t) \, ds dt < \infty.$$

Par le théorème 3, p.104 dans Talagrand (1987)[28], la continuité de $\mathfrak{X}(\cdot)$ sur $[0, 1]^d$ implique la continuité de $K(\cdot, \cdot)$ sur $[0, 1]^d \times [0, 1]^d$, et donc la convergence de l'intégrale (2.1). Nous supposons que $\sigma_{\mathfrak{X}}^2 > 0$, équivaut au fait que $\mathfrak{X}(\cdot)$ n'est pas identiquement nul sur $[0, 1]^d$. Pour tout $t = (t_1, \dots, t_d) \in \mathbb{R}^d$ ou $(s = (s_1, \dots, s_d) \in \mathbb{R}^d)$, nous désignons par dt ou (ds) la mesure de Lebesgue dans \mathbb{R}^d . De plus, en général, nous posons pour chaque fonction mesurable $\phi(\cdot)$ sur $[0, 1]^d$,

$$\int_{[0,1]^d \times \dots \times [0,1]^d} \phi(s) \, ds = \int_0^t \phi(s) \, ds = \int_0^{t_1} \dots \int_0^{t_d} \phi(s_1, \dots, s_d) \, ds_1 \dots ds_d.$$

Introduisons la fonction de $t \in [0, 1]^d$ définie par

$$\Psi(t) := \int_{[0,1]^d} K(s, t) \, ds = \mathbb{E} \left(\mathfrak{X}(t) \int_{[0,1]^d} \mathfrak{X}(s) \, ds \right), \quad \text{pour } t \in [0, 1]^d.$$

En gardant à l'esprit, compte tenu de (2.1) que

$$(2.2) \quad \sigma_{\mathfrak{X}}^2 = \int_{[0,1]^d} \Psi(t) \, dt = \text{Var} \left(\int_{[0,1]^d} \mathfrak{X}(s) \, ds \right),$$

nous notons $\mathfrak{D} = \mathfrak{D}(\mathfrak{X}) = \{\mathfrak{X}_C : C \in \mathbb{R}\}$, la classe de tous les processus gaussiens de la forme

$$(2.3) \quad \mathfrak{X}_C(t) := \mathfrak{X}(t) - \frac{C \Psi(t)}{\sigma_{\mathfrak{X}}^2} \int_{[0,1]^d} \mathfrak{X}(s) \, ds, \quad \text{pour } t \in [0, 1]^d,$$

où $C \in \mathbb{R}$ est une constante. Les processus gaussiens de cette forme sont appelés *processus gaussiens centrés sur une moyenne*.

$\mathfrak{E} = \mathfrak{E}(\mathfrak{X}) = \{\lambda \mathfrak{X}_C : \lambda \in \mathbb{R}, C \in \mathbb{R}\}$ coïncide avec l'espace vectoriel engendré par \mathfrak{D} . Pour chaque $C \in \mathbb{R}$, nous définissons une application linéaire $J_C : \mathfrak{Y} \in \mathfrak{E} \rightarrow \mathfrak{Y}_C \in \mathfrak{E}$ de \mathfrak{E} sur lui, même par $\mathfrak{Y} \in \mathfrak{E}$,

$$(2.4) J_C \mathfrak{Y}(t) = \mathfrak{Y}_C(t) = \mathfrak{Y}(t) - \frac{C}{\sigma_{\mathfrak{Y}}^2} \int_{[0,1]^d} \mathfrak{Y}(s) ds, \text{ pour } t \in [0,1]^d.$$

Les propriétés de $\{J_C : C \in \mathbb{R}\}$ sont précisées dans le lemme suivant. Nous désignons par $f \circ g = f(g)$ la composition de g par f , et par f^{-1} , l'élément inverse de f (quand il existe).

Lemme 2.1. *Nous avons les identités suivantes. Pour chaque $A, B, C \in \mathbb{R}$,*

$$(2.5) \quad J_A \circ J_B = J_A \circ J_B = J_{A+B-AB};$$

$$(2.6) \quad J_A \circ (J_B \circ J_C) = (J_A \circ J_B) \circ J_C = J_{A+B+C-AB-AC-BC+ABC};$$

$$(2.7) \quad J_0 \circ J_A = J_A \circ J_0 = J_A; \quad J_A \circ J_B = J_1 \iff A = 1 \text{ ou } B = 1;$$

$$(2.8) \quad J_1 \circ J_A = J_A \circ J_1 = J_1; \quad A \neq 1 \implies J_A^{-1} = J_{A/(A-1)}$$

$$(2.9) \quad J_A + J_B = 2J_{(A+B)/2}.$$

Démonstration. Simple donc omise. \square

Le lemme 2.1 montre que $\{J_C : C \neq 1\}$ est un groupe abélien d'endomorphismes de \mathfrak{E} . Ce groupe est une représentation du groupe commutatif défini sur $\mathbb{R} - \{1\}$ par le produit interne $x * y = x + y - xy$.

Lemme 2.2. *Pour tout $C \in \mathbb{R}$, nous avons les identités en loi*

$$(2.10) \quad J_C(\mathfrak{X}_0) = \mathfrak{X}_C \stackrel{d}{=} J_C(\mathfrak{X}_2) = \mathfrak{X}_{2-C}.$$

Démonstration. Observons que

$$(2.11) \quad K_C(s, t) = \mathbb{E}(\mathfrak{X}_C(s)\mathfrak{X}_C(t)) = K(s, t) + (C^2 - 2C) \left\{ \frac{\Psi(s)\Psi(t)}{\sigma_{\mathfrak{X}}^2} \right\}.$$

La conclusion suit du fait que $(2 - C)^2 - 2(2 - C) = C^2 - 2C$, qui implique, via (2.11) que \mathfrak{X}_{2-C} et \mathfrak{X}_C ont des fonctions de covariance identiques. \square

Le lemme simple suivant jouera un rôle instrumental dans la suite.

Lemme 2.3. *Le processus gaussien $\{\mathfrak{X}_1(t) : t \in [0, 1]^d\}$ et la variable aléatoire*

$$\int_{[0,1]^d} \mathfrak{X}(s) ds \stackrel{d}{=} N(0, \sigma_{\mathfrak{X}}^2)$$

sont indépendants.

Démonstration. Nous observons que, pour chaque $t \in [0, 1]^d$,

$$\mathbb{E} \left(\mathfrak{X}_C(t) \int_{[0,1]^d} \mathfrak{X}(s) \, ds \right) = \Psi(t) - C\Psi(t),$$

qui s'annule pour $C = 1$. Ceci suffit pour nos besoins. \square

Le théorème suivant est plus ou moins direct et facile, étant donné le lemme 2.3.

Théorème 2.1. *Soit $Y \stackrel{d}{=} N(0, \sigma^2)$ qui désigne une variable aléatoire gaussienne indépendante de $\{\mathfrak{X}(t) : t \in [0, 1]^d\}$. Alors, pour chaque $C \in \mathbb{R}$, nous avons l'égalité distributionnelle*

$$(2.12) \quad \left\{ \mathfrak{X}_C(t) + \Psi(t)Y : t \in [0, 1]^d \right\} \stackrel{d}{=} \left\{ \mathfrak{X}_{1 \pm \sqrt{(1-C)^2 + \sigma^2 \sigma_{\mathfrak{X}}^2}}(t) : t \in [0, 1]^d \right\}.$$

Démonstration. Nous utilisons la décomposition

$$\mathfrak{X}_C(t) + \Psi(t)Y = \mathfrak{X}_1(t) + \frac{\Psi(t)}{\sigma_{\mathfrak{X}}^2} \left\{ Y\sigma_{\mathfrak{X}}^2 + (1-C) \int_{[0,1]^d} \mathfrak{X}(s) \, ds \right\} =: \mathfrak{X}_1(t) + \frac{\Psi(t)}{\sigma_{\mathfrak{X}}^2} Z,$$

où compte tenu de (2.2) et du lemme 2.3, Z est une v.a. normale centrée, indépendante de $\mathfrak{X}_1(\cdot)$, avec une distribution donnée par

$$Z \stackrel{d}{=} -Z \stackrel{d}{=} N \left(0, \sigma_{\mathfrak{X}}^2 \left\{ (1-C)^2 + \sigma^2 \sigma_{\mathfrak{X}}^2 \right\} \right) \stackrel{d}{=} \pm \sqrt{(1-C)^2 + \sigma^2 \sigma_{\mathfrak{X}}^2} \int_{[0,1]^d} \mathfrak{X}(s) \, ds.$$

Ceci à son tour, implique les relations

$$\begin{aligned} \mathfrak{X}_C(t) + \Psi(t)Y &= \mathfrak{X}_1(t) + \frac{\Psi(t)}{\sigma_{\mathfrak{X}}^2} Z \\ &\stackrel{d}{=} \mathfrak{X}_1(t) \pm \frac{\Psi(t)}{\sigma_{\mathfrak{X}}^2} \sqrt{(1-C)^2 + \sigma^2 \sigma_{\mathfrak{X}}^2} \int_{[0,1]^d} \mathfrak{X}(s) \, ds \\ &= \mathfrak{X}(t) - \frac{\Psi(t)}{\sigma_{\mathfrak{X}}^2} \left\{ 1 \pm \sqrt{(1-C)^2 + \sigma^2 \sigma_{\mathfrak{X}}^2} \right\} \int_{[0,1]^d} \mathfrak{X}(s) \, ds, \end{aligned}$$

ce qui donne (2.12), comme voulu. \square

Le corollaire suivant du théorème 2.1 est d'un intérêt en soi.

Corollaire 2.1. *Nous avons l'identité distributionnelle*

$$(2.13) \quad \left\{ \mathfrak{X}(t) : t \in [0, 1]^d \right\} \stackrel{d}{=} \left\{ \mathfrak{X}(t) - \frac{2\Psi(t)}{\sigma_{\mathfrak{X}}^2} \int_{[0,1]^d} \mathfrak{X}(s) \, ds : t \in [0, 1]^d \right\}.$$

Démonstration. En posant $C = 0$ et $\sigma^2 = 0$ dans (2.12), nous obtenons que $\mathfrak{X}(\cdot) = \mathfrak{X}_0(\cdot) \stackrel{d}{=} \mathfrak{X}_2(\cdot)$ qui est (2.13). Cette égalité suit aussi de (2.10), pris avec $C = 0$. \square

Remarque 2.1. Dans le présent article, nous serons principalement concernés avec le cas, où, pour un entier $m \geq 1$ fixé, $\mathfrak{X}(\cdot) = B(H_m(\cdot))$ est un pont Brownien, H_m est la f.r. de la loi $\beta_{m,m}$, définie, pour $0 \leq x \leq 1$, par

$$\begin{aligned}
(2.14) \quad H_m(x) &:= \frac{\Gamma(2m)}{(\Gamma(m))^2} \int_0^x (1-t)^{m-1} t^{m-1} dt \\
&= \sum_{j=m}^{2m-1} \frac{(2m-1)!}{j!(2m-1-j)!} x^j (1-x)^{2m-1-j} \\
&= 1 - \sum_{j=0}^{m-1} \frac{(2m-1)!}{j!(2m-1-j)!} x^j (1-x)^{2m-1-j},
\end{aligned}$$

et $d = 1$, car si X' est une variable aléatoire qui suit une loi $\beta_{a,b}$, avec $a, b > 0$, alors sa fonction de répartition, la fonction béta régularisée $I_t(a, b)$ est définie, pour tout $0 \leq t \leq 1$, par

$$\begin{aligned}
(2.15) \quad I_t(a, b) &= \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_0^t x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx = \frac{B(t; a, b)}{B(a, b)} \\
&= \sum_{j=a}^{a+b-1} \frac{(a+b-1)!}{j!(a+b-1-j)!} t^j (1-t)^{a+b-1-j} \\
&= 1 - \sum_{j=0}^{a-1} \frac{(a+b-1)!}{j!(a+b-1-j)!} t^j (1-t)^{a+b-1-j},
\end{aligned}$$

où $B(t; a, b)$ est la fonction béta incomplète définie, pour tout $0 \leq t \leq 1$, par

$$B(t; a, b) = \int_0^t x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx \quad \text{où } B(1; a, b) = B(a, b).$$

On a, alors dans ce cas,

$$K(s, t) = \mathbb{E}(B(H_m(s))B(H_m(t))) = H_m(s) \wedge H_m(t) - H_m(s)H_m(t),$$

pour $0 \leq s, t \leq 1$, afin que, pour tout $t \in]0, 1[$,

$$\begin{aligned}
\Psi(t) &= \int_{[0,1]} K(s, t) ds = \int_{[0,1]} \mathbb{E}(B(H_m(s))B(H_m(t))) ds \\
&= \int_0^1 \{H_m(s) \wedge H_m(t) - H_m(s)H_m(t)\} ds \\
&= \int_0^1 \{H_m(s \wedge t) - H_m(s)H_m(t)\} ds.
\end{aligned}$$

Soit $U' \stackrel{d}{=} \mathcal{U}(0, 1)$ et posons

$$W' = \int_0^1 \left(H_m(s) - \mathbb{I}_{\{U' \leq H_m(s)\}} \right) ds \quad \text{et pour tout } t \in [0, 1],$$

$$V' = H_m(t) - \mathbb{I}_{\{U' \leq H_m(t)\}}.$$

Notons que

$$W' = H_m^{-1}(U') - \mathbb{E}H_m^{-1}(U') \quad \text{et pour tout } t \in [0, 1],$$

$$V' = H_m(t) - \mathbb{I}_{\{H_m^{-1}(U') \leq t\}}.$$

Nous voyons facilement que, pour tout $t \in (0, 1)$,

$$\Psi(t) = \text{Cov}(W', V') = -\mathbb{E}H_m^{-1}(U')\mathbb{I}_{\{H_m^{-1}(U') \leq t\}} + \mathbb{E}H_m^{-1}(U')\mathbb{E}\mathbb{I}_{\{H_m^{-1}(U') \leq t\}}.$$

Or $H_m^{-1}(U') \stackrel{d}{=} \beta_{m,m}$, donc, on a,

$$(2.16) \quad \begin{aligned} \Psi(t) &= \text{Cov}(W', V') \\ &= -\mathbb{E}H_m^{-1}(U')\mathbb{I}_{\{H_m^{-1}(U') \leq t\}} + \mathbb{E}H_m^{-1}(U')\mathbb{E}\mathbb{I}_{\{H_m^{-1}(U') \leq t\}} \\ &= -\frac{1}{B(m, m)} \int_0^t x^{m+1-1}(1-x)^{m-1} dx \\ &\quad + \frac{H_m(t)}{B(m, m)} \int_0^1 x^{m+1-1}(1-x)^{m-1} dx \\ &= \frac{B(m+1, m)}{B(m, m)} \left(-\frac{1}{B(m+1, m)} \int_0^t x^{m+1-1}(1-x)^{m-1} dx + H_m(t) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(-\sum_{j=m+1}^{2m} \frac{(2m)!}{j!(2m-j)!} t^j (1-t)^{2m-j} \right. \\ &\quad \left. + \sum_{j=m}^{2m-1} \frac{(2m-1)!}{j!(2m-1-j)!} t^j (1-t)^{2m-1-j} \right) \\ &= \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} (t(1-t))^m, \end{aligned}$$

et

$$(2.17) \quad \begin{aligned} \sigma_{\tilde{x}}^2 &= \sigma_{B \circ H_m}^2 \\ &= \text{Var} \left(\int_0^1 B(H_m(x)) dx \right) = \mathbb{E} \left(\int_0^1 B(H_m(x)) dx \int_0^1 B(H_m(y)) dy \right) \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \mathbb{E}(B(H_m(x))B(H_m(y))) dx dy \\ &= \int_0^1 \int_0^1 (H_m(x) \wedge H_m(y) - H_m(x)H_m(y)) dx dy \\ &= \int_0^1 \int_0^1 (H_m(x \wedge y) - H_m(x)H_m(y)) dx dy = \text{Var}(Y') = \frac{1}{4(2m+1)}, \end{aligned}$$

où Y' est une v.a. de loi $\beta_{m,m}$, c'est-à-dire $Y' \stackrel{d}{=} \beta_{m,m}$.

Nous obtenons aussi comme un cas particulier de (2.13), l'identité distributionnelle inattendue (voir par exemple, (1.3), dans [12, p. 1190])

$$(2.18) \quad \left\{ (B \circ H_m)(t) : 0 \leq t \leq 1 \right\} \\ \stackrel{d}{=} \left\{ (B \circ H_m)(t) - 4(2m+1) \frac{(2m-1)!}{m((m-1)!)^2} (t(1-t))^m \right. \\ \left. \times \int_0^1 B(H_m(s)) ds : 0 \leq t \leq 1 \right\}.$$

De plus, le lemme 2.3 implique l'indépendance de

$$(2.19) \quad \left\{ (B \circ H_m)(t) - 4(2m+1) \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} (t(1-t))^m \right. \\ \left. \times \int_0^1 B(H_m(s)) ds : 0 \leq t \leq 1 \right\} \quad \text{et} \quad \left\{ (B \circ H_m)(t) : 0 \leq t \leq 1 \right\}.$$

Posons en accord avec (2.3), (2.14) et (2.16), pris avec $\mathfrak{X} = B \circ H_m$ et $d = 1$,

$$(2.20) \quad (B \circ H_m)_C(t) = B(H_m(t)) \\ - 2(2m+1)C \frac{(2m-1)!}{m((m-1)!)^2} (t(1-t))^m \int_0^1 B(H_m(s)) ds,$$

pour $0 \leq t \leq 1$.

Compte tenu de (2.19), nous voyons que

$$(2.21) \quad \mathbb{E}((B \circ H_m)_C(s)(B \circ H_m)_C(t)) \\ = H_m(s) \wedge H_m(t) - H_m(s)H_m(t) \\ + 4(2m+1)(C^2 - 2C) \frac{((2m-1)!)^2}{(2m((m-1)!)^2)^2} (st(1-s)(1-t))^m,$$

pour $0 \leq s, t \leq 1$.

3 Le Processus empirique de base

3.1 Un théorème d'approximation forte

Dans ce qui suit, nous construisons, sur le même espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, une suite $\{(\zeta_{\ell,N}, \xi_{\ell,N}) : \ell \geq 1\}$, $N = 1, 2, \dots$, de répliques indépendantes et idem-distribuées [i.i.d.] d'un vecteur aléatoire bivarié (ζ, ξ) , où ζ et ξ sont des v.a. indépendantes de loi exponentielle de moyenne 1. Cette loi est désignée par la suite par $\Gamma(1)$, et nous notons ceci $\zeta \stackrel{d}{=} \xi \stackrel{d}{=} \Gamma(1)$. Nous considérons

ensuite une suite de vecteurs $\left\{ \left(Z_{k,N}, Z'_{k,N} \right) : k \geq 0 \right\}$, $N = 1, 2, \dots$, telle que, pour tout $k \geq 0$,

$$(3.1) \quad Z_{k,N} := \sum_{\ell=k+1}^{(k+1)m} \zeta_{\ell,N} \quad \text{et} \quad Z'_{k,N} := \sum_{\ell=k+1}^{(k+1)m} \xi_{\ell,N}.$$

Cette définition implique que, pour tout $k \geq 0$, $(Z_{k,N}, Z'_{k,N}) \stackrel{d}{=} (Z, Z')$, où $Z := Z_{0,N}$ et $Z' := Z'_{0,N}$ sont indépendantes et de même loi $\Gamma(m, 1)$. Cette dernière propriété est notée $Z \stackrel{d}{=} Z' \stackrel{d}{=} \Gamma(m, 1)$. La fonction de répartition [f.r.] jointe de Z et Z' est donc donnée par

$$(3.2) \quad P(Z \leq x, Z' \leq y) = G_1^{(m)}(x)G_1^{(m)}(y), \quad \text{pour } x, y \in \mathbb{R},$$

où, pour $x \geq 0$, la f.r. de la loi $\Gamma(m, 1)$ est donnée par

$$(3.3) \quad G_1^{(m)}(x) := \frac{1}{\Gamma(m)} \int_0^x t^{m-1} e^{-t} dt = 1 - e^{-x} \sum_{j=0}^{m-1} \frac{x^j}{j!}.$$

Désignons, respectivement, la f.r. de la loi $\beta_{m,m}$, pour $0 \leq x \leq 1$, par

$$(3.4) \quad \begin{aligned} G_3^{(m)}(x) &:= \frac{\Gamma(2m)}{(\Gamma(m))^2} \int_0^x (1-t)^{m-1} t^{m-1} dt \\ &= \sum_{j=m}^{2m-1} \frac{(2m-1)!}{j!(2m-1-j)!} x^j (1-x)^{2m-1-j} \\ &= 1 - \sum_{j=0}^{m-1} \frac{(2m-1)!}{j!(2m-1-j)!} x^j (1-x)^{2m-1-j}, \end{aligned}$$

et la f.r. de la loi $\Gamma(2m, 1)$, pour $x \geq 0$, par

$$(3.5) \quad G_2^{(m)}(x) := \frac{1}{\Gamma(2m)} \int_0^x t^{2m-1} e^{-t} dt = 1 - e^{-x} \sum_{j=0}^{2m-1} \frac{x^j}{j!}.$$

Désignons, respectivement, les fonctions de quantiles des lois $\beta_{m,m}$ et $\Gamma(2m, 1)$, pour $0 < u, v < 1$, par

$$\begin{aligned} Q_3^{(m)}(u) &= \inf\{x \geq 0 : G_3^{(m)}(x) \geq u\}, \\ Q_2^{(m)}(v) &= \inf\{x \geq 0 : G_2^{(m)}(x) \geq v\}. \end{aligned}$$

Compte tenu de (3.4) et (3.5), on a, les relations réciproques

$$(3.6) \quad G_3^{(m)}\left(Q_3^{(m)}(v)\right) = v, \quad \text{pour } 0 < v < 1,$$

$$(3.7) \quad G_2^{(m)}\left(Q_2^{(m)}(w)\right) = w, \quad \text{pour } 0 < w < 1,$$

et

$$(3.8) \quad Q_3^{(m)}(G_3^{(m)}(y)) = y, \text{ pour } 0 < y < 1,$$

$$(3.9) \quad Q_2^{(m)}(G_2^{(m)}(y)) = y, \text{ pour } y \geq 0.$$

Désignons les densités des lois $\beta_{m,m}$ et $\Gamma(2m, 1)$, par

$$(3.10) \quad g_3^{(m)}(y) = \frac{d}{dy} G_3^{(m)}(y) = \frac{1}{\beta(m, m)}(1-y)^{m-1}y^{m-1}, \text{ pour } 0 < y < 1,$$

$$(3.11) \quad g_2^{(m)}(x) = \frac{d}{dx} G_2^{(m)}(x) = \frac{1}{\Gamma(2m)}x^{2m-1}e^{-x}, \text{ pour } x > 0.$$

On déduit de (3.5), (3.7), (3.6) et (3.9) que les densités de quantile $q_3^{(m)}(v) = \frac{d}{dv}Q_3^{(m)}(v)$ et $q_2^{(m)}(w) = \frac{d}{dw}Q_2^{(m)}(w)$ sont continues en $v \in (0, 1)$ et $w \in (0, 1)$, et telles que, pour $0 < v, w < 1$,

$$(3.12) \quad q_3^{(m)}(v) = \frac{d}{dv} Q_3^{(m)}(v) = \frac{1}{g_3^{(m)}(Q_3^{(m)}(v))} \in (0, \infty),$$

$$(3.13) \quad q_2^{(m)}(w) = \frac{d}{dw} Q_2^{(m)}(w) = \frac{1}{g_2^{(m)}(Q_2^{(m)}(w))} \in (0, \infty).$$

Notons aussi que,

$$(3.14) \quad \beta(m, m) = \frac{\Gamma(m)^2}{\Gamma(2m)} = \frac{\{(m-1)!\}^2}{(2m-1)!} = \frac{m!m!2m}{m^2(2m)!} = \frac{2^{1-2m}m!}{m\left(\frac{1}{2}\right)_m},$$

relation dans laquelle nous avons fait usage du symbole de Pochhammer

$$(a)_m = \frac{\Gamma(a+m)}{\Gamma(a)} = a \times (a+1) \times \dots \times (a+m-1).$$

Comme la loi $\beta_{m,m}$ est symétrique par rapport à $1/2$, on a,

$$(3.15) \quad g_3^{(m)}(1-y) = g_3^{(m)}(y), \text{ pour } 0 < y < 1,$$

et donc, pour $0 < y < 1$, $G_3^{(m)}(y) = 1 - G_3^{(m)}(1-y)$, et pour $0 < v < 1$, $Q_3^{(m)}(v) = 1 - Q_3^{(m)}(1-v)$, de sorte que

$$(3.16) \quad q_3^{(m)}(v) = q_3^{(m)}(1-v), \text{ pour } 0 < v < 1.$$

La proposition suivante décrivant le comportement asymptotique de $q_3^{(m)}(v)$ et $Q_3^{(m)}(v)$ lorsque $v \downarrow 0$ ou $v \uparrow 1$, ainsi que celui de $q_2^{(m)}(w)$ et $Q_2^{(m)}(w)$ lorsque $w \downarrow 0$ ou $w \uparrow 1$, sera utile par la suite.

Proposition 3.1. *Nous avons*

$$(3.17) \quad q_3^{(m)}(v) = \frac{1}{m} \left\{ \frac{\left(\frac{1}{2}\right)_m}{2^{1-2m}m!} \right\}^{-1/m} v^{1/m-1} (1 + o(1)), \quad v \downarrow 0,$$

$$(3.18) \quad q_3^{(m)}(v) = \frac{1}{m} \left\{ \frac{\left(\frac{1}{2}\right)_m}{2^{1-2m}m!} \right\}^{-1/m} (1-v)^{1/m-1} (1 + o(1)), \quad v \uparrow 1,$$

$$(3.19) \quad q_2^{(m)}(w) = \frac{1 + o(1)}{2m} \{\Gamma(2m + 1)\}^{1/(2m)} w^{1/(2m)-1}, \quad w \downarrow 0$$

$$(3.20) \quad q_2^{(m)}(w) = \frac{1 + o(1)}{1 - w}, \quad w \uparrow 1,$$

ainsi que

$$(3.21) \quad Q_3^{(m)}(v) = \left\{ \frac{\left(\frac{1}{2}\right)_m}{2^{1-2m}m!} \right\}^{-1/m} (1 + o(1))v^{1/m}, \quad v \downarrow 0,$$

$$(3.22) \quad Q_3^{(m)}(v) = 1 - \left\{ \frac{\left(\frac{1}{2}\right)_m}{2^{1-2m}m!} \right\}^{-1/m} (1 + o(1)) (1 - v)^{1/m}, \quad v \uparrow 1.$$

$$(3.23) \quad Q_2^{(m)}(w) = \{\Gamma(2m + 1)\}^{1/(2m)} (1 + o(1)) w^{1/(2m)}, \quad w \downarrow 0,$$

$$(3.24) \quad Q_2^{(m)}(w) = \int_0^w q_2^{(m)}(s) ds = (1 + o(1)) \{-\log(1 - w)\}, \quad w \uparrow 1.$$

Démonstration. Par (3.10), on obtient que, lorsque $y \downarrow 0$,

$$(3.25) \quad \begin{aligned} g_3^{(m)}(y) &= \frac{1}{\beta(m, m)} \left\{ y^{m-1} - \binom{m-1}{1} y^m + \dots \right. \\ &\quad \left. + (-1)^{m-1} \binom{m-1}{m-1} y^{2m-2} \right\} = \left\{ \frac{m \left(\frac{1}{2}\right)_m}{2^{1-2m}m!} \right\} y^{m-1} (1 + o(1)). \end{aligned}$$

Par conséquent, on a, lorsque $y \downarrow 0$,

$$G_3^{(m)}(y) = \left\{ \frac{\left(\frac{1}{2}\right)_m}{2^{1-2m}m!} \right\} y^m (1 + o(1)).$$

En posant $y = Q_3^{(m)}(u)$ dans cette relation, nous voyons que, lorsque $u \downarrow 0$, $Q_3^{(m)}(u) \downarrow 0$, et

$$G_3^{(m)}(Q_3^{(m)}(u)) = u = \left\{ \frac{\left(\frac{1}{2}\right)_m}{2^{1-2m}m!} \right\} \left(Q_3^{(m)}(u) \right)^m (1 + o(1)).$$

On en déduit (3.21). En appliquant à (3.21), les relations (3.12) et (3.25), on

obtient que, lorsque $u \downarrow 0$,

$$\begin{aligned} q_3^{(m)}(u) &= \frac{1}{g_3^{(m)}(Q_3^{(m)}(u))} \\ &= \left\{ \frac{2^{1-2m}m!}{m \left(\frac{1}{2}\right)_m} \right\} \left(\left\{ \frac{\left(\frac{1}{2}\right)_m}{2^{1-2m}m!} \right\}^{-1/m} u^{1/m} \right)^{1-m} (1 + o(1)). \end{aligned}$$

On en déduit (3.17). En posant $u = 1 - v$ dans (3.17), on obtient que, lorsque $v \rightarrow 1$,

$$q_3^{(m)}(1 - v) = \frac{1}{m} \left\{ \frac{\left(\frac{1}{2}\right)_m}{2^{1-2m}m!} \right\}^{-1/m} (1 - v)^{1/m-1} (1 + o(1)).$$

Ceci, via (3.16), établit (3.18). Par ailleurs, en posant $u = 1 - v$ dans (3.21), on obtient que, lorsque $v \rightarrow 1$,

$$Q_3^{(m)}(1 - v) = \left\{ \frac{\left(\frac{1}{2}\right)_m}{2^{1-2m}m!} \right\}^{-1/m} (1 - v)^{1/m} (1 + o(1)).$$

Ceci, via (3.16), établit (3.22). Par (3.7) et compte tenu de l'expression de la densité $g_2^{(m)}$, on obtient que, lorsque $s \rightarrow \infty$,

$$1 - G_2^{(m)}(s) = \left\{ 1 + \sum_{j=1}^{2m-1} \frac{(2m-1)!}{(2m-1-j)!s^j} \right\} g_2^{(m)}(s) = (1 + o(1)) g_2^{(m)}(s).$$

En posant $s = Q_2^{(m)}(t)$ dans cette relation, nous voyons que, lorsque $t \uparrow 1$, $Q_2^{(m)}(t) \uparrow \infty$, et $1 - G_2^{(m)}(Q_2^{(m)}(t)) = 1 - t = (1 + o(1)) g_2^{(m)}(Q_2^{(m)}(t))$. Compte tenu de (3.13), ceci suffit pour justifier (3.20). Par (3.7) et l'expression de la densité $g_2^{(m)}$, un développement de Taylor de $G_2^{(m)}(s)$ dans un voisinage à droite de 0 montre que, lorsque $s \downarrow 0$,

$$\begin{aligned} G_2^{(m)}(s) &= 1 - e^{-s} \left(1 + \sum_{j=1}^{2m-1} \frac{s^j}{j!} \right) \\ &= 1 - \left(1 + \sum_{k=1}^{2m} \frac{(-1)^k s^k}{k!} + o(s^{2m}) \right) \left(1 + \sum_{j=1}^{2m-1} \frac{s^j}{j!} \right) \\ &= (1 + o(1)) \frac{s^{2m}}{\Gamma(2m+1)}, \end{aligned}$$

et

$$(3.26) \quad g_2^{(m)}(s) = \frac{1}{\Gamma(2m)} (1 + o(1)) s^{2m-1}.$$

Ceci implique que, lorsque $t \downarrow 0$, $Q_2^{(m)}(t) \downarrow 0$ et

$$G_2^{(m)}\left(Q_2^{(m)}(t)\right) = t = (1 + o(1)) \frac{\left(Q_2^{(m)}(t)\right)^{2m}}{\Gamma(2m + 1)}.$$

On en déduit (3.23). De plus, en appliquant à (3.23), les relations (3.13) et (3.26), on obtient que, lorsque $u \downarrow 0$,

$$q_2^{(m)}(t) = \frac{1}{g_2^{(m)}(Q_2^{(m)}(t))} = (1 + o(1))\Gamma(2m) \left\{ \left\{ \Gamma(2m + 1) \right\}^{1/(2m)} t^{1/(2m)} \right\}^{1-2m}.$$

On en déduit (3.19). Finalement, nous voyons que, lorsque $t \uparrow 1$,

$$\begin{aligned} -\log(1 - t) &= -\log \left\{ 1 - G_2^{(m)}\left(Q_2^{(m)}(t)\right) \right\} \\ &= -\log \left\{ \left(1 + \sum_{j=1}^{2m-1} \frac{\left(Q_2^{(m)}(t)\right)^j}{j!} \right) e^{-Q_2^{(m)}(t)} \right\} \\ &= Q_2^{(m)}(t) - \log \left(1 + \sum_{j=1}^{2m-1} \frac{\left(Q_2^{(m)}(t)\right)^j}{j!} \right) = (1 + o(1)) Q_2^{(m)}(t), \end{aligned}$$

qui complète la démonstration de (3.24). \square

En se rappelant de la définition (3.1) de la suite i.i.d. de vecteurs $\left\{ \left(Z_{k,N}, Z'_{k,N} \right) : k \geq 0, N \geq 1 \right\}$, ainsi que Z et Z' , nous introduisons la paire aléatoire (R, T) et une suite i.i.d. $\left\{ (R_{k,N}, T_{k,N}) : k \geq 0, N \geq 1 \right\}$, de répliques indépendantes de (R, T) , en posant

$$(3.27) \quad R = \frac{Z}{Z + Z'}, \quad T = Z + Z', \quad \text{et}$$

$$(3.28) \quad R_{k,N} = \frac{Z_{k,N}}{Z_{k,N} + Z'_{k,N}}, \quad T_{k,N} = Z_{k,N} + Z'_{k,N}, \quad \text{pour } k \geq 0 \text{ et } N \geq 1.$$

Les variables R, T dans (3.27) (de même que $R_{k,N}, T_{k,N}$ dans (3.28)) sont indépendantes, respectivement, de lois $\beta_{m,m}$ et $\Gamma(2m, 1)$. Cette relation est notée $R \stackrel{d}{=} \beta_{m,m}$ et $T \stackrel{d}{=} \Gamma(2m, 1)$. La loi jointe de R, T est donc donnée par

$$(3.29) \quad P(R \leq v, T \leq y) = G_3^{(m)}(v) G_2^{(m)}(y), \quad \text{pour } v, y \in \mathbb{R},$$

où $G_3^{(m)}(\cdot)$ et $G_2^{(m)}(\cdot)$ sont définies par (3.4) et (3.5). Compte tenu de la transformation de quantiles (voir le théorème 1, pp. 3-4 de Shorack et Wellner[26]), nous posons, pour $k \geq 0$ et $N \geq 1$,

$$(3.30) \quad V = G_3^{(m)}(R) \quad \text{et} \quad V_{k,N} = G_3^{(m)}(R_{k,N}),$$

et

$$(3.31) \quad W = G_2^{(m)}(T) \text{ et } W_{k,N} = G_2^{(m)}(T_{k,N}).$$

$\{(V_{k,N}, W_{k,N}) : k \geq 0, N \geq 1\}$ définit une suite i.i.d. de répliques indépendantes de (V, W) , où $V \stackrel{d}{=} \mathcal{U}(0,1)$ et $W \stackrel{d}{=} \mathcal{U}(0,1)$ sont de loi uniforme $\mathcal{U}(0,1)$. (3.6), (3.8), (3.7), (3.9) et (3.28) impliquent que, pour tout $0 \leq k \leq N$,

$$(3.32) \quad \begin{aligned} Z_{k,N} &= R_{k,N} T_{k,N} = Q_3^{(m)}(V_{k,N}) Q_2^{(m)}(W_{k,N}) \text{ et} \\ Z'_{k,N} &= (1 - R_{k,N}) T_{k,N} = \left(1 - Q_3^{(m)}(V_{k,N})\right) Q_2^{(m)}(W_{k,N}). \end{aligned}$$

Pour $N \geq 1$, la mesure empirique basée sur $\{(V_{k,N}, W_{k,N}) : 0 \leq k \leq N\}$ est notée

$$(3.33) \quad \lambda_N(\cdot) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N \delta_{(V_{k,N}, W_{k,N})}(\cdot),$$

où $\delta_z(\cdot)$ désigne la mesure de Dirac en $z \in \mathbb{R}^2$. En dénotant par $\lambda(\cdot)$ la mesure de Lebesgue sur $[0,1]^2$, le processus empirique uniforme indexé par des ensembles est défini par

$$(3.34) \quad \alpha_N(A) := (N+1)^{1/2} (\lambda_N(A) - \lambda(A)),$$

pour chaque borélien $A \subseteq [0,1]^2$. Lorsque A est un produit d'intervalles, nous définissons la version continue à droite de la f.r. empirique bivariée basée sur $\{(V_{k,N}, W_{k,N}) : 0 \leq k \leq N\}$, en posant, pour $0 \leq v, w \leq 1$,

$$(3.35) \quad \begin{aligned} \mathbf{U}_N(v, w) &= \lambda_N([0, v] \times [0, w]) \\ &= \frac{1}{N+1} \# \{V_{k,N} \leq v, W_{k,N} \leq w : 0 \leq k \leq N\}, \end{aligned}$$

$\#E$ désignant, ici, le nombre d'éléments de E . Pour $0 \leq v, w \leq 1$, on note

$$(3.36) \quad \alpha_N(v, w) = \alpha_N([0, v] \times [0, w]) = (N+1)^{1/2} (\mathbf{U}_N(v, w) - vw),$$

la version continue à droite du processus empirique uniforme engendré par $\{(V_{k,N}, W_{k,N}) : 0 \leq k \leq N\}$. La version continue à gauche du processus empirique engendré par $\{(1 - V_{k,N}, 1 - W_{k,N}) : 0 \leq k \leq N\}$ sera notée par analogie, $\{\alpha_N^*(v, w) : 0 \leq v, w \leq 1\}$. Comme $\alpha_N(1, 1) = 0$, ce processus vérifie les relations, pour $0 \leq u, v \leq 1$,

$$(3.37) \quad \begin{aligned} \alpha_N^*(1 - v, 1 - w) &= \alpha_N^*((v, 1] \times (w, 1]) \\ &= \alpha_N(v, w) - \alpha_N(v, 1) - \alpha_N(1, w). \end{aligned}$$

On a l'identité en loi

$$\{\alpha_N^*(s, t) : 0 \leq s, t \leq 1\} \stackrel{d}{=} \left\{ \lim_{v \uparrow s, w \uparrow t} \alpha_N(v, w) : 0 \leq s, t \leq 1 \right\}.$$

On notera que les versions continues à droite des processus empiriques marginaux

$$(3.38) \quad \alpha_{N;1}(v) := \alpha_N(v, 1), \quad \text{pour } 0 \leq v \leq 1,$$

$$(3.39) \quad \alpha_{N;2}(w) := \alpha_N(1, w), \quad \text{pour } 0 \leq w \leq 1,$$

engendrés, respectivement par $\{V_{k,N} : 0 \leq k \leq N\}$ et $\{W_{k,N} : 0 \leq k \leq N\}$, sont des processus empiriques uniformes indépendants, sur $[0, 1]$.

Nous allons étudier le comportement limite de $\{\alpha_{N;1}(v) : 0 \leq v \leq 1\}$, processus empirique engendré, par $\{V_{k,N} : 0 \leq k \leq N\}$, et des statistiques

$$(3.40) \quad \Delta_N := \bar{Z}_N - \bar{Z}'_N = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N \{Z_{k,N} - Z'_{k,N}\},$$

et

$$(3.41) \quad \begin{aligned} \Theta_N &:= \bar{Z}_N + \bar{Z}'_N - 2m = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N \{Z_{k,N} + Z'_{k,N} - 2m\} \\ &= \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N \{T_{k,N} - 2m\}. \end{aligned}$$

Nous établissons le théorème suivant qui généralise à $m \geq 1$ le théorème 3.1 de Deheuvels et Derzko [11].

Théorème 3.1. *Sous une version appropriée de $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, il existe une suite $\{(B_N(\cdot), \phi_N, \psi_N) : N \geq 1\}$ vérifiant les propriétés suivantes.*

(i) *Pour chaque $N \geq 1$, $\{B_N(v) : 0 \leq v \leq 1\}$ est un pont Brownien et $\phi_N \stackrel{d}{=} \psi_N \stackrel{d}{=} N(0, 1)$ sont deux v.a. normales standard.*

(ii) *Pour chaque $N \geq 1$, $\{B_N(v) : 0 \leq v \leq 1\}$, et les variables aléatoires ϕ_N et ψ_N sont indépendants.*

(iii) *Nous avons, lorsque $N \rightarrow \infty$,*

$$(3.42) \quad \|\alpha_{N;1} - B_N\| = \sup_{0 \leq v \leq 1} |\alpha_{N;1}(v) - B_N(v)| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^2}{\sqrt{N}} \right),$$

$$(3.43) \quad \begin{aligned} &\left| (N+1)^{1/2} \Delta_N - \phi_N \sqrt{\frac{2m}{2m+1}} + 4m \int_0^1 B_N(G_3^{(m)}(x)) \, dx \right| \\ &= O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^3}{\sqrt{N}} \right), \end{aligned}$$

et

$$(3.44) \quad \left| (N+1)^{1/2} \Theta_N - \psi_N \sqrt{2m} \right| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^3}{\sqrt{N}} \right).$$

Démonstration. La démonstration du théorème 3.1 est reportée au paragraphe 4.6. Les ingrédients de base nécessaires pour cette preuve sont donnés dans les paragraphes 3.2, 3.3 et dans le paragraphe 4 ci-dessous.

3.2 Décompositions du processus empirique

La première étape dans la description de $\alpha_{N:1}(\cdot)$, Δ_N et Θ_N , définis par (3.38), (3.40) et (3.41), est fournie par les propositions 3.2 et 3.3 suivantes, qui généralisent au cas $m \geq 1$ les propositions 3.1 et 3.2 de Deheuvels et Derzko [11]. Nous commençons par un lemme qui jouera un rôle important par la suite. Rappelons la définition (3.37) de $\alpha_N^*(\cdot, \cdot)$.

Lemme 3.1. *Nous avons l'égalité*

$$(3.45) \quad \int_0^1 \alpha_{N:1}(v) dv = \int_0^1 \alpha_N(v, 1) dv = - \int_0^1 \alpha_N^*(z, 1) dz.$$

Démonstration. Nous déduisons de (3.37) que $\alpha_{N:1}(v) = \alpha_N(v, 1) = -\alpha_N^*(1-v, 1)$, pour $0 \leq v \leq 1$. La conclusion suit après le changement de variables $v = 1 - z$ dans (3.45). \square

Proposition 3.2. *Nous avons les identités*

$$(3.46) \quad \begin{aligned} (N+1)^{1/2} \Delta_N &= \int \int_{[0,1]^2} \left(2 Q_3^{(m)}(s) - 1 \right) Q_2^{(m)}(t) \alpha_N(ds, dt) \\ &= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(v) q_2^{(m)}(w) \{ \alpha_N(v, w) - \alpha_N(v, 1) - \alpha_N(1, w) \} dv dw \\ &\quad + \int_0^1 q_2^{(m)}(w) \alpha_N(1, w) dw \\ &= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N^*(v, w) dv dw \\ &\quad - \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N^*(1, w) dw, \end{aligned}$$

et

$$(3.47) \quad \begin{aligned} (N+1)^{1/2} \Theta_N &= \int_0^1 Q_2^{(m)}(t) \alpha_N(1, dt) \\ &= - \int_0^1 q_2^{(m)}(w) \alpha_N(1, w) dw = \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N^*(1, w) dw. \end{aligned}$$

Démonstration. Par (3.32), (3.35) et (3.40), on a,

$$(3.48) \quad \Delta_N = \int \int_{[0,1]^2} \left(2 Q_3^{(m)}(s) - 1 \right) Q_2^{(m)}(t) \mathbf{U}_N(ds, dt) =: \Delta_{N,1} + \Delta_{N,2},$$

où

$$(3.49) \quad \Delta_{N,1} := 2 \int \int_{[0,1]^2} Q_3^{(m)}(s) Q_2^{(m)}(t) \mathbf{U}_N(ds, dt),$$

et, compte tenu de (3.32) et (3.41),

$$(3.50) \quad \Delta_{N,2} := - \int_0^1 Q_2^{(m)}(t) \mathbf{U}_N(1, dt) = - \{\Theta_N + 2m\}.$$

Compte tenu de (3.12), (3.13), (3.21) et (3.23), nous appliquons le théorème de Fubini dans (3.49) pour obtenir les relations

$$(3.51) \quad \begin{aligned} \Delta_{N,1} &= 2 \int \int_{[0,1]^2} Q_3^{(m)}(s) Q_2^{(m)}(t) \mathbf{U}_N(ds, dt) \\ &= 2 \int \int_{[0,1]^2} \left\{ \int \int_{[0,1]^2} \mathbb{I}_{[0,s]}(v) q_3^{(m)}(v) \mathbb{I}_{[0,t]}(w) q_2^{(m)}(w) dv dw \right\} \mathbf{U}_N(ds, dt) \\ &= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(v) q_2^{(m)}(w) \left\{ \int \int_{[0,1]^2} \mathbb{I}_{[0,s]}(v) \mathbb{I}_{[0,t]}(w) \mathbf{U}_N(ds, dt) \right\} dv dw \\ &= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(v) q_2^{(m)}(w) \{\lambda_N((v, 1] \times (w, 1])\} dv dw \\ &= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(v) q_2^{(m)}(w) \{\mathbf{U}_N(1, 1) - \mathbf{U}_N(v, 1) \\ &\quad - \mathbf{U}_N(1, w) + \mathbf{U}_N(v, w)\} dv dw. \end{aligned}$$

Les hypothèses du théorème de Fubini exigent que la fonction $\mathbb{I}_{[0,s]}(v) q_3^{(m)}(v) \times \mathbb{I}_{[0,t]}(w) q_2^{(m)}(w)$ de $s, t, v, w \in [0, 1]$ soit intégrable sur $[0, 1]^4$, par rapport à $dv dw \mathbf{U}_N(dv, dw)$. Cette propriété découle du fait que la mesure empirique $\lambda_N = \mathbf{U}_N(dv, dw)$ s'annule sur l'intervalle $(\max_{0 \leq k \leq N} V_{k,N}, 1] \times (\max_{0 \leq k \leq N} W_{k,N}, 1]$, presque sûrement de mesure de Lebesgue positive. Les mêmes arguments, compte tenu de (3.50), donnent les relations

$$(3.52) \quad \begin{aligned} \Delta_{N,2} &= - \int_0^1 Q_2^{(m)}(t) \mathbf{U}_N(1, dt) \\ &= - \int_0^1 \left\{ \int_0^1 \mathbb{I}_{[0,t]}(w) q_2^{(m)}(w) dv \right\} \mathbf{U}_N(1, dt) \\ &= - \int_0^1 q_2^{(m)}(w) \left\{ \int_0^1 \mathbb{I}_{[0,t]}(w) \right\} \mathbf{U}_N(1, dt) dw \\ &= - \int_0^1 q_2^{(m)}(w) \{\mathbf{U}_N(1, 1) - \mathbf{U}_N(1, w)\} dw = - \{\Theta_N + 2m\}. \end{aligned}$$

Le théorème de Fubini s'applique, du fait que la mesure empirique $\mathbf{U}_N(1, dt)$ est nulle sur l'intervalle $(\max_{0 \leq k \leq N} W_{k,N}, 1]$, presque sûrement de mesure de Lebesgue positive.

En se rappelant de (3.8) (resp. (3.9)), (3.10) (resp. (3.11)) et de (3.18) (resp. (3.20)), nous faisons usage du changement de variable $w = 1 - v$ (resp. $v = 1 - w$) et $v = G_3^{(m)}(x) = 1 - \sum_{j=0}^{m-1} \frac{(2m-1)!}{j!(2m-1-j)!} x^j (1-x)^{2m-1-j}$

(resp. $w = G_2^{(m)}(x) = 1 - e^{-x} \cdot \sum_{j=0}^{2m-1} \frac{x^j}{j!}$), pour obtenir les égalités $q_3^{(m)}(v) = q_3^{(m)}(G_3^{(m)}(x)) = 1/g_3^{(m)}(x)$, $dv = g_3^{(m)}(x) dx$ et $q_3^{(m)}(v) dv = dx$ (resp. $q_2^{(m)}(w) = q_2^{(m)}(G_2^{(m)}(x)) = 1/g_2^{(m)}(x)$, $dw = g_2^{(m)}(x) dx$ et $q_2^{(m)}(w) dv = dx$), pour $0 < v < 1$ (resp. $0 < w < 1$). Ceci, à son tour, donne, via (3.4) (resp. (3.5)),

$$\begin{aligned}
(3.53) \quad \int_0^1 w q_3^{(m)}(1-w) dw &= \int_0^1 (1-v) q_3^{(m)}(v) dv = \int_0^1 (1 - G_3^{(m)}(x)) dx \\
&= \sum_{j=0}^{m-1} \frac{(2m-1)!}{j!(2m-1-j)!} \int_0^1 x^{j+1-1} (1-x)^{2m-1-j} dx \\
&= \sum_{j=0}^{m-1} \frac{(2m-1)!}{j!(2m-1-j)!} \frac{j!(2m-1-j)!}{(2m)!} = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(3.54) \quad \left(\text{resp. } \int_0^1 v q_2^{(m)}(1-v) dv &= \int_0^1 (1-w) q_2^{(m)}(w) dw = \int_0^1 (1 - G_2^{(m)}(x)) dx \right. \\
&= \int_0^\infty e^{-x} \cdot \sum_{j=0}^{2m-1} \frac{x^j}{j!} = \sum_{j=0}^{2m-1} \frac{1}{j!} \int_0^\infty e^{-x} x^j dx \\
&= \left. \sum_{j=0}^{2m-1} \frac{1}{j!} \Gamma(j+1) = 2m \right).
\end{aligned}$$

En combinant (3.51) avec (3.52), (3.53) et (3.54), nous obtenons les relations,

$$\begin{aligned}
(3.55) \quad \mathbb{E}(\Delta_{N,1}) &= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(v) q_2^{(m)}(w) \{(1-v)(1-w)\} dv dw \\
&= \int_0^1 (1-w) q_2^{(m)}(w) dw = -\mathbb{E}(\Delta_{N,2}) = 2m.
\end{aligned}$$

En combinant (3.51), (3.52) et (3.55), avec la définition (3.36) de $\alpha_N(v, w)$, nous obtenons les 2 premières égalités de (3.46). Pour prouver la dernière égalité de (3.46), nous rappelons d'abord par (3.37) que $\alpha_N^*(1-v, 1-w) = \alpha_N(v, w) - \alpha_N(v, 1) - \alpha_N(1, w)$, qui pour $v = 0$, donne $\alpha_N^*(1, 1-w) = -\alpha_N(1, w)$. Ceci à son tour, montre que

$$\begin{aligned}
(N+1)^{1/2} \Delta_N &= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(v) q_2^{(m)}(w) \alpha_N^*(1-v, 1-w) dv dw \\
&\quad - \int_0^1 q_2^{(m)}(w) \alpha_N^*(1, 1-w) dw.
\end{aligned}$$

La preuve de (3.46) est complétée en faisant les changements de variables $(v, w) \rightarrow (1 - v, 1 - w)$ dans cette dernière relation. En combinant (3.52) avec (3.55) et le changement de variables $w \rightarrow 1 - w$, nous voyons que

$$(N+1)^{1/2} \Theta_N = - \int_0^1 q_2^{(m)}(w) \alpha_N(1, w) dw = \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N(1, 1-w) dw.$$

En se rappelant de (3.37), que $\alpha_N(1, 1-w) = -\alpha_N^*(1, w)$, pour $0 \leq w \leq 1$, nous déduisons facilement (3.47) de cette relation. \square

Proposition 3.3. *Nous avons*

$$(3.56) \quad (N+1)^{1/2} \Delta_N = 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \{ \alpha_N^*(v, w) - v \alpha_N^*(1, w) \\ - w \alpha_N^*(v, 1) \} dv dw \\ + 4m \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) \alpha_N^*(v, 1) dv.$$

Démonstration. Nous récrivons (3.46) en

$$(3.57) \quad (N+1)^{1/2} \Delta_N = 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \{ \alpha_N^*(v, w) - v \alpha_N^*(1, w) \\ - w \alpha_N^*(v, 1) \} dv dw \\ + 2 \left\{ \int_0^1 v q_3^{(m)}(1-v) dv \right\} \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N^*(1, w) dw \\ + 2 \left\{ \int_0^1 w q_2^{(m)}(1-w) dw \right\} \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) \alpha_N^*(v, 1) dv \\ - \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N^*(1, w) dw,$$

où nous avons utilisé (3.53) et (3.54). Ceci donne (3.56), comme demandé. \square

Après avoir obtenu, dans les propositions 3.2 et 3.3, les représentations appropriées de $(N+1)^{1/2} \Delta_N$ et $(N+1)^{1/2} \Theta_N$ en termes de α_N et α_N^* , nous allons maintenant approcher dans le paragraphe 4.3 ces statistiques par des homologues gaussiens. Nous devons d'abord obtenir dans le paragraphe 3.3 des bornes supérieures pour les versions pondérées de ces processus empiriques. Ces préliminaires sont rendus nécessaires du fait que la fonction $q_2^{(m)}(\cdot)$ dans (3.46), (3.47) et (3.56) n'est pas bornée sur $(0, 1)$.

3.3 Processus empiriques pondérés

Dans ce sous-paragraphe, nous allons prouver certains résultats techniques, indiqués dans les lemmes 3.2 et 3.3 ci-dessous. Ces lemmes joueront un rôle crucial dans la preuve de la prochaine proposition 4.4, donnée plus tard, dans le

sous-paragraphe 4.6. La notation suivante sera nécessaire. Posons, pour chaque $N \geq 1$,

$$(3.58) \quad I'_N := \int_0^1 \int_0^{1/N} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N^*(v, w) \, dv dw,$$

et

$$(3.59) \quad K'_N := \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N^*(1, w) \, dw.$$

Nous obtiendrons des limites de bornes supérieures pour $|I'_N|$ et $|K'_N|$. Vers ce but, et compte tenu de (3.35), nous introduisons la version continue à droite de la f.r. empirique basée sur la suite $\{(V_{k,1}, W_{k,1}) : 0 \leq k \leq N\}$, de vecteurs aléatoires i.i.d. avec des lois uniformes sur $[0, 1]^2$. Cette f.r. empirique est définie, pour $0 \leq v, w \leq 1$, par

$$(3.60) \quad U_N^{[s]}(v, w) = \frac{1}{N+1} \# \{V_{k,1} \leq v, W_{k,1} \leq w : 0 \leq k \leq N\}.$$

Le processus empirique correspondant est défini, pour $0 \leq v, w \leq 1$, par

$$(3.61) \quad \alpha_N^{[s]}(v, w) = (N+1)^{1/2} \left(U_N^{[s]}(v, w) - vw \right).$$

Nos arguments dépendront du fait 1 suivant. Nous notons que, dans ce fait, la relation (3.62) est une conséquence du corollaire 2 de Einmahl et Mason[18], pris avec $\nu = \frac{1}{2}$ et $d = 2$, alors que la relation (3.63) est due à Csáki[5, 6].

Fait 1. *Nous avons,*

$$(3.62) \quad \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\log \log N} \log \left\{ \sup_{0 < v, w \leq 1} \left| \frac{\alpha_N^{[s]}(v, w)}{\sqrt{vw(1-vw)}} \right| \right\} = 1 \quad p.s.$$

et

$$(3.63) \quad \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\log \log N} \log \left\{ \sup_{0 < w \leq 1} \left| \frac{\alpha_N^{[s]}(1, w)}{\sqrt{w(1-w)}} \right| \right\} = \frac{1}{2} \quad p.s.$$

Lemme 3.2. *Pour chaque $\varepsilon > 0$, nous avons, lorsque $N \rightarrow \infty$,*

$$(3.64) \quad |I'_N| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^{1+\varepsilon}}{\sqrt{N}} \right).$$

Démonstration. Par le fait 1, pour chaque $C_0 > 0$ et $\varepsilon > 0$, il existe un $N_0 < \infty$ p.s., tel que, pour tout $N \geq N_0$ et $0 < v, w \leq 1$,

$$(3.65) \quad \left| \alpha_N^{[s]}(v, w) \right| \leq C_0 (\log N)^{1+\varepsilon} \sqrt{vw}.$$

En se rappelant de la définition (3.58) de I'_N , nous observons que

$$I'_N \stackrel{d}{=} I_N^{[s]} := \int_0^1 \int_0^{1/N} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N^{[s]}(v, w) dv dw.$$

Comme suit de (3.65), nous avons, pour tout $N \geq N_0$,

$$(3.66) \quad \left| I_N^{[s]} \right| \leq C_0 (\log n)^{1+\varepsilon} \int_0^1 \int_0^{1/N} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \sqrt{vw} dv dw.$$

En se rappelant de (3.20), que $q_2^{(m)}(1-w) = \frac{1+o(1)}{w}$ lorsque $w \downarrow 0$, nous déduisons de (3.66) que, pour chaque $1 < C_0 < C_1 < \infty$, il existe un $N_1 \geq N_0$, tel que, pour tout $N \geq N_1$,

$$\left| I_N^{[s]} \right| \leq C_1 (\log N)^{1+\varepsilon} \left\{ \int_0^1 \sqrt{v} q_3^{(m)}(1-v) dv \right\} \int_0^{1/N} \frac{dw}{\sqrt{w}}.$$

Or $v \mapsto q_3^{(m)}(1-v)$ est bornée sur $(0, 1)$. De plus,

$$(3.67) \quad \forall v \in (0, 1), \quad 0 < q_3^{(m)}(1-v) < 1,$$

d'où,

$$\left| I_N^{[s]} \right| \leq C_1 (\log n)^{1+\varepsilon} \sup_{0 < v < 1} q_3^{(m)}(1-v) \left\{ \int_0^1 \sqrt{v} dv \right\} \int_0^{1/N} \frac{dw}{\sqrt{w}} = \frac{4}{3} C_1 \frac{(\log N)^{1+\varepsilon}}{\sqrt{N}}.$$

Ceci, avec le fait que la convergence presque sûre implique la convergence en probabilité, implique que lorsque $N \rightarrow \infty$ $\left| I_N^{[s]} \right| = O_{\mathbb{P}} \left(N^{-1/2} (\log N)^{1+\varepsilon} \right)$.

Puisque $I'_N \stackrel{d}{=} I_N^{[s]}$, ceci implique (3.64). \square

Lemme 3.3. *Pour chaque $\varepsilon > 0$, nous avons, lorsque $N \rightarrow \infty$,*

$$(3.68) \quad |K'_N| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^{1/2 + \varepsilon}}{\sqrt{N}} \right).$$

Démonstration. En se rappelant de la définition (3.59) de K'_N , nous observons que

$$(3.69) \quad K'_N \stackrel{d}{=} K_N^{[s]} := \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N^{[s]}(1, w) dw.$$

Par (3.63) dans le fait 1, pour chaque $C_2 > 0$ et $\varepsilon > 0$, il existe un $N_2 < \infty$ p.s., tel que, pour tout $N \geq N_2$ et $0 \leq w \leq 1$,

$$(3.70) \quad \left| \alpha_N^{[s]}(1, w) \right| \leq C_2 (\log N)^{\frac{1}{2} + \varepsilon} \sqrt{w},$$

d'où, par (3.69),

$$(3.71) \quad \left| K_N'^{[s]} \right| \leq C_2 (\log N)^{\frac{1}{2} + \varepsilon} \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) \sqrt{w} \, dw.$$

En se rappelant de (3.20), que $q_2^{(m)}(1-w) = \frac{1+o(1)}{w}$ lorsque $w \downarrow 0$, nous déduisons de (3.71) que, pour chaque $1 < C_2 < C_3 < \infty$, il existe un $N_3 \geq N_2$ tel que, pour tout $N \geq N_3$,

$$\left| K_N'^{[s]} \right| \leq C_3 (\log N)^{\frac{1}{2} + \varepsilon} \int_0^{1/N} \frac{dw}{\sqrt{w}} \leq 2 C_3 \frac{(\log N)^{\frac{1}{2} + \varepsilon}}{\sqrt{N}}.$$

Puisque la convergence presque sûre implique la convergence en probabilité, cela implique que $\left| K_N'^{[s]} \right| = O_{\mathbb{P}} \left(N^{-1/2} (\log N)^{1/2 + \varepsilon} \right)$ lorsque $N \rightarrow \infty$. De plus, on a, $K_N' \stackrel{d}{=} K_N'^{[s]}$, donc en déduit (3.68). \square

4 Approximations gaussiennes

4.1 Ponts browniens et processus de Wiener

La notation et les faits suivants concernant les processus de Wiener et les ponts browniens seront nécessaires. Nous rappelons les définitions usuelles d'un processus de Wiener (univarié) $\{W(u) : u \geq 0\}$ et d'un pont Brownien $\{B(u) : 0 \leq u \leq 1\}$, tous deux définis comme des processus gaussiens centrés avec un échantillon de trajectoires continues et des covariances vérifiant respectivement,

$$(4.1) \quad \mathbb{E}(W(u) W(v)) = u \wedge v, \quad \text{pour } u, v \geq 0,$$

et

$$(4.2) \quad \mathbb{E}(B(u) B(v)) = u \wedge v - uv, \quad \text{pour } 0 \leq u, v \leq 1.$$

Nous pouvons définir ces processus sur le même espace de probabilité, en posant

$$(4.3) \quad B(u) = W(u) - u W(1), \quad \text{pour } 0 \leq u \leq 1.$$

Nous notons que pour un usage ultérieur, lorsque $B(\cdot)$ et $W(\cdot)$ sont tels que dans (4.3), $\{B(u) : 0 \leq u \leq 1\}$ et $W(1) \stackrel{d}{=} N(0, 1)$ sont indépendants.

Ces définitions s'étendent aux processus bivariés comme suit. Par un *processus bivarié*, on sous-entend une fonction aléatoire de $(u, v) \in A$, où A désigne un sous-ensemble de \mathbb{R}^2 . Nous définissons un *processus de Wiener bivarié* $\{\mathbf{W}(u, v) : u, v \geq 0\}$ comme un processus gaussien centré sur \mathbb{R}_+^2 , avec un échantillon de trajectoires continues, et une fonction de covariance vérifiant, pour tout $u', u'', v', v'' \geq 0$,

$$(4.4) \quad \mathbb{E}(\mathbf{W}(u', v') \mathbf{W}(u'', v'')) = (u' \wedge u'') (v' \wedge v'').$$

Un pont Brownien bivarié $\{\mathbf{B}(u, v) : 0 \leq u, v \leq 1\}$ est défini à son tour comme un processus gaussien centré avec un échantillon de trajectoires continues sur $[0, 1]^2$ et une fonction de covariance telle que

$$(4.5) \quad \mathbb{E}(\mathbf{B}(u', v') \mathbf{B}(u'', v'')) = (u' \wedge u'') (v' \wedge v'') - u' u'' v' v'',$$

pour $0 \leq u', u'', v', v'' \leq 1$. Nous pouvons définir $\{\mathbf{B}(u, v) : 0 \leq u, v \leq 1\}$ et $\{\mathbf{W}(u, v) : u, v \geq 0\}$ sur le même espace de probabilité en posant

$$(4.6) \quad \mathbf{B}(u, v) = \mathbf{W}(u, v) - uv \mathbf{W}(1, 1), \quad \text{pour } 0 \leq u, v \leq 1.$$

Quand $\mathbf{B}(\cdot, \cdot)$ et $\mathbf{W}(\cdot, \cdot)$ sont comme dans (4.6), $\{\mathbf{B}(u, v) : 0 \leq u, v \leq 1\}$ et $\mathbf{W}(1, 1) \stackrel{d}{=} N(0, 1)$ sont indépendants.

Il sera commode d'écrire $\mathbf{W}(s, t)$ en fonction de la *mesure de Wiener* $\mathbf{W}(du, dv)$ (voir par exemple Lifshits[23], p. 107), soit par l'une des intégrales

$$\mathbf{W}(s, t) = \int \int_{[0, s] \times [0, t]} \mathbf{W}(du, dv) = \int \int_{[0, s] \times [0, t]} \mathbf{W}(du, dv),$$

pour $s, t \leq 0$. En définissant la mesure du pont Brownien par $\mathbf{B}(du, dv) = \mathbf{W}(du, dv) - \mathbf{W}(1, 1) dudv$, nous obtenons la représentation intégrale, pour $0 \leq s, t \leq 1$,

$$\mathbf{B}(s, t) = \int \int_{[0, s] \times [0, t]} \mathbf{B}(du, dv) = \int \int_{[0, s] \times [0, t]} \mathbf{B}(du, dv).$$

En se rappelant les égalités $\mathbf{B}(0, 0) = \mathbf{B}(1, 1) = 0$, le processus défini, pour $0 \leq u, v \leq 1$, par

$$(4.7) \quad \mathbf{B}^*(1 - u, 1 - v) = \int \int_{(u, 1] \times (v, 1]} \mathbf{B}(du, dv) = \mathbf{B}(u, v) - \mathbf{B}(u, 1) - \mathbf{B}(1, v)$$

vérifie l'identité distributionnelle

$$(4.8) \quad \{\mathbf{B}(u, v) : 0 \leq u, v \leq 1\} \stackrel{d}{=} \{\mathbf{B}^*(u, v) : 0 \leq u, v \leq 1\}.$$

Ceci vaut en tant que conséquence de la stationnarité de la mesure de Wiener $\mathbf{W}(du, dv)$ dans \mathbb{R}_+^2 , avec l'invariance de la mesure de Lebesgue par translations sur \mathbb{R}^2 .

Nous définissons un *pont Brownien réduit* $\{\mathbf{B}_{[0]}(u, v) : 0 \leq u, v \leq 1\}$ comme un processus gaussien centré avec un échantillon de trajectoires continues sur $[0, 1]^2$, et une fonction de covariance

$$(4.9) \quad \mathbb{E}(\mathbf{B}_{[0]}(u', v')\mathbf{B}_{[0]}(u'', v'')) = (u' \wedge u'' - u'u'')(v' \wedge v'' - v'v''),$$

pour tout $0 \leq u', u'', v', v'' \leq 1$.

Nous pouvons définir un pont Brownien réduit en fonction du pont Brownien bivarié (usuel) $\{\mathbf{B}(u, v) : 0 \leq s, t \leq 1\}$, par la relation

$$(4.10) \quad \mathbf{B}_{[0]}(u, v) = \mathbf{B}(u, v) - u\mathbf{B}(1, v) - v\mathbf{B}(u, 1), \quad \text{pour } 0 \leq u, v \leq 1.$$

Les processus marginaux de $\mathbf{B}(u, v)$, sont obtenus en posant

$$(4.11) \quad \mathbf{B}_{[1]}(u) = \mathbf{B}(u, 1), \quad \text{pour } 0 \leq u \leq 1,$$

et

$$(4.12) \quad \mathbf{B}_{[2]}(v) = \mathbf{B}(1, v), \quad \text{pour } 0 \leq v \leq 1,$$

qui sont des ponts Browniens, avec des fonctions de covariance comme dans (4.2). Les processus définis par (4.10), (4.11) et (4.12) sont liés comme suit.

Lemme 4.1. *Les processus $\mathbf{B}_{[0]}(\cdot, \cdot)$, $\mathbf{B}_{[1]}(\cdot)$ et $\mathbf{B}_{[2]}(\cdot)$ sont indépendants, et constituent, respectivement un pont Brownien bivarié réduit et deux ponts Browniens univariés vérifiant, pour $0 \leq u, v \leq 1$,*

$$(4.13) \quad \mathbf{B}(u, v) = \mathbf{B}_{[0]}(u, v) + v \mathbf{B}_{[1]}(u) + u \mathbf{B}_{[2]}(v).$$

Démonstration. Voir le théorème 1, p. 105 dans Deheuvels[8] et par exemple, le fait 2.1. p. 499 dans Deheuvels, Peccati et Yor[15].□

4.2 Identités distributionnelles pour les intégrales de ponts Browniens

Dans ce paragraphe, nous établissons des propriétés distributionnelles intéressantes d'intégrales de fonctionnelles de ponts browniens qui sont nécessaires dans la preuve de nos théorèmes. La proposition 4.1 et le corollaire 4.1 sont respectivement les mêmes que la proposition 4.1 et le corollaire 4.1 de Deheuvels et Derzko [11]. Pour les démonstrations des propositions 4.1, 4.2 et du corollaire 4.1, nous nous référons à Deheuvels et Derzko [11]. Soit $X \geq 0$, une v.a. non négative avec une f.r. $F(x) = P(X \leq x)$, et $\{B(t) : 0 \leq t \leq 1\}$ qui désigne un pont Brownien (univarié).

Proposition 4.1. *Supposons que $\sigma_F^2 := \text{Var}(X) < \infty$. Alors,*

$$(4.14) \quad \int_0^\infty B(F(t)) \, dt \stackrel{d}{=} N(0, \sigma_F^2).$$

Les lemmes 4.2 et 4.3 suivants sont nécessaires pour la preuve de la proposition 4.1.

Lemme 4.2. *Chaque fois que $\mathbb{E}(X) < \infty$, nous avons*

$$(4.15) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x(1 - F(x)) = 0 \quad \text{et} \quad \mathbb{E}(X) = \int_0^\infty (1 - F(t)) \, dt.$$

Si, en plus $\mathbb{E}(X^2) < \infty$, alors nous avons

$$(4.16) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x^2(1 - F(x)) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^\infty (1 - F(y)) \, dy = 0,$$

et

$$(4.17) \quad \mathbb{E}(X^2) = 2 \int_0^\infty y(1 - F(y)) \, dy.$$

Démonstration. Pour $k = 1, 2, \dots$, l'hypothèse que $\mathbb{E}(X^k) < \infty$ implique que $\mathbb{E}(X^k \mathbb{I}_{\{X \geq x\}}) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow \infty$. L'inégalité de Markov $x^k(1 - F(x)) \leq \mathbb{E}(X^k \mathbb{I}_{\{X \geq x\}})$, implique aussi que $x^k(1 - F(x)) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow \infty$. La preuve de (4.15) est obtenue en posant $k = 1$ dans cette relation, puis, en intégrant par parties pour obtenir

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x y \, dF(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ [-y(1 - F(y))]_0^x \right. \\ &\quad \left. + \int_0^x (1 - F(y)) \, dy \right\} = \int_0^\infty (1 - F(y)) \, dy. \end{aligned}$$

Pour établir (4.16), nous appliquons l'argument ci-dessus avec $k = 2$, pour obtenir que, chaque fois $\mathbb{E}(X^2) < \infty$, nous avons $x^2(1 - F(x)) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow \infty$. Ceci, combiné à une intégration par parties montre que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^2) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x y^2 \, dF(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ [-y^2(1 - F(y))]_{y=0}^{y=x} \right. \\ &\quad \left. + 2 \int_0^x y(1 - F(y)) \, dy \right\} = 2 \int_0^\infty y(1 - F(y)) \, dy, \end{aligned}$$

ce qui donne (4.17) comme demandé. \square

Lemme 4.3. *Sous l'hypothèse que $\sigma_F^2 = \text{Var}(X) < \infty$, nous avons*

$$(4.18) \quad \sigma_F^2 = \int_0^\infty \int_0^\infty \{F(x) \wedge F(y) - F(x)F(y)\} \, dx \, dy.$$

Démonstration. Supposons que $\sigma_F^2 = \text{Var}(X) < \infty$. Nous avons la chaîne d'égalités

$$\begin{aligned} (4.19) \quad I &:= \int_0^\infty \int_0^\infty \{F(x) \wedge F(y) - F(x)F(y)\} \, dx \, dy \\ &= \int_0^\infty \left\{ (1 - F(x)) \int_0^x F(y) \, dy + F(x) \int_x^\infty (1 - F(y)) \, dy \right\} \, dx \\ &= \int_0^\infty \left\{ -(1 - F(x)) \int_0^x (1 - F(y)) \, dy + x(1 - F(x)) \right. \\ &\quad \left. - (1 - F(x)) \int_x^\infty (1 - F(y)) \, dy + \int_x^\infty (1 - F(t)) \, dt \right\} \, dx, \\ &= \int_0^\infty x(1 - F(x)) \, dx - \left\{ \int_0^\infty (1 - F(x)) \, dx \right\}^2 \\ &\quad + \int_0^\infty \left\{ \int_x^\infty (1 - F(y)) \, dy \right\} \, dx \end{aligned}$$

qui, compte tenu de (4.15) et (4.16), est égal à

$$(4.20) \quad I = \frac{1}{2} \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 + \int_0^\infty \left\{ \int_x^\infty (1 - F(y)) \, dy \right\} \, dx.$$

Par intégration par parties, nous déduisons de (4.16) et (4.17) que, lorsque $z \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} \int_0^z \left\{ \int_x^\infty (1 - F(y)) \, dy \right\} dx &= \left[x \int_x^\infty (1 - F(y)) \, dy \right]_{x=0}^{x=z} + \int_0^z x (1 - F(x)) \, dx \\ &\longrightarrow \int_0^\infty y (1 - F(y)) \, dy = \frac{1}{2} \mathbb{E}(X^2). \end{aligned}$$

Ceci, combiné à (4.19) et (4.20), achève la démonstration de (4.18). \square

Démonstration de la proposition 4.1. Pour chaque $0 < T < \infty$, la variable aléatoire

$$I_T := \int_0^T B(F(x)) \, dx \stackrel{d}{=} N(0, \sigma_{F;T}^2),$$

est normale centrée avec une variance donnée par

$$\begin{aligned} (4.21) \quad \sigma_{F;T}^2 &:= \mathbb{E} \left(\left\{ \int_0^T B(F(x)) \, dx \right\}^2 \right) = \mathbb{E} \left(\int_0^T \int_0^T B(F(x)) B(F(y)) \, dx dy \right) \\ &= \int_0^T \int_0^T \{F(x) \wedge F(y) - F(x)F(y)\} \, dx dy, \end{aligned}$$

où nous avons utilisé le théorème de Fubini. En faisant $T \rightarrow \infty$ dans (4.21), nous voyons que $\sigma_{F;T}^2 \rightarrow \sigma_F^2$ lorsque $T \rightarrow \infty$, où σ_F^2 est comme dans (4.18). Nous faisons alors l'utilisation du lemme 4.3, pour montrer que $\sigma_F^2 = \text{Var}X$, qui à son tour, donne (4.14). \square

Soit $\{B(u) : 0 \leq u \leq 1\}$ un pont Brownien et soit $\{B_{[0]}(u) : 0 \leq u \leq 1\}$ un pont Brownien bivarié réduit. Nous rappelons que les fonctions de covariance de ces processus sont données, respectivement, par (4.2) et (4.9).

Proposition 4.2. *Chaque fois que $\sigma_F^2 := \text{Var}(X) < \infty$, nous avons l'identité distributionnelle,*

$$(4.22) \quad \left\{ \int_0^\infty \mathbf{B}_{[0]}(F(x), w) \, dx : 0 \leq w \leq 1 \right\} \stackrel{d}{=} \{ \sigma_F B(w) : 0 \leq w \leq 1 \}.$$

Démonstration. Le membre de gauche de (4.22) définit un processus gaussien centré avec une fonction de covariance

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left(\left\{ \int_0^\infty \mathbf{B}_{[0]}(F(x), w) \, dx \right\} \left\{ \int_0^\infty \mathbf{B}_{[0]}(F(y), v) \, dy \right\} \right) \\
&= \int_0^\infty \int_0^\infty \mathbb{E} (\mathbf{B}_{[0]}(F(x), w) \mathbf{B}_{[0]}(F(y), v)) \, dx dy \\
&= (w \wedge v - wv) \int_0^\infty \int_0^\infty \{F(x) \wedge F(y) - F(x)F(y)\} \, dx dy \\
&= (w \wedge v - wv) \sigma_F^2, \quad \text{pour } 0 \leq w, v \leq 1,
\end{aligned}$$

où nous avons utilisé (4.18). En se rappelant de la forme (4.2) de la fonction de covariance d'un pont Brownien, nous voyons que ce dernier résultat est équivalent à (4.22). \square

Corollaire 4.1. *Soit $X \geq 0$ et $Y \geq 0$ des variables aléatoires non négatives, avec des f.r. $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ et $G(y) = \mathbb{P}(Y \leq y)$. Supposons que $\sigma_F^2 := \text{Var}(X) < \infty$, et $\sigma_G^2 := \text{Var}(Y) < \infty$. Alors, nous avons*

$$(4.23) \quad \int_0^\infty \int_0^\infty \mathbf{B}_{[0]}(F(x), G(y)) \, dx dy \stackrel{d}{=} N(0, \sigma_F^2 \sigma_G^2).$$

Démonstration. Par (4.22), nous avons l'identité distributionnelle

$$(4.24) \quad \left\{ \int_0^\infty \mathbf{B}_{[0]}(F(x), G(y)) \, dx : 0 \leq y < \infty \right\} \stackrel{d}{=} \{ \sigma_F B(G(y)) : 0 \leq y < \infty \},$$

où $\{B(u) : 0 \leq u \leq 1\}$ désigne un pont Brownien. En se rappelant de (4.14) que

$$\int_0^\infty B(G(y)) \, dy \stackrel{d}{=} N(0, \sigma_G^2),$$

nous déduisons facilement (4.23) de (4.24). \square

4.3 Décompositions de ponts browniens.

Rappelons les définitions (3.6), (3.8), (3.7), (3.9), (3.12) et (3.13) de $Q_3^{(m)}$, $Q_2^{(m)}$, $q_3^{(m)}$ et $q_2^{(m)}$. Soit $\{\mathbf{B}(v, w) : 0 \leq v, w \leq 1\}$ qui désigne un pont brownien bivarié, et, compte tenu de (4.8), soit $\mathbf{B}^*(.,.)$ un pont Brownien bivarié défini, comme dans (4.7) par la relation

$$(4.25) \quad \mathbf{B}^*(1-v, 1-w) = \mathbf{B}(v, w) - \mathbf{B}(v, 1) - \mathbf{B}(1, w),$$

pour $0 \leq v, w \leq 1$. Compte tenu de (4.14), nous posons $\mathbf{B}_{[0]}^*(\cdot, \cdot), B_{[1]}^*(\cdot)$ et $B_{[2]}^*(\cdot)$, un pont Brownien réduit et des ponts Browniens univariés, définis en fonction de \mathbf{B}^* , par les relations, pour $0 \leq v, w \leq 1$,

$$(4.26) \quad \mathbf{B}_{[0]}^*(v, w) = \mathbf{B}^*(v, w) - v\mathbf{B}^*(1, w) - w\mathbf{B}^*(v, 1),$$

et

$$(4.27) \quad B_{[1]}^*(v) = \mathbf{B}^*(v, 1) \text{ et } B_{[2]}^*(w) = \mathbf{B}^*(1, w).$$

La proposition suivante peut être interprétée comme une version limite des propositions 3.2 et 3.3, lorsque $N \rightarrow \infty$.

Proposition 4.3. *Sous la notation et les hypothèses ci-dessus, nous avons les relations,*

$$(4.28) \quad \begin{aligned} & \int \int_{[0,1]^2} (2 Q_3^{(m)}(v) - 1) Q_2^{(m)}(w) \mathbf{B}(dv, dw) \\ &= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}^*(v, w) dv dw - \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}^*(1, w) dw \\ &= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}_{[0]}^*(v, w) dv dw \\ &\quad + 4m \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) B_{[1]}^*(v) dv \\ &= 2 \int \int_{[0,1] \times [0, \infty)} \mathbf{B}_{[0]}^*(1 - G_3^{(m)}(x), 1 - G_2^{(m)}(y)) dx dy \\ &\quad + 4m \int_0^1 B_{[1]}^*(1 - G_3^{(m)}(x)) du \stackrel{d}{=} N(0, 2m), \end{aligned}$$

et

$$(4.29) \quad \begin{aligned} & \int \int_{[0,1]^2} Q_2^{(m)}(w) \mathbf{B}(dv, dw) = - \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}(1, w) dw \\ &= \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}^*(1, w) dw = \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) B_{[2]}^*(w) dw, \end{aligned}$$

où les composantes aléatoires

$$(4.30) \quad \begin{aligned} & 2 \int \int_{[0,1]^2} \mathbf{B}_{[0]}^*(v, w) q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) dv dw \\ &= 2 \int \int_{[0,1] \times [0, \infty)} \mathbf{B}_{[0]}^*(1 - G_3^{(m)}(x), 1 - G_2^{(m)}(y)) dx dy \stackrel{d}{=} N\left(0, \frac{2m}{2m+1}\right), \end{aligned}$$

$$(4.31) \quad \begin{aligned} & 4m \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) B_{[1]}^*(v) dv = 4m \int_0^1 B_{[1]}^*(1 - G_3^{(m)}(x)) dx \\ &= -4m \int_0^1 \mathbf{B}(G_3^{(m)}(x), 1) dx \stackrel{d}{=} N\left(0, \frac{4m^2}{2m+1}\right), \end{aligned}$$

et

$$(4.32) \quad \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) B_{[2]}^*(w) dw \stackrel{d}{=} N(0, 2m),$$

sont indépendantes.

Démonstration. Soit $R \stackrel{d}{=} \beta_{m,m}$ (resp. $T \stackrel{d}{=} \Gamma(2m, 1)$). Compte tenu de (3.30) (resp. (3.31)), nous faisons usage de l'identité distributionnelle $R \stackrel{d}{=} Q_3^{(m)}(V)$ (resp. $T \stackrel{d}{=} Q_2^{(m)}(W)$), où $V \stackrel{d}{=} \mathcal{U}(0, 1)$ (resp. $W \stackrel{d}{=} \mathcal{U}(0, 1)$).

$$(4.33) \quad \mathbb{E}(R) = \int_0^1 Q_3^{(m)}(v) dv = \frac{1}{2}$$

$$(4.34) \quad \left(\text{resp. } \mathbb{E}(T) = \int_0^1 Q_2^{(m)}(w) dw = 2m \right).$$

Nous déduisons de (4.33) (resp. (4.34)), une preuve alternative de (3.53) (resp. (3.54)). En se rappelant de (3.21) et (3.22) (resp. (3.23) et (3.24)) que $Q_3^{(m)}(v) \rightarrow 0$ (resp. $Q_2^{(m)}(w) \rightarrow 0$) lorsque $v \downarrow 0$ (resp. $w \downarrow 0$), et $(1-v)Q_3^{(m)}(v) \rightarrow 0$ (resp. $(1-w)Q_2^{(m)}(w) \rightarrow 0$) lorsque $v \uparrow 1$ (resp. $w \uparrow 1$), par (4.33) (resp. (4.34)) et une intégration par parties, nous obtenons

$$(4.35) \quad \int_0^1 (1-v) q_3^{(m)}(1-v) dv = \left[(1-v) Q_3^{(m)}(v) \right]_0^1 + \int_0^1 Q_3^{(m)}(v) dv$$

$$(4.36) \quad \left(\text{resp. } \int_0^1 (1-w) q_2^{(m)}(1-w) dw = \left[(1-w) Q_2^{(m)}(w) \right]_0^1 + \int_0^1 Q_2^{(m)}(w) dw \right).$$

Nous faisons usage ensuite d'un argument de type Fubini, dans l'esprit de Donati-Martin et Yor[16, 17](voir par exemple le paragraphe 3.3 de Deheuvels, Peccati et Yor[15]). Nous écrivons, par (4.25) et les changements de variables $(v, w) \rightarrow (1-v, 1-w)$,

$$(4.37) \quad \begin{aligned} J_1 &:= 2 \int \int_{[0,1]^2} Q_3^{(m)}(v) Q_2^{(m)}(w) \mathbf{B}(dv, dw) \\ &= 2 \int \int_{[0,1]^2} \left\{ \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(s) \mathbb{I}_{[0,v]}(s) q_2^{(m)}(t) \mathbb{I}_{[0,w]}(t) ds dt \right\} \mathbf{B}(dv, dw) \\ &= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(s) q_2^{(m)}(t) \left\{ \int \int_{[0,1]^2} \mathbb{I}_{[0,v]}(s) \mathbb{I}_{[0,w]}(t) \mathbf{B}(dv, dw) \right\} ds dt \\ &= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(s) q_2^{(m)}(t) \{ \mathbf{B}(s, t) - \mathbf{B}(s, 1) - \mathbf{B}(1, t) \} ds dt \\ &= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(s) q_2^{(m)}(t) \mathbf{B}^*(1-s, 1-t) ds dt \\ &= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}^*(v, w) dv dw. \end{aligned}$$

En faisant usage de (4.26), (4.35) et (4.36), nous obtenons aussi que

$$\begin{aligned}
(4.38) \quad J_1 &= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}_{[0]}^*(v, w) \, dv \, dw \\
&\quad + 2 \int \int_{[0,1]^2} v q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}^*(1, w) \, dv \, dw \\
&\quad + 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) w q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}^*(v, 1) \, dv \, dw \\
&= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}_{[0]}^*(v, w) \, dv \, dw \\
&\quad + \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) B_{[2]}^*(w) \, dw \\
&\quad + 4m \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) B_{[1]}^*(v) \, dv.
\end{aligned}$$

En se rappelant de (4.25) que $\mathbf{B}^*(1, w) = -\mathbf{B}(1, 1-w)$, un argument similaire nous permet d'écrire par le changement de variables $t \rightarrow 1-w$, la relation

$$\begin{aligned}
(4.39) \quad J_2 &:= \int \int_{[0,1]^2} Q_2^{(m)}(w) \mathbf{B}(dv, dw) \\
&= \int \int_{[0,1]^2} \left\{ \int_0^1 \mathbb{I}_{[0,w]}(t) q_2^{(m)}(t) \, dt \right\} \mathbf{B}(dv, dw) \\
&= \int_0^1 \left\{ \int \int_{[0,1]^2} \mathbb{I}_{[0,w]}(t) \mathbf{B}(dv, dw) \right\} q_2^{(m)}(t) \, dt \\
&= - \int_0^1 q_2^{(m)}(t) \mathbf{B}(1, t) \, dt = - \int_0^1 q_2^{(m)}(t) B_{[2]}(t) \, dt \\
&= \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}^*(1, w) \, dw = \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) B_{[2]}^*(w) \, dw.
\end{aligned}$$

En combinant (4.37) avec (4.38) et (4.39), nous obtenons facilement que

$$\begin{aligned}
&\int \int_{[0,1]^2} \left(2 Q_3^{(m)}(v) - 1 \right) Q_2^{(m)}(w) \mathbf{B}(dv, dw) = J_1 - J_2 \\
&= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}^*(v, w) \, dv \, dw - \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}^*(1, w) \, dw \\
&= 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}_{[0]}^*(v, w) \, dv \, dw + 4m \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) B_{[1]}^*(v) \, dv,
\end{aligned}$$

ce qui donne les deux premières égalités de (4.28). Le fait que les composantes aléatoires (4.30), (4.31) et (4.32) sont indépendantes provient du lemme 4.1. Pour conclure la preuve de (4.28), nous utilisons les arguments suivants. En premier lieu, nous faisons les changements de variables $(v, w) \rightarrow (1 - v, 1 - w)$, et puis nous posons $v = G_3^{(m)}(x)$ avec $q_3^{(m)}(v) dv = dx$ et $w = G_2^{(m)}(y)$ avec $q_2^{(m)}(w) dw = dy$, pour obtenir l'égalité,

$$\begin{aligned} & \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}_{[0]}^*(v, w) dv dw \\ &= \int \int_{[0,1]^2} \mathbf{B}_{[0]}^*(1-v, 1-w) dv q_3^{(m)}(v) dw q_2^{(m)}(w) \\ &= \int \int_{[0,1] \times [0,\infty)} \mathbf{B}_{[0]}^*(1 - G_3^{(m)}(x), 1 - G_2^{(m)}(y)) dx dy. \end{aligned}$$

Alors, nous observons que $\{\mathbf{B}_{[0]}^*(v, w) : 0 \leq v, w \leq 1\} \stackrel{d}{=} \{\mathbf{B}_{[0]}^*(1-v, 1-w) : 0 \leq v, w \leq 1\}$. Puisque, la variance de $R \stackrel{d}{=} \beta_{m,m}$ est égale à $\sigma_R^2 = \frac{1}{4(2m+1)}$ et la variance de $T \stackrel{d}{=} \Gamma(2m, 1)$ est égale à $\sigma_{G_2^{(m)}}^2 = 2m$, nous pouvons appliquer (4.23) pour obtenir que

$$\begin{aligned} & \int \int_{[0,1] \times [0,\infty)} \mathbf{B}_{[0]}^*(1 - G_3^{(m)}(x), 1 - G_2^{(m)}(y)) dx dy \\ & \stackrel{d}{=} \int_0^1 \int_0^\infty \mathbf{B}_{[0]}^*(G_3^{(m)}(x), G_2^{(m)}(y)) dx dy \stackrel{d}{=} N\left(0, \sigma_R^2 \sigma_{G_2^{(m)}}^2\right) \stackrel{d}{=} N\left(0, \frac{m}{2(2m+1)}\right), \end{aligned}$$

ce qui donne (4.30). De même, en faisant le changement de variable $v \rightarrow 1-v$ et puis en posant $v = G_3^{(m)}(x)$ et $q_3^{(m)}(v) dv = dx$, on obtient l'égalité

$$\int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) B_{[1]}^*(v) dv = \int_0^1 B_{[1]}^*(1-v) q_3^{(m)}(v) dv = \int_0^1 B_{[1]}^*(1-G_3^{(m)}(x)) dx.$$

Or, d'après (4.25), on a, pour tout $0 \leq x \leq 1$, $B_{[1]}^*(1-G_3^{(m)}(x)) = -B(G_3^{(m)}(x), 1)$ et comme la variance de $R \stackrel{d}{=} \beta_{m,m}$ est égale à $\sigma_R^2 = \frac{1}{4(2m+1)}$, nous pouvons appliquer (4.14) pour obtenir que,

$$\int_0^1 B_{[1]}^*(1-G_3^{(m)}(x)) dx = - \int_0^1 \mathbf{B}(G_3^{(m)}(x), 1) dx \stackrel{d}{=} N(0, \sigma_R^2) \stackrel{d}{=} N\left(0, \frac{1}{4(2m+1)}\right),$$

ce qui donne (4.31). La preuve est complétée par l'observation que si $Y \stackrel{d}{=} N\left(0, \frac{m}{2(2m+1)}\right)$ et $Z \stackrel{d}{=} N\left(0, \frac{1}{4(2m+1)}\right)$ sont indépendantes, alors $2Y + 4mZ \stackrel{d}{=} N\left(0, \frac{4m}{2(2m+1)} + \frac{16m^2}{4(2m+1)}\right) \stackrel{d}{=} N(0, 2m)$. \square

4.4 Ponts Browniens pondérés

Dans ce paragraphe, nous donnons des bornes pour des ponts browniens pondérés parallèlement à celles obtenues précédemment pour les processus empiriques pondérés dans le paragraphe 3.3. Nous supposons que $\{\mathbf{B}(v, w) : 0 \leq v, w \leq 1\}$ désigne un pont Brownien bivarié. A la suite de (4.13), nous définissons un pont Brownien réduit $\{\mathbf{B}_{[0]}(v, w) : 0 \leq v, w \leq 1\}$ en posant

$$(4.40) \quad \mathbf{B}(v, w) = \mathbf{B}_{[0]}(v, w) + w\mathbf{B}(v, 1) + v\mathbf{B}(1, w).$$

Dans l'esprit de (3.58) et (3.59), nous posons, pour chaque $N \geq 1$,

$$(4.41) \quad J'_N := \int_0^1 \int_0^{1/N} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}(v, w) dv dw,$$

et

$$(4.42) \quad L'_N := \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}(1, w) dw.$$

Lemme 4.4. *Nous avons, lorsque $N \rightarrow \infty$,*

$$(4.43) \quad |J'_N| = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right) \quad \text{et} \quad |L'_N| = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right).$$

Démonstration. Nous observons tout d'abord, par l'intermédiaire de (4.40), que, pour $0 \leq w \leq 1$,

$$\begin{aligned} \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}(v, w) dv &= q_2^{(m)}(1-w) \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) \mathbf{B}(v, w) dv \\ &= q_2^{(m)}(1-w) \left\{ \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) \mathbf{B}_{[0]}(v, w) dv + \mathbf{B}(1, w) \int_0^1 v q_3^{(m)}(1-v) dv \right. \\ &\quad \left. + w \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) \mathbf{B}(v, 1) dv \right\}. \end{aligned}$$

En faisant le changement de variable $v \rightarrow 1-v$ et en posant $v = G_3^{(m)}(x)$ et $q_3^{(m)}(v) dv = dx$, on obtient, pour $0 \leq w \leq 1$, l'égalité

$$\int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) \mathbf{B}_{[0]}(v, w) dv = \int_0^1 q_3^{(m)}(v) \mathbf{B}_{[0]}(1-v, w) dv = \int_0^1 \mathbf{B}_{[0]}(1-G_3^{(m)}(x), w) dx.$$

Observons que

$$\{\mathbf{B}_{[0]}(v, w) : 0 \leq v, w \leq 1\} \stackrel{d}{=} \{\mathbf{B}_{[0]}(1 - v, w) : 0 \leq v, w \leq 1\}.$$

De plus, en faisant usage de (4.22), avec $F = G_3^{(m)}$ qui est la f.r. d'une loi $\beta_{m,m}$ de variance $\sigma_{G_3^{(m)}}^2 = \frac{1}{4(2m+1)}$, nous voyons que le processus $\{B_0(w) : 0 \leq w \leq 1\}$ défini en posant, pour $0 \leq w \leq 1$,

$$(4.44) \quad \frac{1}{2\sqrt{2m+1}} B_0(w) = \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) \mathbf{B}_{[0]}(v, w) dv = \int_0^1 \mathbf{B}_{[0]}(G_3^{(m)}(x), w) dx$$

est un pont Brownien. De même, en faisant un changement de variable $v \rightarrow 1 - v$ et en posant $v = G_3^{(m)}(x)$ et $q_3^{(m)}(v) dv = dx$, on obtient l'égalité

$$\int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) \mathbf{B}(v, 1) dv = \int_0^1 q_3^{(m)}(v) \mathbf{B}(1-v, 1) dv = \int_0^1 \mathbf{B}(1-G_3^{(m)}(x), 1) dx.$$

Observons que

$$\{\mathbf{B}(v, 1) : 0 \leq v \leq 1\} \stackrel{d}{=} \{\mathbf{B}(1 - v, 1) : 0 \leq v \leq 1\}.$$

De plus, en faisant usage de (4.14), avec $F = G_3^{(m)}$ qui est la f.r. d'une loi $\beta_{m,m}$ de variance $\sigma_{G_3^{(m)}}^2 = \frac{1}{4(2m+1)}$, on obtient,

$$\int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) \mathbf{B}(v, 1) dv \stackrel{d}{=} \int_0^1 \mathbf{B}(G_3^{(m)}(x), 1) dx \stackrel{d}{=} N\left(0, \frac{1}{4(2m+1)}\right).$$

Une application du lemme 4.1, montre que les ponts Browniens $\{B_0(w) : 0 \leq w \leq 1\}$ et $\{B_1(w) := \mathbf{B}(1, w) : 0 \leq w \leq 1\}$ dans (4.40) et (4.44) ainsi que la variable Z définie par

$$\frac{1}{2\sqrt{2m+1}} Z := \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) \mathbf{B}(v, 1) dv \stackrel{d}{=} N\left(0, \frac{1}{4(2m+1)}\right)$$

sont mutuellement indépendantes. Ceci avec (3.53) aussi montre que le processus $\{B_3(w) : 0 \leq w \leq 1\}$, défini par l'identité, pour $0 \leq w \leq 1$,

$$\sqrt{\frac{m+1}{2(2m+1)}} B_3(w) = \frac{1}{2\sqrt{2m+1}} B_0(w) + \frac{1}{2} B_1(w),$$

est un pont brownien indépendant de $Z \stackrel{d}{=} N(0, 1)$. Par tout cela, nous avons l'égalité

$$\int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}(v, w) dv = q_2^{(m)}(1-w) \left\{ \sqrt{\frac{m+1}{2(2m+1)}} B_3(w) + \frac{1}{2\sqrt{2m+1}} w Z \right\}.$$

En faisant usage du théorème de Fubini, nous déduisons de ce dernier résultat que

$$(4.45) \quad \begin{aligned} J'_N &= \int_0^{1/N} \left\{ \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}(v, w) dv \right\} dw \\ &= \sqrt{\frac{m+1}{2(2m+1)}} \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) B_3(w) dw \\ &\quad + \frac{Z}{2\sqrt{2m+1}} \int_0^{1/N} w q_2^{(m)}(1-w) dw =: J'_{N;1} + J'_{N;2}. \end{aligned}$$

Par (3.20), nous voyons que $w q_2^{(m)}(1-w) \rightarrow 1$, lorsque $w \downarrow 0$. Donc, lorsque $w \downarrow 0$,

$$(4.46) \quad \begin{aligned} J'_{N;2} &= \frac{Z}{2\sqrt{2m+1}} \int_0^{1/N} w q_2^{(m)}(1-w) dw = (1 + o(1)) \frac{Z}{2N\sqrt{2m+1}} \\ &= O_{\mathbb{P}}\left(\frac{1}{N}\right). \end{aligned}$$

En se rappelant de (4.42) et (4.45), nous voyons également que

$$(4.47) \quad J'_{N;1} = \sqrt{\frac{m+1}{2(2m+1)}} \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) B_3(w) dw \stackrel{d}{=} \sqrt{\frac{m+1}{2(2m+1)}} L'_N = N(0, \sigma_N^2),$$

où nous utilisons le changement de variables $(w, v) = (s/N, t/N)$ pour écrire

$$\begin{aligned} N \sigma_N^2 &= N \mathbb{E} \left\{ \left(\sqrt{\frac{m+1}{2(2m+1)}} \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) B_3(w) dw \right)^2 \right\} \\ &= \frac{N(m+1)}{2(2m+1)} \int_0^{1/N} \int_0^{1/N} (w \wedge v - wv) q_2^{(m)}(1-w) q_2^{(m)}(1-v) dw dv \\ &= \frac{N(m+1)}{2(2m+1)} \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{s \wedge t}{st} - \frac{1}{N} \right) \left\{ \frac{s}{N} q_2^{(m)}\left(1 - \frac{s}{N}\right) \frac{t}{N} q_2^{(m)}\left(1 - \frac{t}{N}\right) \right\} ds dt. \end{aligned}$$

En utilisant à nouveau le fait que, par (3.20), $w q_2^{(m)}(1-w) \rightarrow 1$, lorsque $w \downarrow 0$, nous déduisons de cette dernière égalité que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$N \sigma_N^2 = \frac{m+1}{2(2m+1)} \int_0^1 \int_0^1 \frac{s \wedge t}{st} ds dt - \frac{1+o(1)}{N} \frac{m+1}{2(2m+1)}.$$

Un calcul facile montre que

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 \frac{s \wedge t}{st} ds dt &= \int_0^1 \left\{ \frac{1}{t} \int_0^t ds + \int_t^1 \frac{ds}{s} \right\} dt \\ &= \int_0^1 \{1 - \log t\} dt = 1 - [t \log t - t]_0^1 = 2. \end{aligned}$$

Ceci, aussi, montre que $N \sigma_N^2 \rightarrow \frac{m+1}{2m+1}$, lorsque $N \rightarrow \infty$. En se rappelant de (4.45), (4.46) et (4.47), nous déduisons facilement (4.43) de cette propriété. \square

4.5 Approximations fortes

Le fait suivant est une version du théorème 2.3 de Castelle et Laurent-Bonvalot[3] (voir par exemple Tusnády[29], et le théorème 1.1 de Castelle[4]). Posons $\log_+ v = \log(v \vee e)$, pour $v \in \mathbb{R}$, et posons $\|f\| = \sup_{z \in A} |f(z)|$, pour la norme-sup d'une fonction f bornée, définie sur A .

Fait 2. *Sur un espace de probabilité convenable $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, il est possible de construire une suite de vecteurs aléatoires $\{(V_{k,N}, W_{k,N}) : 0 \leq k \leq N, N \geq 1\}$ uniformément distribués sur $[0, 1]^2$ et une suite de ponts Browniens bivariés $\{\mathbf{B}_N(v, w) : 0 \leq v, w \leq 1\}$ telle que la propriété suivante soit vérifiée. Pour des constantes appropriées $a > 0$, $b > 0$ et $c > 0$, nous avons, pour tout $x \geq 0$ et $N \geq 1$,*

$$(4.48) \quad \mathbb{P} \left(\|\alpha_N - \mathbf{B}_N\| \geq \frac{\log_+ N (a \log_+ N + x)}{\sqrt{N}} \right) \leq b e^{-cx}.$$

Comme une conséquence évidente de (4.48), nous avons, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(4.49) \quad \|\alpha_N - \mathbf{B}_N\| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^2}{\sqrt{N}} \right).$$

Compte tenu de (4.25), (4.26) et (4.27), nous allons examiner ci-dessous, les processus définis par

$$(4.50) \quad B_N(v) = \mathbf{B}_N(v, 1) = -\mathbf{B}_N^*(1-v, 1) = -B_{[1];N}^*(1-v),$$

pour $0 \leq v \leq 1$, où

$$(4.51) \quad \mathbf{B}_N^*(1-v, 1-w) = \mathbf{B}_N(v, w) - \mathbf{B}_N(v, 1) - \mathbf{B}_N(1, w),$$

$$(4.52) \quad \mathbf{B}_{[0];N}^*(v, w) = \mathbf{B}_N^*(v, w) - v\mathbf{B}_N^*(1, w) - w\mathbf{B}_N^*(v, 1),$$

$$(4.53) \quad B_{[1];N}^*(v) = \mathbf{B}_N^*(v, 1) \text{ et } B_{[2];N}^*(w) = \mathbf{B}_N^*(1, w),$$

pour $0 \leq v, w \leq 1$.

Le fait suivant est un cas particulier des principes d'invariance forts de Komlós, Major et Tusnády[21, 22] pour les sommes partielles. Nous nous référons au lemme A1 de Berkes et Philipp[1] pour des résultats qui nous permettent de combiner ces constructions sur le même espace de probabilité.

Fait 3. *Sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, soit $\{\gamma_{i,n} : 1 \leq i \leq n\}$ qui désigne une suite de v.a. de loi $\Gamma(m, 1)$, $\gamma_{i,n} \stackrel{d}{=} \Gamma(m, 1)$ avec $\mathbb{E}(\gamma_{i,n}) = m$ et $\text{Var}(\gamma_{i,n}) = m$ telle que, pour chaque $n \geq 1$, $\gamma_{1,n}, \dots, \gamma_{n,n}$ sont indépendantes. Alors sur une version convenablement élargie de $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, il est possible de définir une suite $\{W_n(t) : t \geq 0, n \geq 1\}$ de processus de Wiener, telle que, pour chaque $n \geq 1$ et $x \geq 0$,*

$$(4.54) \quad \mathbb{P} \left(\max_{1 \leq j \leq n} \left| \sum_{i=1}^j \gamma_{i,n} - jm - \sqrt{m} W_n(j) \right| \geq x + A \log n \right) \leq B e^{-cx},$$

où $A > 0$, $B > 0$ et $C > 0$ sont des constantes universelles.

Une conséquence facile du fait 3 est que nous pouvons poser

$$(4.55) \quad \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n (\gamma_{i,n} - m) - n^{-1/2} \sqrt{m} W_n(n) = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\log n}{\sqrt{n}} \right), \text{ lorsque } n \rightarrow \infty.$$

4.6 Preuve du théorème 3.1

Nous avons maintenant en main tous les ingrédients nécessaires à la preuve du théorème 3.1. Nous posons $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et $\mathbf{B}_N(\cdot, \cdot)$ comme dans le fait 2. Nous posons de plus $B_N(\cdot)$, $\mathbf{B}_N^*(\cdot, \cdot)$, $\mathbf{B}_{[0];N}^*(\cdot, \cdot)$, $B_{[1];N}^*(\cdot)$ et $B_{[2];N}^*(\cdot)$ définis comme dans (4.50)–(4.53). Compte tenu de (4.25), (4.26) et (4.27), nous posons de plus,

$$(4.56) \quad \phi_N := \sqrt{\frac{2(2m+1)}{m}} \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}_{[0];N}^*(v, w) dv dw$$

$$(4.57) \quad \text{et} \quad \psi_N = \frac{1}{\sqrt{2m}} \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) B_{[2];N}^*(w) dw.$$

Comme suit facilement de (4.49), nous avons, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(4.58) \quad \begin{aligned} \|\alpha_{N;1} - B_N\| &= \sup_{0 \leq v \leq 1} |\alpha_{N;1}(v, 1) - \mathbf{B}_N(v, 1)| \\ &\leq \|\alpha_N - \mathbf{B}_N\| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^2}{\sqrt{N}} \right), \end{aligned}$$

qui est (3.42). Les arguments ci-dessous, capturés dans la proposition suivante complètent la preuve du théorème 3.1.

Proposition 4.4. *Sous la notation ci-dessus, nous avons, lorsque $N \rightarrow \infty$,*

$$(4.59) \quad \left| (N+1)^{1/2} \Delta_N - \phi_N \sqrt{\frac{2m}{2m+1}} + 4m \int_0^1 B_N(G_3^{(m)}(x)) \, dx \right| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^3}{N^{1/2}} \right),$$

$$(4.60) \quad \text{et} \quad \left| (N+1)^{1/2} \Theta_N - \psi_N \sqrt{2m} \right| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^3}{N^{1/2}} \right),$$

où, pour chaque $N \geq 1$, le pont Brownien $\{B_N(v) : 0 \leq v \leq 1\}$ et les v.a. $\phi_N \stackrel{d}{=} N(0,1)$ et $\psi_N \stackrel{d}{=} N(0,1)$ sont indépendants.

Démonstration. Nous déduisons de (3.46) et (4.28) que

$$\begin{aligned} A_N &:= \left| (N+1)^{1/2} \Delta_N - \int \int_{[0,1]^2} \left(2 Q_3^{(m)}(v) - 1 \right) Q_2^{(m)}(w) \mathbf{B}_N(dv, dw) \right| \\ &= \left| (N+1)^{1/2} \Delta_N - 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}_N^*(v, w) \, dv \, dw \right. \\ &\quad \left. + \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}_N^*(1, w) \, dw \right| \\ &= \left| 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \{ \alpha_N^*(v, w) - \mathbf{B}_N^*(v, w) \} \, dv \, dw \right. \\ &\quad \left. - \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) \{ \alpha_N^*(1, w) - \mathbf{B}_N^*(1, w) \} \, dw \right|. \end{aligned}$$

Compte tenu de (3.12), (3.13), que $v \mapsto q_3^{(m)}(1-v)$ est bornée sur $(0,1)$ et que plus $\forall v \in (0,1)$, $0 < q_3^{(m)}(1-v) < 1$ et en faisant usage de (4.49) et (4.58), nous déduisons de cette expression et de l'inégalité triangulaire que

$$\begin{aligned} A_N &\leq 3 \left\{ \int_{1/N}^1 q_2^{(m)}(1-w) \, dw \right\} \| \alpha_N^* - \mathbf{B}_N^* \| \\ &\quad + 2 \left| \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) \left\{ \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N^*(v, w) \, dw \right\} dv \right| \\ &\quad + 2 \left| \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) \left\{ \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}_N^*(v, w) \, dw \right\} dv \right| \\ &\quad + \left| \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N^*(1, w) \, dw \right| \\ &\quad + \left| \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}_N^*(1, w) \, dw \right|. \end{aligned}$$

En combinant (3.24) et (4.58), nous voyons que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(4.61) \quad 3 \left\{ \int_{1/N}^1 q_2^{(m)}(1-w) dw \right\} \|\alpha_N^* - \mathbf{B}_N^*\| \\ = 3 Q_2^{(m)} \left(1 - \frac{1}{N} \right) \|\alpha_N^* - \mathbf{B}_N^*\| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^3}{N^{1/2}} \right).$$

Compte tenu de (3.58), (3.64), (3.59), (3.68), (4.41), (4.42) et (4.43), nous voyons que, pour chaque $\varepsilon > 0$, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(4.62) \quad 2 \left| \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) \left\{ \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N^*(v,w) dw \right\} dv \right| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^{1+\varepsilon}}{N^{1/2}} \right),$$

$$\left| \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N^*(1,w) dw \right| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^{1+\varepsilon}}{N^{1/2}} \right),$$

$$(4.63) \quad 2 \left| \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) \left\{ \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}_N^*(v,w) dw \right\} dv \right| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{N^{1/2}} \right)$$

et

$$\left| \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}_N^*(1,w) dw \right| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{N^{1/2}} \right).$$

En posant $\varepsilon = 1$ dans les inégalités ci-dessus, nous concluons que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$A_N = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^3}{N^{1/2}} \right),$$

qui est (4.59). Ensuite, nous faisons usage de la proposition 4.3 pour réécrire la déclaration ci-dessus en

$$A_N = \left| (N+1)^{1/2} \Delta_N - 2 \int \int_{[0,1]^2} q_3^{(m)}(1-v) q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}_{[0];N}^*(v,w) dv dw \right. \\ \left. - 4m \int_0^1 q_3^{(m)}(1-v) B_{[1];N}^*(v) dv \right| \\ = \left| (N+1)^{1/2} \Delta_N - \phi_N \sqrt{\frac{2m}{2m+1}} + 4m \int_0^1 B_N(G_3^{(m)}(x)) dx \right| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^3}{N^{1/2}} \right),$$

lorsque $N \rightarrow \infty$. Par des arguments similaires, nous déduisons de (3.47) et (4.29) que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$C_N := \left| (N+1)^{1/2} \Theta_N - \int \int_{[0,1]^2} Q_2^{(m)}(w) \mathbf{B}_N(dv, dw) \right| \\ = \left| \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) \{ \alpha_N^*(1,w) - \mathbf{B}_N^*(1,w) \} dw \right| \\ \leq \left\{ \int_{1/N}^1 q_2^{(m)}(1-w) dw \right\} \|\alpha_N^* - \mathbf{B}_N^*\| + \left| \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) \alpha_N^*(1,w) dw \right| \\ + \left| \int_0^{1/N} q_2^{(m)}(1-w) \mathbf{B}_N^*(1,w) dw \right|.$$

Compte tenu de (4.61), (4.62) et (4.63), nous déduisons de cette dernière relation que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$C_N = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^3}{N^{1/2}} \right).$$

Ceci combiné à (4.57) et (4.29) dans la proposition 4.3, implique que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} C_N &= \left| (N+1)^{1/2} \Theta_N - \int_0^1 q_2^{(m)}(1-w) B_{[2];N}^*(w) dw \right| \\ &= \left| (N+1)^{1/2} \Theta_N - \psi_N \sqrt{2m} \right| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{(\log N)^3}{N^{1/2}} \right), \end{aligned}$$

qui est (4.60). Une application de la proposition 4.3 montre que $\phi_N \stackrel{d}{=} N(0,1)$, $\psi_N \stackrel{d}{=} N(0,1)$ et $\{B_N(v) : 0 \leq v \leq 1\}$ sont indépendants. Ceci complète la preuve de la proposition 4.4. \square

5 Rapports d'espacements

5.1 Faits de base

Ci-dessous, nous supposons que $F_X(t) = F_Y(t) = t$, pour $0 \leq t \leq 1$, et soit, pour $0 \leq k \leq N$, $S_{k,N;X}^{(m)}$ et $S_{k,N;Y}^{(m)}$ connu comme dans (1.2). Dans toute la suite, nous allons considérer que dans (1.2), pour tout $0 \leq k \leq N$, $i_{k,n_1} = i_{0,n_1} + km$, et $j_{k,n_2} = j_{0,n_2} + km$, où $i_{0,n_1} = j_{0,n_2} = 0$, et allons donc travailler avec les paires de m -espacements disjoints, $S_{k,N;X}^{(m)}$ et $S_{k,N;Y}^{(m)}$, définies de la façon suivante.

$$\begin{aligned} S_{k,N;X}^{(m)} &= D_{i_{k,n_1}, n_1; X}^{(m)} = X_{(k+1)m, n_1} - X_{km, n_1} \quad \text{et} \\ S_{k,N;Y}^{(m)} &= D_{j_{k,n_2}, n_2; Y}^{(m)} = Y_{(k+1)m, n_2} - Y_{km, n_2}, \quad \text{pour } k = 0, \dots, N. \end{aligned}$$

Nous ferons usage du fait suivant qui est une conséquence du théorème de représentation des 1-espacements uniformes (voir par exemple, Pyke[25]). Rappelons les définitions (3.40) et (3.41) de Δ_N et Θ_N . Posons, pour tout entier m fixé tel que $1 \leq m < n_1 \wedge n_2$, $N_1 = \lfloor (n_1 + 1)/m \rfloor - 1$ et $N_2 = \lfloor (n_2 + 1)/m \rfloor - 1$ comme dans (1.1) et posons aussi $P = P(N)$ et $Q = Q(N)$ comme dans (1.3).

Fait 4. *Pour chaque $1 \leq N < N_1 \wedge N_2$, il existe deux suites indépendantes $\{\zeta_{\ell, N} : \ell \geq 1\}$ et $\{\xi_{\ell, n} : \ell \geq 1\}$ de v.a. exponentiellement distribuées avec une moyenne 1, telles que les relations suivantes soient vérifiées. Posons*

$$(5.1) \quad \mathcal{T}_{N;X} = \sum_{k=0}^N \sum_{\ell=km+1}^{(k+1)m} \zeta_{\ell,N} = \sum_{k=0}^N Z_{k,N} = \frac{N+1}{2} \{\Theta_N + 2m + \Delta_N\},$$

$$\mathcal{R}_{N;X} = \sum_{k=N+1}^{N+P} \sum_{\ell=km+1}^{(k+1)m} \zeta_{\ell,N} = \sum_{k=N+1}^{N+P} Z_{k,N},$$

$$(5.2) \quad \mathcal{T}_{N;Y} = \sum_{k=0}^N \sum_{\ell=km+1}^{(k+1)m} \xi_{\ell,N} = \sum_{k=0}^N Z'_{k,N} = \frac{N+1}{2} \{\Theta_N + 2m - \Delta_N\},$$

$$\mathcal{R}_{N;Y} = \sum_{k=N+1}^{N+Q} \sum_{\ell=km+1}^{(k+1)m} \xi_{\ell,N} = \sum_{k=N+1}^{N+Q} Z'_{k,N},$$

où, pour tout $k \geq 0$, $Z_{k,N} = \sum_{\ell=km+1}^{(k+1)m} \zeta_{\ell,N}$ et $Z'_{k,N} = \sum_{\ell=km+1}^{(k+1)m} \xi_{\ell,N}$ sont comme dans (3.1).

Nous avons, pour tout $k = 0, \dots, N$,

$$(5.3) \quad S_{k,N;X}^{(m)} \stackrel{d}{=} \frac{\sum_{\ell=km+1}^{(k+1)m} \zeta_{\ell,n}}{\mathcal{T}_{N;X} + \mathcal{R}_{N;X}} \stackrel{d}{=} \frac{Z_{k,N}}{\mathcal{T}_{N;X} + \mathcal{R}_{N;X}} \quad \text{et}$$

$$S_{k,N;Y}^{(m)} \stackrel{d}{=} \frac{\sum_{\ell=km+1}^{(k+1)m} \xi_{\ell,n}}{\mathcal{T}_{N;Y} + \mathcal{R}_{N;Y}} \stackrel{d}{=} \frac{Z'_{k,N}}{\mathcal{T}_{N;Y} + \mathcal{R}_{N;Y}}.$$

Compte tenu de (1.5) et en faisant usage du fait 4, nous observons que les égalités d'événements suivantes sont vérifiées. Posons, pour tout $t \in [0, 1]$,

$$\tau_N(t) = \left\{ 1 + \left(\frac{1}{t} - 1 \right) \frac{\{\mathcal{T}_{N;Y} + \mathcal{R}_{N;Y}\} / (N + Q + 1)}{\{\mathcal{T}_{N;X} + \mathcal{R}_{N;X}\} / (N + P + 1)} \right\}^{-1}.$$

En se rappelant des définitions (3.28) et (3.30), de respectivement $R_{k,N}$ et $V_{k,N}$, nous voyons que, pour tout $0 \leq k \leq N$, et pour tout $t \in [0, 1]$,

$$(5.4) \quad \{R_{k;n_1,n_2} \leq t\} = \left\{ \frac{(N+P+1) S_{k,N;X}^{(m)}}{(N+P+1) S_{k,N;X}^{(m)} + (N+Q+1) S_{k,N;Y}^{(m)}} \leq t \right\}$$

$$= \left\{ \frac{S_{k,N;Y}^{(m)}}{S_{k,N;X}^{(m)}} \geq \left(\frac{1}{t} - 1 \right) \frac{N+P+1}{N+Q+1} \right\}$$

$$= \left\{ \frac{Z'_{k,N}}{Z_{k,N}} \geq \left(\frac{1}{t} - 1 \right) \frac{\{\mathcal{T}_{N;Y} + \mathcal{R}_{N;Y}\} / (N+Q+1)}{\{\mathcal{T}_{N;X} + \mathcal{R}_{N;X}\} / (N+P+1)} \right\}$$

$$= \left\{ \frac{Z'_{k,N}}{Z_{k,N}} \geq \frac{1}{\tau_N(t)} - 1 \right\} = \left\{ \frac{Z_{k,N}}{Z_{k,N} + Z'_{k,N}} \leq \tau_N(t) \right\} = \{R_{k,N} \leq \tau_N(t)\}$$

$$= \{G_3^{(m)}(R_{k,N}) \leq G_3^{(m)}(\tau_N(t))\} = \{V_{k,N} \leq G_3^{(m)}(\tau_N(t))\}.$$

Rappelons les définitions (1.6) et (1.9) de $H_{N;n_1,n_2}(\cdot)$ et $\gamma_{N;n_1,n_2}(\cdot)$. Compte tenu de (3.35), (3.36) et (3.38), nous déduisons de (5.4) que, pour tout $t \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned}
(5.5) \quad \gamma_{N;n_1,n_2}(t) &= (N+1)^{1/2} (H_{N;n_1,n_2}(t) - H_m(t)) \\
&= (N+1)^{1/2} \left(U_N(G_3^{(m)}(\tau_N(t)), 1) - H_m(t) \right) \\
&= \alpha_{N;1}(G_3^{(m)}(\tau_N(t))) + (N+1)^{1/2} \left(G_3^{(m)}(\tau_N(t)) - H_m(t) \right) \\
&= \alpha_{N;1}(G_3^{(m)}(\tau_N(t))) + (N+1)^{1/2} \left(G_3^{(m)}(\tau_N(t)) - G_3^{(m)}(t) \right),
\end{aligned}$$

puisque, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$H_m(t) = G_3^{(m)}(t).$$

Lemme 5.1. *Nous avons, uniformément en $t \in [0, 1]$, et lorsque $N \rightarrow \infty$,*

$$\begin{aligned}
(5.6) \quad \gamma_{N;n_1,n_2}(t) &= \alpha_{N;1}(G_3^{(m)}(\tau_N(t))) + \frac{(2m-1)!}{((m-1)!)^2} (t(1-t))^{m-1} (N+1)^{1/2} (\tau_N(t) - t) \\
&\quad + O_{\mathbb{P}}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right).
\end{aligned}$$

Posons, pour tout $N \geq 1$,

$$\mathcal{Q}_N = \frac{\{\mathcal{T}_{N;Y} + \mathcal{R}_{N;Y}\} / (N+Q+1)}{\{\mathcal{T}_{N;X} + \mathcal{R}_{N;X}\} / (N+P+1)} - 1.$$

Observons que

$$(5.7) \quad \tau_N(t) - t = -t(1-t) \mathcal{Q}_N \{1 + (1-t)\mathcal{Q}_N\}^{-1}.$$

Posons, de plus

$$(5.8) \quad \mathcal{D}_N = \mathcal{Q}_N + \frac{1}{2m} \left\{ \frac{N+1}{N+P+1} + \frac{N+1}{N+Q+1} \right\} \Delta_N + \frac{1}{2m} \left\{ \frac{N+1}{N+P+1} - \frac{N+1}{N+Q+1} \right\} \Theta_N.$$

Lemme 5.2. *Supposons que $0 \leq c \leq d \leq \infty$. Alors, lorsque $N \rightarrow \infty$,*

$$(5.9) \quad \left(\sqrt{N+1} \Delta_N, \sqrt{N+1} \Theta_N, \sqrt{N+1} \mathcal{D}_N \right) \xrightarrow{d} \left(\sqrt{2m} \mathcal{X}, \sqrt{2m} \mathcal{Y}, \sigma_1(c, d) \mathcal{Z} \right),$$

où $\mathcal{X} \stackrel{d}{=} N(0, 1)$, $\mathcal{Y} \stackrel{d}{=} N(0, 1)$, $\mathcal{Z} \stackrel{d}{=} N(0, 1)$ sont indépendantes et

$$(5.10) \quad \sigma_1^2(c, d) = \begin{cases} \frac{1}{m} \left\{ \frac{c}{(1+c)^2} + \frac{d}{(1+d)^2} \right\} & \text{si } 0 \leq c \leq d < \infty \\ \frac{1}{m} \frac{c}{(1+c)^2} & \text{si } 0 \leq c < d = \infty \\ 0 & \text{si } c = d = \infty \end{cases}.$$

De plus, nous avons, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(5.11) \quad (N+1)^{1/2} \mathcal{Q}_N \xrightarrow{d} N(0, \sigma_2^2(c, d)),$$

où

$$(5.12) \quad \sigma_2^2(c, d) = \begin{cases} \frac{1}{m} \left\{ \frac{1}{1+c} + \frac{1}{1+d} \right\} & \text{si } 0 \leq c \leq d < \infty \\ \frac{1}{m} \frac{1}{1+c} & \text{si } 0 \leq c < d = \infty \\ 0 & \text{si } c = d = \infty \end{cases} .$$

Démonstration. Nous supposons ci-dessous que (1.4) est vérifié avec $0 < c, d < \infty$. La preuve du lemme dans les autres cas étant très similaire, sera omise. Posons

$$(5.13) \quad \mathcal{T}_{N;X} = m(N+1) + \eta'_N \sqrt{N+1}, \quad \mathcal{R}_{N;X} = mP + \eta''_N \sqrt{P}$$

$$(5.14) \quad \mathcal{T}_{N;Y} = m(N+1) + v'_N \sqrt{N+1}, \quad \mathcal{R}_{N;Y} = mQ + v''_N \sqrt{Q}.$$

Compte tenu de (5.1)–(5.2) et (5.13)–(5.14), nous notons que pour un usage ultérieur,

$$(5.15) \quad (N+1)^{1/2} \Delta_N = \eta'_N - v'_N \quad \text{et} \quad (N+1)^{1/2} \Theta_N = \eta'_N + v'_N.$$

Or, de (5.1) et (5.13), on a,

$$m(N+1) + \eta'_N \sqrt{N+1} = \sum_{k=0}^N Z_{k,N} \quad \text{et} \quad mP + \eta''_N \sqrt{P} = \sum_{k=N+1}^{N+P} Z_{k,N}$$

i.e,

$$\eta'_N = \sqrt{N+1} \left(\frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N Z_{k,N} - m \right) \quad \text{et} \quad \eta''_N = \sqrt{P} \left(\frac{1}{P} \sum_{k=N+1}^{N+P} Z_{k,N} - m \right).$$

De même, de (5.2) et (5.14), on a,

$$m(N+1) + v'_N \sqrt{N+1} = \sum_{k=0}^N Z'_{k,N} \quad \text{et} \quad mQ + v''_N \sqrt{Q} = \sum_{k=N+1}^{N+Q} Z'_{k,N}$$

i.e,

$$v'_N = \sqrt{N+1} \left(\frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N Z'_{k,N} - m \right) \quad \text{et} \quad v''_N = \sqrt{Q} \left(\frac{1}{Q} \sum_{k=N+1}^{N+Q} Z'_{k,N} - m \right).$$

Donc, on a, lorsque $N \rightarrow \infty$, la normalité asymptotique jointe suivante,

$$(5.16) \quad \begin{pmatrix} \eta'_N \\ \eta''_N \\ v'_N \\ v''_N \end{pmatrix} \xrightarrow{d} N \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \Sigma \right),$$

où

$$(5.17) \quad \Sigma = \begin{bmatrix} A & E & F & G \\ E & B & H & I \\ F & H & C & J \\ G & I & J & D \end{bmatrix},$$

avec

$$\begin{aligned} A &= \lim_{N \rightarrow \infty} \text{Var} \left\{ \frac{1}{\sqrt{N+1}} \left(\sum_{k=0}^N Z_{k,N} - m(N+1) \right) \right\}, \\ B &= \lim_{N \rightarrow \infty} \text{Var} \left\{ \frac{1}{\sqrt{P}} \left(\sum_{k=N+1}^{N+P} Z_{k,N} - m P \right) \right\}, \\ C &= \lim_{N \rightarrow \infty} \text{Var} \left\{ \frac{1}{\sqrt{N+1}} \left(\sum_{k=0}^N Z'_{k,N} - m(N+1) \right) \right\}, \\ D &= \lim_{N \rightarrow \infty} \text{Var} \left\{ \frac{1}{\sqrt{Q}} \left(\sum_{k=N+1}^{N+Q} Z'_{k,N} - m Q \right) \right\}, \\ E &= \lim_{N \rightarrow \infty} \text{Cov} \left\{ \frac{1}{\sqrt{N+1}} \left(\sum_{k=0}^N Z_{k,N} - m(N+1) \right), \frac{1}{\sqrt{P}} \left(\sum_{k=N+1}^{N+P} Z_{k,N} - m P \right) \right\} \\ F &= \lim_{N \rightarrow \infty} \text{Cov} \left\{ \frac{1}{\sqrt{N+1}} \left(\sum_{k=0}^N Z_{k,N} - m(N+1) \right), \frac{1}{\sqrt{N+1}} \left(\sum_{k=0}^N Z'_{k,N} - m(N+1) \right) \right\}, \\ G &= \lim_{N \rightarrow \infty} \text{Cov} \left\{ \frac{1}{\sqrt{N+1}} \left(\sum_{k=0}^N Z_{k,N} - m(N+1) \right), \frac{1}{\sqrt{Q}} \left(\sum_{k=N+1}^{N+Q} Z'_{k,N} - m Q \right) \right\}, \\ H &= \lim_{N \rightarrow \infty} \text{Cov} \left\{ \frac{1}{\sqrt{P}} \left(\sum_{k=N+1}^{N+P} Z_{k,N} - m P \right), \frac{1}{\sqrt{N+1}} \left(\sum_{k=0}^N Z'_{k,N} - m(N+1) \right) \right\}, \\ I &= \lim_{N \rightarrow \infty} \text{Cov} \left\{ \frac{1}{\sqrt{P}} \left(\sum_{k=N+1}^{N+P} Z_{k,N} - m P \right), \frac{1}{\sqrt{Q}} \left(\sum_{k=N+1}^{N+Q} Z'_{k,N} - m Q \right) \right\} \text{ et} \\ J &= \lim_{N \rightarrow \infty} \text{Cov} \left\{ \frac{1}{\sqrt{N+1}} \left(\sum_{k=0}^N Z'_{k,N} - m(N+1) \right), \frac{1}{\sqrt{Q}} \left(\sum_{k=N+1}^{N+Q} Z'_{k,N} - m Q \right) \right\}. \end{aligned}$$

Or

$$(5.18) \quad A = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N \text{Var}(Z_{0,N}) \right\} = \text{Var}(Z_{0,N}) = m,$$

$$(5.19) \quad B = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{P} \sum_{k=N+1}^{N+P} \text{Var}(Z_{0,N}) \right\} = \text{Var}(Z_{0,N}) = m,$$

de même, on a,

$$(5.20) \quad C = D = m.$$

De plus, comme les suites de v.a. $\{Z_{k,N} : k \geq 0\}$ et $\{Z'_{k,N} : k \geq 0\}$ sont indépendantes, on a,

$$(5.21) \quad E = F = G = H = I = J = 0.$$

Et donc, de (5.19)–(5.21), on en déduit que,

$$(5.22) \quad \Sigma = m \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

D'où, de (5.16) et (5.22), on en déduit que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(5.23) \quad \begin{pmatrix} \eta'_N \\ \eta''_N \\ v'_N \\ v''_N \end{pmatrix} \xrightarrow{d} N \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, m \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right).$$

Par suite, on en déduit que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(5.24) \quad (\eta'_N, \eta''_N, v'_N, v''_N) \xrightarrow{d} (\eta', \eta'', v', v''),$$

où η', η'', v', v'' désignent des v.a. indépendantes de loi $N(0, m)$. Nous obtenons donc que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}_N &= \left\{ m + \frac{v'_N \sqrt{N+1} + v''_N \sqrt{Q}}{N+Q+1} \right\} \left\{ m + \frac{\eta'_N \sqrt{N+1} + \eta''_N \sqrt{P}}{N+P+1} \right\}^{-1} - 1 \\ &= \left\{ m + \frac{v'_N \sqrt{N+1} + v''_N \sqrt{Q}}{N+Q+1} \right\} \left\{ \frac{1}{m} - \frac{1}{m^2} \frac{\eta'_N \sqrt{N+1} + \eta''_N \sqrt{P}}{N+P+1} \right\}^{-1} - 1 \\ &= 1 - \frac{1}{m} \frac{\eta'_N \sqrt{N+1} + \eta''_N \sqrt{P}}{N+P+1} + \frac{1}{m} \frac{v'_N \sqrt{N+1} + v''_N \sqrt{Q}}{N+Q+1} \\ &\quad - \frac{1}{m^2} \left(\frac{v'_N \sqrt{N+1} + v''_N \sqrt{Q}}{N+Q+1} \right) \left(\frac{\eta'_N \sqrt{N+1} + \eta''_N \sqrt{P}}{N+P+1} \right) - 1 \\ &= -\frac{1}{m} \frac{\eta'_N \sqrt{N+1} + \eta''_N \sqrt{P}}{N+P+1} + \frac{1}{m} \frac{v'_N \sqrt{N+1} + v''_N \sqrt{Q}}{N+Q+1} \\ &\quad - \frac{1}{m^2} \frac{v'_N \eta'_N (N+1)}{(N+Q+1)(N+P+1)} - \frac{1}{m^2} \frac{v'_N \eta''_N \sqrt{N+1} \sqrt{P}}{(N+Q+1)(N+P+1)} \\ &\quad - \frac{1}{m^2} \frac{v''_N \eta'_N \sqrt{Q} \sqrt{N+1}}{(N+Q+1)(N+P+1)} - \frac{1}{m^2} \frac{v''_N \eta''_N \sqrt{Q} \sqrt{P}}{(N+Q+1)(N+P+1)}. \end{aligned}$$

D'après (5.24), on a, lorsque $N \rightarrow \infty$, $\eta'_N \xrightarrow{d} \eta'$, $\eta''_N \xrightarrow{d} \eta''$, $v'_N \xrightarrow{d} v'$, $v''_N \xrightarrow{d} v''$, et donc, on a, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(5.25) \quad \eta'_N = \eta''_N = v'_N = v''_N = O_{\mathbb{P}}(1).$$

D'où, on a, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}_N &= -\frac{1}{m} \frac{\eta'_N \sqrt{N+1} + \eta''_N \sqrt{P}}{N+P+1} + \frac{1}{m} \frac{v'_N \sqrt{N+1} + v''_N \sqrt{Q}}{N+Q+1} \\ &\quad + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{N+1}{(N+Q+1)(N+P+1)} \right) + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\sqrt{N+1} \sqrt{P}}{(N+Q+1)(N+P+1)} \right) \\ &\quad + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\sqrt{Q} \sqrt{N+1}}{(N+Q+1)(N+P+1)} \right) + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\sqrt{Q} \sqrt{P}}{(N+Q+1)(N+P+1)} \right). \end{aligned}$$

Or, d'après (1.3), on a, $P = P(N) = N_1 - N \geq 0$ et $Q = Q(N) = N_2 - N \geq 0$, donc, on a, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}_N &= -\frac{1}{m} \frac{\eta'_N \sqrt{N+1} + \eta''_N \sqrt{P}}{N+P+1} + \frac{1}{m} \frac{v'_N \sqrt{N+1} + v''_N \sqrt{Q}}{N+Q+1} \\ &\quad + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{N_1 - P + 1}{(N_1 - P + Q + 1)(N_1 + 1)} \right) + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\sqrt{N_1 - P + 1} \sqrt{N_1 - N}}{(N_1 + Q - P + 1)(N_1 + 1)} \right) \\ &\quad + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\sqrt{N_2 - N} \sqrt{N_2 - Q + 1}}{(N_2 + 1)(N_2 + P - Q + 1)} \right) + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\sqrt{N_2 - N} \sqrt{N_1 - N}}{(N_1 + 1)(N_2 + 1)} \right) \\ &= -\frac{1}{m} \frac{\eta'_N \sqrt{N+1} + \eta''_N \sqrt{P}}{N+P+1} + \frac{1}{m} \frac{v'_N \sqrt{N+1} + v''_N \sqrt{Q}}{N+Q+1} \\ &\quad + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{N_1 + 1} \right) + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{N_2 + 1} \right) \\ &= -\frac{1}{m} \frac{\eta'_N \sqrt{N+1} + \eta''_N \sqrt{P}}{N+P+1} + \frac{1}{m} \frac{v'_N \sqrt{N+1} + v''_N \sqrt{Q}}{N+Q+1} \\ &\quad + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{N+P+1} \right) + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{N+Q+1} \right). \end{aligned}$$

Or, $\forall N \geq 1$, on a, les inégalités suivantes,

$$(5.26) \quad \frac{1}{\sqrt{N+P+1}} \leq \frac{\sqrt{N+1} + \sqrt{P}}{N+P+1} \leq \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{N+P+1}}$$

et $\frac{1}{\sqrt{N+Q+1}} \leq \frac{\sqrt{N+1} + \sqrt{Q}}{N+Q+1} \leq \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{N+Q+1}},$

donc, d'après (5.25) et (5.26), on en déduit que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(5.27) \quad \begin{aligned} \mathcal{Q}_N &= \frac{1}{m} \frac{v'_N \sqrt{N+1} + v''_N \sqrt{Q}}{N+Q+1} - \frac{1}{m} \frac{\eta'_N \sqrt{N+1} + \eta''_N \sqrt{P}}{N+P+1} \\ &\quad + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{N+P+1} \right) + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{N+Q+1} \right) \\ &= O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{\sqrt{N+P+1}} \right) + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{\sqrt{N+Q+1}} \right) = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{\sqrt{N+1}} \right) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \end{aligned}$$

Or, d'après (5.23), on a, $\forall w_1, w_2, w_3, w_4 \in \mathbb{R}$, et lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} \varphi_{\eta'_N, \eta''_N, v'_N, v''_N}(w_1, w_2, w_3, w_4) &= \mathbb{E} \left(e^{i w_1 \eta'_N + i w_2 \eta''_N + i w_3 v'_N + i w_4 v''_N} \right) \\ &\rightarrow \varphi(w_1, w_2, w_3, w_4) = \exp \left[-\frac{1}{2} \{ m (w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 + w_4^2) \} \right]. \end{aligned}$$

Donc, en posant $w_1 = -\frac{1}{m} \frac{N+1}{N+P+1} w_1$, $w_2 = -\frac{1}{m} \frac{\sqrt{(N+1)P}}{N+P+1} w_1$,
 $w_3 = \frac{1}{m} \frac{N+1}{N+Q+1} w_1$ et $w_4 = \frac{1}{m} \frac{\sqrt{(N+1)Q}}{N+Q+1} w_1$, on a, pour tout $w_1 \in \mathbb{R}$,
et lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} &\varphi \left\{ \frac{1}{m} \sqrt{N+1} \left(\frac{v'_N \sqrt{N+1} + v''_N \sqrt{Q}}{N+Q+1} - \frac{\eta'_N \sqrt{N+1} + \eta''_N \sqrt{P}}{N+P+1} \right) \right\}^{(w_1)} \\ &\rightarrow \varphi \left(-\frac{1}{m} \frac{N+1}{N+P+1} w_1, -\frac{1}{m} \frac{\sqrt{(N+1)P}}{N+P+1} w_1, \frac{1}{m} \frac{N+1}{N+Q+1} w_1, \frac{1}{m} \frac{\sqrt{(N+1)Q}}{N+Q+1} w_1 \right) \\ &= \exp \left(-\frac{1}{2} \left[m \cdot \frac{1}{m^2} \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \frac{(N+1)^2 + (N+1)P}{(N+P+1)^2} + \frac{(N+1)^2 + (N+1)Q}{(N+Q+1)^2} \right\} \right] w_1^2 \right) \\ &= \exp \left(-\frac{1}{2} \sigma_2^2(c, d) w_1^2 \right). \end{aligned}$$

Donc, on en déduit que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(5.28) \quad \sqrt{N+1} \mathcal{Q}_N \xrightarrow{d} N(0, \sigma_2^2(c, d)),$$

où nous faisons usage de (1.4) pour écrire,

$$\begin{aligned} \sigma_2^2(c, d) &= \frac{1}{m} \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \frac{(N+1)^2 + (N+1)P}{(N+1+P)^2} + \frac{(N+1)^2 + (N+1)Q}{(N+1+Q)^2} \right\} \\ &= \frac{1}{m} \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1 + \frac{P}{N+1}}{1 + 2 \frac{P}{N+1} + \left(\frac{P}{N+1} \right)^2} + \frac{1 + \frac{Q}{N+1}}{1 + 2 \frac{Q}{N+1} + \left(\frac{Q}{N+1} \right)^2} \right\} \\ &= \frac{1}{m} \left\{ \frac{1}{1+c} + \frac{1}{1+d} \right\}. \end{aligned}$$

Nous obtenons ainsi (5.11) et (5.12).

Pour compléter notre preuve, nous combinons (5.8) avec (5.15) et (5.27). Nous obtenons que,

$$\begin{aligned}
(5.29) \quad & (N+1)^{1/2} \mathcal{D}_N \\
&= (N+1)^{1/2} \mathcal{Q}_N + \frac{1}{2m} \left\{ \frac{N+1}{N+P+1} + \frac{N+1}{N+Q+1} \right\} (N+1)^{1/2} \Delta_N \\
&\quad + \frac{1}{2m} \left\{ \frac{N+1}{N+P+1} - \frac{N+1}{N+Q+1} \right\} (N+1)^{1/2} \Theta_N \\
&= (N+1)^{1/2} \mathcal{Q}_N + \frac{1}{2m} \left\{ \frac{N+1}{N+P+1} + \frac{N+1}{N+Q+1} \right\} (\eta'_N - v'_N) \\
&\quad + \frac{1}{2m} \left\{ \frac{N+1}{N+P+1} - \frac{N+1}{N+Q+1} \right\} (\eta'_N + v'_N) \\
&= \frac{1}{m} \frac{v''_N \sqrt{(N+1)Q}}{N+Q+1} - \frac{1}{m} \frac{\eta''_N \sqrt{(N+1)P}}{N+P+1} \\
&\quad + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{\sqrt{N+P+1}} \right) + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{\sqrt{N+Q+1}} \right) \xrightarrow{d} N(0, \sigma_1^2(c, d)),
\end{aligned}$$

où compte tenu de (5.23),

$$\begin{aligned}
(5.30) \quad \sigma_1^2(c, d) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ m \cdot \frac{1}{m^2} \left(\frac{(N+1)Q}{(N+1+Q)^2} + \frac{(N+1)P}{(N+1+P)^2} \right) \right\} \\
&= \frac{1}{m} \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \frac{(N+1)Q}{(N+1+Q)^2} + \frac{(N+1)P}{(N+1+P)^2} \right\} \\
&= \frac{1}{m} \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \frac{\frac{Q}{N+1}}{1+2\frac{Q}{N+1} + \left(\frac{Q}{N+1}\right)^2} + \frac{\frac{P}{N+1}}{1+2\frac{P}{N+1} + \left(\frac{P}{N+1}\right)^2} \right\} \\
&= \frac{1}{m} \left\{ \frac{d}{(1+d)^2} + \frac{c}{(1+c)^2} \right\},
\end{aligned}$$

ce qui donne (5.10). \square

En faisant usage du fait 3, nous pouvons définir, pour chaque $N \geq 1$, une v.a. $\theta'_N \stackrel{d}{=} N(0, 1)$, indépendante de $\{\zeta_{\ell, N} : \ell \geq 1\}$ telle que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(5.31) \quad \frac{1}{m} \frac{\eta''_N \sqrt{(N+1)P}}{N+P+1} - \frac{1}{\sqrt{m}} \frac{\sqrt{(N+1)P}}{N+P+1} \theta'_N = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\sqrt{N+1} \log P}{N+P+1} \right).$$

De même, en faisant usage du fait 3, nous pouvons définir, pour chaque $N \geq 1$, une v.a. $\theta''_N \stackrel{d}{=} N(0, 1)$, indépendante de $\{\xi_{\ell, N} : \ell \geq 1\}$ telle que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(5.32) \quad \frac{1}{m} \frac{v''_N \sqrt{(N+1)Q}}{N+Q+1} - \frac{1}{\sqrt{m}} \frac{\sqrt{(N+1)Q}}{N+Q+1} \theta''_N = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\sqrt{N+1} \log Q}{N+Q+1} \right).$$

Donc d'après (5.31) et (5.32), nous pouvons définir pour chaque $N \geq 1$, une v.a. $\theta_N \stackrel{d}{=} N(0, 1)$, indépendante de $\{\zeta_{\ell, N} : \ell \geq 1\}$ et $\{\xi_{\ell, N} : \ell \geq 1\}$ (et donc, de Δ_N , Θ_N , ϕ_N et ψ_N , comme défini dans la proposition 4.4), telle que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned}
(5.33) \quad & \frac{1}{m} \frac{v_N'' \sqrt{(N+1)Q}}{N+Q+1} - \frac{1}{m} \frac{\eta_N'' \sqrt{(N+1)P}}{N+P+1} - \left\{ \frac{1}{m} \left(\frac{(N+1)P}{(N+P+1)^2} \right. \right. \\
& \left. \left. + \frac{(N+1)Q}{(N+Q+1)^2} \right) \right\}^{1/2} \theta_N \\
& = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\sqrt{N+1} \log P}{N+P+1} \right) + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\sqrt{N+1} \log Q}{N+Q+1} \right) \\
& = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\sqrt{N_1 - P + 1} \log(N_1 - N)}{N_1 + 1} \right) + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\sqrt{N_2 - Q + 1} \log(N_2 - N)}{N_2 + 1} \right) \\
& = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\log(N_1 + 1)}{\sqrt{N_1 + 1}} \right) + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\log(N_2 + 1)}{\sqrt{N_2 + 1}} \right) \\
& = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\log(N + P + 1)}{\sqrt{N + P + 1}} \right) + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\log(N + Q + 1)}{\sqrt{N + Q + 1}} \right) = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{\log N}{\sqrt{N}} \right).
\end{aligned}$$

Démonstration du lemme 5.1. Faisons un développement limité de Taylor à l'ordre 2, de l'expression $G_3^{(m)}(\tau_N(t)) - G_3^{(m)}(t)$ dans (5.5). On a, uniformément en $t \in [0, 1]$, et lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned}
(5.34) \quad & G_3^{(m)}(\tau_N(t)) - G_3^{(m)}(t) \\
& = (\tau_N(t) - t) G_3^{(m)'}(t) + \frac{(\tau_N(t) - t)^2}{2} G_3^{(m)''}(t) + O \left[(\tau_N(t) - t)^2 \right] \\
& = \frac{(2m-1)!}{((m-1)!)^2} (t(1-t))^{m-1} (\tau_N(t) - t) \\
& \quad + \frac{(2m-1)!}{2(m-2)!(m-1)!} (1-2t) (t(1-t))^{m-2} (\tau_N(t) - t)^2 \\
& \quad + O \left[(\tau_N(t) - t)^2 \right].
\end{aligned}$$

Or, en se rappelant de (5.7) et (5.34), on a, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$\sup_{0 \leq t \leq 1} |\tau_N(t) - t| \leq \frac{1}{4} |\mathcal{Q}_N| \{1 - |\mathcal{Q}_N|\}^{-1} = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{\sqrt{N+1}} \right).$$

D'où, on a, uniformément en $t \in [0, 1]$, et lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(5.35) \quad \tau_N(t) - t = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{\sqrt{N+1}} \right).$$

Donc, de (5.34), (5.35) et comme la fonction $t \mapsto (1-2t) (t(1-t))^{m-2}$ est bornée sur $[0, 1]$, on en déduit que, l'on a, uniformément en $t \in [0, 1]$, et lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(5.36) \quad G_3^{(m)}(\tau_N(t)) - G_3^{(m)}(t) = \frac{(2m-1)!}{((m-1)!)^2} (t(1-t))^{m-1} (\tau_N(t) - t) + O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{N+1} \right).$$

D'où, de (5.5) et (5.36), on en déduit (5.6), ce qui achève la démonstration du lemme 5.1. \square

Lemme 5.3. *Nous avons, lorsque $N \rightarrow \infty$,*

$$(5.37) \quad \sup_{0 \leq t \leq 1} \left| (N+1)^{1/2} (\tau_N(t) - t) + t(1-t) (N+1)^{1/2} \mathcal{Q}_N \right| = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \right).$$

Démonstration. En se rappelant de l'expression (5.7) de $\tau_N(t) - t$ et en faisant un D.L. à l'ordre 2 de $\tau_N(t) - t$, on a, uniformément en $t \in [0, 1]$, et lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} & (N+1)^{1/2} (\tau_N(t) - t) \\ &= - (N+1)^{1/2} t(1-t) \mathcal{Q}_N \cdot \frac{1}{1 + (1-t) \mathcal{Q}_N} \\ &= -t(1-t) (N+1)^{1/2} \mathcal{Q}_N (1 - (1-t) \mathcal{Q}_N) \\ &= -t(1-t) (N+1)^{1/2} \mathcal{Q}_N + t(1-t)^2 (N+1)^{1/2} \mathcal{Q}_N^2. \end{aligned}$$

Or, d'après (5.11), on a, lorsque $N \rightarrow \infty$, $(N+1)^{1/2} \mathcal{Q}_N = O_{\mathbb{P}}(1)$, de plus $t \mapsto t(1-t)^2$ est bornée sur $[0, 1]$, donc, on a, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(N+1)^{1/2} (\tau_N(t) - t) = -t(1-t) (N+1)^{1/2} \mathcal{Q}_N + O_{\mathbb{P}} \left((N+1)^{1/2} \mathcal{Q}_N^2 \right).$$

Et donc, on en déduit que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} & \sup_{0 \leq t \leq 1} \left| (N+1)^{1/2} (\tau_N(t) - t) + t(1-t) (N+1)^{1/2} \mathcal{Q}_N \right| \\ &= O_{\mathbb{P}} \left((N+1)^{1/2} \mathcal{Q}_N^2 \right) = O_{\mathbb{P}} \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \right), \end{aligned}$$

ce qui achève la démonstration du lemme 5.3. \square

Le fait suivant est une conséquence directe du théorème 1.2 de Deheuvels et Einmahl[13] (voir aussi Stute[27] et le théorème 3.1 de Deheuvels et Mason[14], pour les versions antérieures et les variantes de ce résultat).

Fait 5. *Soit $\{h_N : N \geq 1\}$ une suite de constantes positives telle que, lorsque $N \rightarrow \infty$,*

$$h_N \rightarrow \infty, \quad \frac{N h_N}{\log N} \rightarrow \infty \quad \text{et} \quad \frac{\log(1/h_N)}{\log \log N} \rightarrow \infty.$$

Alors, nous avons, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(5.38) \quad \{2 h_N \log(1/h_N)\}^{-1/2} \sup_{\substack{0 \leq t, s \leq 1 \\ |t-s| \leq h_N}} |\alpha_{N;1}(t) - \alpha_{N;1}(s)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 1.$$

Lemme 5.4. *Nous avons, lorsque $N \rightarrow \infty$,*

$$(5.39) \quad \sup_{0 \leq t \leq 1} \left| \alpha_{N;1} \left(G_3^{(m)}(\tau_N(t)) \right) - \alpha_{N;1} \left(G_3^{(m)}(t) \right) \right| = O_{\mathbb{P}} \left(N^{-1/4} (\log(N))^{1/2} \right).$$

Démonstration. D'après (5.35) et (5.36), et comme $t \mapsto \frac{(2m-1)!}{((m-1)!)^2} (t(1-t))^{m-1}$ est bornée sur $[0, 1]$, on a, uniformément en $t \in [0, 1]$, et lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$G_3^{(m)}(\tau_N(t)) - G_3^{(m)}(t) = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right).$$

D'où, on en déduit, que lorsque $N \rightarrow \infty$, on a,

$$\sup_{0 \leq t \leq 1} \left| G_3^{(m)}(\tau_N(t)) - G_3^{(m)}(t) \right| = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right).$$

Par conséquent, $\forall \varepsilon > 0, \exists C_\varepsilon < \infty$, tel que

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left[\sup_{0 \leq t \leq 1} \left| G_3^{(m)}(\tau_N(t)) - G_3^{(m)}(t) \right| \geq \frac{C_\varepsilon}{\sqrt{N}} \right] < \varepsilon.$$

Donc, avec une probabilité supérieure ou égale à $1 - \varepsilon$, on a, à partir d'un certain rang,

$$\sup_{0 \leq t \leq 1} \left| G_3^{(m)}(\tau_N(t)) - G_3^{(m)}(t) \right| \leq \frac{C_\varepsilon}{\sqrt{N}}.$$

D'où, pour tout $t \in [0, 1]$, on a,

$$\left| G_3^{(m)}(\tau_N(t)) - G_3^{(m)}(t) \right| \leq \frac{C_\varepsilon}{\sqrt{N}}.$$

Posons, pour tout $N \geq 1$, $h_N = \frac{C_\varepsilon}{\sqrt{N}}$. On constate que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$h_N \downarrow 0, \quad \frac{N h_N}{\log N} \rightarrow \infty \quad \text{et} \quad \frac{\log(1/h_N)}{\log \log N} \rightarrow \infty.$$

Donc, h_N vérifie les conditions du fait 5 appliqué au processus empirique uniforme $\alpha_{N;1}$. On a, donc, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$\left\{ 2 C_\varepsilon N^{-1/2} \log \left(N^{1/2} C_\varepsilon^{-1} \right) \right\}^{-1/2} \times \sup_{0 \leq t \leq 1} \left| \alpha_{N;1} \left(G_3^{(m)}(\tau_N(t)) \right) - \alpha_{N;1} \left(G_3^{(m)}(t) \right) \right| = O_{\mathbb{P}}(1),$$

$$G_3^{(m)}(\tau_N(t)) - G_3^{(m)}(t) \leq \frac{C_\varepsilon}{\sqrt{N}}$$

i.e,

$$\left\{ \sqrt{C_\varepsilon} N^{-1/4} (\log N)^{1/2} \right\}^{-1} \times \sup_{0 \leq t \leq 1} \left| \alpha_{N;1} \left(G_3^{(m)}(\tau_N(t)) \right) - \alpha_{N;1} \left(G_3^{(m)}(t) \right) \right| = O_{\mathbb{P}}(1).$$

$$G_3^{(m)}(\tau_N(t)) - G_3^{(m)}(t) \leq \frac{C_\varepsilon}{\sqrt{N}}$$

D'où, on en déduit (5.39), ce qui achève la démonstration du lemme 5.4. \square

Proposition 5.1. *Sur un espace $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ de probabilité convenable, il existe une suite $\{B_N(\cdot) : N \geq 1\}$ de ponts Browniens, et des suites $\{\phi_N, \psi_N, \theta_N : N \geq 1\}$ de variables aléatoires normales $N(0, 1)$, tels que, pour chaque $N \geq 1$, $\{B_N(v) : 0 \leq v \leq 1\}$, ϕ_N , ψ_N et θ_N soient indépendants, et vérifient, lorsque $N \rightarrow \infty$,*

$$(5.40) \quad \sup_{0 \leq t \leq 1} \left| \gamma_{N; n_1, n_2}(t) - B_N(H_m(t)) + \frac{(2m-1)!}{((m-1)!)^2} (t(1-t))^m \times \right. \\ \left. \left[\left\{ \frac{1}{m} \left(\frac{(N+1)P}{(N+1+P)^2} + \frac{(N+1)Q}{(N+1+Q)^2} \right) \right\}^{1/2} \theta_N \right. \right. \\ \left. \left. - \frac{1}{2m} \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right\} \left(\phi_N \sqrt{\frac{2m}{2m+1}} - 4m \int_0^1 B_N(H_m(x)) dx \right) \right. \right. \\ \left. \left. - \frac{1}{2m} \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} - \frac{N+1}{N+1+Q} \right\} \psi_N \sqrt{2m} \right] \right| = O_{\mathbb{P}} \left(N^{-1/4} (\log N)^{1/2} \right).$$

Démonstration. Nous déduisons facilement (5.40) de (5.6) dans le lemme 5.1, de (5.39) dans le lemme 5.4, de (5.37) dans le lemme 5.3, des 1^{re} et 4^e parties de (5.29) dans la démonstration du lemme 5.2 et de (5.33), en combinaison avec (3.42), (3.43) et (3.44) dans le théorème 3.1. \square

5.2 Preuve du théorème 1.2

D'après (5.40), nous avons, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$\sup_{0 \leq t \leq 1} \left| \gamma_{N; n_1, n_2}(t) - B_N(H_m(t)) + \frac{(2m-1)!}{((m-1)!)^2} (t(1-t))^m \times \right. \\ \left. \left[\left\{ \frac{1}{m} \left(\frac{(N+1)P}{(N+1+P)^2} + \frac{(N+1)Q}{(N+1+Q)^2} \right) \right\}^{1/2} \theta_N \right. \right. \\ \left. \left. - \frac{1}{2m} \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right\} \left(\phi_N \sqrt{\frac{2m}{2m+1}} - 4m \int_0^1 B_N(H_m(x)) dx \right) \right. \right. \\ \left. \left. - \frac{1}{2m} \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} - \frac{N+1}{N+1+Q} \right\} \psi_N \sqrt{2m} \right] \right| = O_{\mathbb{P}} \left(N^{-1/4} (\log N)^{1/2} \right).$$

Maintenant, nous avons les identités en loi suivantes. En se rappelant de la définition (1.7) de H_m et en posant $\{B(t) : 0 \leq t \leq 1\}$ qui désigne un pont Brownien, ϕ , ψ , et θ , qui désignent des variables aléatoires normales $N(0, 1)$ tels que, $\{B(t) : 0 \leq t \leq 1\}$, ϕ , ψ , et θ soient indépendants, nous avons,

$$\begin{aligned}
\mathfrak{Y}_N(t) &:= B_N(H_m(t)) - \frac{(2m-1)!}{((m-1)!)^2} (t(1-t))^m \times \\
&\quad \left[\left\{ \frac{1}{m} \left(\frac{(N+1)P}{(N+1+P)^2} + \frac{(N+1)Q}{(N+1+Q)^2} \right) \right\}^{1/2} \theta_N \right. \\
&\quad \left. - \frac{1}{2m} \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right\} \right. \\
&\quad \times \left(\phi_N \sqrt{\frac{2m}{2m+1}} - 4m \int_0^1 B_N(H_m(x)) \, dx \right) \\
&\quad \left. - \frac{1}{2m} \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} - \frac{N+1}{N+1+Q} \right\} \psi_N \sqrt{2m} \right] \\
&\stackrel{d}{=} B(H_m(t)) - 4(2m+1) \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} (t(1-t))^m \\
&\quad \times \left\{ \frac{m}{2m+1} \left[\frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right] \int_0^1 B(H_m(x)) \, dx \right. \\
&\quad \left. + \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} (t(1-t))^m \left[\left\{ \frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right\} \right. \right. \\
&\quad \times \phi \sqrt{\frac{2m}{2m+1}} + \left. \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} - \frac{N+1}{N+1+Q} \right\} \psi \sqrt{2m} \right. \\
&\quad \left. \left. - \left\{ \frac{(N+1)P}{(N+1+P)^2} + \frac{(N+1)Q}{(N+1+Q)^2} \right\}^{1/2} \theta \sqrt{2m} \right] \right\} \\
&= (B \circ H_m) \left\{ \frac{m}{2m+1} \left[\frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right] \right\}^{(t) + \Psi(t)Y},
\end{aligned}$$

où $(B \circ H_m)_C(\cdot)$ est comme dans (2.20), $\Psi(t) = \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} (t(1-t))^m$

et $\sigma_{\mathfrak{X}}^2 = \sigma_{B \circ H_m}^2 = \frac{1}{4(2m+1)}$ sont comme dans (2.16) et (2.17), et

$$\begin{aligned}
Y &\stackrel{d}{=} N \left(0, \frac{2m}{2m+1} \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right\}^2 + 2m \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} - \frac{N+1}{N+1+Q} \right\}^2 \right. \\
&\quad \left. + 4m \left\{ \frac{(N+1)P}{(N+1+P)^2} + \frac{(N+1)Q}{(N+1+Q)^2} \right\} \right)
\end{aligned}$$

est indépendant de $(B \circ H_m)(\cdot)$. Maintenant, nous appliquons (2.12), pris avec

$$\begin{aligned}
C &= \frac{m}{2m+1} \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right\}, \quad \sigma^2 = \frac{2m}{2m+1} \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right\}^2 \\
&+ 2m \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} - \frac{N+1}{N+1+Q} \right\}^2 + 4m \left\{ \frac{(N+1)P}{(N+1+P)^2} + \frac{(N+1)Q}{(N+1+Q)^2} \right\}, \quad \mathfrak{X} = B \circ H_m
\end{aligned}$$

et $\sigma_{\mathfrak{X}}^2 = \frac{1}{4(2m+1)}$.

Il est facile de montrer que

$$\begin{aligned}
(1-C)^2 + \sigma^2 \sigma_{\mathfrak{X}}^2 &= \left(1 - \frac{m}{2m+1} \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right\}\right)^2 \\
&\quad + \frac{m}{2(2m+1)^2} \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right\}^2 \\
&\quad + \frac{m}{2(2m+1)} \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} - \frac{N+1}{N+1+Q} \right\}^2 \\
&\quad + \frac{m}{2m+1} \left\{ \frac{(N+1)P}{(N+1+P)^2} + \frac{(N+1)Q}{(N+1+Q)^2} \right\} \\
&= 1 - \frac{m}{2m+1} \left\{ \frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right\} := R_{N,m}.
\end{aligned}$$

En se rappelant de (2.5) et (2.8), nous obtenons aussi que

$$\begin{aligned}
\mathfrak{Y}_N(\cdot) &= (B \circ H_m) \left\{ \frac{m}{2m+1} \left[\frac{N+1}{N+1+P} + \frac{N+1}{N+1+Q} \right] \right\} (\cdot) + \Psi(\cdot)Y \\
&\stackrel{d}{=} (B \circ H_m)_{\{1 \pm \sqrt{R_{N,m}}\}}(\cdot) = J_{\{1 \pm \sqrt{R_{N,m}}\}} B \circ H_m(\cdot).
\end{aligned}$$

Ceci montre que les suites de processus $\{\mathcal{B}_N^+(t) : 0 \leq t \leq 1\}$ et $\{\mathcal{B}_N^-(t) : 0 \leq t \leq 1\}$, $N = 1, 2, \dots$, définies en posant

$$\begin{aligned}
(5.41) \quad \mathcal{B}_N^+ \circ H_m(\cdot) &= J_{\left\{ \frac{R_{N,m} + \sqrt{R_{N,m}}}{R_{N,m}} \right\}} \mathfrak{Y}_N(\cdot) = J_{\{1 + \sqrt{R_{N,m}}\}}^{-1} \mathfrak{Y}_N(\cdot) \\
&\stackrel{d}{=} J_{\{1 + \sqrt{R_{N,m}}\}}^{-1} \circ J_{\{1 + \sqrt{R_{N,m}}\}} B \circ H_m(\cdot) = B \circ H_m(\cdot),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(5.42) \quad \mathcal{B}_N^- \circ H_m(\cdot) &= J_{\left\{ \frac{R_{N,m} - \sqrt{R_{N,m}}}{R_{N,m}} \right\}} \mathfrak{Y}_N(\cdot) = J_{\{1 - \sqrt{R_{N,m}}\}}^{-1} \mathfrak{Y}_N(\cdot) \\
&\stackrel{d}{=} J_{\{1 - \sqrt{R_{N,m}}\}}^{-1} \circ J_{\{1 - \sqrt{R_{N,m}}\}} B \circ H_m(\cdot) = B \circ H_m(\cdot),
\end{aligned}$$

sont toutes les deux des ponts Browniens qui vérifient les identités

$$(5.43) \quad \mathfrak{Y}_N = J_{\{1 + \sqrt{R_{N,m}}\}} \mathcal{B}_N^+ \circ H_m = J_{\{1 - \sqrt{R_{N,m}}\}} \mathcal{B}_N^- \circ H_m,$$

ensemble avec

$$(5.44) \quad \mathcal{B}_N^+ \circ H_m = J_{\left\{ \frac{R_{N,m} + \sqrt{R_{N,m}}}{R_{N,m}} \right\}} \circ J_{\{1 - \sqrt{R_{N,m}}\}} \mathcal{B}_N^- \circ H_m = J_2 \mathcal{B}_N^- \circ H_m,$$

et

$$(5.45) \quad \mathcal{B}_N^- \circ H_m = J_{\left\{ \frac{R_{N,m} - \sqrt{R_{N,m}}}{R_{N,m}} \right\}} \circ J_{\{1 + \sqrt{R_{N,m}}\}} \mathcal{B}_N^+ \circ H_m = J_2 \mathcal{B}_N^+ \circ H_m.$$

Ceci suffit pour (1.18), (1.19) et (1.20) et complète la preuve du théorème 1.2. \square

5.3 Preuve du théorème 1.1

La preuve est essentiellement similaire à celle du théorème 1.2. Soit (1.4) vérifié avec $c = d = 0$. Une application de (5.40) montre que, lorsque $N \rightarrow \infty$,

$$(5.46) \quad \sup_{0 \leq t \leq 1} \left| \gamma_{N;n_1,n_2}(t) - B_N(H_m(t)) + \frac{(2m-1)!}{((m-1)!)^2} (t(1-t))^m \times \left\{ 4 \int_0^1 B_N(H_m(x)) dx - \frac{1}{m} \phi_N \sqrt{\frac{2m}{2m+1}} \right\} \right| = o_{\mathbb{P}}(1).$$

Par commodité, nous réécrivons le processus gaussien approchant $\gamma_{N;n_1,n_2}(\cdot)$ dans (5.46) en

$$B_N(H_m(t)) - 4(2m+1) \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} (t(1-t))^m \left\{ \frac{2m}{2m+1} \right\} \\ \times \int_0^1 B_N(H_m(x)) dx + \frac{(2m-1)!}{2m((m-1)!)^2} (t(1-t))^m \left\{ 2\phi_N \sqrt{\frac{2m}{2m+1}} \right\}.$$

Nous appliquons donc (2.12) pris avec

$$C = \frac{2m}{2m+1}, \quad \sigma^2 = \frac{8m}{2m+1}, \quad \mathfrak{X} = B \circ H_m \quad \text{et} \quad \sigma_{\mathfrak{X}}^2 = \frac{1}{4(2m+1)}.$$

Des calculs de routine montrent que

$$(1-C)^2 + \sigma^2 \sigma_{\mathfrak{X}}^2 = 1 - \frac{2m}{2m+1} = \frac{1}{2m+1}.$$

Étant donné ce fait, nous faisons usage de (5.46) et complétons la preuve du théorème 1.1 en suivant mot à mot les arguments utilisés pour la preuve juste donnée du théorème 1.2. \square

5.4 Preuve du théorème 1.3

Soient, pour $k = 0, \dots, N$, $S_{k,N;X}^{(m)}$ et $S_{k,N;Y}^{(m)}$ qui désignent les paires de m -espacements uniformes disjoints sur $(0, 1)$, engendrées par des suites indépendantes de v.a. i.i.d. de loi uniforme sur $(0, 1)$ définies comme dans (1.2), et posons $P = P(N)$ et $Q = Q(N)$ comme dans (1.3). Il est facile de montrer que, sous les hypothèses du théorème 1.3, nous avons, pour tout $0 \leq k \leq N$, et pour tout $0 \leq t \leq 1$, l'égalité d'événements suivante,

$$(5.47) \quad \left\{ \frac{e(N+1+P) S_{k,N;X}^{(m)}}{e(N+1+P) S_{k,N;X}^{(m)} + h(N+1+Q) S_{k,N;Y}^{(m)}} \leq t \right\} \\ = \left\{ \frac{(N+1+P) S_{k,N;X}^{(m)}}{(N+1+P) S_{k,N;X}^{(m)} + (N+1+Q) S_{k,N;Y}^{(m)}} \leq \frac{th}{th + (1-t)e} \right\}.$$

Compte tenu de (5.47), nous voyons que (1.21), (1.22) et (1.23) sont des conséquences directes de (1.17), (1.18) et (1.19). \square

Références

- [1] I. Berkes and W. Philipp. Approximation theorems for independent and weakly dependent random vectors. *Ann. Probab.*, 7(1) :29–54, 1979.
- [2] P. Billingsley. *Convergence of probability measures*. John Wiley & Sons Inc., New York, 1968.
- [3] N. Castle. Approximation fortes pour des processus bivariés. *Canad. J. Math.*, 54(3) :533–553, 2002.
- [4] N. Castle and F. Laurent-Bonvalot. Strong approximations of bivariate uniform empirical processes. *Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist.*, 34(4) :425–480, 1998.
- [5] E. Csáki. Some notes on the law of the iterated logarithm for empirical distribution function. In *Limit theorems of probability theory (Colloq., Keszthely, 1974)*, pages 47–58. Colloq. Math. Soc. János Bolyai, Vol. 11. North-Holland, Amsterdam, 1975.
- [6] E. Csáki. On the standardized empirical distribution function. In *Non-parametric statistical inference, Vol. I, II (Budapest, 1980)*, volume 32 of *Colloq. Math. Soc. János Bolyai*, pages 123–138. North-Holland, Amsterdam, 1982.
- [7] M. Csörgő, S. Csörgő, L. Horváth, and D. Mason. Weighted empirical and quantile processes. *Ann. Probab.*, 14(1) :31–85, 1986.
- [8] P. Deheuvels. An asymptotic decomposition for multivariate distribution-free tests of independence. *J. Multivariate Anal.*, 11(1) :102–113, 1981.
- [9] P. Deheuvels. A Karhunen-Loève expansion for a mean-centered Brownian bridge. *Statist. Probab. Lett.*, 77(12) :1190–1200, 2007.
- [10] P. Deheuvels and G. Derzko. A Glivenko-Cantelli-type theorem for the spacings-ratio empirical distribution functions. *Ann. I.S.U.P.*, 52(1-2) :25–38, 2008.
- [11] P. Deheuvels and G. Derzko. Spacings-ratio empirical processes. *Period. Math. Hungar.*, 61(1-2) :121–164, 2010.
- [12] P. Deheuvels and L. Devroye. Strong laws for the maximal k -spacing when $k \leq c \log n$. *Z. Wahrsch. Verw. Gebiete*, 66(3) :315–334, 1984.
- [13] P. Deheuvels and J.H.J. Einmahl. Functional limit laws for the increments of Kaplan-Meier product-limit processes and applications. *Ann. Probab.*, 28(3) :1301–1335, 2000.
- [14] P. Deheuvels and D.M. Mason. Functional laws of the iterated logarithm for the increments of empirical and quantile processes. *Ann. Probab.*, 20(3) :1248–1287, 1992.
- [15] P. Deheuvels, G. Peccati, and M. Yor. On quadratic functionals of the Brownian sheet and related processes. *Stochastic Process. Appl.*, 116(3) :493–538, 2006.

- [16] C. Donati-Martin and M. Yor. Fubini's theorem for double Wiener integrals and the variance of the Brownian path. *Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist.*, 27(2) :181–200, 1991.
- [17] C. Donati-Martin and M. Yor. Some Brownian functionals and their laws. *Ann. Probab.*, 25(3) :1011–1058, 1997.
- [18] J.H. Einmahl and D.M. Mason. Bounds for weighted multivariate empirical distribution functions. *Z. Wahrsch. Verw. Gebiete*, 70(4) :563–571, 1985.
- [19] I.G. Gradshteyn and I.M. Ryzhik. *Table of integrals, series, and products*. Elsevier/Academic Press, Amsterdam, seventh edition, 2007. Translated from the Russian, Translation edited and with a preface by Alan Jeffrey and Daniel Zwillinger, With one CD-ROM (Windows, Macintosh and UNIX).
- [20] M. Jérémie. *Principe d'invariance pour le processus empirique des rapports de m -espacements et lois limites des statistiques de fonctionnelles de rapports de m -espacements*. PhD thesis, Université de Pierre et Marie Curie, Paris VI, 2012.
- [21] J. Komlós, P. Major, and G. Tusnády. An approximation of partial sums of independent RV's and the sample DF. I. *Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und Verw. Gebiete*, 32 :111–131, 1975.
- [22] J. Komlós, P. Major, and G. Tusnády. An approximation of partial sums of independent RV's, and the sample DF. II. *Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und Verw. Gebiete*, 34(1) :33–58, 1976.
- [23] M.A. Lifshits. *Gaussian random functions*, volume 322 of *Mathematics and its Applications*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1995.
- [24] D. M. Mason and G.R. Shorack. Necessary and sufficient conditions for asymptotic normality of trimmed L -statistics. *J. Statist. Plann. Inference*, 25(2) :111–139, 1990.
- [25] R. Pyke. Spacings. (With discussion.). *J. Roy. Statist. Soc. Ser. B*, 27 :395–449, 1965.
- [26] G.R. Shorack and J.A. Wellner. *Empirical processes with applications to statistics*. Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics : Probability and Mathematical Statistics. John Wiley & Sons Inc., New York, 1986.
- [27] W. Stute. The oscillation behavior of empirical processes. *Ann. Probab.*, 10(1) :86–107, 1982.
- [28] Michel Talagrand. Regularity of Gaussian processes. *Acta Math.*, 159(1-2) :99–149, 1987.
- [29] G. Tusnády. A remark on the approximation of the sample DF in the multidimensional case. *Period. Math. Hungar.*, 8(1) :53–55, 1977.