

УДК 517.986

О границе Шилова и спектре Гельфанда алгебр обобщенных аналитических функций

А.Р. Миротин

amirotin@yandex.ru

В работе изучается алгебра обобщенных аналитических функций, определенных на полугруппе полухарактеров \widehat{S} дискретной абелевой полугруппы S с сокращениями и единицей, более широкая, чем алгебра Аренса-Зингера. Показано, что строгая граница и граница Шилова этой алгебры являются объединениями максимальных подгрупп полугруппы \widehat{S} . Если S не содержит нетривиальных простых идеалов, обе границы совпадают с группой характеров полугруппы S . В последнем случае вычислен и спектр Гельфанда рассматриваемой алгебры.

Ключевые слова. Граница Шилова, спектр Гельфанда, равномерная алгебра, обобщенная аналитическая функция.

Abstract. Let S be a discrete abelian semigroup with unit and cancellations and \widehat{S} the semigroup of semicharacters of S . We show that the strong boundary and the Shilov boundary of the algebra of generalized analytic functions defined on \widehat{S} are unions of some maximal subgroups of \widehat{S} . We show also that the both boundaries coincide with the character group of S if S does not contain nontrivial simple ideals. In the last case the Gelfand spectrum of the algebra under consideration is calculated.

Keywords. Shilov boundary, Gelfand spectrum, uniform algebra, generalized analytic function.

1 Введение

Первые работы по теории обобщенных аналитических функций на пространствах полухарактеров принадлежат Р. Аренсу и И.М. Зингеру [1], [2]. В настоящее время это довольно развитый раздел функционального анализа, расположенный на стыке теории равномерных алгебр, абстрактного гармонического анализа и теории аналитических функций

одного и нескольких комплексных переменных. Современное состояние предмета отражено в монографиях [3] – [9].

С другой стороны, имеются задачи, для решения которых понятие обобщенной аналитичности в смысле Аренса-Зингера оказывается слишком ограничительным. Так, в работе [10] была решена задача описания образа пространства квадратично суммируемых функций на подполугруппе S топологической абелевой группы относительно преобразования Лапласа на этой полугруппе. В случае полуоси ответ на этот вопрос дает, как известно, классическая теорема Пэли-Винера. Согласно этой теореме образом в этом случае служит пространство Харди H^2 в полуплоскости, которое состоит из функций, аналитических в этой полуплоскости и удовлетворяющих некоторым дополнительным ограничениям. В случае общих полугрупп, рассмотренном в [10], ответом служит обобщенное пространство Харди $H^2(\widehat{S})$, состоящее из функций, определенных на пространстве \widehat{S} полухарактеров полугруппы S и аналитических в смысле, более общем, чем в [1]. В то же время, равномерная алгебра $A(\widehat{S})$, состоящая из функций, непрерывных на пространстве полухарактеров дискретной полугруппы и аналитических "внутри" этого пространства в этом более общем, чем у Аренса и Зингера, смысле, оставалась неисследованной. Такие исследования полезны и для самой теории Аренса-Зингера. Например, представляет интерес вопрос об условиях, при которых алгебра Аренса-Зингера и алгебра $A(\widehat{S})$ совпадают, поскольку его решение дает новое удобное определение аналитичности по Аренсу-Зингеру. Другая задача теории алгебр Аренса-Зингера, при решении которой возникают алгебры типа $A(\widehat{S})$, — это проблема описания интерполяционных подмножеств (см. [11]). Сужения алгебр типа $A(\widehat{S})$ на группу характеров полугруппы S дают новые примеры сдвигоинвариантных алгебр в смысле ([9], с. 120). Добавим, что для многих полугрупп соответствующее пространство \widehat{S} является (вещественным или комплексным) многообразием, что приводит к результатам об алгебрах аналитических функций на этих многообразиях.

Следует заметить, что теория алгебр типа $A(\widehat{S})$ оказалась в некоторых отношениях более трудной, чем теория алгебр Аренса-Зингера, и в ней возникает ряд интересных задач. Например, проблема описания спектра Гельфанда таких алгебр в общем случае остается нерешенной.

Основные результаты данной работы описывают структуру строгой границы и границы Шилова равномерной алгебры функций, аналитических в смысле [10]. Если полугруппа не содержит нетривиальных простых идеалов, обе границы совпадают с группой характеров этой полугруппы. В последнем случае получен ответ на вопрос о спектре Гель-

фанда рассматриваемой алгебры. При других предположениях эти вопросы рассматривались в [11]. Отметим также, что нижеследующие теоремы 1 и 2 усиливают результаты, анонсированные в [12]. Статья продолжает цикл работ автора, посвященных гармоническому анализу на полугруппах, см. [4], [5], [6].

Всюду ниже S — дискретная абелева полугруппа с сокращениями и единицей e , записываемая мультипликативно, $G = S^{-1}S$ — группа частных для S . *Полухарактером* полугруппы S называется гомоморфизм ψ полугруппы S в мультипликативную полугруппу $\overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$, не являющийся тождественным нулем. *Характерами* называются полухарактеры, равные по модулю единице.

Множество всех полухарактеров полугруппы S далее обозначается через \widehat{S} , а его подмножество, состоящее из неотрицательных полухарактеров, — через \widehat{S}_+ . Символом $E(\widehat{S})$ будем обозначать множество всех *идемптов* полугруппы \widehat{S} , т. е. полухарактеров, принимающих лишь значения 0 и 1. Множества \widehat{S} , \widehat{S}_+ и $E(\widehat{S})$, наделенные топологией поточечной сходимости на S , являются компактными топологическими полугруппами по умножению с единицей 1 (они замкнуты в $\overline{\mathbb{D}}^S$). Компактную группу всех характеров полугруппы S будем обозначать X .

Согласно ([1], теорема 3.1) каждый полухарактер $\psi \in \widehat{S}$ может быть представлен в виде $\psi = \rho\chi$, где $\chi \in X$, а полухарактер $\rho = |\psi| \in \widehat{S}_+$ определяется по ψ однозначно (*полярное разложение*). С полухарактером $\rho \in \widehat{S}_+$ связаны подполугруппы $S(\rho) := \{s \in S : \rho(s) > 0\}$ и $S^\rho := \{s \in S : \rho(s) = 1\}$ полугруппы S , дополнения которых, если они не пусты, являются идеалами полугруппы S . Идеалы, дополнения которых есть полугруппа, называются *простыми*. Простые идеалы, отличные от $S \setminus \{e\}$, будем называть *нетривиальными*. Через θ_S (или просто θ , если это не будет приводить к недоразумениям) обозначим индикатор подмножества $\{e\} \subset S$. Это полухарактер полугруппы S , если и только если $S^{-1} \cap S = \{e\}$. Наконец отметим, что степень ρ^0 по определению есть индикатор $S(\rho)$, и что $\rho^z \in \widehat{S} \setminus X$ при $\rho \in \widehat{S}_+$, $\rho \neq 1$, $z \in \Pi$, где $\Pi := \{\operatorname{Re} z > 0\}$ ([1], §7). Относительно понятий и обозначений из теории коммутативных банаховых алгебр, не определенных в данной работе, см. [3].

2 Границы

Пусть A есть коммутативная банахова алгебра со спектром Гельфанда M_A . *Точечной производной* в точке $\phi \in M_A$ называется такой линейный

функционал L на A , для которого

$$L(fg) = \phi(f)L(g) + \phi(g)L(f), \quad f, g \in A.$$

В частности, если A есть равномерная алгебра на компакте Y , то точечная производная в точке $y \in Y$ удовлетворяет равенству

$$L(fg) = f(y)L(g) + g(y)L(f), \quad f, g \in A.$$

Напомним, что *строгой границей* равномерной алгебры A на компакте Y называется множество всех ее p -точек, т. е. точек из Y , являющихся пересечениями множеств пика.

Для доказательства основных результатов нам понадобятся три леммы. Следующее утверждение сформулировано в ([3], с. 92). Ввиду отсутствия ссылок на работу, где эта лемма доказана, приводим здесь ее доказательство.

Лемма 1 *Пусть A есть равномерная алгебра на компакте Y . Если точка $p \in Y$ принадлежит строгой границе алгебры A , то любая точечная производная в точке p тривиальна.*

Доказательство. Рассмотрим максимальный идеал $I_p = \{f \in A : f(p) = 0\}$ алгебры A и покажем, что он имеет ограниченную аппроксимативную единицу. Ввиду теоремы Альтмана (см., например, [13], с. 58) достаточно проверить, что для любых $f \in I_p$ и $\epsilon > 0$ найдется такой $u \in I_p$, $\|u\| \leq 2$, что $\|f - fu\| < \epsilon$. Для проверки выберем окрестность U точки p , для которой $|f(x)| < \epsilon$ при $x \in U$. В силу ([3], лемма II.12.2) найдется такое множество пика F , что $p \in F \subset U$. Если функция h образует пик на F , то для натурального n , при котором $|h(y)|^n < \epsilon/\|f\|$ для $y \in Y \setminus U$, функция $u = 1 - h^n$ удовлетворяет поставленным требованиям. Теперь в силу факторизационной теоремы Коэна (см., например, [14], следствие (32.26)) для любого $f \in I_p$ найдутся такие $f_1, f_2 \in I_p$, что $f = f_1 f_2$. Если L есть точечная производная в точке p , то $L(f) = f_1(p)L(f_2) + f_2(p)L(f_1) = 0$. Поскольку коразмерность I_p равна 1, и $L(1) = 0$, то $L = 0$. \square

Следующее понятие в неявной форме впервые появилось в [10], а в явной – в [11].

Определение 1 *Комплекснозначную функцию F на $\widehat{S} \setminus X$ будем называть обобщенной аналитической, если для любых полухарактеров ρ, ψ из $\widehat{S} \setminus X$, $\rho \geq 0$ отображение $z \mapsto F(\rho^z \psi)$ аналитично в открытой правой полуплоскости Π и непрерывно в $+0$.*

Равномерную алгебру функций, непрерывных на \widehat{S} и обобщенных аналитических на $\widehat{S} \setminus X$, обозначим $A(\widehat{S})$. Границу Шилова алгебры $A(\widehat{S})$ будем обозначать через $\partial_{A(\widehat{S})}$, а строгую границу – через Γ .

Легко проверить, что функции вида $\widehat{a}(\xi) := \xi(a)$ ($a \in S$, $\xi \in \widehat{S}$) принадлежат $A(\widehat{S})$. Равномерная алгебра на \widehat{S} , порожденная этими функциями, называется алгеброй Аренса-Зингера и обозначается $A_0(\widehat{S})$. Ясно, что $A_0(\widehat{S}) \subseteq A(\widehat{S})$, причем строгое включение возможно ([11], пример 1).

Лемма 2 *Если полухарактер ψ полугруппы S принадлежит строгой границе Γ алгебры $A(\widehat{S})$, то $|\psi| \in E(\widehat{S})$.*

Доказательство. Пусть $\psi = \rho\chi$ – полярное разложение полухарактера ψ . Допустим противное, т. е. $\rho \notin E(\widehat{S})$. Если положим $\kappa(z) = \rho^z\psi$ ($z \in \mathbb{P}$), то функционал, определенный на функциях $F \in A(\widehat{S})$ равенством $L(F) = (F \circ \kappa)'(1)$, есть, как легко проверить, точечная производная алгебры $A(\widehat{S})$ в точке ψ . Кроме того, если элемент $a \in S$ таков, что $\rho(a) \neq 0, 1$, то $L(\widehat{a}) = \psi(a) \log \rho(a) \neq 0$. Применение леммы 1 приводит к противоречию. \square

Обозначим через $E_0(\widehat{S})$ множество тех полухарактеров $\rho_0 \in E(\widehat{S})$, для каждого из которых найдется такой полухарактер $\rho_1 \in \widehat{S}_+$, что $\rho_1(s) = 1$ при $s \in S(\rho_0)$ и $0 < \rho_1(s) < 1$ при $s \notin S(\rho_0)$.

Нижеследующее предложение показывает, что утверждение, обратное лемме 2, вообще говоря, неверно.

Предложение 1 $\theta \notin E_0(\widehat{S}) \cap \Gamma$.

Доказательство. Пусть $\theta \in E_0(\widehat{S})$. В силу ([11], теорема 2) для любой функции $F \in A(\widehat{S})$ справедливо равенство $\int_X F(\chi) d\chi = F(\theta)$, где $d\chi$ есть нормированная мера Хаара (компактной) группы X . Таким образом, комплексный гомоморфизм $F \mapsto F(\theta)$ алгебры $A(\widehat{S})$ имеет представляющую меру $\sigma \neq \delta_\theta$, что невозможно для точек строгой границы (см., например, [3], теорема II.11.3 и замечание с. 86; [15], утверждение 10.3.1). \square

Ниже (см. теорему 1) обобщим предложение 1 для случая, когда полугруппа S счетна.

В связи со следующей леммой отметим, что множество $E(T)$ идемпотентов абелевой компактной полугруппы T есть компактная полугруппа, и для каждого $e \in E(T)$ существует наибольшая подгруппа $H(e)$, содержащая e . Эта группа компактна и называется *максимальной подгруппой полугруппы T , содержащей e* ; кроме того, множество $H = \prod_{e \in E(T)} H(e)$ также компактно в T (см., например, [16], с. 17 - 18).

Лемма 3 Для любого полухарактера $\rho_0 \in E(\widehat{S})$ справедливо равенство $H(\rho_0) = \rho_0 X$.

Доказательство. Поскольку $\rho_0 X$ является группой, содержащей ρ_0 , то $\rho_0 X \subseteq H(\rho_0)$. Пусть теперь $\psi \in H(\rho_0)$, $|\psi| = \rho$. Так как $\rho_0 \psi = \psi$, то, переходя к модулям, получаем $\rho_0 \rho = \rho$. Следовательно, $S(\rho) \subseteq S(\rho_0)$. С другой стороны, найдется такой $\psi' \in H(\rho_0)$, что $\psi \psi' = \rho_0$. Если $\rho' = |\psi'|$, то $\rho \rho' = \rho_0$, а потому $\rho = \rho_0$. \square

Теорема 1 Строгая граница Γ алгебры $A(\widehat{S})$ есть объединение максимальных подгрупп полугруппы \widehat{S} , т. е.

$$\Gamma = \coprod_{\rho \in F} \rho X,$$

где F содержится в $E(\widehat{S})$. Если S счетна, то $1 \in F$, а $E_0(\widehat{S}) \cap F = \emptyset$.

Доказательство. По лемме 2 любой полухарактер $\psi \in \Gamma$ имеет полярное разложение $\psi = \rho \chi$, в котором $\rho \in E(\widehat{S})$. С учетом леммы 3 это означает, что ψ принадлежит максимальной подгруппе ρX полугруппы \widehat{S} . Заметим, что каждому характеру $\xi \in X$ соответствует автоморфизм алгебры $A(\widehat{S})$, переводящий $f \in A(\widehat{S})$ в $f_\xi : \psi \mapsto f(\xi \psi)$. Отсюда следует, что $\xi \Gamma = \Gamma$, а потому $\psi X = \rho X \subseteq \Gamma$. Если F есть образ Γ при отображении $\psi \mapsto |\psi|$, то $\Gamma = \coprod_{\rho \in F} \rho X$.

Далее будем предполагать, что S счетна, $S = \{s_n : n = 1, 2, \dots\}$. Зафиксируем строго положительную функцию v на S , удовлетворяющую условию $\sum_{n=1}^{\infty} v(s_n) = 1$, а также точку $\chi \in X$ и рассмотрим функцию

$$f(\psi) := \sum_{n=1}^{\infty} \psi(s_n) \overline{\chi(s_n)} v(s_n) = \langle \psi, \chi \rangle,$$

где угловые скобки обозначают скалярное произведение в весовом пространстве $l_2(S, v)$. Ясно, что $f \in A(\widehat{S})$ как сумма равномерно по ψ сходящегося ряда аналитических функций (мажорантным рядом является $\sum_{n=1}^{\infty} v(s_n) = 1$). Неравенство Коши-Буняковского $|f(\psi)| \leq \|\psi\| \|\chi\| \leq 1$ показывает, что $|f|$ достигает своего максимума, равного 1, в точке χ и только в этой точке (если оно при некотором $\psi \in \widehat{S}$ превращается в равенство, то $\psi(s) = c \chi(s)$, и при $s = e$ получаем $c = 1$). Таким образом, X содержится в любой границе алгебры $A(\widehat{S})$, а тогда $1 \in F$.

Заметим, наконец, что по критерию А. С. Мищенко (см., например, [17], с. 391) компактное пространство \widehat{S} метризуемо, так как каждая его точка ψ обладает счетной базой окрестностей вида

$$U(\psi; t_1, \dots, t_n; \epsilon) := \{\zeta \in \widehat{S} : |\zeta(t_i) - \psi(t_i)| < \epsilon \text{ при } i = 1, \dots, n\},$$

где $t_i \in S, n \in \mathbb{N}, \epsilon \in \mathbb{Q}_+$. В этой ситуации, как известно, Γ есть наименьшая из границ алгебры $A(\widehat{S})$. Пусть $f \in A(\widehat{S}), \rho_0 \in E_0(\widehat{S})$ и $\rho_1 \in \widehat{S}_+$ таков, что $\rho_1(s) = 1$ при $s \in S(\rho_0)$ и $0 < \rho_1(s) < 1$ при $s \notin S(\rho_0)$. Так как функция $\phi(z) = f(\rho_1^z)$ непрерывна и ограничена в замкнутой правой полуплоскости $\overline{\Pi}$ и аналитична в Π , то по принципу Фрагмена-Линделефа $\sup_{z \in \overline{\Pi}} |\phi(z)| = \sup_{r \in \mathbb{R}} |\phi(ir)|$. Отсюда следует, что при всех натуральных n справедливо неравенство

$$|f(\rho_1^n)| \leq \sup_{r \in \mathbb{R}} |f(\rho_1^{ir})|.$$

Поскольку $\rho_1^{ir} \in X$, то, устремляя n к ∞ , получаем $|f(\rho_0)| \leq \max_X |f|$. Но $X \subset \Gamma$, и Γ минимальна. Следовательно, $\rho_0 \notin \Gamma$. \square

Отметим, что в условиях предложения полухарактер $\theta \notin F$.

Выясним теперь структуру границы Шилова алгебры $A(\widehat{S})$ (ниже квадратные скобки обозначают замыкание в \widehat{S}).

Теорема 2 *Для границы Шилова алгебры $A(\widehat{S})$ справедливо равенство*

$$\partial_{A(\widehat{S})} = \prod_{\rho \in K} \rho X,$$

где $K = [F]$ есть компактное подмножество $E(\widehat{S})$, содержащее 1.

Доказательство. Заметим сначала, что для любого замкнутого $C \subset E(\widehat{S})$ множество $M := \prod_{\rho \in C} \rho X$ замкнуто в \widehat{S} . Действительно, если направленность ψ_n из M сходится к полухарактеру $\psi \in \widehat{S}$, то $|\psi_n|$ сходится к $|\psi|$. А так как $|\psi_n| \in C$, то и $|\psi| \in C$. В силу полярного разложения $\psi \in |\psi| \cdot X \subset M$.

Покажем теперь, что для любого множества $D \subset E(\widehat{S})$ справедливо равенство

$$\left[\prod_{\rho \in D} \rho X \right] = \prod_{\rho \in [D]} \rho X.$$

Действительно, левая часть содержится в правой по причине замкнутости последней. Для доказательства обратного включения возьмем полухарактер $\psi \in \prod_{\rho \in [D]} \rho X$. Он имеет полярное разложение $\psi = \rho \chi$, где $\rho \in [D], \chi \in X$. Тогда $\rho = \lim_n \rho_n$ для некоторой направленности $\rho_n \in D$. Поэтому направленность $\psi_n := \rho_n \chi \rightarrow \psi$, причем $\psi_n \in \prod_{\rho \in D} \rho X$. Значит,

$$\psi \in \left[\prod_{\rho \in D} \rho X \right].$$

Теперь, поскольку строгая граница Γ плотна в $\partial_{A(\widehat{S})}$ (см., например, [15], с. 90), с учетом теоремы 1 имеем

$$\partial_{A(\widehat{S})} = [\Gamma] = \coprod_{\rho \in [F]} \rho X.$$

Компактность $[F]$ следует из компактности $E(\widehat{S})$. Наконец, заметим, что алгебра $A(\widehat{S})$ содержит в качестве замкнутой подалгебры алгебру Аренса-Зингера $A_0(\widehat{S})$, границей Шилова которой служит X [1], а потому $X \subset \partial_{A(\widehat{S})}$. \square

Следствие 1 *Если $E(\widehat{S})$ содержит лишь конечное множество p -точек, то $\Gamma = \partial_{A(\widehat{S})}$. Кроме того, $\theta \notin E_0(\widehat{S}) \cap \partial_{A(\widehat{S})}$.*

Доказательство. По условию множество $F = \Gamma \cap E(\widehat{S})$ конечно. Поэтому первое утверждение следует из равенства $K = [F]$, а второе — из предложения 1. \square

Следствие 2 *Если полугруппа S не содержит нетривиальных простых идеалов, то*

$$\Gamma = \partial_{A(\widehat{S})} = X.$$

Доказательство. В силу теоремы 2 имеем $X \subset \partial_{A(\widehat{S})}$. Поскольку дополнения к $S(\rho)$ и S^ρ в случае их непустоты являются простыми идеалами, а множество $S \setminus \{e\}$ есть по условию единственный простой идеал полугруппы S , то все неотрицательные полухарактеры ρ , отличные от θ , удовлетворяют условию $0 < \rho(s) < 1$ при всех $s \in S, s \neq e$, а идемпотентами полугруппы \widehat{S} являются только 1 и θ ($S \setminus (S^{-1} \cap S)$ есть простой идеал, и значит, $S^{-1} \cap S = \{e\}$). Поэтому в силу следствия 1 и теоремы 1 $\Gamma = \partial_{A(\widehat{S})} \subseteq X \cup \{\theta\}$. Из ([15], теорема 4.5.2) следует $\widehat{S}_+ \neq \{1, \theta\}$ (см. также [18], теорема 2.3.9), а значит выполнены все условия следствия 1 и $\theta \in E_0(\widehat{S})$. Следовательно, $\theta \notin \partial_{A(\widehat{S})}$. \square

3 Спектр Гельфанда

Следствие 2 позволяет вычислить спектр Гельфанда алгебры $A(\widehat{S})$ в случае, когда S не содержит нетривиальных простых идеалов. Ниже через $A(X)$ обозначаем алгебру, образованную сужениями на X функций из $A(\widehat{S})$, а S_1 есть подполугруппа группы G , порожденная носителями преобразований Фурье функций из $A(X)$.

Теорема 3 Пусть полугруппа S не содержит нетривиальных простых идеалов. Тогда

- 1) $S_1^{-1} \cap S_1 = \{e\}$;
- 2) \widehat{S} есть подполугруппа полугруппы \widehat{S}_1 в том смысле, что $S \subseteq S_1$ и отображение сужения на S есть топологический изоморфизм некоторой подполугруппы полугруппы \widehat{S}_1 и полугруппы \widehat{S} ;
- 3) отображение сужения на \widehat{S} есть изометрический изоморфизм алгебры Аренса-Зингера $A_0(\widehat{S}_1)$ и алгебры $A(\widehat{S})$;
- 4) спектр Гельфанда алгебры $A(\widehat{S})$ можно отождествить с \widehat{S}_1 .

Доказательство. Сначала докажем 1, 2). Для любого $a \in S$ обозначим через \tilde{a} функцию вычисления $\psi \mapsto \psi(a)$ ($\psi \in \widehat{S}$). Тогда $\tilde{a} \in A(\widehat{S})$. Заметим, прежде всего, что носителем преобразования Фурье сужения функции \tilde{a} на X служит множество $\{a\}$. Поэтому $S \subseteq S_1$. Также легко проверить, что группы характеров полугрупп S и S_1 естественно изоморфны группе характеров X группы G (характеры этих полугрупп однозначно продолжаются на G), поэтому далее будем их отождествлять.

Поскольку алгебра $A(X)$, очевидно, инвариантна относительно сдвигов, она в силу ([9], предложение 4.1.8) равна алгебре A_{S_1} , состоящей из всех непрерывных на X функций, преобразование Фурье которых сосредоточено на S_1 . Последняя алгебра, в свою очередь, посредством отображения сужения $i_0 : F \mapsto F|X$ изометрически изоморфна алгебре $A_0(\widehat{S}_1)$ по теореме 2.6 из [1]. С другой стороны, равенство $\partial_{A(\widehat{S})} = X$ влечет то, что отображения сужения $i : \Phi \mapsto \Phi|X$ есть изометрический изоморфизм алгебр $A(\widehat{S})$ и $A(X)$. Таким образом, возникает изометрический изоморфизм $j : A_0(\widehat{S}_1) \rightarrow A(\widehat{S})$ такой, что следующая диаграмма коммутативна:

$$\begin{array}{ccc} A_{S_1} & = & A(X) \\ \uparrow i_0 & & \uparrow i \\ A_0(\widehat{S}_1) & \xrightarrow{j} & A(\widehat{S}) \end{array}$$

Покажем, что каждый полухарактер $\psi \in \widehat{S}$ продолжается до полухарактера $\tilde{\psi} \in \widehat{S}_1$. Действительно, для любого $x \in S_1$ имеем $\widehat{x} \in A_0(\widehat{S}_1)$. Положим $\tilde{\psi}(x) := j(\widehat{x})(\psi)$. Тогда при всех $x, y \in S_1$

$$\tilde{\psi}(xy) = j(\widehat{xy})(\psi) = j(\widehat{x})(\psi)j(\widehat{y})(\psi) = \tilde{\psi}(x)\tilde{\psi}(y).$$

Кроме того, изометричность j дает $|\tilde{\psi}(x)| = |j(\widehat{x})(\psi)| \leq \|j(\widehat{x})\| = \|\widehat{x}\| = 1$. Следовательно, $\tilde{\psi} \in \widehat{S}_1$.

Покажем, что $\tilde{\psi}|_S = \psi$. Заметим, что $j(\widehat{a}) = i^{-1}(i_0(\widehat{a})) = i^{-1}(\widehat{a}|_X) = \tilde{a}$ ($a \in S$), поскольку функции из $A(\widehat{S})$ и $A_0(\widehat{S}_1)$ однозначно определяются своими значениями на X , а значения \widehat{a} и \tilde{a} на X совпадают. Поэтому для любого $\psi \in \widehat{S}_1$ имеем $\tilde{\psi}(a) = j(\widehat{a})(\psi) = \tilde{a}(\psi) = \psi(a)$, что и утверждалось.

Как показано в доказательстве следствия 2, если полухарактер $\psi \neq \theta_S$, то $\psi(s) \in (0, 1)$ при $s \neq e$. Следовательно, если $x = a^{-1}b \in S_1$ ($a, b \in S$), то необходимо $\tilde{\psi}(x) = \psi(b)/\psi(a)$. Теперь ясно, что (очевидно, непрерывное и инъективное) отображение $h : \psi \mapsto \tilde{\psi}$ из \widehat{S} в \widehat{S}_1 есть гомоморфизм полугруппы $\widehat{S} \setminus \{\theta_S\}$ в \widehat{S}_1 . В доказательстве следствия 2 показано также, что $S^{-1} \cap S = \{e\}$, а потому в силу ([19], лемма 3) полугруппа \widehat{S} связна. Следовательно, полугруппа $\widehat{S} \setminus \{\theta_S\}$ плотна в \widehat{S} , и значит h однозначно продолжается по непрерывности до гомоморфизма $h : \widehat{S} \rightarrow \widehat{S}_1$. Так как \widehat{S} компактна, то h есть гомеоморфизм \widehat{S} на свой образ. Следовательно, отображение h^{-1} (являющееся отображением сужения на S) есть топологический изоморфизм полугрупп $h(\widehat{S})$ и \widehat{S} . Это доказывает 2).

Для завершения доказательства утверждения 1) достаточно установить равенство $h(\theta_S) = \theta_{S_1}$, так как из него следует, что θ_{S_1} есть полухарактер полугруппы S_1 . Но $h(\theta_S)(h(\psi) - 1) = 0$, поскольку h есть гомоморфизм, т. е. $\tilde{\theta}_S(\psi - 1) = 0$ для любого $\psi \in \widehat{S}$. Пусть $x \in S_1 \setminus \{e\}$, и $\psi = \chi|_S$, где $\chi \in X$, $\chi(x) \neq 1$. Тогда равенство $\tilde{\theta}_S(x)(\psi(x) - 1) = 0$ влечет $\tilde{\theta}_S(x) = 0$, что и требовалось доказать.

3) Утверждение следует из 2) и того факта, что для любой функции $F \in A_0(\widehat{S}_1)$ функции $j(F)$ и $F|_{\widehat{S}}$ совпадают на X , а потому и всюду.

4) Это сразу вытекает из утверждения 3) и теоремы 4.1 [1], согласно которой спектр Гельфанда алгебры $A_0(\widehat{S}_1)$ есть \widehat{S}_1 . \square

Пример. Выберем иррациональные числа α, β , такие, что $\beta < \alpha < 0$, и рассмотрим следующую подполугруппу группы \mathbb{Z}^2 : $S_{\alpha\beta} = \{(m, n) \in \mathbb{Z}^2 \mid \alpha m \leq n, \beta m \leq n\}$. Полугруппа $S_{\alpha\beta}$ не содержит нетривиальных простых идеалов, и ее полухарактеры имеют в точности вид $\psi(m, n) = z_1^m z_2^n$, где $z_1, z_2 \in \overline{\mathbb{D}}$, $|z_1|^\alpha \leq |z_2| \leq |z_1|^\beta$ ($0^0 := 1$). Таким образом, полугруппа $\widehat{S}_{\alpha\beta}$ естественным образом отождествляется с замкнутой областью в \mathbb{C}^2

$$\Delta_{\alpha\beta} = \{(z_1, z_2) \in \overline{\mathbb{D}}^2 \mid |z_1|^\alpha \leq |z_2| \leq |z_1|^\beta\}.$$

Из вида полухарактеров следует, что $S_{\alpha\beta}$ является конусом в смысле [10], а потому в силу ([11], теорема 3) алгебра $A(\widehat{S}_{\alpha\beta})$ совпадает с алгеброй Аренса-Зингера $A_0(\widehat{S}_{\alpha\beta})$, отвечающей полугруппе $S_{\alpha\beta}$.

Предположим теперь, что $\alpha - \beta > 1$. Тогда множество $S = S_{\alpha\beta} \setminus \{(0, 1)\}$ является полугруппой, которая тоже не содержит нетривиальных про-

стных идеалов. Так как ее полухарактеры, отличные от θ , не принимают нулевых значений, они продолжаются на полугруппу $S_{\alpha\beta}$, и имеют тот же вид, что и у этой полугруппы. Алгебра $A(\widehat{S})$ состоит из функций, непрерывных на $\Delta_{\alpha\beta}$ и аналитических внутри этого множества, и не совпадает с $A_0(\widehat{S})$. В этом примере $S_1 = S_{\alpha\beta}$. Следовательно, строгая граница и граница Шилова алгебры $A(\widehat{S})$ отождествляются с двумерным тором \mathbb{T}^2 , а ее спектр Гельфанда — с пространством $\Delta_{\alpha\beta}$.

Список литературы

- [1] Arens R., Singer I. M. *Generalised analytic functions*, Trans. Amer. Math. Soc. **81** (2), 379–393 (1956).
- [2] Arens R. *A Banach algebra generalization of conformal mappings of the disc*, Trans. Amer. Math. Soc. **81** (3), 501–513 (1956).
- [3] Гамелин Т. *Равномерные алгебры*. (Мир, М., 1973).
- [4] Mirotin A. R. *Every invariant measure semigroup contains an ideal which is embeddable in a group // Semigroup Forum*. - 1999. - V. 59. - N 3. - P. 354 - 361.
- [5] A. R. Mirotin, *On Hilbert Transform in Context of Locally Compact Abelian Groups*, Int. J. Pure Appl. Math., 51:4 (2009), 463 – 474.
- [6] A. R. Mirotin, *Fredholm and spectral properties of Toeplitz operators on the spaces H^p over ordered groups*, Sbornik Math., 202:5 (2011), 101 – 116, <http://dx.doi.org/10.1070/SM2011v202n05ABEH004163>.
- [7] Rudin W. *Fourier Analysis on Groups*. (Interscience, N. Y., 1962).
- [8] Tonev T. *Big planes, Boundaries and Function Algebras*. (North-Holland, Amsterdam, 1992).
- [9] Grigoryan S.A., Tonev T. *Shift-invariant Uniform Algebras on Groups*. (Birkhauser, Basel 2006).
- [10] Миротин А. Р. *Теорема Пэли-Винера для конусов в локально компактных абелевых группах*, Известия вузов. Математика, No 3, 35-44 (1995).
- [11] Миротин А. Р., Романова М. А. *Интерполяционные множества алгебры обобщенных аналитических функций*, Известия вузов. Математика, No 3, 51-59 (2007).

- [12] Миротин А. Р., Романова М. А. *О строгой границе и границе Шилова алгебр обобщенных аналитических функций*, Новые математические методы и комп. техн. Материалы XI Респ. науч. конф. студ. и асп. (Гомель, 17 - 19 марта 2008 г), Ч. 1, 133-134 (Гомель, 2008).
- [13] Bonsall F. F., Duncan J. *Complete Normed Algebras*. (Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1973).
- [14] Хьюитт Э., Росс К. *Абстрактный гармонический анализ*. Т. 2. (Мир, М., 1974).
- [15] Taylor J. L. *Measure algebras*. (AMS, Providence, 1973).
- [16] Carruth J. H., Hildebrandt J. A., Koch R. J. *The theory of topological semigroups*. (Marcel Dekker, inc., New York-Basel, 1983).
- [17] Келли Дж. *Общая топология* (Наука, М., 1981).
- [18] Миротин А. Р. *Гармонический анализ на абелевых полугруппах*. (ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель, 2008).
- [19] Миротин А. Р., Романова М. А. *Об H -автоморфных обобщенных аналитических функциях*, Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фіз.-мат. навук, No 2, 24-28 (2007).