

Normes universelles et conjecture de Greenberg

Jean-François JAULENT

Résumé. Nous étudions le groupe des normes universelles attaché à la \mathbb{Z}_ℓ -tour cyclotomique d'un corps de nombres totalement réel à la lumière de la conjecture de Greenberg sur la trivialité des invariants d'Iwasawa.

Abstract. We investigate the group of universal norms attached to the cyclotomic \mathbb{Z}_ℓ -tower of a totally real number field in connection with Greenberg's conjecture on Iwasawa invariants of such a field.

Table des matières

Introduction	1
1 Énoncé de la conjecture en termes de normes universelles	2
2 Interprétation en termes de capitulation logarithmique	3
3 Comparaison avec la formule d'indice des unités circulaires	4
4 Étude du cas complètement décomposé	5
5 Non-trivialité du quotient normique $\tilde{\mathcal{E}}_K/\mathcal{N}_K$	6
Appendice	7
Bibliographie	7

Introduction

Étant donné un corps de nombres K et un nombre premier ℓ arbitraires, le pro- ℓ -groupe des normes universelles de K , étudié par Greither dans [6] et dont il est question ici, est le groupe universel pour le foncteur norme attaché à la \mathbb{Z}_ℓ -extension cyclotomique $K_\infty = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$ de K , relatif aux ℓ -adifiés $\mathcal{E}'_{K_n} = \mathbb{Z}_\ell \otimes_{\mathbb{Z}} E'_{K_n}$ des groupes de ℓ -unités E'_{K_n} des divers étages K_n .

C'est tout simplement l'intersection des groupes de normes $\mathcal{N}_K = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} N_{K_n/K}(\mathcal{E}'_{K_n})$ et sa définition est irréductiblement globale.

Il se présente ainsi comme un sous-groupe naturel du pro- ℓ -groupe des normes cyclotomiques $\tilde{\mathcal{E}}_K = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} N_{K_n/K}(\mathcal{R}_{K_n})$, défini, lui, comme intersection des groupes de normes attachés aux ℓ -adifiés $\mathcal{R}_{K_n} = \mathbb{Z}_\ell \otimes_{\mathbb{Z}} K_n^\times$ des groupes multiplicatifs des K_n , et qui peut donc être décrit localement en vertu du principe de Hasse (cf. e.g. [11], App.). De fait, $\tilde{\mathcal{E}}_K$ n'est rien d'autre que le pro- ℓ -groupe des unités logarithmiques introduit dans [9].

Le but de la présente note est de comparer ces deux groupes qui jouent un rôle central dans plusieurs questions de la Théorie d'Iwasawa et, plus précisément, d'étudier le quotient $\tilde{\mathcal{E}}_K/\mathcal{N}_K$ à la lumière de la conjecture de Greenberg (cf. [5]).

Notre point de départ est le Théorème 1 infra, qui relie l'indice $(\tilde{\mathcal{E}}_K : \mathcal{N}_K)$ au cardinal du ℓ -groupe des classes logarithmiques $\tilde{\mathcal{C}}_K$ du corps considéré.

1 Énoncé de la conjecture en termes de normes universelles

La conjecture de Greenberg pour un nombre premier ℓ postule que les ℓ -groupes de classes d'idéaux \mathcal{C}_{K_n} attachés aux étages finis K_n de la \mathbb{Z}_ℓ -extension cyclotomique d'un corps de nombres totalement réel K sont d'ordre borné indépendamment de n .

Sous la conjecture de Leopoldt, donc inconditionnellement pour K abélien sur \mathbb{Q} , il est bien connu que les sous-groupes sauvages $\mathcal{C}_{K_n}^{[\ell]}$, i.e. les sous-groupes respectifs des \mathcal{C}_{K_n} construits sur les places au-dessus de ℓ , sont d'ordre borné; de sorte que la conjecture de Greenberg revient à postuler qu'il en est de même des quotients $\mathcal{C}'_{K_n} = \mathcal{C}_{K_n} / \mathcal{C}_{K_n}^{[\ell]}$, i.e. des ℓ -groupes de ℓ -classes.

En d'autres termes la Conjecture affirme que la limite projective pour les applications normes¹

$$\mathcal{T}_{K_\infty} = \mathcal{C}'_{K_\infty} = \varprojlim \mathcal{C}'_{K_n}$$

regardée comme module sur l'algèbre d'Iwasawa $\Lambda = \mathbb{Z}_\ell[[\gamma - 1]]$ construite sur un générateur topologique γ du groupe procyclique $\Gamma = \text{Gal}(K_\infty/K)$ est pseudo-nulle.

Par un argument classique de Théorie d'Iwasawa (cf. e.g. [13], Lem. 1), cela revient à postuler que le sous-module des points fixes $\mathcal{T}_{K_\infty}^\Gamma$ et le quotient de co-points fixes ${}^\Gamma\mathcal{T}_{K_\infty}$ sont deux \mathbb{Z}_ℓ -modules finis et de même ordre. Or, ces deux modules ont une interprétation simple :

— Le quotient des genres ${}^\Gamma\mathcal{T}_{K_\infty} = \mathcal{T}_{K_\infty} / \mathcal{T}_{K_\infty}^{(\gamma-1)}$ n'est rien d'autre que le ℓ -groupe des classes logarithmiques introduit dans [9] et calculé dans [1] et [2] :

$${}^\Gamma\mathcal{T}_{K_\infty} = \tilde{\mathcal{C}}_K.$$

— Et le sous-groupe ambige $\mathcal{T}_{K_\infty}^\Gamma$ est donné par un isomorphisme de Kuz'min (cf. [14], Prop. 7.5 ou e.g. [11], Th. 17, pour son interprétation logarithmique) ; il s'identifie au quotient

$$\mathcal{T}_{K_\infty}^\Gamma \simeq \tilde{\mathcal{E}}_K / \mathcal{N}_K,$$

du groupe $\tilde{\mathcal{E}}_K$ des unités logarithmiques de K par le sous-groupe $\mathcal{N}_K = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} N_{K_n/K}(\mathcal{E}'_{K_n})$ des *normes universelles*, défini comme intersection des groupes de normes de ℓ -unités, mais qui est encore l'intersection $\tilde{\mathcal{E}}_K^\nu = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} N_{K_n/K}(\tilde{\mathcal{E}}_{K_n})$ des sous-groupes de normes d'unités logarithmiques attachés aux divers étages de la tour cyclotomique (cf. Lem. 12 infra).

En résumé, il vient ainsi :

Théorème 1. *Étant donné un corps de nombres totalement réel K qui vérifie la conjecture de Leopoldt pour un premier donné ℓ (par exemple un corps abélien réel), la conjecture de Greenberg pour le corps K et le premier ℓ affirme exactement que l'indice du sous-groupe des normes universelles $\mathcal{N}_K = \tilde{\mathcal{E}}_K^\nu = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} N_{K_n/K}(\tilde{\mathcal{E}}_{K_n})$ dans le pro- ℓ -groupe des unités logarithmiques $\tilde{\mathcal{E}}_K$ du corps K coïncide avec le cardinal du ℓ -groupe des classes logarithmiques :*

$$(\tilde{\mathcal{E}}_K : \mathcal{N}_K) = |\tilde{\mathcal{C}}_K|.$$

Dans la formule obtenue, le ℓ -groupe des classes logarithmiques $\tilde{\mathcal{C}}_K$ est effectivement calculable (cf. [1, 2]) et un algorithme performant est désormais implanté dans PARI (cf. [1]). Il en est de même du pro- ℓ -groupe $\tilde{\mathcal{E}}_K$, à cette réserve près que, les unités logarithmiques étant de nature ℓ -adique, l'algorithme fournit un système minimal de générateurs de $\tilde{\mathcal{E}}_K$ déterminés à puissance ℓ^{n_0} -ième près, pour tout n_0 fixé à l'avance. En revanche, le sous-groupe des normes universelles, quoique bien défini dans K , reste difficilement calculable. La formule du Théorème fournit ainsi un critère (conjectural) d'arrêt. Donnons tout de suite un exemple (cf. Prop. 4 infra) :

Corollaire 2. *Soient K un corps abélien réel de degré $d = [K : \mathbb{Q}]$ étranger à ℓ et de groupe Δ , puis $\mathbb{Z}_\ell[\Delta] = \bigoplus_\varphi \mathbb{Z}_\ell[\Delta]e_\varphi = \bigoplus_\varphi \mathbb{Z}_\varphi$ la décomposition semi-locale de son algèbre de Galois.*

Le groupe des unités logarithmiques de K , regardé comme $\mathbb{Z}_\ell[\Delta]$ -module, est alors somme directe de ses composantes isotypiques $\tilde{\mathcal{E}}_K^{e_\varphi}$, lesquelles sont \mathbb{Z}_φ -monogènes (à l'exception éventuelle de la composante unité $\{\pm 1\}^{\mathbb{Z}_\ell} \times \ell^{\mathbb{Z}_\ell}$, qui est formée exclusivement de normes universelles).

Sous la conjecture de Greenberg, la φ -composante isotypique $\mathcal{N}_K^{e_\varphi}$ du sous-groupe des normes universelles \mathcal{N}_K est ainsi, pour chaque caractère φ , l'unique sous-module de $\mathcal{E}_K^{e_\varphi}$ d'indice $|\tilde{\mathcal{C}}_K^{e_\varphi}|$.

1. Ce Λ -module, dit de Kuz'min-Tate, (ou de Tate par Kuz'min [14]) est noté \mathcal{T}_{K_∞} dans [11] et \mathcal{C}'_{K_∞} dans [13].

2 Interprétation en termes de capitulation logarithmique

Considérons, comme dans le Théorème 1, un corps totalement réel K et un nombre premier ℓ ; notons K_n le n -ième étage de la \mathbb{Z}_ℓ -tour cyclotomique K_∞/K et Γ_n le groupe cyclique $\text{Gal}(K_n/K)$.

Le quotient $\tilde{\mathcal{E}}_K/N_{K_n/K}(\tilde{\mathcal{E}}_{K_n})$ s'identifie au groupe de cohomologie $H^2(\Gamma_n, \tilde{\mathcal{E}}_K)$ relatif à l'action de $\Gamma_n = \text{Gal}(K_n/K)$ sur le ℓ -groupe des unités logarithmiques de K_n . Or, sous la conjecture de Gross-Kuz'min dans K_n , donc en particulier ici sous la conjecture de Leopoldt, le quotient de Herbrand $q(\Gamma_n, \tilde{\mathcal{E}}_K) = |H^2(\Gamma_n, \tilde{\mathcal{E}}_K)|/|H^1(\Gamma_n, \tilde{\mathcal{E}}_K)|$ est égal à 1 (cf. [9], Th. 3.6) ; de sorte que l'on a l'égalité :

$$(\tilde{\mathcal{E}}_K : N_{K_n/K}(\tilde{\mathcal{E}}_{K_n})) = |H^2(\Gamma_n, \tilde{\mathcal{E}}_K)| = |H^1(\Gamma_n, \tilde{\mathcal{E}}_K)|.$$

D'autre part, l'extension K_n/K étant logarithmiquement non ramifiée, le groupe $H^1(\Gamma_n, \tilde{\mathcal{E}}_K)$ mesure la capitulation logarithmique dans K_n/K (cf. [9], Th. 4.5) :

$$H^1(\Gamma_n, \tilde{\mathcal{E}}_K) \simeq \widetilde{\text{Cap}}_{K_n/K} = \text{Ker}(\tilde{\mathcal{C}}_{\ell K} \rightarrow \tilde{\mathcal{C}}_{\ell K_n}).$$

L'ordre de celle-ci étant borné par le cardinal du groupe des classes logarithmiques $\tilde{\mathcal{C}}_{\ell K}$, la suite décroissante des groupes $N_{K_n/K}(\tilde{\mathcal{E}}_{K_n})$ stationne donc à partir d'un certain rang, disons, n_0 :

$$\mathcal{N}_K = \tilde{\mathcal{E}}_K^\nu = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} N_{K_n/K}(\tilde{\mathcal{E}}_{K_n}) = N_{K_n/K}(\tilde{\mathcal{E}}_{K_n}), \text{ pour tout } n \geq n_0.$$

Et le résultat de capitulation donné dans [13, 16] peut ainsi être précisé comme suit :

Théorème 3. *Sous la conjecture de Gross-Kuz'min dans K_∞ , l'indice des normes universelles $(\tilde{\mathcal{E}}_K : \mathcal{N}_K)$ mesure la capitulation logarithmique dans K_n/K pour tout n assez grand :*

$$(\tilde{\mathcal{E}}_K : \mathcal{N}_K) = |\widetilde{\text{Cap}}_{K_\infty/K}| = |\widetilde{\text{Cap}}_{K_n/K}|, \text{ pour } n \gg 0.$$

En particulier on a : $(\tilde{\mathcal{E}}_K : \mathcal{N}_K) \leq |\tilde{\mathcal{C}}_{\ell K}|$ et l'égalité si et seulement si le corps K vérifie la conjecture de Greenberg pour le premier ℓ .

Sous des hypothèses de semi-simplicité, il est facile, en outre, de raffiner l'inégalité obtenue : supposons que le corps K soit abélien sur un sous-corps F avec $\ell \nmid [K : F]$ et notons $\Delta = \text{Gal}(K/F)$ son groupe de Galois. Dans ce cas, l'algèbre de Galois $\mathbb{Z}_\ell[\Delta]$ est un anneau semi local, produit direct d'extensions non-ramifiées \mathbb{Z}_φ de \mathbb{Z}_ℓ indexées par les caractères ℓ -adiques irréductibles de Δ ; ce qui permet d'écrire tout $\mathbb{Z}_\ell[\Delta]$ -module M comme somme directe de ses composantes isotypiques :

$$M = \bigoplus_{\varphi} M^{e_\varphi}, \text{ avec } e_\varphi = \frac{1}{|\Delta|} \sum_{\sigma \in \Delta} \varphi(\sigma) \sigma^{-1}.$$

Il vient ainsi :

Proposition 4. *Sous les mêmes hypothèses et lorsque en outre le corps totalement réel K est abélien sur un sous-corps F de degré relatif $[K : F]$ étranger à ℓ , l'égalité précédente vaut pour chaque composante isotypique de l'algèbre de Galois $\mathbb{Z}_\ell[\Delta]$ associée au groupe $\Delta = \text{Gal}(K/F)$:*

$$(\tilde{\mathcal{E}}_K^{e_\varphi} : \mathcal{N}_K^{e_\varphi}) = |\widetilde{\text{Cap}}_{K_n/K}^{e_\varphi}|, \text{ pour } n \gg 0.$$

Ce résultat vaut, en particulier, si K est un corps abélien réel de degré $[K : \mathbb{Q}]$ pour tout premier ℓ qui ne divise pas $[K : \mathbb{Q}]$, auquel cas les φ -composantes du groupe des unités logarithmiques $\tilde{\mathcal{E}}_K$ sont respectivement libres de dimension 1 sur l'anneau $Z_\varphi = \mathbb{Z}_\ell[\Delta]e_\varphi$.

Preuve. Dans le cas abélien, en effet, le corps (totalement) réel K vérifie la conjecture de Leopoldt pour tout premier ℓ et, par suite, celle de Gross-Kuz'min ; laquelle assure que le caractère de $\tilde{\mathcal{E}}_K$ est le caractère régulier (cf. [9], Th. 3.6). Sous l'hypothèse $\ell \nmid [K : \mathbb{Q}]$, c'est donc le produit de son sous groupe de torsion μ_K (qui est trivial pour $\ell \neq 2$) et d'un $\mathbb{Z}_\ell[\Delta]$ -module libre de dimension 1.

Exemple. Pour ℓ impair et K quadratique réel, le groupe $\tilde{\mathcal{E}}_K$ des unités logarithmiques de K est la somme directe de sa composante unité $\ell^{\mathbb{Z}_\ell}$, qui est formée de normes universelles, et de sa composante d'augmentation, qui est un \mathbb{Z}_ℓ -module libre de rang 1. En particulier, le quotient $\tilde{\mathcal{E}}_K/N_{K_n/K}(\tilde{\mathcal{E}}_{K_n})$ est cyclique d'ordre inférieur ou égal au degré ℓ^n de l'extension K_n/K . Il suit de là que la capitulation logarithmique dans K_n/K est d'ordre au plus ℓ^n . Si le groupe des classes logarithmiques $\tilde{\mathcal{C}}_{\ell K}$ est d'ordre ℓ^m , il faut donc monter au moins jusqu'au m -ième étage de la tour cyclotomique pour le faire capituler, quel que soit l'exposant de $\tilde{\mathcal{C}}_{\ell K}$.

3 Comparaison avec la formule d'indice des unités circulaires

La formule conjecturale donnée par le Théorème 1 peut être mise en parallèle avec l'identité

$$(\mathcal{E}_K : \mathcal{E}_K^\circ) = |\mathcal{C}_K|.$$

reliant l'indice du sous-groupe circulaire \mathcal{E}_K° dans le ℓ -adifié $\mathcal{E}_K = \mathbb{Z}_\ell \otimes_{\mathbb{Z}} E_K$ du groupe des unités au cardinal $|\mathcal{C}_K|$ du ℓ -groupe des classes d'idéaux, obtenue par voie analytique (cf. [22], Th. 8.2).

Donnons un exemple très simple :

Proposition 5. *Soit ℓ un nombre premier impair, $n_0 \geq 1$, puis $K = \mathbb{Q}[\zeta + \zeta^{-1}]$ le sous-corps réel du corps cyclotomique $\mathbb{Q}[\zeta]$ engendré par les racines ℓ^{n_0} -ièmes de l'unité et $G = \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ son groupe de Galois.*

Le corps K vérifie la conjecture de Greenberg pour ℓ si et seulement si le groupe \mathcal{N}_K des normes universelles de K coïncide avec le groupe circulaire \mathcal{C}_K° , multiplicativement engendré sur l'algèbre de groupe $\mathbb{Z}_\ell[G]$ par l'élément $\eta_K = (1 - \zeta)(1 - \zeta^{-1})$ construit sur une racine primitive ℓ^{n_0} -ième de l'unité ζ ; autrement dit, si l'on a : $N_{K_n/K}(\mathcal{E}'_{K_n}) = \mathcal{C}_K^\circ$ pour n assez grand.

Preuve. Rappelons que le ℓ -groupe circulaire $\mathcal{C}'_{K'}$ du corps cyclotomique $K' = \mathbb{Q}[\zeta]$ est le \mathbb{Z}_ℓ -module multiplicatif engendré par la racine primitive ζ , l'élément $\eta = 1 - \zeta$ et ses conjugués. Son sous-groupe réel \mathcal{C}'_K est l'image par la norme $N_{K'/K} = 1 + \tau$ ou, si l'on préfère (ℓ étant impair), par l'idempotent $e_+ = \frac{1}{2}(1 + \tau)$ associé à la conjugaison complexe τ . C'est donc le $\mathbb{Z}_\ell[G]$ -module engendré par $\eta_K = \eta^{(1+\tau)}$, qui est contenu dans le ℓ -adifié $\mathcal{E}'_K = \mathbb{Z}_\ell \otimes_{\mathbb{Z}} E'_K$ du groupe des ℓ -unités.

Observons d'abord que toute ℓ -unité $\varepsilon' \in \mathcal{E}'_K$ s'écrit de façon unique $\varepsilon' = \eta_K^\alpha \varepsilon$ avec $\alpha \in \mathbb{Z}_\ell$ et $\varepsilon \in \mathcal{E}_K$; de sorte que nous avons la décomposition directe :

$$\mathcal{E}'_K = \eta_K^{\mathbb{Z}_\ell} \oplus \mathcal{E}_K.$$

Regardons maintenant le sous-groupe circulaire \mathcal{C}'_K . Il contient évidemment $\eta_K^{\mathbb{Z}_\ell}$. Et son intersection avec le $\mathbb{Z}_\ell[G]$ -module des unités \mathcal{E}_K est, par convention, le ℓ -groupe des unités circulaires \mathcal{C}_K° . Ainsi, de la décomposition

$$\mathcal{C}'_K = \eta_K^{\mathbb{Z}_\ell} \oplus \mathcal{E}_K^\circ,$$

nous concluons :

$$\mathcal{E}'_K / \mathcal{C}'_K \simeq \mathcal{E}_K / \mathcal{E}_K^\circ, \quad \text{puis} \quad (\mathcal{E}'_K : \mathcal{C}'_K) = (\mathcal{E}_K : \mathcal{E}_K^\circ) = |\mathcal{C}_K|.$$

Cela étant, comme l'unique place de K au-dessus de ℓ est principale, nous avons $\mathcal{C}_K^{(q)} = 1$, i.e. $\mathcal{C}_K = \mathcal{C}'_K$. Portons enfin notre attention sur les ℓ -groupes logarithmiques : rappelons qu'ils sont définis en remplaçant les valuations habituelles $v_{\mathfrak{p}}$ attachées aux places finies de K par leurs analogues logarithmiques $\tilde{v}_{\mathfrak{p}}$, lesquelles coïncident avec les précédentes pour $\mathfrak{p} \nmid \ell$ et vérifient en outre une formule du produit (cf. [9]). Dans le cas qui nous occupe, puisque K contient une unique place au-dessus de ℓ et que sa \mathbb{Z}_ℓ -extension cyclotomique K_∞/K est totalement ramifiée, nous avons directement : $\tilde{\mathcal{C}}_K = \mathcal{C}'_K$; ce qui nous donne : $(\mathcal{E}'_K : \mathcal{C}'_K) = |\mathcal{C}'_K| = |\tilde{\mathcal{C}}_K|$.

Enfin, toujours parce qu'il n'existe qu'une seule place au-dessus de ℓ , le ℓ -groupe $\tilde{\mathcal{E}}_K$ des unités logarithmiques coïncide avec \mathcal{E}'_K . En fin de compte, l'égalité précédente s'écrit aussi bien :

$$(\tilde{\mathcal{E}}_K : \mathcal{C}'_K) = |\tilde{\mathcal{C}}_K|;$$

tandis que la formulation de la conjecture de Greenberg donnée par le Théorème s'écrit, elle :

$$(\tilde{\mathcal{E}}_K : \mathcal{N}_K) = |\tilde{\mathcal{C}}_K|.$$

Et, comme on a l'inclusion banale $\mathcal{C}'_K \subset \mathcal{N}_K$ du fait des identités normiques satisfaites par les unités circulaires $\eta_{\ell^n} = 1 - \zeta_{\ell^n}$, on voit que la conjecture de Greenberg pour K et ℓ postule tout simplement l'égalité :

$$\mathcal{C}'_K = \mathcal{N}_K,$$

qui affirme que l'intersection $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} N_{K_n/K}(\mathcal{E}'_{K_n})$ se réduit à \mathcal{C}'_K ; autrement dit, que l'on a :

$$N_{K_n/K}(\mathcal{E}'_{K_n}) = \mathcal{C}'_K, \quad \text{pour } n \text{ assez grand,}$$

comme annoncé.

4 Étude du cas complètement décomposé

On peut se demander si la coïncidence entre normes universelles et éléments circulaires donnée par la proposition précédente dans le cas particulier du sous-corps réel du corps cyclotomique $\mathbb{Q}[\zeta_{\ell^n}]$ est générale. Il n'en est rien, comme le montre le cas complètement décomposé.

Pour voir cela, partons d'un corps abélien réel K dans lequel ℓ se décompose complètement ; notons $G = G_K$ son groupe de Galois et $f = f_K$ son conducteur (qui n'est donc pas divisible par ℓ). Puis, pour chaque diviseur $d > 1$ de f , faisons choix d'une racine d -ième primitive de l'unité ζ_d et posons $\eta_d = 1 - \zeta_d$.

Le pro- ℓ -groupe des éléments circulaires (de Sinnott) \mathcal{C}_K° est alors le $\mathbb{Z}_\ell[G]$ -module multiplicatif engendré par le ℓ -groupe μ_K des racines de l'unité contenues dans K et les normes $N_{K[\zeta_d]/K}(\eta_d)$ des η_d . Il est bien connu que les η_d sont des unités, pour d non primaire ; des p -unités, sinon. Dans tous les cas, ce sont donc des unités en ℓ , de sorte que l'intersection de \mathcal{C}_K° avec le ℓ -groupe des ℓ -unités \mathcal{E}'_K est contenu dans \mathcal{E}_K : c'est le ℓ -groupe \mathcal{E}_K° des unités circulaires de Sinnott (cf. [20]).

Or, comme observé par Greither (cf. [6], p. 218, l. 11–13), on a le résultat suivant :

Proposition 6. *Pour tout corps abélien réel K dans lequel le nombre premier ℓ est complètement décomposé l'intersection $\tilde{\mathcal{E}}_K^\circ$ du ℓ -groupe circulaire \mathcal{C}_K° avec le ℓ -groupe de unités logarithmique $\tilde{\mathcal{E}}_K$ se réduit au ℓ -groupe μ_K des racines de l'unité contenues dans K :*

$$\mathcal{C}_K^\circ \cap \tilde{\mathcal{E}}_K = \mathcal{E}_K \cap \tilde{\mathcal{E}}_K = \mu_K.$$

Posant $\tilde{\mathcal{E}}_K^\circ = \mathcal{C}_K^\circ \cap \mathcal{E}_K$, on obtient donc, dans ce contexte :

$$\tilde{\mathcal{E}}_K^\circ = \mu_K ; \quad \text{mais} \quad \mathcal{N}_K \simeq \mu_K \times \mathbb{Z}_\ell^{[K:\mathbb{Q}]},$$

puisque le groupe des normes universelles \mathcal{N}_K est le produit de μ_K et d'un \mathbb{Z}_ℓ -module libre de rang $[K:\mathbb{Q}]$, indépendamment de toute conjecture (cf. e.g. [6]).

De fait, en l'absence même de toute hypothèse d'abélianité, l'indépendance (aux racines de l'unité près) entre groupes d'unités et groupes d'unités logarithmiques dans le cas complètement décomposé se lit déjà au niveau semi-local :

Théorème 7. *Soit K un corps de nombres arbitraire dans lequel le nombre premier ℓ se décompose complètement ; puis, pour chaque place \mathfrak{l} de K au-dessus de ℓ , soit $\ell_{\mathfrak{l}}$ l'image canonique de ℓ dans le ℓ -adifié $\mathcal{R}_{K_{\mathfrak{l}}} = \varprojlim K_{\mathfrak{l}}^\times / K_{\mathfrak{l}}^{\times \ell^n}$ du groupe multiplicatif du complété $K_{\mathfrak{l}}$.*

Avec ces notations, le ℓ -adifié $\mathcal{R}_{K_{\mathfrak{l}}}$ s'écrit comme produit direct du sous-groupe des unités $\mathcal{U}_{K_{\mathfrak{l}}} = \{\pm 1\}^{\mathbb{Z}_{\ell_{\mathfrak{l}}}}(1 + \ell_{\mathfrak{l}})^{\mathbb{Z}_{\ell_{\mathfrak{l}}}}$ et du sous-groupe des unités logarithmiques $\tilde{\mathcal{U}}_{K_{\mathfrak{l}}} = \ell_{\mathfrak{l}}^{\mathbb{Z}_{\ell_{\mathfrak{l}}}}$:

$$\mathcal{R}_{K_{\mathfrak{l}}} = \mathcal{U}_{K_{\mathfrak{l}}} \tilde{\mathcal{U}}_{K_{\mathfrak{l}}} = \{\pm 1\}^{\mathbb{Z}_{\ell_{\mathfrak{l}}}}(1 + \ell_{\mathfrak{l}})^{\mathbb{Z}_{\ell_{\mathfrak{l}}}} \ell_{\mathfrak{l}}^{\mathbb{Z}_{\ell_{\mathfrak{l}}}}.$$

Corollaire 8. *Lorsque K est totalement réel, et sous la conjecture de Leopoldt pour ℓ , l'application de semi-localisation s_ℓ identifie ainsi le produit $\mathcal{E}'_K(1 + \ell)^{\mathbb{Z}_\ell}$ du ℓ -adifié \mathcal{E}'_K du groupe des ℓ -unités par le \mathbb{Z}_ℓ -module libre engendré par $1 + \ell$ à un sous-module d'indice fini du produit :*

$$\mathcal{R}_{K_\ell} = \prod_{\mathfrak{l}|\ell} \mathcal{R}_{K_{\mathfrak{l}}} = \prod_{\mathfrak{l}|\ell} \{\pm 1\}^{\mathbb{Z}_{\ell_{\mathfrak{l}}}}(1 + \ell_{\mathfrak{l}})^{\mathbb{Z}_{\ell_{\mathfrak{l}}}} \ell_{\mathfrak{l}}^{\mathbb{Z}_{\ell_{\mathfrak{l}}}}.$$

Il suit :

$$\mathcal{E}_K(1 + \ell)^{\mathbb{Z}_\ell} \cap \tilde{\mathcal{E}}_K = 1, \text{ pour } \ell \neq 2 ; \quad \mathcal{E}_K(1 + \ell)^{\mathbb{Z}_\ell} \cap \tilde{\mathcal{E}}_K = \{\pm 1\}, \text{ pour } \ell = 2.$$

Preuve. Dès lors que la place ℓ est complètement décomposée dans K/\mathbb{Q} , chacun des complétés $K_{\mathfrak{l}}$ au-dessus de ℓ s'identifie à \mathbb{Q}_ℓ . La décomposition des ℓ -adifiés $\mathcal{R}_{K_{\mathfrak{l}}}$ résulte donc directement de celle de \mathbb{Q}_ℓ^\times :

$$\mathbb{Q}_\ell^\times = (1 + \ell)^{\mathbb{Z}_\ell} \ell^{\mathbb{Z}}, \text{ pour } \ell \text{ impair} ; \quad \mathbb{Q}_\ell^\times = \{\pm 1\}(1 + 4)^{\mathbb{Z}_\ell} 2^{\mathbb{Z}}, \text{ pour } \ell = 2.$$

Si, de plus, K vérifie la conjecture de Leopoldt pour le premier ℓ (cf. e.g. [10], §2.3), l'application de semi-localisation s_ℓ envoie injectivement le tensorisé $\mathcal{E}'_K = \mathbb{Z}_\ell \otimes E'_K$ du groupe des ℓ -unités de K dans le produit $\mathcal{R}_{K_\ell} = \prod_{\mathfrak{l}|\ell} \mathcal{R}_{K_{\mathfrak{l}}}$ et se prolonge donc, du fait de l'égalité des rangs, en un pseudo-isomorphisme injectif du produit direct $\mathcal{E}'_K(1 + \ell)^{\mathbb{Z}_\ell}$ dans \mathcal{R}_{K_ℓ} . D'où le résultat annoncé.

5 Non-trivialité du quotient normique $\tilde{\mathcal{E}}_K/\mathcal{N}_K$

Revenons au cas général : considérons un corps totalement réel K et intéressons-nous à la trivialité du quotient $\tilde{\mathcal{E}}_K/\mathcal{N}_K$ sous la conjecture de Gross-Kuz'min. Notons $\mathcal{T}_{K_\infty} = \varprojlim \tilde{\mathcal{C}}_{\mathcal{L}_{K_n}}$ le module de Kuz'min-Tate et écrivons \mathcal{F}_{K_∞} son sous-module fini. Il est bien connu que \mathcal{F}_{K_∞} est la limite projective des sous-groupes de capitulation $\widetilde{\text{Cap}}_{K_\infty/K_n} = \text{Ker}(\tilde{\mathcal{C}}_{\mathcal{L}_{K_n}} \rightarrow \tilde{\mathcal{C}}_{\mathcal{L}_{K_\infty}})$ (cf. [8, 11, 15] :

$$\mathcal{F}_{K_\infty} = \varprojlim \widetilde{\text{Cap}}_{K_\infty/K_n}.$$

De l'inclusion $\mathcal{T}_{K_\infty}^\Gamma \subset \mathcal{F}_{K_\infty}$, donnée par la conjecture de Gross-Kuz'min, on tire directement :

$$\mathcal{T}_{K_\infty}^\Gamma = 1 \Rightarrow \mathcal{F}_{K_\infty}^\Gamma = 1 \Rightarrow \mathcal{F}_{K_\infty} = 1 \Rightarrow \mathcal{T}_{K_\infty}^\Gamma = 1.$$

de sorte que la trivialité de $\mathcal{T}_{K_\infty}^\Gamma \simeq \tilde{\mathcal{E}}_K/\mathcal{N}_K$, équivaut à celle de \mathcal{F}_K , ce qui revient à postuler que les morphismes d'extension $\tilde{\mathcal{C}}_{\mathcal{L}_{K_n}} \rightarrow \tilde{\mathcal{C}}_{\mathcal{L}_{K_\infty}}$ sont ultimement injectifs. Plus précisément :

Proposition 9. *Sous la conjecture de Gross-Kuz'min dans K_∞ , on a $\tilde{\mathcal{E}}_K = \mathcal{N}_K$, i.e. $\mathcal{F}_{K_\infty} = 1$ si et seulement si le groupe des classes logarithmiques $\tilde{\mathcal{C}}_K$ s'injecte dans $\tilde{\mathcal{C}}_{K_\infty}$, i.e. $\widetilde{\text{Cap}}_{K_\infty/K} = 1$.*

Preuve. D'après la suite exacte des classes logarithmiques ambiges (cf. [9], Th. 4.5), il vient :

$$\tilde{\mathcal{E}}_K = \mathcal{N}_K \underset{n \gg 0}{\Leftrightarrow} \tilde{\mathcal{E}}_K = N_{K_n/K}(\tilde{\mathcal{E}}_{K_n}) \underset{n \gg 0}{\Leftrightarrow} H^1(\Gamma_n, \tilde{\mathcal{E}}_{K_n}) = 1 \underset{n \gg 0}{\Leftrightarrow} \widetilde{\text{Cap}}_{K_n/K} = 1 \underset{n \gg 0}{\Leftrightarrow} \widetilde{\text{Cap}}_{K_\infty/K} = 1.$$

Ainsi, il suffit que $\tilde{\mathcal{C}}_K$ s'injecte dans $\tilde{\mathcal{C}}_{K_\infty}$, pour qu'il en soit de même de tous les $\tilde{\mathcal{C}}_{K_n}$.

Remarque. La condition $\tilde{\mathcal{E}}_K/\mathcal{N}_K = 1$ peut être regardée comme un critère suffisant de la conjecture de Gross-Kuz'min, a priori moins exigeant que la condition $\tilde{\mathcal{C}}_K = 1$. Pour K totalement réel cependant, la conjecture de Greenberg postule qu'elles sont équivalentes, en vertu du Théorème 1.

Il peut être intéressant de donner un critère suffisant effectif de non-trivialité de $\tilde{\mathcal{E}}_K/\mathcal{N}_K$.

Partons d'un corps totalement réel K , supposons pour simplifier $\ell \neq 2$ et notons $L = F[\zeta + \bar{\zeta}]$ le sous-corps réel du corps $N = F[\zeta]$ engendré sur F par une racine ℓ -ième primitive de l'unité ζ . Écrivons enfin $|\mu_L| = \ell^m$ l'ordre du ℓ -groupe des racines de l'unité dans N ; notons $N_\infty = \bigcup N_n$ la \mathbb{Z}_ℓ -tour cyclotomique de N (avec, donc, $N_n = K[\zeta_{\ell^{m+n}}]$) ; et introduisons les radicaux universels $\mathfrak{R}_L = (\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell) \otimes_{\mathbb{Z}} L^\times \subset \mathfrak{R}_{N_\infty} = (\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell) \otimes_{\mathbb{Z}} N_\infty^\times$ (cf. [7]) ; puis considérons :

- le sous-radical normique ${}_{\ell^m}\mathfrak{N}_L = \{\ell^{-m} \otimes x \in \mathfrak{R}_L \mid x \in \mathcal{N}_L\}$, image des normes universelles ;
- le radical logarithmique ${}_{\ell^m}\tilde{\mathcal{E}}_L = \{\ell^{-m} \otimes x \in \mathfrak{R}_L \mid x \in \tilde{\mathcal{E}}_L\} \subset (\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \tilde{\mathcal{E}}_L$;
- le radical initial ${}_{\ell^m}\mathfrak{Z}_L = \{\ell^{-m} \otimes x \in \mathfrak{R}_L \mid N_\infty[{}^{\ell^m}\sqrt{x}] \subset Z\} = \text{Rad}(Z/N_\infty)$ attaché au composant Z des \mathbb{Z}_ℓ -extensions de N ;
- et le noyau universel de Tate ${}_{\ell^m}\mathfrak{U}_L = \{\ell^{-m} \otimes x \in \mathfrak{R}_L \mid \{\zeta_{\ell^m}, x\} = 1 \text{ dans } K_2(N)\}$.

Il est bien connu que ${}_{\ell^m}\mathfrak{U}_L$ est un $(\mathbb{Z}/\ell^m\mathbb{Z})$ -module libre de dimension $[L : \mathbb{Q}]$; qu'il en est de même de ${}_{\ell^m}\tilde{\mathcal{E}}_L$ sous la conjecture de Gross-Kuz'min dans N , et de ${}_{\ell^m}\mathfrak{Z}_L$ sous celle de Leopoldt ; qu'enfin ${}_{\ell^m}\mathfrak{N}_L$ est contenu dans chacun des trois précédents (cf. [8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21]). En particulier, il ne peut coïncider avec ${}_{\ell^m}\tilde{\mathcal{E}}_L$ que s'il coïncide avec les trois. Descendant alors par la norme (ou par l'idempotent $\frac{1}{[L:K]}N_{L/K}$) de l'algèbre de Galois $\mathbb{Z}_\ell[\text{Gal}(L/K)]$, nous en déduisons :

Théorème 10 (Critère de non-trivialité). *Sous les conjectures de Leopoldt et de Gross-Kuz'min dans N (par exemple lorsque le corps K est abélien sur \mathbb{Q}), le quotient normique $\tilde{\mathcal{E}}_K/\mathcal{N}_K$ ne peut être trivial que s'il y a coïncidence entre le radical logarithmique ${}_{\ell^m}\tilde{\mathcal{E}}_K$, le radical initial attaché aux \mathbb{Z}_ℓ -extensions ${}_{\ell^m}\mathfrak{Z}_K$ et le noyau universel de Tate ${}_{\ell^m}\mathfrak{U}_K$.*

Scolie 11. *Lorsque K est un corps abélien réel de degré $d = [K : \mathbb{Q}]$ étranger à ℓ et de groupe de Galois $\Delta = \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$, le résultat vaut pour chaque composante isotypique de l'algèbre semi-locale $\mathbb{Z}_\ell[\Delta]$; en d'autres termes, pour chaque caractère ℓ -adique irréductible φ de Δ on a l'implication :*

$$\mathcal{F}_K^{e_\varphi} = 1 \Leftrightarrow \mathcal{N}_K^{e_\varphi} = \tilde{\mathcal{E}}_K^{e_\varphi} \Rightarrow {}_{\ell}\tilde{\mathcal{E}}_K^{e_\varphi} = {}_{\ell}\mathfrak{Z}_K^{e_\varphi} = {}_{\ell}\mathfrak{U}_K^{e_\varphi}.$$

Appendice : description du groupe des normes universelles

L'interprétation des normes universelles comme normes logarithmiques s'obtient comme suit :

Lemme 12. *Soient ℓ un nombre premier, K un corps de nombres et $K_\infty = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$ sa \mathbb{Z}_ℓ -extension cyclotomique. Pour tout ensemble fini S de places finies de K contenant celles au-dessus de ℓ , l'intersection $\mathcal{N}_K = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} N_{K_n/K}(\mathcal{E}_{K_n}^S)$ des groupes normiques attachés aux ℓ -adifiés $\mathcal{E}_{K_n}^S = \mathbb{Z}_\ell \otimes E_{K_n}^S$ des groupes de S -unités est indépendante de S et coïncide avec l'intersection $\tilde{\mathcal{E}}_K^V = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} N_{K_n/K}(\tilde{\mathcal{E}}_{K_n})$ des sous-groupes normiques d'unités logarithmiques.*

Preuve. Partons d'un η_0 de \mathcal{N}_K et écrivons-le $N_{K_n/K}(\varepsilon_n)$ avec $\varepsilon_n \in \mathcal{E}_{K_n}^S$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. Observons que η_0 est une unité logarithmique (puisque norme à chaque étage fini K_n/K de la \mathbb{Z}_ℓ -tour K_∞/K) et que, le groupe $\mathcal{E}_{K_1}^S$ étant compact, la suite $(N_{K_n/K_1}(\varepsilon_n))_{n \geq 1}$ possède une valeur d'adhérence η_1 . De l'égalité $\eta_1 = \lim N_{K_{n_k}/K_1}(\varepsilon_{n_k})$, pour une suite extraite convenable $(\varepsilon_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, les groupes normiques $N_{K_n/K_1}(\mathcal{E}_{K_n}^S)$ étant fermés, on tire :

$$\eta_1 \in N_{K_{n_k}/K_1}(\mathcal{E}_{K_{n_k}}^S) \text{ pour tout } n_k; \text{ et finalement } \eta_1 \in N_{K_n/K_1}(\mathcal{E}_{K_n}^S) \text{ pour tout } n \geq 1.$$

D'où le résultat par itération du procédé, puisqu'on a par construction $\eta_0 = N_{K_1/K_0}(\eta_1)$.

RÉFÉRENCES

- [1] K. BELABAS, J.-F. JAULENT, *The logarithmic class group package in PARI/GP*, Pub. Math. Besançon (2016).
- [2] F. DIAZ Y DIAZ, J.-F. JAULENT, S. PAULI, M.E. POHST, F. SORIANO, *A new algorithm for the computation of logarithmic class groups of number fields*, Experimental Math. **14** (2005), 67–76.
- [3] G. GRAS, *Class Field Theory : from theory to practice*, Springer Monographs in Mathematics (2005).
- [4] G. GRAS, *Approche p -adique de la conjecture de Greenberg pour les corps totalement réels*, Annales Mathématiques Blaise Pascal (2017).
- [5] R. GREENBERG, *On the Iwasawa invariants of totally real number fields*, Amer. J. Math. **98** (1976), 263–284.
- [6] C. GREITHER, *Sur les normes universelles dans les \mathbb{Z}_p -extensions*, J. Théor. Nombres Bordeaux **6** (1994), 205–220.
- [7] J.-F. JAULENT, *La Théorie de Kummer et le K_2 des corps de nombres*, J. Théor. Nombres Bordeaux **2** (1990), 377–411.
- [8] J.-F. JAULENT, *Noyau universel et valeurs absolues*, Astérisque **198-199-200** (1991), 187–207.
- [9] J.-F. JAULENT, *Classes logarithmiques des corps de nombres*, J. Théor. Nombres Bordeaux **6** (1994), 301–325.
- [10] J.-F. JAULENT, *Théorie ℓ -adique globale du corps de classes*, J. Théor. Nombres Bordeaux **10** (1998), 355–397.
- [11] J.-F. JAULENT, *Sur les normes cyclotomiques et les conjectures de Leopoldt et de Gross-Kuz'min*, Annales Math. Québec **41** (2017), 119–140.
- [12] J.-F. JAULENT, *Sur le radical kummérien des \mathbb{Z}_ℓ -extensions*, Acta Arithmetica **175** (2016), 245–253.
- [13] J.-F. JAULENT, *Note sur la conjecture de Greenberg*, J. Ramanujan Math. Soc. **34** (2019), 59–80.
- [14] L. V. KUZ'MIN, *The Tate module of algebraic number fields*, Izv. Akad. Nauk SSSR **36** (1972), 267–327.
- [15] A. MOVAHHEDI & T. NGUYEN QUANG DO, *On universal norms and the first layers of \mathbb{Z}_p -extensions of a number field*, Math. Annalen **362** (2015), 817–838.
- [16] T. NGUYEN QUANG DO, *Formule des genres et conjecture de Greenberg*, Annales Math. Québec **42** (2018), 267–280.
- [17] S. SEO, *On first layers of \mathbb{Z}_p -extensions*, J.Number Th. **133** (2013) 4010–4023.
- [18] S. SEO, *On first layers of \mathbb{Z}_p -extensions II*, Acta Arith. **150** (2011), no. 4, 385–397.
- [19] S. SEO, *On finite layers of \mathbb{Z}_ℓ -extensions and K_2* , J.Number Th. **145** (2014) 153–180.
- [20] W. SINNOTT, *On the Stickelberger ideal and the circular units of an abelian number field*, Inv. Math. **62** (1980), 181–234.
- [21] J. TATE, *Relations between K_2 and Galois cohomology*, Invent. Math. **36** (1976), 257–274.
- [22] L. WASHINGTON, *Introduction to cyclotomic fields*. Second edition. Graduate Texts in Mathematics **83**, Springer-Verlag, New York, 1997, xiv+487 pp.

Institut de Mathématiques de Bordeaux, Université de BORDEAUX & CNRS
 351 cours de la libération, F-33405 TALENCE Cedex
 courriel : Jean-Francois.Jaulent@math.u-bordeaux.fr
<https://www.math.u-bordeaux.fr/~jjaulent/>