

ОДНА ТЕОРЕМА О МАЛЫХ ИНТЕРВАЛАХ ДЛЯ СУБГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Л. А. ГАБДРАХМАНОВА, Б. Н. ХАБИБУЛЛИН

1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ

1.1. Предшествующие результаты. В теории роста целых и мероморфных функций на комплексной плоскости \mathbb{C} нередко возникает необходимость в оценках интегралов, подынтегральное выражение в которых построено по логарифму модуля таких функций и, возможно, дополнено некоторой весовой функцией-множителем. Такие оценки относительно множества интегрирования можно отнести к одному из следующих двух типов: по различным интервалам на вещественной оси $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ и на положительной полуоси $\mathbb{R}^+ := \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\} \subset \mathbb{R}$ или же по малым подмножествам на интервалах дуги или луча. Возможна и одновременная комбинация этих двух типов оценок. Среди исходных результатов первого типа можно рассматривать одну из классических теорем Р. Неванлинны [1, стр. 24–27], изложенную в монографии А. А. Гольдберга и И. В. Островского [2]. Истоки второго типа оценок — лемма А. Эдрея и В. Фукса о малых дугах [3, 2, лемма III, 9], нашедшая важные применения в теории мероморфных функций, отражённые, в частности, в [2, гл. 1, теоремы 7.3, 7.4]. Вариации на тему леммы о малых дугах — лемма о малых интервалах А. Ф. Гришина и М. Л. Содина, доказательство которой, как отмечено авторами в [4], дословно повторяет доказательство леммы Эдрея–Фукса, и поэтому она приводится в [4] без доказательства, но с интересными применениями [4, лемма 3.2, теорема 3.1] к мероморфным функциям конечного порядка, а также к целым функциям слабо регулярного роста на луче [4, § 3, определение]. Версия этой леммы для субгармонических функций *конечного порядка* доказана в совместной работе А. Ф. Гришина и Т. И. Малютиной [5], посвящённой ряду вопросов теории роста субгармонических функций. Она нашла в [5] неоднократные важные применения в доказательствах ключевых результатов [5, теоремы 2, 4]. Приведём здесь эту версию в максимально близкой к первоисточнику форме.

Теорема Гришина – Малютиной о малых интервалах ([5, теорема 8]). Пусть $\rho : (0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ — уточнённый порядок в смысле Валирона [6, гл. III, 6], [7, гл. I, § 12], [2, гл. II, § 2], т. е. функция ρ дифференцируема и существуют два конечных предела $\lim_{r \rightarrow +\infty} \rho(r) := \rho \in [0, +\infty)$, $\lim_{r \rightarrow +\infty} r \rho'(r) \ln r = 0$. Пусть $v \not\equiv -\infty$ — субгармоническая функция формального порядка ρ на \mathbb{C} , т. е. существует постоянная $c \in [0, +\infty)$, с которой

$$v(z) \leq cr^{\rho(r)} \quad \text{при } r = |z| \text{ для всех } z \in \mathbb{C}, \quad (1.1)$$

E — измеримое множество на полуоси $[1, +\infty)$. Тогда существует величина M_{11} , не зависящая от R, θ, E , такая, что выполняется неравенство

$$\int_0^R \mathbf{1}_E(t) |v(te^{i\theta})| dt \leq M_{11} \frac{\text{mes } E_R}{R} \ln \frac{4R}{\text{mes } E_R} R \cdot R^{\rho(R)}, \quad E_R := E \cap [0, R], \quad (1.2)$$

где $\mathbf{1}_E$ — характеристическая функция подмножества E в \mathbb{R} , а $\text{mes } E_R$ — линейная мера Лебега множества E_R .

В настоящей статье рассматриваются интегралы по подмножествам на интервалах на луче и не затрагиваются оценки интегралов по малым дугам на окружностях. В теореме 1, сформулированной в подразделе 1.3, мы распространяем теорему Гришина – Малютиной о малых интервалах на *субгармонические функции произвольного роста* с полностью контролируруемыми постоянными в оценках с точностью до абсолютных постоянных-множителей. При этом теорема Гришина – Малютиной усиливается и для субгармонических функций v формального порядка ρ из (1.1), а именно: аналог постоянной M_{11} из (1.2) перестает зависеть от субгармонической функции v из (1.1) при условии полунормировки $v(0) \geq 0$, а зависит только от уточнённого порядка ρ и постоянной c из правой части (1.1). Менее существенное дополнение в нашем основном результате, — теореме 1, сформулированной в подразделе 1.3, — допущение произвольной измеримой функции-множителя g в подынтегральном выражении в интеграле из (1.2), хотя иногда это может быть полезным — см. замечание 1.2.

1.2. Основные обозначения и соглашения. К этому подразделу можно обращаться по мере необходимости. Наши обозначения могут отличаться от использованных выше.

$\mathbb{R}_{-\infty} := \{-\infty\} \cup \mathbb{R}$, $\mathbb{R}_{+\infty} := \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$; $\mathbb{R}_{\pm\infty} := \mathbb{R}_{-\infty} \cup \mathbb{R}_{+\infty}$ — *расширенная вещественная ось* с естественным отношением порядка, продолженным с \mathbb{R} до неравенств $-\infty \leq x \leq +\infty$ для любого $x \in \mathbb{R}_{\pm\infty}$ и порядковой топологией с двумя концами $\pm\infty$; $S_* := S \setminus \{0\}$ для $S \subset \mathbb{R}_{\pm\infty}$, в частности, $\mathbb{R}_*^+ := (\mathbb{R}^+)_* = \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$. Определены следующие действия:

$$\begin{aligned} x + (+\infty) &= +\infty \text{ для } x \in \mathbb{R}_{+\infty}, \quad x + (-\infty) = -\infty \text{ для } x \in \mathbb{R}_{-\infty}, \quad -(\pm\infty) = \mp\infty, \\ x^+ &:= \max\{0, x\} =: (-x)^-, \quad x \cdot (\pm\infty) := \pm\infty =: (-x) \cdot (\mp\infty) \text{ для } x \in \mathbb{R}_*^+ \cup \{+\infty\}, \\ \frac{\pm x}{0} &:= \pm\infty \text{ для } x \in \mathbb{R}_*^+ \cup \{+\infty\}, \quad \frac{x}{\pm\infty} := 0 \text{ для } x \in \mathbb{R}, \text{ но } 0 \cdot (\pm\infty) := 0, \end{aligned} \quad (1.3)$$

если не оговорено противное. *Интервал* I на вещественной оси \mathbb{R} или её расширении $\mathbb{R}_{\pm\infty}$ — *связное множество с концами* $\inf I$ и $\sup I$ в $\mathbb{R}_{\pm\infty}$. Используем широко распространённые обозначения для *открытых интервалов* $(a, b) := \{x \in \mathbb{R}_{\pm\infty} : a < x < b\}$ и *замкнутых интервалов* $[a, b] := \{x \in \mathbb{R}_{\pm\infty} : a \leq x \leq b\}$, а также для *полуоткрытых* или *полузамкнутых интервалов* $[a, b) := [a, b] \setminus \{b\}$, $(a, b] := [a, b] \setminus \{a\}$ с концами $a, b \in \mathbb{R}_{\pm\infty}$.

Для $z \in \mathbb{C}$ при $r \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ через $D(z, r) := \{z' \in \mathbb{C} : |z' - z| < r\}$ обозначаем *открытый круг с центром z радиуса r* , $\bar{D}(z, r) := \{z' \in \mathbb{C} : |z' - z| \leq r\}$ — *замкнутый круг с центром z радиуса r* , $\partial\bar{D}(z, r) := \{z' \in \mathbb{C} : |z' - z| = r\}$ — *окружность с центром z радиуса r* . При $r = 0$ из этих определений $D(z, 0) = \emptyset$, $\bar{D}(z, 0) = \partial\bar{D}(z, 0) = \{z\}$.

Для $X \subset \mathbb{R}_{\pm\infty}$ функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}_{\pm\infty}$ *возрастающая* (соответственно *убывающая*) если для любых $x_1, x_2 \in X$ из $x_1 \leq x_2$ следует $f(x_1) \leq f(x_2)$ (соответственно $f(x_1) \geq f(x_2)$).

Для $S \subset \mathbb{C}$ через $\text{har}(S)$ и $\text{sbh}(S)$ обозначаем классы всех соответственно *гармонических* и *субгармонических* функций на каких-либо открытых окрестностях S [8], [9]. Так, для $z \in \mathbb{C}$ класс $\text{har}(z) := \text{har}(\{z\})$ состоит из гармонических функций в окрестностях точки z .

Через λ обозначаем *линейную меру Лебега* на \mathbb{R} и её ограничения на λ -измеримые подмножества $S \subset \mathbb{R}_{\pm\infty}$. При этом используем и обозначение $\text{mes } S := \lambda(S)$, отдавая дань традиции, отражённой выше в формулировке теоремы Гришина – Малютиной о малых интервалах. Понятия *почти всюду*, *измеримость* и *интегрируемость* означают λ -почти всюду, λ -измеримость и λ -интегрируемость соответственно. Для *определённой почти всюду* и *измеримой* функции $f: S \rightarrow \mathbb{R}_{\pm\infty}$ через

$$\text{ess sup}_S f := \inf \left\{ a \in \mathbb{R} : \lambda(\{x \in S : f(x) > a\}) = 0 \right\} \quad (1.4)$$

обозначаем *существенную верхнюю грань* функции f на S .

Если $S := I$ — интервал с концами $a \leq b$, то для *интеграла Лебега* от f по интервалу I будем использовать две равноправные формы обозначений

$$\int_I f \, d\lambda := \int_a^b f(x) \, dx,$$

если такой интеграл корректно определён.

Для $r \in \mathbb{R}^+$ и произвольной функции $v: \partial\bar{D}(0, r) \rightarrow \mathbb{R}_{\pm\infty}$ определим

$$\begin{aligned} M_v(r) &:= \sup_{|z|=r} v(z); \\ C_v(r) &:= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(re^{is}) \, ds \end{aligned} \quad (1.5)$$

— *среднее по окружности* $\partial\bar{D}(0, r)$ функции v при условии, что интеграл Лебега в правой части корректно определён. В частности, $M_v(0) = C_v(0) = v(0)$. Свойства характеристик M_v и C_v в случае субгармонической функции v см. в [8, 2.6], [9, 2.7]

1.3. Формулировка основного результата.

Теорема 1 (о малых интервалах). *Существует абсолютная постоянная $a \geq 1$, с которой*

- [u] для любой субгармонической на \mathbb{C} функции $u \not\equiv -\infty$,
- [r] для любых чисел $0 \leq r_0 \leq r < R < +\infty$,
- [E] для любого измеримого подмножества $E \subset [r, R]$,
- [g] для любой измеримой функции g на E ,
- [b] для любого числа $b \in (0, 1]$

имеет место неравенство

$$\begin{aligned} \int_E M_{|u|g} \, d\lambda &\leq \left(\frac{a}{b} \ln \frac{a}{b}\right) \left(M_u((1+b)R) - 2 \min\{0, C_u(r_0)\}\right) \left(\operatorname{ess\,sup}_E |g|\right) \\ &\quad \times \left(\operatorname{mes} E + \min\{\operatorname{mes} E, 3bR\} \ln \frac{3ebR}{\min\{\operatorname{mes} E, 3bR\}}\right) \end{aligned} \quad (1.6)$$

Замечание 1.1. Последнюю скобку-множитель

$$M \stackrel{(1.6)}{:=} \operatorname{mes} E + \min\{\operatorname{mes} E, 3bR\} \ln \frac{3ebR}{\min\{\operatorname{mes} E, 3bR\}} \quad (1.7)$$

часто можно «сжать». Так,

$$M \stackrel{(1.7)}{\leq} 2 \operatorname{mes} E \ln \frac{3ebR}{\operatorname{mes} E}, \quad \text{если } \operatorname{mes} E \leq 3bR, \quad (1.8)$$

а в противном случае

$$M \stackrel{(1.7)}{=} \operatorname{mes} E + 3bR \leq 2 \operatorname{mes} E \quad \text{при } \operatorname{mes} E > 3bR, \quad (1.9)$$

где как в случае (1.8), так и в случае (1.9) число 2 можно перекинуть как множитель в абсолютную постоянную a . Кроме того, всегда $\operatorname{mes} E \leq R$, поскольку $E \subset [r, R]$. При этом

$$(x, t) \mapsto x \ln \frac{t}{x} - \text{возрастающая функция по } t \in \mathbb{R}_*^+ \text{ и по } x \in [0, t/e]. \quad (1.10)$$

Исходя из этого, при любом $b \in (0, 1]$ имеем

$$\begin{aligned} M &\stackrel{(1.7)}{\leq} \text{mes } E + \min\{\text{mes } E, 3bR\} \ln \frac{\max\{3ebR, eR\}}{\min\{\text{mes } E, 3bR\}} \stackrel{(1.10)}{\leq} \text{mes } E + \text{mes } E \ln \frac{3eR}{\text{mes } E} \\ &= (1 + \ln 3) \text{mes } E + \text{mes } E \ln \frac{eR}{\text{mes } E} \leq (2 + \ln 3) \text{mes } E \ln \frac{eR}{\text{mes } E}, \end{aligned} \quad (1.11)$$

где множитель $2 + \ln 3$ можно перебросить в абсолютную постоянную a . Конечно же, замена значения M из правой части (1.7) на правую часть из (1.11) в оценке сверху (1.6) может вести к значительному огрублению оценки (1.6) при малых значениях $b > 0$.

Замечание 1.2. Если функция $g \geq 0$ в $[\mathbf{g}]$ *возрастающая*, то в неравенстве (1.6) величину $\text{ess sup}_E |g|$ можно заменить на $g(R)$, а если *убывающая*, то на $g(r)$.

Покажем, что теорема Гришина–Малютиной содержится в теореме 1.

Вывод теоремы Гришина–Малютиной. По условию $E \subset [1, +\infty)$. Положим $g \equiv 1$ на \mathbb{R}^+ , а $b := 1$. По теореме 1 о малых интервалах с учётом замечания 1.1 с оценкой (1.11) найдётся абсолютная постоянная $A \geq 1$, с которой оценку (1.6) при $r_0 = r = 1 < R$ для субгармонической функции $v \not\equiv -\infty$, удовлетворяющей (1.1), можно записать в виде

$$\begin{aligned} \int_0^R \mathbf{1}_E(t) |v(te^{i\theta})| dt &\leq \int_{E_R} M_{|v|} d\lambda \\ &\leq A \left(c(2R)^{\rho(2R)} - 2 \min\{0, C_v(1)\} \right) \text{mes } E_R \ln \frac{eR}{\text{mes } E_R}. \end{aligned} \quad (1.12)$$

Из свойств уточнённого порядка ρ следует существование постоянной C_ρ , с которой $(2R)^{\rho(2R)} \leq C_\rho R^{\rho(R)}$ для всех $R \geq 1$ [2, гл. II, теорема 2.2, следствие], [7, гл. 1, § 12, 2)]. Таким образом, из (1.12) получаем

$$\int_0^R \mathbf{1}_E(t) |v(te^{i\theta})| dt \leq A \left(cC_\rho - 2 \frac{\min\{0, C_v(1)\}}{\inf_{r \geq 1} r^{\rho(r)}} \right) \text{mes } E_R \ln \frac{eR}{\text{mes } E_R} \cdot R^{\rho(R)},$$

откуда следует (1.2). □

2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1

2.1. Оценка модуля субгармонической функции. Нам потребуется одна из оценок снизу для субгармонических функций, установленная в [10], [11] в гораздо более общей форме, чем необходимо для наших целей.

Теорема А ([10, теорема 1.2], [11, теорема 2]). *Существует такая абсолютная постоянная $a_0 \geq 1$, что для любой убывающей непрерывной функции $a: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}_*^+$ и для любой возрастающей непрерывной функции $A: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}_*^+$, связанных соотношениями $1 \leq aA \leq A$ на \mathbb{R}^+ , для каждой функции*

$$u \in \text{sbh}(\mathbb{C}) \cap \text{har}(0) \quad \text{со значением } u(0) = 0 \quad (2.1)$$

найдётся не более чем счётное множество кругов

$$\{D(z_j, t_j)\}_{j \in N}, \quad N \subset \mathbb{N} := \{1, 2, \dots\}, \quad (2.2)$$

для которого неравенства

$$u(z) \geq -\frac{a_0}{a(2|z|)} M_u((1 + a(|z|))|z|) \ln(a_0 A(|z|))$$

выполнены при всех $z \in \mathbb{C} \setminus \bigcup_{j \in N} D(z_j, t_j)$ и при этом

$$\sum_{D(0,r) \cap D(z_j, t_j) \neq \emptyset} t_j \leq \frac{1}{a(2r)} \int_0^r \frac{1}{A(t)} \quad \text{для любых } r \in \mathbb{R}_*^+.$$

Следствие 2.1. Существует такая абсолютная постоянная $a_0 \geq 1$, что для любой субгармонической функции u , удовлетворяющей ограничениям из (2.1), и для любого числа $B > 1$ найдётся не более чем счётное множество кругов (2.2), для которого

$$u(z) \stackrel{(1.5)}{\geq} -(a_0 B \ln(a_0 B)) M_u((1 + 1/B)|z|), \quad (2.3)$$

при всех $z \in \mathbb{C} \setminus \bigcup_{j \in N} D(z_j, t_j)$ и при этом

$$\sum_{D(r) \cap D(z_j, t_j) \neq \emptyset} t_j \leq \frac{1}{B} r \quad \text{для любых } r \in \mathbb{R}_*^+. \quad (2.4)$$

Доказательство. Предложение 2.1 сразу следует из теоремы А при постоянных функциях $A(t) \equiv B^2$ и $a(t) \equiv 1/B$ при всех $t \in \mathbb{R}^+$. \square

Предложение 2.1. Для любого числа $b \in (0, 1]$ при

$$B > 2 + \frac{2}{b} \quad (2.5)$$

для каждого множества кругов (2.2) с ограничением (2.4), для всякой точки $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ найдётся число $r_z > 0$, удовлетворяющее условиям

$$0 < r_z < b|z|, \quad \left(\bigcup_{j \in N} D(z_j, r_j) \right) \cap \partial D(z, r_z) = \emptyset, \quad (2.6)$$

т. е. окружность $\partial \bar{D}(z, r_z)$ при некотором $r_z > 0$ содержится в круге $D(z, b|z|)$ и не пересекается ни с одним из кругов $D(z_j, r_j)$ с $j \in N$.

Предложение 2.1 элементарно, но в целях контроля за соотношениями между постоянными b и B всё же приведём его стандартное

Доказательство. Достаточно рассмотреть положительную точку $z \in \mathbb{R}_*^+$. При ограничении (2.4) и значении B из (2.5) имеем

$$\sum_{D(z, bz) \cap D(z_j, t_j) \neq \emptyset} 2t_j \leq \sum_{D((1+b)z) \cap D(z_j, t_j) \neq \emptyset} 2t_j \stackrel{(2.4)}{\leq} \frac{2}{B} (1+b)z \stackrel{(2.5)}{<} bz.$$

Отсюда для всех кругов $D(z_j, t_j)$ с $D(z, bz) \cap D(z_j, t_j) \neq \emptyset$, сумма длин интервалов

$$\left(z + (D(z_j, t_j) - z) e^{-i \arg(z_j - z)} \right) \cap [0, bz), \quad (2.7)$$

являющихся круговыми проекциями с центром z в $D(z, bz)$ диаметров кругов $D(z_j, t_j)$ на радиус $[z, bz) \subset \mathbb{R}_*^+$ круга $D(z, bz)$, меньше, чем длина bz радиуса круга $D(z, bz)$. Следовательно, на радиусе $[z, bz) \subset \mathbb{R}_*^+$ есть точка $z + r_z$, не принадлежащая ни одному из интервалов (2.7). Это сразу влечёт за собой (2.6). \square

Предложение 2.2. Существует такая абсолютной постоянной $A_0 \geq 1$, что

- [а] для любой субгармонической функции u из (2.1) с мерой Рисса $\mu_u := \frac{1}{2\pi} \Delta u$, где Δ — оператор Лапласа, действующий в смысле теории обобщённых функций,
- [б] для любого числа $b \in (0, 1] \subset \mathbb{R}^+$

имеет место неравенство

$$M_{|u|}(r) \leq \int_{(1-b)r}^{(1+b)r} \ln \frac{br}{|t-r|} d\mu_u^{\text{rad}}(t) + \left(\frac{A_0}{b} \ln \frac{A_0}{b}\right) M_u((1+2b)r) \quad \text{при всех } r \in \mathbb{R}^+, \quad (2.8)$$

где $\mu^{\text{rad}}(t) := \mu(\overline{D}(0, t))$, $t \in \mathbb{R}^+$, — считающая функция положительной меры μ на \mathbb{C} .

Доказательство. По определению (1.5) из принципа максимума

$$u(z) \leq M_u(|z|) \leq M_u((1+2b)|z|) \quad \text{при всех } z \in \mathbb{C}. \quad (2.9)$$

Для абсолютной постоянной $a_0 \geq 1$ из следствия 2.1 положим

$$B \stackrel{(2.5)}{:=} 3 + \frac{3}{b}, \quad 1 \leq c_b := a_0 B \ln(a_0 B) = \frac{3a_0(b+1)}{b} \ln \frac{3a_0(b+1)}{b} \leq \frac{6a_0}{b} \ln \frac{6a_0}{b}. \quad (2.10)$$

Пусть $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Исходя из оценки снизу (2.3) следствия 2.1 для функции u и предложения 2.1, найдется такое число $r_z \in (0, b|z|)$, удовлетворяющее (2.6), что имеет место оценка снизу

$$\begin{aligned} u(z') &\geq -M_u((1+1/B)|z'|) a_0 B \ln(a_0 B) \stackrel{(2.10)}{\geq} -c_b M_u((1+1/B)(1+b)|z|) \\ &\stackrel{(2.10)}{\geq} -c_b M_u((1+2b)|z|) \quad \text{для всех } z' \in \partial \overline{D}(z, r_z). \end{aligned} \quad (2.11)$$

По формуле Пуассона–Йенсена [9, 3.7], [8, 4.5] для круга $D(z, r_z)$ имеем

$$u(z) = - \int_{D(z, r_z)} \ln \left| \frac{r_z^2}{r_z(z-z')} \right| d\mu_u(z') + h(z) =: G(z) + h(z), \quad (2.12)$$

где наименьшая гармоническая мажоранта h функции v в круге $D(z, r_z)$ ввиду (2.9) и (2.11) удовлетворяет оценке

$$|h(z)| \leq c_b M_u((1+2b)|z|). \quad (2.13)$$

Поскольку функция Грина для круга под знаком интеграла с полюсом z в центре круга в промежуточном равенстве из (2.12) положительна, имеем

$$\begin{aligned} |G(z)| &= \int_{D(z, r_z)} \ln \frac{r_z}{|z-z'|} d\mu_u(z') \leq \int_{D(z, r_z)} \ln \frac{b|z|}{|z-z'|} d\mu_u(z') \leq \int_{D(z, b|z|)} \ln \frac{b|z|}{||z'| - |z||} d\mu_u(z') \\ &\leq \int_{(1-b)|z| \leq |z'| < (1+b)|z|} \ln \frac{b|z|}{||z'| - |z||} d\mu_u(z') = \int_{(1-b)|z|}^{(1+b)|z|} \ln \frac{b|z|}{|t-|z||} d\mu_u^{\text{rad}}(t). \end{aligned}$$

Из последней оценки и из (2.13) ввиду (2.12) получаем

$$|u(z)| \leq |G(z)| + |h(z)| \leq \int_{(1-b)|z|}^{(1+b)|z|} \ln \frac{b|z|}{|t-|z||} d\mu_u^{\text{rad}}(t) + c_b M_u((1+2b)|z|)$$

Здесь правая часть не зависит от аргумента $\arg z$, что при $r := |z| > 0$ по (1.5) даёт (2.8) с $A_0 \stackrel{(2.10)}{:=} 6a_0$. При $r = 0$ неравенство (2.8) очевидно, поскольку $u(0) = 0$. \square

2.2. Интегральные оценки. Если $\text{mes } E = 0$, то в рамках соглашений (1.3) о действиях в $\mathbb{R}_{\pm\infty}$ обе части неравенства (1.6) равны нулю и оно верно. Поэтому далее $\text{mes } E > 0$. При этом если $\text{ess sup}_E |g| = +\infty$, то согласно (1.3) правая часть неравенства (1.6) равна $+\infty$ и неравенство (1.6) верно. В противном случае сразу можем «убрать» функцию g из подынтегрального выражения в интеграле из левой части (1.6):

$$\int_E M_{|u|} g \, d\lambda \leq \int_r^R M_{|u|}(x) \mathbf{1}_E \, dx \cdot \text{ess sup}_E |g|. \quad (2.14)$$

Основные этапы доказательства содержит случай

2.2.1. Функция u из (2.1). Пока считаем, что $b \in (0, 1/2]$. По предложению 2.2 для любой функции u из (2.1) для интеграла из правой части (2.14) имеет место неравенство

$$\begin{aligned} \int_r^R M_{|u|}(x) \mathbf{1}_E(x) \, dx &\leq \int_r^R \left(\int_{(1-b)x}^{(1+b)x} \ln \frac{bx}{|t-x|} \, d\mu_u^{\text{rad}}(t) + \left(\frac{A_0}{b} \ln \frac{A_0}{b} \right) M_u((1+2b)x) \right) \mathbf{1}_E(x) \, dx \\ &\leq \int_r^R \int_{(1-b)x}^{(1+b)x} \ln \frac{bx}{|t-x|} \, d\mu_u^{\text{rad}}(t) \mathbf{1}_E(x) \, dx + \left(\frac{A_0}{b} \ln \frac{A_0}{b} \right) M_u((1+2b)R) \text{mes } E. \end{aligned} \quad (2.15)$$

Обозначим повторный интеграл в правой части (2.15) как

$$I := \int_r^R \int_{(1-b)x}^{(1+b)x} \ln \frac{bx}{|t-x|} \, d\mu_u^{\text{rad}}(t) \mathbf{1}_E(x) \, dx = \iint_S \mathbf{1}_E(x) \ln^+ \frac{bx}{|t-x|} \, d\mu_u^{\text{rad}}(t) \, dx \quad (2.16)$$

где $\ln^+ := \max\{0, \ln\}$ и двойной интеграл в правой части берётся по множеству

$$S := \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^2 : x \in [r, R], (1-b)x \leq t \leq (1+b)x \right\} \subset \mathbb{R}^2,$$

содержащемуся при $b \in (0, 1/2]$ в множестве

$$T := \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^2 : t \in [(1-b)r, (1+b)R], (1-2b)t \leq x \leq (1+2b)t \right\}.$$

Отсюда согласно (2.16) при $b \in (0, 1/2]$ получаем

$$\begin{aligned} I &\leq \iint_T \mathbf{1}_E(x) \ln^+ \frac{bx}{|t-x|} \, d\mu_u^{\text{rad}}(t) \, dx = \int_{(1-b)r}^{(1+b)R} \int_{(1-2b)t}^{(1+2b)t} \mathbf{1}_E(x) \ln^+ \frac{bx}{|t-x|} \, dx \, d\mu_u^{\text{rad}}(t) \\ &\leq \left(\mu_u^{\text{rad}}((1+b)R) - \mu_u^{\text{rad}}((1-b)r) \right) \sup_{(1-b)r \leq t \leq (1+b)R} \int_{(1-2b)t}^{(1+2b)t} \mathbf{1}_E(x) \ln^+ \frac{bx}{|t-x|} \, dx \\ &\leq \mu_u^{\text{rad}}((1+b)R) \sup_{(1-b)r \leq t \leq (1+b)R} \int_0^{(1+b)(1+2b)R} \mathbf{1}_E(x) \ln^+ \frac{b(1+b)(1+2b)R}{|t-x|} \, dx \\ &\leq \mu_u^{\text{rad}}((1+b)R) \sup_{t \in \mathbb{R}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{1}_E(x) \ln^+ \frac{3bR}{|x-t|} \, dx \\ &= \mu_u^{\text{rad}}((1+b)R) \sup_{t \in \mathbb{R}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{1}_{(E-t)}(s) \ln^+ \frac{3bR}{|s|} \, ds, \end{aligned} \quad (2.17)$$

где множитель перед \sup стандартно оценивается сверху при $b \in (0, 1/2]$ как

$$\begin{aligned} \mu_u^{\text{rad}}((1+b)R) &\leq \frac{1}{\ln \frac{1+2b}{1+b}} \int_{(1+b)R}^{(1+2b)R} \frac{\mu_u^{\text{rad}}(t)}{t} dt \leq \frac{4(1+b)}{b} \int_0^{(1+2b)R} \frac{\mu_u^{\text{rad}}(t)}{t} dt \\ &= \frac{6}{b} C_u((1+2b)R) \leq \frac{6}{b} M_u(1+2b)R, \end{aligned} \quad (2.18)$$

поскольку в этом п. 2.2.1 функция u удовлетворяет требованиям из (2.1). Для оценки последнего интеграла в (2.17) будет использована

Лемма А ([2, лемма 7.2]). Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}_{\pm\infty}$ — чётная интегрируемая функция на симметричном относительно нуля открытом интервале $I \subset \mathbb{R}$, убывающая на интервале $I \cap \mathbb{R}_*$, $E \subset I$ — измеримое подмножество. Тогда

$$\int_E f d\lambda \leq 2 \int_0^{(\text{mes } E)/2} f(x) dx. \quad (2.19)$$

Применяя лемму А с $f: x \mapsto \ln^+ \frac{3bR}{|x|}$, $x \in \mathbb{R}$, и множеством $E - t$ в роли E к оценке сверху интегралов из правой части (2.17), получим

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{1}_{(E-t)}(s) \ln^+ \frac{3bR}{|s|} ds &= \int_{(E-t)} \ln^+ \frac{3bR}{|s|} d\lambda(s) \leq 2 \int_0^{\text{mes}(E-t)/2} \ln^+ \frac{3bR}{x} dx \\ &= 2 \int_0^{\text{mes } E/2} \ln^+ \frac{3bR}{x} dx = 2 \int_0^{\min\{\text{mes } E/2, 3bR\}} \ln^+ \frac{3bR}{x} dx \\ &= \min\{\text{mes } E, 6bR\} \ln \frac{6ebR}{\min\{\text{mes } E, 6bR\}}, \end{aligned} \quad (2.20)$$

где последнее выражение не зависит от переменной t . Таким образом, последовательно применяя оценку (2.15), обозначение (2.16) для интеграла I с оценками сверху (2.17) и (2.18), а также (2.20), в случае функции u из (2.1) при $b \in (0, 1/2]$ получаем

$$\begin{aligned} \int_E M_{|u|} g d\lambda &\leq \max \left\{ \left(\frac{A_0}{b} \ln \frac{A_0}{b} \right), \frac{6}{b} \right\} M_u((1+2b)R) \text{ess sup}_E |g| \\ &\quad \times \left(\text{mes } E + \min\{\text{mes } E, 6bR\} \ln \frac{6ebR}{\min\{\text{mes } E, 6bR\}} \right) \end{aligned}$$

Если здесь вместо числа $b \in (0, 1/2]$ рассмотреть число $2b \in (0, 1]$, сохранив за ним прежнее обозначение b , а также положить $a := 2(A_0 + 6)$, то получим в точности неравенство (1.6), поскольку для субгармонической функции u из (2.1) в силу $u(0) = 0$ имеем $C_u(r_0) \geq 0$ и $\min\{0, C_u(r_0)\} = 0$. Осталось рассмотреть

2.2.2. Случай произвольной субгармонической функции $u \not\equiv -\infty$. При $u(0) = -\infty$ и $r_0 = 0$ имеем $\min\{0, C_u(r_0)\} = -\infty$. Следовательно, правая часть неравенства (1.6) в рамках правил действий (1.3) равна $+\infty$ и неравенство (1.6) верно.

Пусть $r_0 > 0$. Тогда от произвольной субгармонической функции $u \not\equiv -\infty$ можно с помощью её гармонического продолжения внутрь круга $D(0, r_0)$ и вычитания из этого продолжения среднего по окружности $c_0 \stackrel{(1.5)}{:=} C_u(r_0)$ перейти к субгармонической функции u_0 , равной $u - c_0$ на $\mathbb{C} \setminus D(0, r_0)$, гармонической в круге $D(0, r_0)$ и равной нулю в нуле. Таким образом, эта преобразованная функция u_0 удовлетворяет требованиям из (2.1) и для нее справедливо неравенство (1.6)

с заменой u на u_0 . Таким образом, применяя (1.6) к u_0 , с теми же скобками, за исключением второй, в правой части имеем

$$\begin{aligned} \int_E M_{|u|}|g| \, d\lambda &\leq \int_E M_{|u_0|}|g| \, d\lambda + \int_E M_{|c_0|}|g| \, d\lambda \\ &\leq (\dots) \left(M_u((1+b)R) - c_0 \right) (\dots) \times (\dots) + \int_E |c_0||g| \, d\lambda \\ &\leq (\dots) \left(M_u((1+b)R) - (c_0 - |c_0|) \right) (\dots) \times (\dots) \end{aligned}$$

где $c_0 - |c_0| = -2c_0^- = 2 \min\{0, C_u(r_0)\}$. Это даёт неравенство (1.6) для $r_0 > 0$. Наконец, к случаю $u(0) > -\infty$ и $r_0 = 0$ можно перейти от последнего разобранного случая, устремляя $r_0 > 0$ к нулю, с $\min\{0, C_u(r_0)\} \rightarrow \min\{0, u(0)\} > -\infty$.

Теорема 1 доказана.

Замечание 2.1. В случае, когда $u = \ln |f|$, где f — целая ненулевая функция с $|f(0)| = 0$, в п. 2.2.2 можно, конечно, поступить и иначе, — более традиционно, — а именно: вместо функции f рассмотреть результат деления функции f на одночлен $z \mapsto \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k$, где $k \geq 1$ — кратность корня функции f в нуле. Но тогда вместо дополнительного слагаемого $-2 \min\{0, C_u(r_0)\}$ в правую часть придётся приписать слагаемое порядка роста $k \ln R + O(1)$ что при $k \geq 1$ и росте $R \rightarrow +\infty$, очевидно, строго грубее, чем постоянная $-2 \min\{0, C_u(r_0)\}$.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Nevanlinna R. Le théorème de Picard – Borel et la théorie des fonctions méromorphes (Gauthier-Villars, Paris, 1929).
- [2] Гольдберг А. А., Островский И. В. Распределение значений мероморфных функций (Наука, М., 1970).
- [3] Edrei A., Fuchs W. H. J. *Bounds for number of deficient values of certain classes of meromorphic functions*, Proc. London Math. Soc. **12**, 315–344 (1962).
- [4] Гришин А. Ф., Содин М. Л. *Рост по лучу, распределение корней по аргументам целой функции конечного порядка и одна теорема единственности*, Респ. сб. «Теория функций, функциональный анализ и их приложения», Харьков, Вища школа, Вып. 50, 47–61 (1988).
- [5] Гришин А. Ф., Малютина Т. И. *Новые формулы для индикаторов субгармонических функций*, Матем. физ., анал., геом. **12** (1), 25–72 (2005).
- [6] Valiron G. *Lectures on the General Theory of Integral Functions* (Chelsea, 1949).
- [7] Левин Б. Я. *Распределение корней целых функций* (ГИТТЛ, М., 1956).
- [8] Ransford Th. *Potential Theory in the Complex Plane* (Cambridge University Press, Cambridge, 1995).
- [9] Хейман У., Кеннеди П. *Субгармонические функции* (Мир, М., 1980).
- [10] Хабибуллин Б. Н. *Оценки снизу и свойства однородности субгармонических функций*, ВИНТИ, № 1604–84Деп (Уфа, 1984) <https://www.researchgate.net/publication/265318048>
- [11] Хабибуллин Б. Н. *Оценки снизу и свойства однородности субгармонических функций*, в сб. «Исследования по теории аппроксимации функций» (Башкирский филиал АН СССР, Уфа, 1984), с. 148–159, <https://www.researchgate.net/publication/299749932>