arXiv:1911.02370v1 [math.CV] 1 Nov 2019

ОДНА ТЕОРЕМА О МАЛЫХ ИНТЕРВАЛАХ ДЛЯ СУБГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Л. А. ГАБДРАХМАНОВА, Б. Н. ХАБИБУЛЛИН

1. Введение. Основной результат

1.1. **Предшествующие результаты.** В теории роста целых и мероморфных функций на комплексной плоскости $\mathbb{C}$ нередко возникает необходимость в оценках интегралов, подынтегральное выражение в которых построено по логарифму модуля таких функций и, возможно, дополнено некоторой весовой функцией-множителем. Такие оценки относительно множества интегрирования можно отнести к одному из следующих двух типов: по различным интервалам на *вещественной оси* $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ и на *положительной полуоси* $\mathbb{R}^+ := \{x \in \mathbb{R}\colon x \geqslant 0\} \subset \mathbb{R}$ или же по малым подмножествам на интервалах дуги или луча. Возможна и одновременная комбинация этих двух типов оценок. Среди исходных результатов первого типа можно рассматривать одну из классических теорем Р. Неванлинны [1, стр. 24–27], изложенную в монографии А. А. Гольдберга и И. В. Островского [2]. Истоки второго типа оценок — лемма А. Эдрея и В. Фукса о малых дугах [3, **2**, лемма III, **9**], нашедшая важные применения в теории мероморфных функций, отражённые, в частности, в [2, гл. 1, теоремы 7.3, 7.4]. Вариации на тему леммы о малых дугах — лемма о малых интервалах А. Ф. Гришина и М. Л. Содина, доказательство которой, как отмечено авторами в [4], дословно повторяет доказательство леммы Эдрея – Фукса, и поэтому она приводится в [4] без доказательства, но с интересным применениями [4, лемма 3.2, теорема 3.1] к мероморфным функциям конечного порядка, а также к целым функциям слабо регулярного роста на луче [4, § 3, определение]. Версия этой леммы для субгармонических функций *конечного порядка* доказана в совместной работе А. Ф. Гришина и Т. И. Малютиной [5], посвящённой ряду вопросов теории роста субгармонических функций. Она нашла в [5] неоднократные важные применения в доказательствах ключевых результатов [5, теоремы 2, 4]. Приведём здесь эту версию в максимально близкой к первоисточнику форме.

Теорема Гришина – Малютиной о малых интервалах ([5, теорема 8])**.** *Пусть* $\boldsymbol{\rho}\colon (0,+\infty) \to [0,+\infty)$ *— уточнённый порядок в смысле Валирона* [6, гл. III, 6], [7, гл. I, § 12], [2, гл. II, § 2]*, т. е. функция* $\boldsymbol{\rho}$ *дифференцируема и существуют два конечных предела* $\lim_{r\to+\infty} \boldsymbol{\rho}(r) := \rho \in 0,+\infty)$, $\lim_{r\to+\infty} r\boldsymbol{\rho}'(r)\ln r = 0$*. Пусть* $v \not\equiv -\infty$ *— субгармоническая функция формального порядка* $\boldsymbol{\rho}$ *на* $\mathbb{C}$*, т. е. существует постоянная* $c \in [0,+\infty)$*, с которой*

$$v(z) \leqslant cr^{\boldsymbol{\rho}(r)} \quad \text{при } r = |z| \text{ для всех } z \in \mathbb{C}, \tag{1.1}$$

E *— измеримое множество на полуоси* $[1,+\infty)$*. Тогда существует величина* M_{11}*, не зависящая от* R, θ, E*, такая, что выполняется неравенство*

$$\int_0^R \mathbf{1}_E(t)\big|v(te^{i\theta})\big|\,\mathrm{d}t \leqslant M_{11}\frac{\operatorname{mes} E_R}{R}\ln\frac{4R}{\operatorname{mes} E_R}\,R\cdot R^{\boldsymbol{\rho}(R)}, \quad E_R := E\cap[0,R], \tag{1.2}$$

где $\mathbf{1}_E$ *— характеристическая функция подмножества* E *в* $\mathbb{R}$*, а* $\operatorname{mes} E_R$ *— линейная мера Лебега множества* E_R*.*

Date: 01/11/2019.

В настоящей статье рассматриваются интегралы по подмножествам на интервалах на луче и не затрагиваются оценки интегралов по малым дугам на окружностях. В теореме 1, сформулированной в подразделе 1.3, мы распространяем теорему Гришина – Малютиной о малых интервалах на *субгармонические функции произвольного роста* с полностью контролируемыми постоянными в оценках с точностью до абсолютных постоянных-множителей. При этом теорема Гришина – Малютиной усиливается и для субгармонических функций v формального порядка $\boldsymbol{\rho}$ из (1.1), а именно: аналог постоянной M_{11} из (1.2) перестает зависеть от субгармонической функции v из (1.1) при условии полунормировки $v(0) \geqslant 0$, а зависит только от уточнённого порядка $\boldsymbol{\rho}$ и постоянной c из правой части (1.1). Менее существенное дополнение в нашем основном результате, — теореме 1, сформулированной в подразделе 1.3, — допущение произвольной измеримой функции-множителя g в подынтегральном выражении в интеграле из (1.2), хотя иногда это может быть полезным — см. замечание 1.2.

1.2. **Основные обозначения и соглашения.** К этому подразделу можно обращаться по мере необходимости. Наши обозначения могут отличаться от использованных выше.

$\mathbb{R}_{-\infty} := \{-\infty\} \cup \mathbb{R}$, $\mathbb{R}_{+\infty} := \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$; $\mathbb{R}_{\pm\infty} := \mathbb{R}_{-\infty} \cup \mathbb{R}_{+\infty}$ — *расширенная вещественная ось* с естественным отношением порядка, продолженным с $\mathbb{R}$ до неравенств $-\infty \leqslant x \leqslant +\infty$ для любого $x \in \mathbb{R}_{\pm\infty}$ и порядковой топологией с двумя концами $\pm\infty$; $S_* := S \setminus \{0\}$ для $S \subset \mathbb{R}_{\pm\infty}$, в частности, $\mathbb{R}^+_* := (\mathbb{R}^+)_* = \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$. Определены следующие действия:

$$\begin{gathered} x + (+\infty) = +\infty \text{ для } x \in \mathbb{R}_{+\infty},\ x + (-\infty) = -\infty \text{ для } x \in \mathbb{R}_{-\infty},\ -(\pm\infty) = \mp\infty, \\ x^+ := \max\{0, x\} =: (-x)^-,\ x \cdot (\pm\infty) := \pm\infty =: (-x) \cdot (\mp\infty) \text{ для } x \in \mathbb{R}^+_* \cup (+\infty), \\ \frac{\pm x}{0} := \pm\infty \text{ для } x \in \mathbb{R}^+_* \cup \{+\infty\},\ \frac{x}{\pm\infty} := 0 \text{ для } x \in \mathbb{R},\ \text{но } 0 \cdot (\pm\infty) := 0, \end{gathered} \tag{1.3}$$

если не оговорено противное. *Интервал* I на вещественной оси $\mathbb{R}$ или её расширении $\mathbb{R}_{\pm\infty}$ — *связное множество* с *концами* $\inf I$ и $\sup I$ в $\mathbb{R}_{\pm\infty}$. Используем широко распространённые обозначения для *открытых интервалов* $(a, b) := \{x \in \mathbb{R}_{\pm\infty} \colon a < x < b\}$ и *замкнутых интервалов* $[a, b] := \{x \in \mathbb{R}_{\pm\infty} \colon a \leqslant x \leqslant b\}$, а также для *полуоткрытых* или *полузамкнутых интервалов* $[a, b) := [a, b] \setminus \{b\}$, $(a, b] := [a, b] \setminus \{a\}$ с *концами* $a, b \in \mathbb{R}_{\pm\infty}$.

Для $z \in \mathbb{C}$ при $r \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ через $D(z, r) := \{z' \in \mathbb{C} \colon |z' - z| < r\}$ обозначаем *открытый круг с центром z радиуса r*, $\overline{D}(z, r) := \{z' \in \mathbb{C} \colon |z' - z| \leqslant r\}$ — *замкнутый круг с центром z радиуса r*, $\partial\overline{D}(z, r) := \{z' \in \mathbb{C} \colon |z' - z| = r\}$ — *окружность с центром z радиуса r*. При $r = 0$ из этих определений $D(z, 0) = \varnothing$, $\overline{D}(z, 0) = \partial\overline{D}(z, 0) = \{z\}$.

Для $X \subset \mathbb{R}_{\pm\infty}$ функция $f \colon X \to \mathbb{R}_{\pm\infty}$ *возрастающая* (соответственно *убывающая*) если для любых $x_1, x_2 \in X$ из $x_1 \leqslant x_2$ следует $f(x_1) \leqslant f(x_2)$ (соответственно $f(x_1) \geqslant f(x_2)$).

Для $S \subset \mathbb{C}$ через $\operatorname{har}(S)$ и $\operatorname{sbh}(S)$ обозначаем классы всех соответственно *гармонических* и *субгармонических* функций на каких-либо открытых окрестностях S [8], [9]. Так, для $z \in \mathbb{C}$ класс $\operatorname{har}(z) := \operatorname{har}(\{z\})$ состоит из гармонических функций в окрестностях точки z.

Через λ обозначаем *линейную меру Лебега* на $\mathbb{R}$ и её ограничения на *λ-измеримые подмножества* $S \subset \mathbb{R}_{\pm\infty}$. При этом используем и обозначение $\operatorname{mes} S := \lambda(S)$, отдавая дань традиции, отражённой выше в формулировке теоремы Гришина – Малютиной о малых интервалах. Понятия *почти всюду, измеримость* и *интегрируемость* означают λ-почти всюду, λ–измеримость и λ–интегрируемость соответственно Для *определенной почти всюду* и *измеримой* функции $f \colon S \to \mathbb{R}_{\pm\infty}$ через

$$\operatorname*{ess\,sup}_S f := \inf\Big\{a \in \mathbb{R} \colon \lambda\big(\{x \in S \colon f(x) > a\}\big) = 0\Big\} \tag{1.4}$$

обозначаем *существенную верхнюю грань* функции f на S.

Если $S := I$ — интервал с концами $a \leqslant b$, то для *интеграла Лебега* от f по интервалу I будем использовать две равноправные формы обозначений

$$\int_I f \, \mathrm{d}\lambda =: \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x,$$

если такой интеграл корректно определён.

Для $r \in \mathbb{R}^+$ и произвольной функции $v\colon \partial\overline{D}(0,r) \to \mathbb{R}_{\pm\infty}$ определим

$$\begin{aligned} \mathsf{M}_v(r) &:= \sup_{|z|=r} v(z); \\ \mathsf{C}_v(r) &:= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(re^{is}) \, \mathrm{d}s \end{aligned} \tag{1.5}$$

— *среднее по окружности* $\partial\overline{D}(0,r)$ *функции* v при условии, что интеграл Лебега в правой части корректно определён. В частности, $\mathsf{M}_v(0) = \mathsf{C}_v(0) = v(0)$. Свойства характеристик M_v и C_v в случае субгармонической функции v см. в [8, 2.6], [9, 2.7]

1.3. **Формулировка основного результата.**

Теорема 1 (о малых интервалах)**.** *Существует абсолютная постоянная* $a \geqslant 1$*, с которой*

- **[u]** *для любой субгармонической на* $\mathbb{C}$ *функции* $u \not\equiv -\infty$*,*
- **[r]** *для любых чисел* $0 \leqslant r_0 \leqslant r < R < +\infty$*,*
- **[E]** *для любого измеримого подмножества* $E \subset [r,R]$*,*
- **[g]** *для любой измеримой функции* g *на* E*,*
- **[b]** *для любого числа* $b \in (0,1]$

имеет место неравенство

$$\begin{aligned} \int_E \mathsf{M}_{|u|} g \, \mathrm{d}\lambda \leqslant \left(\frac{a}{b} \ln \frac{a}{b}\right) \Big(\mathsf{M}_u\big((1+b)R\big) - 2\min\big\{0, \mathsf{C}_u(r_0)\big\}\Big) \Big(\operatorname*{ess\,sup}_E |g|\Big) \\ \times \left(\operatorname{mes} E + \min\{\operatorname{mes} E, 3bR\} \ln \frac{3ebR}{\min\{\operatorname{mes} E, 3bR\}}\right) \end{aligned} \tag{1.6}$$

Замечание 1.1. Последнюю скобку-множитель

$$M \overset{(1.6)}{:=} \operatorname{mes} E + \min\{\operatorname{mes} E, 3bR\} \ln \frac{3ebR}{\min\{\operatorname{mes} E, 3bR\}} \tag{1.7}$$

часто можно «сжать». Так,

$$M \overset{(1.7)}{\leqslant} 2 \operatorname{mes} E \ln \frac{3ebR}{\operatorname{mes} E}, \quad \text{если } \operatorname{mes} E \leqslant 3bR, \tag{1.8}$$

а в противном случае

$$M \overset{(1.7)}{=} \operatorname{mes} E + 3bR \leqslant 2 \operatorname{mes} E \quad \text{при } \operatorname{mes} E > 3bR, \tag{1.9}$$

где как в случае (1.8), так и в случае (1.9) число 2 можно перекинуть как множитель в абсолютную постоянную a. Кроме того, всегда $\operatorname{mes} E \leqslant R$, поскольку $E \subset [r,R]$. При этом

$$(x,t) \longmapsto x \ln \frac{t}{x} \text{ — } \textit{возрастающая функция по } t \in \mathbb{R}_*^+ \textit{ и по } x \in [0, t/e]. \tag{1.10}$$

Исходя из этого, *при любом* $b \in (0,1]$ имеем

$$M \overset{(1.7)}{\leqslant} \operatorname{mes} E + \min\{\operatorname{mes} E, 3bR\} \ln \frac{\max\{3ebR, eR\}}{\min\{\operatorname{mes} E, 3bR\}} \overset{(1.10)}{\leqslant} \operatorname{mes} E + \operatorname{mes} E \ln \frac{3eR}{\operatorname{mes} E}$$
$$= (1 + \ln 3) \operatorname{mes} E + \operatorname{mes} E \ln \frac{eR}{\operatorname{mes} E} \leqslant (2 + \ln 3) \operatorname{mes} E \ln \frac{eR}{\operatorname{mes} E}, \quad (1.11)$$

где множитель $2 + \ln 3$ можно перебросить в абсолютную постоянную a. Конечно же, замена значения M из правой части (1.7) на правую часть из (1.11) в оценке сверху (1.6) может вести к значительному огрублению оценки (1.6) при малых значениях $b > 0$.

Замечание 1.2. Если функция $g \geqslant 0$ в $[\mathbf{g}]$ *возрастающая,* то в неравенстве (1.6) величину $\operatorname{ess\,sup}_E |g|$ можно заменить на $g(R)$, а если *убывающая,* то на $g(r)$.

Покажем, что теорема Гришина – Малютиной содержится в теореме 1.

Вывод теоремы Гришина – Малютиной. По условию $E \subset [1, +\infty)$. Положим $g \equiv 1$ на $\mathbb{R}^+$, а $b := 1$. По теореме 1 о малых интервалах с учётом замечания 1.1 с оценкой (1.11) найдётся абсолютная постоянная $A \geqslant 1$, с которой оценку (1.6) при $r_0 = r = 1 < R$ для субгармонической функции $v \not\equiv -\infty$, удовлетворяющей (1.1), можно записать в виде

$$\int_0^R \mathbf{1}_E(t) \big|v(te^{i\theta})\big| \, \mathrm{d}t \leqslant \int_{E_R} \mathsf{M}_{|v|} \, \mathrm{d}\lambda$$
$$\leqslant A\Big(c(2R)^{\boldsymbol{\rho}(2R)} - 2\min\big\{0, \mathsf{C}_v(1)\big\}\Big) \operatorname{mes} E_R \ln \frac{eR}{\operatorname{mes} E_R}. \quad (1.12)$$

Из свойств уточнённого порядка ρ следует существование постоянной $C_{\boldsymbol{\rho}}$, с которой $(2R)^{\boldsymbol{\rho}(2R)} \leqslant C_{\boldsymbol{\rho}} R^{\boldsymbol{\rho}(R)}$ для всех $R \geqslant 1$ [2, гл. II, теорема 2.2, следствие], [7, гл. 1, § 12, 2)]. Таким образом, из (1.12) получаем

$$\int_0^R \mathbf{1}_E(t) \big|v(te^{i\theta})\big| \, \mathrm{d}t \leqslant A\left(cC_{\boldsymbol{\rho}} - 2\frac{\min\big\{0, \mathsf{C}_v(1)\big\}}{\inf_{r\geqslant 1} r^{\boldsymbol{\rho}(r)}}\right) \operatorname{mes} E_R \ln \frac{eR}{\operatorname{mes} E_R} \cdot R^{\boldsymbol{\rho}(R)},$$

откуда следует (1.2). □

2. Доказательство теоремы 1

2.1. **Оценка модуля субгармонической функции.** Нам потребуется одна из оценок снизу для субгармонических функций, установленная в [10], [11] в гораздо более общей форме, чем необходимо для наших целей.

Теорема A ([10, теорема 1.2], [11, теорема 2])**.** *Существует такая абсолютная постоянная* $a_0 \geqslant 1$, *что для любой убывающей непрерывной функции* $a\colon \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+_*$ *и для любой возрастающей непрерывной функции* $A\colon \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+_*$, *связанных соотношениями* $1 \leqslant aA \leqslant A$ *на* $\mathbb{R}^+$, *для каждой функции*

$$u \in \operatorname{sbh}(\mathbb{C}) \cap \operatorname{har}(0) \quad \textit{со значением } u(0) = 0 \quad (2.1)$$

найдётся не более чем счётное множество кругов

$$\{D(z_j, t_j)\}_{j\in N}, \quad N \subset \mathbb{N} := \{1, 2, \dots\}, \quad (2.2)$$

для которого неравенства

$$u(z) \geqslant -\frac{a_0}{a(2|z|)} \mathsf{M}_u\big((1 + a(|z|))|z|\big) \ln\big(a_0 A(|z|)\big)$$

выполнены при всех $z \in \mathbb{C} \setminus \bigcup_{j\in N} D(z_j, t_j)$ *и при этом*

$$\sum_{D(0,r)\cap D(z_j,t_j)\neq\varnothing} t_j \leqslant \frac{1}{a(2r)} \int_0^r \frac{1}{A(t)} \quad \text{для любых } r \in \mathbb{R}_*^+.$$

Следствие 2.1. *Существует такая абсолютная постоянная* $a_0 \geqslant 1$*, что для любой субгармонической функции* u*, удовлетворяющей ограничениям из* (2.1)*, и для любого числа* $B > 1$ *найдётся не более чем счётное множество кругов* (2.2)*, для которого*

$$u(z) \overset{(1.5)}{\geqslant} -\big(a_0 B \ln(a_0 B)\big)\mathsf{M}_u\big((1+1/B)|z|\big), \tag{2.3}$$

при всех $z \in \mathbb{C} \setminus \bigcup_{j\in N} D(z_j, t_j)$ *и при этом*

$$\sum_{D(r)\cap D(z_j,t_j)\neq\varnothing} t_j \leqslant \frac{1}{B} r \quad \text{для любых } r \in \mathbb{R}_*^+. \tag{2.4}$$

Доказательство. Предложение 2.1 сразу следует из теоремы A при постоянных функциях $A(t) \equiv B^2$ и $a(t) \equiv 1/B$ при всех $t \in \mathbb{R}^+$. □

Предложение 2.1. *Для любого числа* $b \in (0, 1]$ *при*

$$B > 2 + \frac{2}{b} \tag{2.5}$$

для каждого множества кругов (2.2) *с ограничением* (2.4)*, для всякой точки* $z \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$ *найдётся число* $r_z > 0$*, удовлетворяющее условиям*

$$0 < r_z < b|z|, \quad \Big(\bigcup_{j\in N} D(z_j, r_j)\Big) \bigcap \partial D(z, r_z) = \varnothing, \tag{2.6}$$

т. е. окружность $\partial\overline{D}(z, r_z)$ *при некотором* $r_z > 0$ *содержится в круге* $D\big(z, b|z|\big)$ *и не пересекается ни с одним из кругов* $D(z_j, r_j)$ *с* $j \in N$.

Предложение 2.1 элементарно, но в целях контроля за соотношениями между постоянными b и B всё же приведём его стандартное

Доказательство. Достаточно рассмотреть положительную точку $z \in \mathbb{R}_*^+$. При ограничении (2.4) и значении B из (2.5) имеем

$$\sum_{D(z,bz)\cap D(z_j,t_j)\neq\varnothing} 2t_j \leqslant \sum_{D((1+b)z)\cap D(z_j,t_j)\neq\varnothing} 2t_j \overset{(2.4)}{\leqslant} \frac{2}{B}(1+b)z \overset{(2.5)}{<} bz.$$

Отсюда для всех кругов $D(z_j, t_j)$ с $D(z, bz) \cap D(z_j, t_j) \neq \varnothing$, сумма длин интервалов

$$\Big(z + \big(D(z_j, t_j) - z\big)e^{-i\arg(z_j - z)}\Big) \bigcap [0, bz), \tag{2.7}$$

являющихся круговыми проекциями с центром z в $D(z, bz)$ диаметров кругов $D(z_j, t_j)$ на радиус $[z, bz) \subset \mathbb{R}_*^+$ круга $D(z, bz)$, меньше, чем длина bz радиуса круга $D(z, bz)$. Следовательно, на радиусе $[z, bz) \subset \mathbb{R}_*^+$ есть точка $z + r_z$, не принадлежащая ни одному из интервалов (2.7). Это сразу влечёт за собой (2.6). □

Предложение 2.2. *Существует такая абсолютной постоянной* $A_0 \geqslant 1$*, что*

- [u] *для любой субгармонической функции* u *из* (2.1) *с мерой Рисса* $\mu_u := \frac{1}{2\pi}\Delta u$*, где* Δ *— оператор Лапласа, действующий в смысле теории обобщённых функций,*
- [b] *для любого числа* $b \in (0, 1] \subset \mathbb{R}^+$

имеет место неравенство

$$\mathsf{M}_{|u|}(r) \leqslant \int_{(1-b)r}^{(1+b)r} \ln\frac{br}{|t-r|}\,\mathrm{d}\mu_u^{\mathrm{rad}}(t) + \Big(\frac{A_0}{b}\ln\frac{A_0}{b}\Big)\mathsf{M}_u\big((1+2b)r\big) \quad \textit{при всех } r\in\mathbb{R}^+, \tag{2.8}$$

где $\mu^{\mathrm{rad}}(t) := \mu\big(\overline{D}(0,t)\big)$, $t\in\mathbb{R}^+$, — *считающая функция положительной меры* μ *на* $\mathbb{C}$.

Доказательство. По определению (1.5) из принципа максимума

$$u(z) \leqslant \mathsf{M}_u\big(|z|\big) \leqslant \mathsf{M}_u\big((1+2b)|z|\big) \quad \text{при всех } z\in\mathbb{C}. \tag{2.9}$$

Для абсолютной постоянной $a_0 \geqslant 1$ из следствия 2.1 положим

$$B \overset{(2.5)}{:=} 3+\frac{3}{b}, \quad 1 \leqslant c_b := a_0 B\ln(a_0 B) = \frac{3a_0(b+1)}{b}\ln\frac{3a_0(b+1)}{b} \leqslant \frac{6a_0}{b}\ln\frac{6a_0}{b}. \tag{2.10}$$

Пусть $z\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$. Исходя из оценки снизу (2.3) следствия 2.1 для функции u и предложения 2.1, найдется такое число $r_z\in\big(0,b|z|\big)$, удовлетворяющее (2.6), что имеет место оценка снизу

$$\begin{aligned} u(z') &\geqslant -\mathsf{M}_u\big((1+1/B)|z'|\big)a_0 B\ln(a_0 B) \overset{(2.10)}{\geqslant} -c_b\mathsf{M}_u\big((1+1/B)(1+b)|z|\big) \\ &\overset{(2.10)}{\geqslant} -c_b\mathsf{M}_u\big((1+2b)|z|\big) \quad \text{для всех } z'\in\partial\overline{D}(z,r_z). \end{aligned} \tag{2.11}$$

По формуле Пуассона – Йенсена [9, 3.7], [8, 4.5] для круга $D(z,r_z)$ имеем

$$u(z) = -\int_{D(z,r_z)} \ln\Big|\frac{r_z^2}{r_z(z-z')}\Big|\,\mathrm{d}\mu_u(z') + h(z) =: G(z)+h(z), \tag{2.12}$$

где наименьшая гармоническая мажоранта h функции v в круге $D(z,r_z)$ ввиду (2.9) и (2.11) удовлетворяет оценке

$$\big|h(z)\big| \leqslant c_b\mathsf{M}_u\big((1+2b)|z|\big). \tag{2.13}$$

Поскольку функция Грина для круга под знаком интеграла с полюсом z в центре круга в промежуточном равенстве из (2.12) положительна, имеем

$$\begin{aligned} \big|G(z)\big| &= \int_{D(z,r_z)} \ln\frac{r_z}{|z-z'|}\,\mathrm{d}\mu_u(z') \leqslant \int_{D(z,r_z)} \ln\frac{b|z|}{|z-z'|}\,\mathrm{d}\mu_u(z') \leqslant \int_{D(z,b|z|)} \ln\frac{b|z|}{\big||z'|-|z|\big|}\,\mathrm{d}\mu_u(z') \\ &\leqslant \int\limits_{(1-b)|z|\leqslant|z'|<(1+b)|z|} \ln\frac{b|z|}{\big||z'|-|z|\big|}\,\mathrm{d}\mu_u(z') = \int\limits_{(1-b)|z|}^{(1+b)|z|} \ln\frac{b|z|}{\big|t-|z|\big|}\,\mathrm{d}\mu_u^{\mathrm{rad}}(t). \end{aligned}$$

Из последней оценки и из (2.13) ввиду (2.12) получаем

$$\big|u(z)\big| \leqslant \big|G(z)\big| + \big|h(z)\big| \leqslant \int\limits_{(1-b)|z|}^{(1+b)|z|} \ln\frac{b|z|}{\big|t-|z|\big|}\,\mathrm{d}\mu_u^{\mathrm{rad}}(t) + c_b\mathsf{M}_u\big((1+2b)|z|\big)$$

Здесь правая часть не зависит от аргумента $\arg z$, что при $r := |z| > 0$ по (1.5) даёт (2.8) с $A_0 \overset{(2.10)}{:=} 6a_0$. При $r=0$ неравенство (2.8) очевидно, поскольку $u(0)=0$. □

2.2. **Интегральные оценки.** Если $\operatorname{mes} E = 0$, то в рамках соглашений (1.3) о действиях в $\mathbb{R}_{\pm\infty}$ обе части неравенства (1.6) равны нулю и оно верно. Поэтому далее $\operatorname{mes} E > 0$. При этом если $\operatorname{ess\,sup}_E |g| = +\infty$, то согласно (1.3) правая часть неравенства (1.6) равна $+\infty$ и неравенство (1.6) верно. В противном случае сразу можем «убрать» функцию g из подынтегрального выражения в интеграле из левой части (1.6):

$$\int_E \mathsf{M}_{|u|} g \, \mathrm{d}\lambda \leqslant \int_r^R \mathsf{M}_{|u|}(x) \mathbf{1}_E \, \mathrm{d}x \cdot \operatorname*{ess\,sup}_E |g|. \tag{2.14}$$

Основные этапы доказательства содержит случай

2.2.1. **Функция u из (2.1).** Пока считаем, что $b \in (0, 1/2]$. По предложению 2.2 для любой функции u из (2.1) для интеграла из правой части (2.14) имеет место неравенство

$$\begin{aligned}\int_r^R \mathsf{M}_{|u|}(x) \mathbf{1}_E(x) \, \mathrm{d}x &\leqslant \int_r^R \left(\int_{(1-b)x}^{(1+b)x} \ln \frac{bx}{|t-x|} \, \mathrm{d}\mu_u^{\mathrm{rad}}(t) + \Big(\frac{A_0}{b} \ln \frac{A_0}{b}\Big) \mathsf{M}_u\big((1+2b)x\big) \right) \mathbf{1}_E(x) \, \mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_r^R \int_{(1-b)x}^{(1+b)x} \ln \frac{bx}{|t-x|} \, \mathrm{d}\mu_u^{\mathrm{rad}}(t) \mathbf{1}_E(x) \, \mathrm{d}x + \Big(\frac{A_0}{b} \ln \frac{A_0}{b}\Big) \mathsf{M}_u\big((1+2b)R\big) \operatorname{mes} E. \end{aligned} \tag{2.15}$$

Обозначим повторный интеграл в правой части (2.15) как

$$I := \int_r^R \int_{(1-b)x}^{(1+b)x} \ln \frac{bx}{|t-x|} \, \mathrm{d}\mu_u^{\mathrm{rad}}(t) \mathbf{1}_E(x) \, \mathrm{d}x = \iint_S \mathbf{1}_E(x) \ln^+ \frac{bx}{|t-x|} \, \mathrm{d}\mu_u^{\mathrm{rad}}(t) \, \mathrm{d}x \tag{2.16}$$

где $\ln^+ := \max\{0, \ln\}$ и двойной интеграл в правой части берётся по множеству

$$S := \Big\{ (x,t) \in \mathbb{R}^2 \colon x \in [r, R], (1-b)x \leqslant t \leqslant (1+b)x \Big\} \subset \mathbb{R}^2,$$

содержащемуся при $b \in (0, 1/2]$ в множестве

$$T := \Big\{ (x,t) \in \mathbb{R}^2 \colon t \in \big[(1-b)r, (1+b)R\big], (1-2b)t \leqslant x \leqslant (1+2b)t \Big\}.$$

Отсюда согласно (2.16) при $b \in (0, 1/2]$ получаем

$$\begin{aligned} I &\leqslant \iint_T \mathbf{1}_E(x) \ln^+ \frac{bx}{|t-x|} \, \mathrm{d}\mu_u^{\mathrm{rad}}(t) \, \mathrm{d}x = \int_{(1-b)r}^{(1+b)R} \int_{(1-2b)t}^{(1+2b)t} \mathbf{1}_E(x) \ln^+ \frac{bx}{|t-x|} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}\mu_u^{\mathrm{rad}}(t) \\ &\leqslant \Big(\mu_u^{\mathrm{rad}}\big((1+b)R\big) - \mu_u^{\mathrm{rad}}\big((1-b)r\big) \Big) \sup_{(1-b)r \leqslant t \leqslant (1+b)R} \int_{(1-2b)t}^{(1+2b)t} \mathbf{1}_E(x) \ln^+ \frac{bx}{|t-x|} \, \mathrm{d}x \\ &\leqslant \mu_u^{\mathrm{rad}}\big((1+b)R\big) \sup_{(1-b)r \leqslant t \leqslant (1+b)R} \int_0^{(1+b)(1+2b)R} \mathbf{1}_E(x) \ln^+ \frac{b(1+b)(1+2b)R}{|t-x|} \, \mathrm{d}x \\ &\leqslant \mu_u^{\mathrm{rad}}\big((1+b)R\big) \sup_{t \in \mathbb{R}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{1}_E(x) \ln^+ \frac{3bR}{|x-t|} \, \mathrm{d}x \\ &= \mu_u^{\mathrm{rad}}\big((1+b)R\big) \sup_{t \in \mathbb{R}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{1}_{(E-t)}(s) \ln^+ \frac{3bR}{|s|} \, \mathrm{d}s, \end{aligned} \tag{2.17}$$

где множитель перед sup стандартно оценивается сверху при $b \in (0, 1/2]$ как

$$\mu_u^{\mathrm{rad}}\big((1+b)R\big) \leqslant \frac{1}{\ln\frac{1+2b}{1+b}} \int_{(1+b)R}^{(1+2b)R} \frac{\mu_u^{\mathrm{rad}}(t)}{t}\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{4(1+b)}{b} \int_0^{(1+2b)R} \frac{\mu_u^{\mathrm{rad}}(t)}{t}\,\mathrm{d}t$$
$$= \frac{6}{b}\mathsf{C}_u\big((1+2b)R\big) \leqslant \frac{6}{b}\mathsf{M}_u\big(1+2b)R\big), \quad (2.18)$$

поскольку в этом п. 2.2.1 функция u удовлетворяет требованиям из (2.1). Для оценки последнего интеграла в (2.17) будет использована

Лемма A ([2, лемма 7.2]). *Пусть $f\colon I \to \mathbb{R}_{\pm\infty}$ — чётная интегрируемая функция на симметричном относительно нуля открытом интервале $I \subset \mathbb{R}$, убывающая на интервале $I \cap \mathbb{R}_*^+$, $E \subset I$ — измеримое подмножество. Тогда*

$$\int_E f\,\mathrm{d}\lambda \leqslant 2\int_0^{(\operatorname{mes} E)/2} f(x)\,\mathrm{d}x. \quad (2.19)$$

Применяя лемму A с $f\colon x \mapsto \ln^+\frac{3bR}{|x|}$, $x \in \mathbb{R}$, и множеством $E - t$ в роли E к оценке сверху интегралов из правой части (2.17), получим

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{1}_{(E-t)}(s)\ln^+\frac{3bR}{|s|}\,\mathrm{d}s = \int_{(E-t)} \ln^+\frac{3bR}{|s|}\,\mathrm{d}\lambda(s) \leqslant 2\int_0^{\operatorname{mes}(E-t)/2} \ln^+\frac{3bR}{x}\,\mathrm{d}x$$
$$= 2\int_0^{\operatorname{mes} E/2} \ln^+\frac{3bR}{x}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\min\{\operatorname{mes} E/2,\,3bR\}} \ln^+\frac{3bR}{x}\,\mathrm{d}x$$
$$= \min\{\operatorname{mes} E, 6bR\}\ln\frac{6ebR}{\min\{\operatorname{mes} E, 6bR\}}, \quad (2.20)$$

где последнее выражение не зависит от переменной t. Таким образом, последовательно применяя оценку (2.15), обозначение (2.16) для интеграла I с оценками сверху(2.17) и (2.18), а также (2.20), в случае функции u из (2.1) при $b \in (0, 1/2]$ получаем

$$\int_E \mathsf{M}_{|u|}g\,\mathrm{d}\lambda \leqslant \max\left\{\left(\frac{A_0}{b}\ln\frac{A_0}{b}\right), \frac{6}{b}\right\}\mathsf{M}_u\big((1+2b)R\big)\operatorname*{ess\,sup}_E|g|$$
$$\times\left(\operatorname{mes} E + \min\{\operatorname{mes} E, 6bR\}\ln\frac{6ebR}{\min\{\operatorname{mes} E, 6bR\}}\right)$$

Если здесь вместо числа $b \in (0, 1/2]$ рассмотреть число $2b \in (0, 1]$, сохранив за ним прежнее обозначение b, а также положить $a := 2(A_0 + 6)$, то получим в точности неравенство (1.6), поскольку для субгармонической функции u из (2.1) в силу $u(0) = 0$ имеем $\mathsf{C}_u(r_0) \geqslant 0$ и $\min\big\{0, \mathsf{C}_u(r_0)\big\} = 0$. Осталось рассмотреть

2.2.2. **Случай произвольной субгармонической функции $u \not\equiv -\infty$.** При $u(0) = -\infty$ и $r_0 = 0$ имеем $\min\big\{0, \mathsf{C}_u(r_0)\big\} = -\infty$. Следовательно, правая часть неравенства (1.6) в рамках правил действий (1.3) равна $+\infty$ и неравенство (1.6) верно.

Пусть $r_0 > 0$. Тогда от произвольной субгармонической функции $u \not\equiv -\infty$ можно с помощью её гармонического продолжения внутрь круга $D(0, r_0)$ и вычитания из этого продолжения среднего по окружности $c_0 \overset{(1.5)}{:=} \mathsf{C}_u(r_0)$ перейти к субгармонической функции u_0, равной $u - c_0$ на $\mathbb{C} \setminus D(0, r_0)$, гармонической в круге $D(0, r_0)$ и равной нулю в нуле. Таким образом, эта преобразованная функция u_0 удовлетворяет требованиям из (2.1) и для нее справедливо неравенство (1.6)

с заменой u на u_0. Таким образом, применяя (1.6) к u_0, с теми же скобками, за исключением второй, в правой части имеем

$$\begin{aligned}\int_E \mathsf{M}_{|u|}|g|\,\mathrm{d}\lambda &\leqslant \int_E \mathsf{M}_{|u_0|}|g|\,\mathrm{d}\lambda + \int_E \mathsf{M}_{|c_0|}|g|\,\mathrm{d}\lambda \\ &\leqslant \Big(\dots\Big)\Big(\mathsf{M}_u\big((1+b)R\big) - c_0\Big)\Big(\dots\Big)\times\Big(\dots\Big) + \int_E |c_0||g|\,\mathrm{d}\lambda \\ &\leqslant \Big(\dots\Big)\Big(\mathsf{M}_u\big((1+b)R\big) - \big(c_0 - |c_0|\big)\Big)\Big(\dots\Big)\times\Big(\dots\Big)\end{aligned}$$

где $c_0 - |c_0| = -2c_0^- = 2\min\big\{0, \mathsf{C}_u(r_0)\big\}$. Это даёт неравенство (1.6) для $r_0 > 0$. Наконец, к случаю $u(0) > -\infty$ и $r_0 = 0$ можно перейти от последнего разобранного случая, устремляя $r_0 > 0$ к нулю, с $\min\big\{0, \mathsf{C}_u(r_0)\big\} \to \min\big\{0, u(0)\big\} > -\infty$.

Теорема 1 доказана.

Замечание 2.1. В случае, когда $u = \ln|f|$, где f — целая ненулевая функция с $|f(0)| = 0$, в п. 2.2.2 можно, конечно, поступить и иначе, — более традиционно, — а именно: вместо функции f рассмотреть результат деления функции f на одночлен $z \mapsto \frac{f^{(k)}(0)}{k!}z^k$, где $k \geqslant 1$ — кратность корня функции f в нуле. Но тогда вместо дополнительного слагаемого $-2\min\big\{0, \mathsf{C}_u(r_0)\big\}$ в правую часть придётся приписать слагаемое порядка роста $k\ln R + O(1)$ что при $k \geqslant 1$ и росте $R \to +\infty$, очевидно, строго грубее, чем постоянная $-2\min\big\{0, \mathsf{C}_u(r_0)\big\}$.

Литература

[1] Nevanlinna R. Le théoremè de Picard – Borel et la théorie des fonctions méromorphes (Gauthier-Villars, Paris, 1929).

[2] Гольдберг А. А., Островский И. В. Распределение значений мероморфных функций (Наука, М., 1970).

[3] Edrei A., Fuchs W. H. J. *Bounds for number of deficient values of certain classes of meromorphic functions,* Proc. London Math. Soc. **12**, 315–344 (1962).

[4] Гришин А. Ф., Содин М. Л. *Рост по лучу, распределение корней по аргументам целой функции конечного порядка и одна теорема единственности,* Респ. сб. «Теория функций, функциональный анализ и их приложения», Харьков, Вища школа, Вып. 50, 47–61 (1988).

[5] Гришин А. Ф., Малютина Т. И. *Новые формулы для индикаторов субгармонических функций,* Матем. физ., анал., геом. **12** (1), 25–72 (2005).

[6] Valiron G. Lectures on the General Theory of Integral Functions (Chelsea, 1949).

[7] Левин Б. Я. Распределение корней целых функций (ГИТТЛ, М., 1956).

[8] Ransford Th. Potential Theory in the Complex Plane (Cambridge University Press, Cambridge, 1995).

[9] Хейман У., Кеннеди П. Субгармонические функции (Мир, М., 1980).

[10] Хабибуллин Б. Н. *Оценки снизу и свойства однородности субгармонических функций,* ВИНИТИ, № 1604–84Деп (Уфа, 1984) https://www.researchgate.net/publication/265318048

[11] Хабибуллин Б. Н. *Оценки снизу и свойства однородности субгармонических функций,* в сб. «Исследования по теории аппроксимации функций» (Башкирский филиал АН СССР, Уфа, 1984), с. 148–159, https://www.researchgate.net/publication/299749932