Вариации на тему уточнённого порядка

Б. Н. Хабибуллин

Башкирский государственный университет Россия, Республика Башкортостан, 450076 г. Уфа, улица Заки Валиди, 32.

Email: khabib-bulat@mail.ru

Понятие уточнённого порядка широко используется в теориях целых, мероморфных, субгармонических и плюрисубгармонических функций. Приводится общая трактовка этого понятия как уточнённой функции роста относительно модельной функции роста. Классический уточнённый порядок — это $\ln V$, когда V — уточнённая функция роста относительно тождественной функции на положительной полуоси. Наше определение использует лишь одно условии. Такая форма определения новая и для классического уточнённого порядка.

Ключевые слова: функция роста, уточнённый порядок, выпуклая функция, целая функция, субгармоническая функция.

Понятие уточнённого порядка возникло в работах Ж. Валирона [1; Ch. III, I.6]. Основные его свойства и применения изложены в [2; гл. I, § 12], [3; гл. II, § 2], [4; 7.4], [5]. Перейдём к точным определениям и формулировкам. \mathbb{R} — множество действительных чисел; $\mathbb{R}^+ \coloneqq \{r \in \mathbb{R}: r \geq 0\}$ — множество положительных чисел; $\mathbb{R}^+ \coloneqq \{r \in \mathbb{R}: r \geq 0\}$ — множество положительных чисел; $\mathbb{R}^+ \coloneqq \{r \in \mathbb{R}: r \geq 0\}$ — множество положительных чисел; $\mathbb{R}^+ \coloneqq \{r \in \mathbb{R}: r \geq 0\}$ — множество $R \subset \mathbb{R}$ — луч положительного направления на \mathbb{R} , если $\emptyset \neq R \neq \mathbb{R}$, а также для любых $r \in R$ и $x \in \mathbb{R}$ из $r \leq x$ следует, что $x \in R$. Далее через R_+ обозначаем какой-либо произвольный луч положительного направления на \mathbb{R} . Рассматриваются только функции f с областью значений \mathbb{R} и с областью определения, включающей в себя R_+ . Функция f обладает некоторым свойством, если она обладает им на R_+ . Функция f положительная и пишем $f \geq 0$ (соответственно строго положительная и пишем f > 0), если $f(R_+) \subset \mathbb{R}^+$ (соответственно $f(R_+) \subset \mathbb{R}^+$). Функция f возрастающая (соответственно строго возрастающая), если для любых $x_1, x_2 \in R_+$ из $x_1 < x_2$ следует, что $f(x_1) \leq f(x_2)$ (соответственно $f(x_1) < f(x_2)$). Действия над функциями производятся поточечно на R_+ .

Функция M выпукла относительно \ln , если функция $m: x \mapsto M(e^x)$ выпуклая. Из известных свойств выпуклых функций это означает, что функция M непрерывна и существуют левые и правые производные соответственно M'_- и M'_+ , для которых функция $r \mapsto rM'_-(r)$ и/или функция $r \mapsto rM'_+(r)$ возрастающая [6, Ch. I]. Другими словами, по переменной $z \in \mathbb{C}$ на комплексной плоскости \mathbb{C} функция $z \mapsto M(|z|)$ субгармоническая радиальная функция вне некоторого круга с центром в нуле из \mathbb{C} [6, Ch. III].

Определение. Выпуклую относительно \ln функцию M>0 с производной M'>0 и с пределом $\lim_{r\to +\infty} M(r)=+\infty$ называем модельной функцией роста. Дифференцируемую функцию V>0 называем уточнённой функцией роста относительно модельной функции роста M, если существует хотя бы один из пределов

$$\lim_{r \to +\infty} \frac{M(r)V'(r)}{M'(r)V(r)} = \lim_{r \to +\infty} \frac{(\ln V(r))'}{(\ln M(r))'} = \lim_{x \to +\infty} \frac{(\ln v(x))'}{(\ln m(x))'} = \lim_{x \to +\infty} \frac{m(x)v'(x)}{m'(x)v(x)} \in \mathbb{R}^+, \tag{1}$$

где, как и выше, функция $m: x \mapsto M(e^x)$ выпукла, а $v: x \mapsto V(e^x)$ дифференцируема, а равенства в (1) при условии существования хотя бы одного из пределов в (1), как нетрудно показать, всегда имеют место.

Использование в (1) вместе с M и V функций $m(\ln r) = M(r)$ и $v(\ln r) = V(r)$ для $r \in \mathbb{R}^+_*$ обусловлено необходимостью вписать в будущем наш подход к функциям роста в общую идеологию по этому направлению, разработанную К. Кизельманом в [7].

Теорема. Пусть M – модельная функция роста, V > 0 – дифференцируемая функция. Тогда эквивалентны следующие два утверждения:

- 1. Φ ункция V уточнённая функция роста относительно модельной функции M.
- II. Для функции

$$\boldsymbol{\rho}_M := \frac{\ln V}{\ln M} \tag{2}$$

существуют два конечных предела

$$\rho := \lim_{r \to +\infty} \rho_M(r) = \lim_{r \to +\infty} \frac{\ln V(r)}{\ln M(r)} \in \mathbb{R}^+, \tag{3}$$

$$\lim_{r \to +\infty} \frac{M(r)}{M'(r)} \, \boldsymbol{\rho}_{M}'(r) \ln M(r) = \lim_{r \to +\infty} \frac{\ln M(r)}{(\ln M)'(r)} \, \boldsymbol{\rho}_{M}'(r) = 0. \tag{4}$$

При выполнении любого из этих двух утверждений имеем равенства

$$\rho := \lim_{r \to +\infty} \boldsymbol{\rho}_{M}(r) = \lim_{r \to +\infty} \frac{M(r)V'(r)}{M'(r)V(r)}.$$
 (5)

Доказательство. Вычисление производной функции (2) даёт

$$\rho_{M}' = \frac{(V'/V) \ln M - (M'/M) \ln V}{(\ln M)^{2}} = \frac{M'}{M \ln M} \left(\frac{MV'}{M'V} - \frac{\ln V}{\ln M}\right),$$

откуда по определению (2) функции ho_M имеем

$$\frac{MV'}{M'V} = \frac{\ln V}{\ln M} + \frac{M \ln M}{M'} \, \rho'_{M} = \rho_{M} + \frac{M}{M'} \, \rho'_{M} \ln M. \tag{6}$$

Отсюда, если выполнено утверждение II Теоремы и существуют пределы (3) и (4), то

$$\lim_{r\to+\infty}\frac{M(r)V'(r)}{M'(r)V(r)}=\lim_{r\to+\infty}\boldsymbol{\rho}_M(r)+\lim_{r\to+\infty}\frac{M(r)}{M'(r)}\boldsymbol{\rho}_M'(r)\ln M(r)=\rho+0=\rho\in\mathbb{R}^+.$$

Таким образом, существуют пределы (1), справедливо равенство (5) и по Определению выполнено утверждение I Теоремы.

Обратно, пусть выполнено утверждение I Теоремы, т.е. существует предел

$$\rho := \lim_{r \to +\infty} \frac{(\ln V(r))'}{(\ln M(r))'} \in \mathbb{R}^+. \tag{7}$$

Правило Лопиталя [8; теорема 1]. Пусть функции f и g дифференцируемы на некотором луче R_{\rightarrow} положительного направления на \mathbb{R} . Если существуют пределы

$$\lim_{r \to +\infty} |g(r)| = +\infty, \qquad \lim_{r \to +\infty} \frac{f'(r)}{g'(r)} =: L \in \{-\infty\} \cup \mathbb{R} \cup \{+\infty\}, \tag{8}$$

то существует предел

$$\lim_{r \to +\infty} \frac{f(r)}{g(r)} = L = \lim_{r \to +\infty} \frac{f'(r)}{g'(r)}.$$
(9)

Специфика приведённого варианта правила Лопиталя в том, что в отличие от его традиционных форм здесь в условиях (8) не требуется традиционного условия существования бесконечного предела $\lim_{r\to +\infty} |f(r)| = +\infty$ для функции f из числителей в (8) и (9).

Применим правило Лопиталя к функциям $g \coloneqq \ln M$ и $f \coloneqq \ln V$ с $L \coloneqq \rho$ из (7). Тогда по свойствам модельной функции роста M из Определения в обозначении (2) существует

$$\lim_{r \to +\infty} \boldsymbol{\rho}_{M}(r) = \lim_{r \to +\infty} \frac{\ln V(r)}{\ln M(r)} = \lim_{r \to +\infty} \frac{f(r)}{g(r)} = L = \rho.$$

Таким образом, доказано существование предела (3) из утверждения II, а также установлено равенство (5). Наконец, из равенств (6) и (5) получаем

$$\lim_{r\to+\infty}\frac{M(r)}{M'(r)}\,\boldsymbol{\rho}_M'(r)\ln M(r)=\lim_{r\to+\infty}\,\boldsymbol{\rho}_M(r)-\lim_{r\to+\infty}\frac{M(r)V'(r)}{M'(r)V(r)}=\rho-\rho=0,$$

что даёт существование предела (4), равного нулю, и завершает доказательство импликации I ⇒ II. Теорема доказана.

Напомним классическое определение уточнённого порядка. Дифференцируемая функция $\rho \geq 0$, определённая на луче $R_{\rightarrow} \subset \mathbb{R}^+$, называется *уточнённым порядком в смысле Валирона* [1]–[5], если существуют два конечных предела

$$\rho := \lim_{r \to +\infty} \boldsymbol{\rho}(r) \in \mathbb{R}^+, \qquad \lim_{r \to +\infty} r \boldsymbol{\rho}'(r) \ln r = 0.$$
 (10)

Следствие. Пусть функция $\rho \geq 0$ дифференцируема на луче $R_{\to} \subset \mathbb{R}^+$. Тогда эквивалентны следующие два утверждения:

- 1. ρ уточнённый порядок в смысле Валирона и $\rho := \lim_{r \to +\infty} \rho(r) \in \mathbb{R}^+$, как в первом равенстве из (10).
- II. Функция $V(r) \coloneqq r^{\rho(r)}, \ r \in R_{\to}$, уточнённая функция роста относительно тождественной модельной функции роста $M \coloneqq \operatorname{id}: r \mapsto r$, что означает существование хотя бы одного предела из (1), а значит и каждого предела в (1):

$$\rho = \lim_{r \to +\infty} \frac{rV'(r)}{V(r)} = \lim_{r \to +\infty} \frac{(\ln V(r))'}{(\ln r)'} = \lim_{x \to +\infty} \frac{(\ln v(x))'}{(\ln e^x)'} = \lim_{x \to +\infty} \frac{v'(x)}{v(x)} \in \mathbb{R}^+, \quad (11)$$

где, как и прежде в Определении, $v(x) := V(e^x), x \in \ln R_{\rightarrow} := \{\ln r : r \in R_{\rightarrow}\}.$

Доказательство. Утверждение I Следствия – это, ввиду определения уточнённого порядка (10), в точности утверждение II Теоремы при M := id, где соотношения (3) и (4) – это соответственно первое и второе соотношения в (10). Утверждение II Следствия совпадает в случае M := id с утверждением I Теоремы. Величина ρ в (11) совпадает с

величиной $\rho := \lim_{r \to +\infty} \boldsymbol{\rho}(r) \in \mathbb{R}^+$ из утверждения I Следствия по равенству (5) Теоремы. Тем самым, Следствие доказано.

Примеры. Опишем широкий класс модельных функций роста, тесно связанных с важнейшими характеристиками роста субгармонических функций. Пусть u – произвольная субгармоническая функция на \mathbb{C} , отличная от тождественной постоянной; $r \in \mathbb{R}_*^+$,

$$\pmb{\mathcal{C}}_u(r) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u \big(r e^{it} \big) \, dt, \qquad \pmb{\mathcal{B}}_u(r) := \frac{2}{\pi r^2} \int_0^r \pmb{\mathcal{C}}_u(s) s ds \; , \quad \pmb{\mathcal{M}}_u(r) := \sup\{u(z) : |z| = r\}$$

– соответственно интегральное среднее по окружности и по кругу с центром в нуле радиуса r, а также точная верхняя грань на этой окружности функции u [9; определение 2.6.7]. Тогда эти средние C_u , B_u и верхняя грань M_u – модельные функции роста при условии их дифференцируемости при больших $r \in \mathbb{R}^+_*$ [9; теорема 2.6.8].

Основная теорема. Пусть M — модельная функция роста, а возрастающая строго положительная функция A конечного порядка относительно M в том смысле, что

$$\limsup_{r \to +\infty} \frac{\ln(1+A(r))}{\ln M(r)} < +\infty.$$

Тогда существует уточнённая функция роста V относительно модельной функции роста M, с которой выполнено предельное соотношение

$$\limsup_{r \to +\infty} \frac{A(r)}{V(r)} = 1.$$

В случае классического уточнённого порядка этот результат давно известен [1], [2; гл. I, § 12, теорема 16], [3; гл. II, § 2, теорема 2.1], [10; § 2, теорема 6] как основной и мотивировавший введение и использование понятия уточнённого порядка в теории роста классов функций. Уже в этом классическом случае доказательство технически довольно трудоёмко. Мы предполагаем привести полное доказательство Основной теоремы позже в ином месте.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 18-11-00002).

Литература

- 1. Valiron G. Lecture on the General Theory of Integral Functions. Toulouse, 1923. 234 p.
- 2. Левин Б. Я. Распределение корней целых функций. М.: ГИТТЛ, 1956. С. 632.
- 3. Гольдберг А. А., Островский И.В. Распределение значений мероморфных функций. М.: Наука, 1970. С. 591.
- 4. Bingham N. H., Goldie C. M., Teugels J. L. Regular variation. Encyclopedia Math. Appl., 27. Cambrige: Cambrige University Press, 1987. 494 p.
- 5. Гришин А. Ф., Малютина Т. И. Об уточнённом порядке // Комплексный анализ и математическая физика. Красноярск: Красноярский госуниверситет. 1998. С. 10–24.
- 6. Hörmander L. Notions of Convexity. Progress in Mathematics. Boston: Birkhäuser, 1994. 416 p.

- 7. Kiselman Ch. O. Order and type as measures of growth for convex or entire functions // Proceedings of the London Mathematical Society (3). 1993. Vol. 66. Pp. 152–186.
- 8. Taylor A. E. L'Hospital's Rule // American Mathematical Monthly. 1952. Vol. 59, No. 1. Pp. 20–24.
- 9. Ransford Th. Potential Theory in the Complex Plane. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 232 p.
- 10. Гришин А. Ф., Поединцева И. В. Абелевы и тауберовы теоремы для интегралов // Алгебра и анализ. 2014. Т. 26. № 3. С. 1–88; English Transl.: *St. Petersburg Math. J.*, **26**:3 (2015), 357–409.

Variations on the proximate order

B. N. Khabibullin

Bashkir State University 32 Zaki Validi Street, 450076 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.

Email: khabib-bulat@mail.ru

The concept of proximate order is widely used in the theories of entire, meromorphic, subharmonic and plurisubharmonic functions. We give a general interpretation of this concept as a proximate growth function relative to a model growth function. If a function V is the proximate growth function with respect to the identity function on the positive semi-axis, then the function $\ln V$ is the classical proximate order. Our definition uses only one condition. This form of definition is also new for the classical proximate order.

Keywords: growth function, proximate order, convex function, entire function, sub-harmonic function.