

Maximal Lie subalgebras of locally nilpotent derivations

A. Skutin

§ 1. Introduction

Let B denote a commutative $\mathbb{K}$ -domain, where $\mathbb{K}$ is any field of characteristic zero. In the present article we will be interested in the Lie subalgebras $\mathfrak{g}$ of $\text{LND}(B)$, by which we mean subsets $\mathfrak{g}$ of locally nilpotent derivations of algebra B which are Lie subalgebras of the set of all derivations of B . G. Freudenburg [1, 11.7, p. 238] posed the next conjectures about the structure of maximal Lie subalgebras of $\text{LND}(B)$.

Conjecture 1. *The triangular subalgebra $\mathfrak{T} = \mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$ is the maximal Lie algebra of $\text{LND}(\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n])$.*

Conjecture 2. *$\mathfrak{T}$ is the unique maximal subalgebra of $\text{LND}(\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n])$ up to conjugation.*

In this article, we prove that conjecture 1 is true, and conjecture 2 is false for $n > 2$. However, under some natural assumptions about the Lie subalgebra $\mathcal{A}$ of $\text{LND}(\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n])$, conjecture 2 can be proved. In fact, we prove the following theorem:

Theorem 1. *A maximal Lie subalgebra $\mathcal{A}$ of $\text{LND}(\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n])$ is conjugated to $\mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$ if and only if $\ker \mathcal{A} := \cap_{D \in \mathcal{A}} \ker D = \mathbb{K}$.*

Author is grateful to I.V. Arzhantsev for stating the problem and attention to work.

Максимальные подалгебры Ли среди локально нильпотентных дифференцирований

А. Скутин

§ 1. Введение

Рассмотрим произвольную коммутативную алгебру B без делителей нуля, имеющую конечную степень трансцендентности над полем нулевой характеристики $\mathbb{K}$. Далее в работе всегда будем рассматривать только такие алгебры. Нас будут интересовать алгебры Ли содержащиеся среди локально нильпотентных дифференцирований алгебры B .

В своей монографии [1] Джином Фройденбургом были высказаны следующие гипотезы о строении максимальных по вложению подалгебр Ли среди локально нильпотентных дифференцирований алгебры B в случае, когда B – алгебра многочленов от n переменных [1, 11.7; стр. 238].

Гипотеза 1. Алгебра Ли $\mathfrak{T} = \mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$ является максимальной по вложению алгеброй Ли, лежащей в $LND(\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n])$.

Гипотеза 2. Все максимальные алгебры Ли $\mathcal{A} \subset LND(\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n])$ сопряжены алгебре Ли $\mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$.

Как мы покажем дальше, гипотеза 1 верна, а гипотеза 2 не верна в общем случае. Однако, на алгебру Ли $\mathcal{A}$ можно наложить некоторые естественные дополнительные условия, при которых гипотеза 2 всё же имеет место. В этой работе мы докажем, что гипотеза 2 верна в следующей более слабой форме:

Теорема 1. Пусть дана максимальная алгебра Ли $\mathcal{A} \subset LND(\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n])$ и известно, что $\ker \mathcal{A} := \bigcap_{D \in \mathcal{A}} \ker D = \mathbb{K}$. Тогда $\mathcal{A}$ сопряжена алгебре Ли $\mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$.

Автор выражает благодарность И.В. Аржанцеву за постановку задачи и внимание к работе.

§ 2. Используемые утверждения

Будем использовать следующие обозначения:

— Для каждой алгебры Ли $\mathcal{A}$ определим $d(\mathcal{A})$ как её ступень разрешимости. Также, обозначим за $\mathcal{A}^{(i)}$ – i -ый коммутант алгебры Ли $\mathcal{A}$;

— Для произвольного семейства линейных операторов S векторного пространства V , ядром $\ker S$ этого семейства будем называть пересечения ядер всех операторов, лежащих в множестве S ;

— Для произвольных двух семейств линейных операторов S_1, S_2 векторного пространства V обозначим за $[S_1, S_2]$ – множество всевозможных коммутаторов вида $[A, B] = AB - BA$, где $A \in S_1, B \in S_2$;

— Для произвольного семейства линейных операторов S векторного пространства V и произвольного элемента $v \in V$ обозначим за $S(v)$ множество элементов вида $A(v)$, где A – всевозможные операторы из S ;

— Для произвольного семейства линейных операторов S векторного пространства V обозначим за $\text{ad}S$ множество присоединённых эндоморфизмов $\{\text{ad}A : X \rightarrow [A, X] | A \in S, X \in \text{End}(V)\}$ векторного пространства $\text{End}(V)$.

Определение 1. Линейный оператор A на векторном пространстве V называется *локально нильпотентным*, если для каждого вектора v из V найдётся натуральное число $k = k(v) > 0$ такое, что $A^k(v) = 0$.

Определение 2. Множество линейных операторов T на векторном пространстве V будем называть *локально нильпотентным*, если для любой бесконечной последовательности операторов $A_1, A_2, \dots$, лежащих в T , и любого вектора $v \in V$, существует такое $k = k(v, \{A_i\}) > 0$, что выполнено равенство $A_k \dots A_1(v) = 0$.

Лемма 1. Пусть T – локально нильпотентное множество линейных операторов на векторном пространстве V . Тогда для произвольного собственного векторного подпространства $U \subset V$ найдётся элемент $v \in V \setminus U$, для которого $T(v) \subseteq U$.

Доказательство. Рассмотрим произвольный вектор v лежащий в множестве $V \setminus U$. Из того, что множество T является локально нильпотентным имеем, что для некоторого конечного числа элементов $A_1, A_2, \dots, A_k$, лежащих в множестве T , элемент $A_k \dots A_1(v)$ не принадлежит множеству U , однако, элементы $TA_k \dots A_1(x)$ лежат в множестве U . Теперь, в качестве искомого элемента достаточно рассмотреть элемент $v' = A_k \dots A_1(v)$. $\square$

Лемма 2. Рассмотрим произвольное локально нильпотентное множество линейных операторов T на векторном пространстве V . Тогда для любого локально нильпотентного оператора A на векторном пространстве V такого, что $[A, T] \subseteq T$, имеем $T \cup \{A\}$ – локально нильпотентное множество линейных операторов на V .

Доказательство. Пусть U – максимальное по вложению линейное подпространство V инвариантное для каждого линейного оператора из множества $T \cup \{A\}$ такое, что ограничение $T \cup \{A\}$ на U является локально нильпотентным множеством линейных операторов. Предположим, что $U \neq V$. По лемме 1 существует элемент $v \in V \setminus U$ такой, что $Tv \subseteq U$. Несложно проверить, что линейное пространство $U' = \langle T, v, Av, A^2v, \dots \rangle$ является инвариантным для каждого линейного оператора из $T \cup \{A\}$ и ограничение $T \cup \{A\}$ на U' является локально нильпотентным множеством линейных операторов. Противоречие к максимальнойности U . $\square$

Каждое локально нильпотентное дифференцирование алгебры B является также локально нильпотентным линейным оператором на векторном пространстве $B_{\mathbb{K}}$. Поэтому, все предыдущие леммы о локально нильпотентных операторах переносятся на локально нильпотентные дифференцирования, причем, в случае с дифференцированиями алгебры B , локально нильпотентным множеством дифференцирований алгебры B называется произвольное множество дифференцирований алгебры B являющееся локально нильпотентным множеством линейных операторов на векторном пространстве $B_{\mathbb{K}}$.

Лемма 3. Множество $\mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$ является локально нильпотентным множеством дифференцирований алгебры $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$.

Доказательство. Упорядочим переменные $x_1 \prec \dots \prec x_n$ и введём лексикографический порядок на мономах. При действии дифференцирований из $\mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$ на произвольный многочлен, порядок старшего монома этого многочлена уменьшается, откуда получаем доказательство леммы. $\square$

Лемма 4. Рассмотрим произвольное локально нильпотентное множество дифференцирований S алгебры B . Тогда для любого конечного множества локально нильпотентных дифференцирований $D_1, D_2, \dots, D_k$ такого, что $[S \cup \{D_1, D_2, \dots, D_k\}, S \cup \{D_1, D_2, \dots, D_k\}] \subseteq S$, имеем $S \cup \{D_1, D_2, \dots, D_k\}$ – локально нильпотентное подмножество дифференцирований алгебры B .

Доказательство. Для доказательства леммы 4 достаточно воспользоваться индукцией по k и леммой 2. $\square$

Лемма 5. Рассмотрим произвольное подмножество S , лежащее в $\text{Der}(B)$. Тогда для некоторого конечного числа элементов $D_1, \dots, D_k \in S$, $\ker S = \bigcap_{i=1}^k \ker D_i$. Более того, k можно выбрать равным $\text{tr.deg.}(B) - \text{tr.deg.}(\ker S)$.

Доказательство. Предположим противное. Тогда найдётся счётное семейство элементов $\{D_i \in S\}_{i=1}^\infty$ такое, что $\bigcap_{i=1}^{l+1} \ker D_i \subsetneq \bigcap_{j=1}^l \ker D_j$, для всех l . Построим бесконечную цепочку элементов $\{x_l \in (\bigcap_{i=1}^l \ker D_i) \setminus (\bigcap_{j=1}^{l+1} \ker D_j)\}_{l=1}^\infty$. Применяя [1, Prop. 1.8(d); стр. 17], получаем, что $x_1, x_2, \dots$ образует бесконечное алгебраически независимое семейство элементов, что противоречит условию того, что $\text{tr.deg.}(B) < \infty$. $\square$

Лемма 6. *Любая коммутативная алгебра Ли A , лежащая в $LND(B)$, является конечномерной алгеброй Ли размерности не более чем $\text{tr.deg.}_{\mathbb{K}}(B)$.*

Доказательство. Это утверждение является следствием известного факта о том, что не существует более чем $\text{tr.deg.} B$ линейно независимых локально нильпотентных дифференцирований алгебры B . $\square$

§ 3. Опровержение гипотезы 2 в общем случае

Теорема 2. *Пусть D – локально нильпотентное дифференцирование алгебры многочленов $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ такое, что абелева алгебра Ли $(\ker D)D$ является подалгеброй алгебры Ли $\mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$. Тогда $\ker D = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]$ и для некоторого многочлена f , лежащего в алгебре $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]$, выполнено $D = f\partial x_n$.*

Доказательство. По условию теоремы можем считать, что D имеет вид $f_i\partial x_{i+1} + \dots + f_{n-1}\partial x_n$, для некоторых $f_j \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_j]$, причем $f_i \neq 0$. Также, по условию для каждого a из $\ker D$, $aD = af_i\partial x_{i+1} + \dots + af_{n-1}\partial x_n \in \mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$, поэтому $(\ker D)f_i \subseteq \mathbb{K}[x_1, \dots, x_i]$ и $\ker D \subseteq \mathbb{K}[x_1, \dots, x_i]$. С другой стороны $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_i] \subseteq \ker D$, а значит $\ker D = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_i]$ и $i = n - 1$. Откуда $D = f_{n-1}\partial x_n$. $\square$

Следствие 1. *Гипотеза 2 не верна в случае $n = 3$.*

Доказательство. Рассмотрим локально нильпотентное дифференцирование $D = x\partial y + y\partial z$ алгебры многочленов $\mathbb{K}[x, y, z]$. В случае справедливости гипотезы 2 получаем, что для некоторых алгебраически независимых многочленов x', y', z' выполнено $\mathbb{K}[x, y, z] = \mathbb{K}[x', y', z']$ и $(\ker D)D \subseteq \mathbb{K}\partial x' \oplus \mathbb{K}[x']\partial y \oplus \mathbb{K}[x', y']\partial z'$. Применяя теорему 2 к дифференцированию D получаем, что $\ker D = \mathbb{K}[x', y']$ и $\mathbb{K}[x, y, z] = \mathbb{K}[x', y', z'] = (\ker D)[z'] = \mathbb{K}[x, 2xz - y^2, z']$. Что противоречит тому, что $\mathbb{K}[x, 2xz - y^2]$ является подалгеброй многочленов от двух переменных которую нельзя дополнить до алгебры $\mathbb{K}[x, y, z]$ присоединив ровно один многочлен. $\square$

§ 4. Основные свойства локально нильпотентных множеств дифференцирований

Теорема 3. *Пусть S – произвольное локально нильпотентное множество дифференцирований алгебры B , для которого известно, что $\ker S = \mathbb{K}$. Тогда найдутся x_i такие, что $B = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ и $S \subseteq \mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$.*

Доказательство. Рассмотрим семейство $\mathcal{P}$ подалгебр A алгебры B обладающих следующими свойствами:

- 1) A инвариантна для каждого дифференцирования из S ;
- 2) Существуют алгебраически независимые элементы $a_1, a_2, \dots, a_k$ такие, что $A = \mathbb{K}[a_1, \dots, a_k]$ и $S|_A \subseteq \mathbb{K}\partial a_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[a_1, \dots, a_{k-1}]\partial a_k$.

Введём частичный порядок на $\mathcal{P}$. Будем говорить, что для двух подалгебр $A_1, A_2 \in \mathcal{P}$ выполнено $A_1 \prec A_2$ тогда и только тогда, когда существуют элементы $a_1, a_2, \dots, a_{k_1}$ и $a_{k_1+1}, a_{k_1+2}, \dots, a_{k_2}$ такие, что $A_1 = \mathbb{K}[a_1, a_2, \dots, a_{k_1}]$, $A_2 = A_1[a_{k_1+1}, a_{k_1+2}, \dots, a_{k_2}] = \mathbb{K}[a_1, \dots, a_{k_2}]$ и $S|_{A_2} \subseteq \mathbb{K}\partial a_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[a_1, \dots, a_{k_2-1}]\partial a_{k_2}$. Ясно, что не существует бесконечно возрастающей цепочки подалгебр лежащих в $\mathcal{P}$, поэтому можно выбрать максимальную подалгебру A из $\mathcal{P}$. Предположим, что $A \neq B$ и выберем произвольный элемент $b \in B \setminus A$ такой, что $Sb \subseteq A$ (такой элемент существует по лемме 1). Проверим, что b алгебраически независим над A . Предположим противное: пусть для некоторых элементов $a_0, a_1, \dots, a_d \in A$ выполнено $a_0 + a_1b + \dots + a_db^d = 0$, причем $a_d \neq 0$. Можем считать, что $d > 0$ – минимально возможная степень аннулирующего многочлена. Заметим, что по построению алгебры A и элемента b , элементы $D(a_j), D(b)$ лежат в A для всех a_j и всех дифференцирований D лежащих в S . Имеем $0 = D(a_0 + a_1b + \dots + a_db^d) = (D(a_0) + a_1D(b)) + \dots + (D(a_{d-1}) + da_dD(b))b^{d-1} + D(a_d)b^d$ для всех $D \in S$. Поэтому, в случае $a_d \notin \mathbb{K}$, подставляя в последнее равенство вместо элемента $D \in S$ такой элемент $D' \in S$, что $a_d \notin \ker D'$, получим аннулирующий многочлен элемента b степени d со старшим коэффициентом равным $D'(a_d) \neq 0$. Таким образом, из локальной нильпотентности множества дифференцирований S , после выполнения некоторого конечного числа таких операций получаем, что b имеет аннулирующий многочлен степени d со старшим коэффициентом лежащим в поле $\mathbb{K}$. Можем считать, что $a_0 + a_1b + \dots + a_db^d$ – искомый многочлен с $a_d \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$. Заметим тогда, что для каждого дифференцирования D из S выполнено $0 = D(a_0 + a_1b + \dots + a_db^d) = (D(a_0) + a_1D(b)) + \dots + (D(a_{d-1}) + da_dD(b))b^{d-1}$, а значит, из минимальности d , $D(a_{d-1}) + da_dD(b) = D(a_{d-1} + da_db) = 0$ для всех $D \in S$. Откуда $a_{d-1} + da_db \in \mathbb{K}$ и $b \in A$, что противоречит определению элемента b .

В итоге получаем, что $A[b]$ является большей алгеброй чем A , лежащей в $\mathcal{P}$. Противоречие. Значит алгебра A совпадает с B и для некоторых элементов $x_1, x_2, \dots, x_n$, $B = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ и $S \subseteq \mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$. $\square$

Следствие 2. Пусть S – произвольное локально нильпотентное множество дифференцирований алгебры B . Тогда алгебра Ли $\mathcal{A}$ порожденная множеством $(\ker S)S$ является разрешимой алгеброй Ли, которая также является локально нильпотентным подмножеством дифференцирований алгебры B .

Доказательство. Переходя к алгебре $B' = (\ker S \setminus \{0\})^{-1}B$ над полем $(\ker S \setminus \{0\})^{-1}\mathbb{K}$ и локально нильпотентному подмножеству дифференцирований $S' = (\ker S \setminus \{0\})^{-1}S$, можем считать, что $\ker S = \mathbb{K}$. По теореме 3 найдутся x_i такие, что $B = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ и $S \subseteq \mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$. Утверждение следствия теперь следует из того, что $d(\mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n) = n$ и леммы 3. $\square$

Теорема 4. Множество дифференцирований S алгебры B является локально нильпотентным тогда и только тогда, когда каждое его конечное подмножество $S' \subseteq S$ является локально нильпотентным множеством дифференцирований алгебры B .

Доказательство. Докажем, что если каждое конечное подмножество некоторого множества дифференцирований S является локально нильпотентным, то и само S является локально нильпотентным множеством дифференцирований.

Ведём индукцию по степени трансцендентности алгебры B . В случае $\text{tr.deg.}_{\mathbb{K}}(B) = 0$, имеем $\text{LND}(B) = \{0\}, S = \{0\}$ и утверждение леммы очевидно. Из следствия 2 получаем, что алгебра Ли $\mathcal{A}$ порожденная множеством S также обладает тем свойством, что каждое её конечное подмножество образует локально нильпотентное множество дифференцирований алгебры B . Поэтому можем считать, что $S = \mathcal{A}$ – алгебра Ли. Рассматривая алгебру Ли $\mathcal{A}' = (\ker \mathcal{A} \setminus \{0\})^{-1}\mathcal{A}$ над полем $\mathbb{K}' = (\ker \mathcal{A} \setminus \{0\})^{-1}\mathbb{K}$ и алгебру $B' = (\ker \mathcal{A} \setminus \{0\})^{-1}B$ можем считать, что $\ker \mathcal{A} = \mathbb{K}$. Применяя следствие 2, а также лемму 5 к множествам дифференцирований $\mathcal{A}, \mathcal{A}^{(1)}$ получаем, что существует достаточно большая конечномерная разрешимая подалгебра Ли $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ являющаяся локально нильпотентным множеством дифференцирований алгебры B такая, что

$\ker \mathcal{B} = \ker \mathcal{A} = \mathbb{K}$ и $\ker \mathcal{B}^{(1)} = \ker \mathcal{A}^{(1)}$. Поэтому из теоремы 3 получаем, что для некоторых элементов x_i , $B = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ и $\mathcal{B} \subseteq \mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$. Таким образом, $\mathbb{K}[x_1] \subseteq \ker(\mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n)^{(1)} \subseteq \ker \mathcal{B}^{(1)} = \ker \mathcal{A}^{(1)}$. Пусть $\pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}|_{\ker \mathcal{A}^{(1)}}$ – гомоморфизм ограничения алгебры Ли $\mathcal{A}$ на инвариантную подалгебру $\ker \mathcal{A}^{(1)}$. Понятно, что каждое дифференцирование, лежащее в $\ker \pi$, содержит $\ker \mathcal{A}^{(1)}$, а следовательно и $\mathbb{K}[x_1]$, в своём ядре. Рассмотрим алгебру $B' = (\mathbb{K}[x_1] \setminus \{0\})^{-1}B$ степени трансцендентности не более чем $\text{tr.deg}_{\mathbb{K}}(B) - 1$, и алгебру Ли $\mathcal{P} = (\mathbb{K}[x_1] \setminus \{0\})^{-1}\ker \pi$. Алгебра Ли $\mathcal{P}$ является множеством дифференцирований алгебры B' меньшей степени трансцендентности чем B , откуда по предположению индукции $\mathcal{P}$ – локально нильпотентное множество дифференцирований алгебры B' , а значит, $\ker \pi$ – локально нильпотентное множество дифференцирований алгебры B . Заметим, что $\mathcal{A}^{(1)} \subseteq \ker \pi$, поэтому $\mathcal{A}|_{\ker \mathcal{A}^{(1)}} \cong \mathcal{A}/\ker \pi$ является коммутативной алгеброй Ли лежащей в $\text{LND}(\ker \mathcal{A}^{(1)})$ (мы воспользовались условием теоремы для одноэлементных подмножеств). По лемме 6 получаем, что $\mathcal{A}/\ker \pi$ – конечномерная алгебра Ли, откуда $\ker \pi$ – локально нильпотентное множество дифференцирований алгебры B имеющее конечную коразмерность в $\mathcal{A}$. Применяя лемму 4 к множеству $\ker \pi$ и произвольному конечному базису факторпространства $\mathcal{A}/\ker \pi$ получаем, что $\mathcal{A}$ – локально нильпотентное множество дифференцирований алгебры B . $\square$

Следствие 3. Пусть $S_1 \subset S_2 \subset \dots$ – возрастающая цепочка вложенных друг в друга локально нильпотентных множеств дифференцирований алгебры B . Тогда $\cup_{i \geq 1} S_i$ также является локально нильпотентным множеством дифференцирований алгебры B .

Теорема 5. Пусть S – произвольное локально нильпотентное множество дифференцирований алгебры B . Тогда множество $\text{ad}(S)$ является локально нильпотентным множеством линейных операторов на векторном пространстве $\text{Der}(B)$.

Доказательство. Рассмотрим алгебру $B' = (\ker S \setminus \{0\})^{-1}B$ над полем $\mathbb{K}' = (\ker S \setminus \{0\})^{-1}\mathbb{K}$ и локально нильпотентное множество дифференцирований $S' = (\ker S \setminus \{0\})^{-1}S$ алгебры B' . Из теоремы 3 следует, что существуют x_i такие, что $B' = \mathbb{K}'[x_1, \dots, x_n]$, $S \subseteq \mathbb{K}'\partial x_1 \oplus \mathbb{K}'[x_1]\partial x_2 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}'[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$. Умножая элементы $x_i \in B'$ на подходящие элементы из $\ker S \subseteq \mathbb{K}'$, можем считать, что $x_i \in B$. Пусть $\{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ – базис трансцендентности алгебры $\ker S$. Для каждого дифференцирования $D \in \text{Der}(B)$ рассмотрим его "координаты" $D_1 = D(b_1), D_2 = D(b_2), \dots, D_k = D(b_k), D_{k+1} = D(x_1), D_{k+2} = D(x_2), \dots, D_{k+n} = D(x_n)$. Высотой дифференцирования D будем называть максимальное число $t > 0$ такое, что $D_1 = D_2 = \dots = D_{t-1} = 0$. В случае если дифференцирование D имеет высоту равную $n + k + 1$, имеем $\ker D \supseteq \mathbb{K}[b_1, \dots, b_k, x_1, \dots, x_n]$ – алгебра степени трансцендентности равной $\text{tr.deg}_{\mathbb{K}}(B)$ являющаяся алгебраически замкнутой в B (мы воспользовались [1, Prop. 1.8(d); стр. 17]), а следовательно, $\ker D = B$, $D = 0$. Введём частичный порядок на множестве $\text{Der}(B)$. Для произвольных дифференцирований $D, E \in \text{Der}(B)$ будем говорить, что $D \prec E$ если высота h дифференцирования D не меньше высоты дифференцирования E и порядок h -ой координаты дифференцирования D как многочлена в $\mathbb{K}'[x_1, \dots, x_n]$ (считаем, что на многочленах уже введён лексикографический порядок с $x_1 \prec x_2 \prec \dots \prec x_n$) строго меньше порядка соответствующей координаты дифференцирования E . Несложно проверяется, что не существует бесконечной строго убывающей последовательности дифференцирований относительно введённого нами порядка, а также, что для произвольных двух дифференцирований $0 \neq D \in \text{Der}(B)$, $\partial \in S$, $(\text{ad} \partial)(D) \prec D$. Откуда следует, что $\text{ad} S$ – локально нильпотентное множество линейных операторов на векторном пространстве $\text{Der}(B)$. $\square$

§ 5. Доказательство теоремы 1

Мы докажем несколько более сильное утверждение, имеющее место для всех коммутативных алгебр B без делителей нуля, конечной степени трансцендентности.

Теорема 6. Пусть дана алгебра Ли $\mathcal{A}$, лежащая в $LND(B)$ и известно, что $\ker \mathcal{A} = \mathbb{K}$. Тогда найдутся x_i такие, что $B = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ и $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$.

Для доказательства теоремы 6 остаётся показать, что всякая алгебра Ли, лежащая в $LND(B)$, образует локально нильпотентное множество дифференцирований алгебры B , после чего применить теорему 3.

Утверждение 1. Всякая алгебра Ли $\mathcal{A}$, лежащая в $LND(B)$, образует локально нильпотентное множество дифференцирований алгебры B .

Доказательство. По следствию 3 каждая возрастающая цепочка вложенных локально нильпотентных множеств дифференцирований алгебры B лежащих в $\mathcal{A}$ имеет верхнюю грань, поэтому по лемме Цорна существует максимальное по вложению локально нильпотентное множество дифференцирований $S \subseteq \mathcal{A}$. Предположим, что $S \neq \mathcal{A}$. По теореме 5, $\text{ad}S$ – локально нильпотентное множество линейных операторов на $\text{Der}(B)$. Применим лемму 1 к локально нильпотентному множеству линейных операторов $(\text{ad}S)|_{\mathcal{A}}$ на векторном пространстве $\mathcal{A}$ и собственному подпространству $S \subsetneq \mathcal{A}$. Получим, что для некоторого элемента $D \in \mathcal{A} \setminus S$, $(\text{ad}S)(D) = [S, D] \subseteq S$, откуда по лемме 4, $S \cup \{D\}$ – локально нильпотентное множество дифференцирований большее чем S . Противоречие. $\square$

§ 6. Доказательство гипотезы 1

Теорема 7. Алгебра Ли $\mathfrak{T} = \mathbb{K}\partial x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}[x_1, \dots, x_{n-1}]\partial x_n$ является максимальной по вложению алгеброй Ли, лежащей в $LND(\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n])$.

Доказательство. Рассмотрим максимальную по вложению алгебру Ли $\mathcal{A}$, вложенную в $LND(\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n])$ такую, что $\ker \mathcal{A} = \mathbb{K}$ (в качестве примера такой алгебры Ли можно рассмотреть произвольную максимальную по вложению алгебру Ли содержащую $\mathfrak{T}$ и лежащую в $LND(\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n])$). По теореме 1 получаем, что алгебра Ли $\mathcal{A}$ сопряжена некоторой подалгебре $\mathcal{A}'$ алгебры Ли $\mathfrak{T}$. Из максимальной $\mathcal{A}$ имеем $\mathfrak{T} = \mathcal{A}'$ – максимальная по вложению алгебра Ли, лежащая в $LND(\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n])$. $\square$

§ Литература

- [1] Freudenburger, G. *Algebraic Theory of Locally Nilpotent Derivations* (2006).
- [2] Daigle, Daniel, and Gene Freudenburger. *Locally Nilpotent Derivations over a UFD and an Application to Rank Two Locally Nilpotent Derivations of $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$* . Journal of Algebra 204.2 (1998): 353-371.
- [3] Daigle, Daniel, and Shulim Kaliman. *A Note on Locally Nilpotent Derivations and Variables of $k(X, Y, Z)$* . Canadian Mathematical Bulletin 52.4 (2009): 535.
- [4] Rentschler, Rudolf. *Opérations du groupe additif sur le plan affine*. CR Acad. Sci. Paris Sér. AB 267 (1968): 384-387.