

On Symmetrized Pearson's Type Test for Normality of Autoregression: Power under Local Alternatives

M. V. Boldin *

Abstract

We consider a stationary linear $AR(p)$ model with observations subject to gross errors (outliers). The autoregression parameters as well as the distribution function (d.f.) G of innovations are unknown. The distribution of outliers Π is unknown and arbitrary, their intensity is $\gamma n^{-1/2}$ with an unknown γ , n is the sample size. We test the hypothesis for normality of innovations

$$\mathbf{H}_\Phi: G \in \{\Phi(x/\theta), \theta > 0\},$$

$\Phi(x)$ is the d.f. $N(0, 1)$. Our test is the special symmetrized Pearson's type test. We find the power of this test under local alternatives

$$\mathbf{H}_{1n}(\rho): G(x) = A_n(x) := (1 - \rho n^{-1/2})\Phi(x/\theta_0) + \rho n^{-1/2}H(x),$$

$\rho \geq 0$, θ_0 is the unknown (under $\mathbf{H}_\Phi$) variance of innovations. First of all we estimate the autoregression parameters and then using the residuals from the estimated autoregression we construct a kind of empirical distribution function (r.e.d.f.), which is a counterpart of the (inaccessible) e.d.f. of the autoregression innovations. After this we construct the symmetrized variant r.e.d.f. Our test statistic is the functional from symmetrized r.e.d.f. We obtain a stochastic expansion of this symmetrized r.e.d.f. under $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$, which enables us to investigate our test. We establish qualitative robustness of this test in terms of uniform equicontinuity of the limiting power (as functions of γ, ρ and Π) with respect to γ in a neighborhood of $\gamma = 0$.

Key words: autoregression, outliers, residuals, empirical distribution function, Pearson's chi-square test, robustness, estimators, normality, local alternatives.

*Moscow State Lomonosov Univ., Dept. of Mech. and Math., Moscow, Russia
e-mail: boldin_m@hotmail.com

2010 Mathematics Subject Classification: Primary 62G10; secondary 62M10, 62G30, 62G35.

1 Введение

В этой работе мы рассматриваем стационарную $AR(p)$ модель с ненулевым средним

$$v_t = \beta_1 v_{t-1} + \dots + \beta_p v_{t-p} + \nu + \varepsilon_t, \quad t \in \mathbb{Z}. \quad (1.1)$$

В (1.1) $\{\varepsilon_t\}$ – независимые одинаково распределенные случайные величины (н.о.р.сл.в.) с неизвестной функцией распределения (ф.р.) $G(x)$; $E\varepsilon_1 = 0$, $0 < E\varepsilon_1^2 < \infty$; $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_p)^T \in \mathbb{R}^p$ – вектор неизвестных параметров, таких что корни соответствующего (1.1) характеристического уравнения по модулю меньше единицы; ν – неизвестное среднее, $\nu \in \mathbb{R}^1$.

Эти условия дальше всегда предполагаются выполненными и особо не оговариваются.

Мы рассматриваем модель (1.1) с выбросами в наблюдениях. А именно, предполагается, что наблюдаются величины

$$y_t = v_t + z_t^{\gamma_n} \xi_t, \quad t = 1 - p, \dots, n, \quad (1.2)$$

где $v_{1-p}, \dots, v_n$ – выборка из стационарного решения $\{v_t\}$ уравнения (1.1); $\{z_t^{\gamma_n}\}$ н.о.р.сл.в., имеющие распределение Бернулли, т.е. принимающие значения 1 и 0, причем вероятность единицы γ_n ,

$$\gamma_n = \min(1, \frac{\gamma}{\sqrt{n}}), \quad \gamma \geq 0 \text{ неизвестно.}$$

Кроме того, $\{\xi_t\}$ – н.о.р.сл.в. с произвольным и неизвестным распределением. П. Переменные $\{\xi_t\}$ интерпретируются как выбросы (засорения), γ_n уровень засорения. Для $\gamma = 0$ мы получаем модель (1.1) без засорений.

Модель (1.2) – локальный вариант хорошо известной модели засорения данных во временных рядах, см. [8].

В этой работе мы рассматриваем гипотезу о нормальности инноваций

$$H_\Phi: G(x) \in \{\Phi(x/\theta), \theta > 0\},$$

где $\Phi(x)$ – стандартная нормальная ф.р. Напомним, что гипотеза H_Φ эквивалентна нормальности самой стационарной последовательности $\{v_t\}$.

Нормальность инноваций обеспечивает оптимальность процедур наименьших квадратов оценивания и проверки гипотез в авторегрессии, см., например, [1],[6]. Поэтому проверка $\mathbf{H}_\Phi$ – содержательная задача. В [3] была построена специальная симметризованная статистика типа хи-квадрат Пирсона для $\mathbf{H}_\Phi$ в схеме (1.1)–(1.2) с неизвестным средним и найдено ее распределение при гипотезе. Необходимый следующий шаг – найти мощность построенного теста при локальных альтернативах и исследовать устойчивость мощности к выбросам. Этот шаг мы и делаем в настоящей работе. Обозначим неизвестную дисперсию инноваций при $\mathbf{H}_\Phi$ через θ_0 . В качестве альтернативы к $\mathbf{H}_\Phi$ берется предположение о том, что $\{\varepsilon_t\}$ в (1.1) – н.о.р.сл.в. с ф.р. в виде смеси

$$G(x) = A_n(x) := (1 - \rho_n)\Phi(x/\theta_0) + \rho_n H(x), \quad (1.3)$$

где

$$H(x) - \text{ф.р.}, \rho_n = \min(1, \frac{\rho}{\sqrt{n}}), \rho \geq 0.$$

Предположение (1.3) будем понимать как локальную альтернативу к $\mathbf{H}_\Phi$ и обозначать $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$. Разумеется, $\mathbf{H}_\Phi$ и $\mathbf{H}_{1n}(0)$ совпадают.

Наша цель – найти предельное распределение симметризованной статистики из [3] при $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$, найти мощность теста и исследовать ее устойчивость к выбросам.

Отметим, что недавно в [2],[5] были получены результаты о проверке $\mathbf{H}_\Phi$ в схеме (1.1)–(1.2) при $\nu = 0$. Результаты получены и при гипотезе и при локальных альтернативах. Но нулевое среднее – существенное ограничение. В нашей ситуации при неизвестном и, быть может, ненулевом ν , использовать статистики типа хи квадрат из [2], [5] не удастся, т.к. их предельное распределение зависит от оценок β и ν даже при $\gamma = 0$.

Мы преодолеваем эту трудность, строя симметризованную статистику Пирсон. Разбиение, которым она определяется, специально и симметрично относительно нуля. Симметризованная статистика Пирсона является функционалом от симметризованной остаточной эмпирической функции распределения (о.э.ф.р.). Мы находим асимптотические распределения симметризованной о.э.ф.р. и нашей статистики Пирсона при $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$. Асимптотические распределения симметризованных о.э.ф.р. и статистики Пирсона при $\mathbf{H}_\Phi$ и $\gamma = 0$ свободны. Кроме того, симметризованный тест Пирсона оказывается качественно робастным.

Все определения и результаты (основные, это Теоремы 2.1–2.2) представлены в Разделе 2.

2 Основные результаты

2.1 Стохастическое разложение о.э.ф. р.

Относительно альтернативы $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$ из (1.3) нам потребуется сделать некоторые предположения.

Условие (i). Случайная величина с функцией распределения $H(x)$ имеет нулевое среднее и конечную дисперсию.

Условие (ii). Функции распределения $H(x)$ дважды дифференцируема с ограниченной второй производной.

Условие (iii). Функции распределения $H(x)$ симметрична относительно нуля.

Перепишем уравнение (1.1) в удобном для дальнейшего рассмотрения виде. Для этого определим константу μ соотношением

$$\nu = (1 - \beta_1 - \dots - \beta_p)\mu,$$

тогда

$$v_t - \mu = \beta_1(v_{t-1} - \mu) + \dots + \beta_p(v_{t-p} - \mu) + \varepsilon_t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Если положить $u_t := v_t - \mu$, то

$$v_t = \mu + u_t, \quad u_t = \beta_1 u_{t-1} + \dots + \beta_p u_{t-p} + \varepsilon_t, \quad t \in \mathbb{Z}. \quad (2.1)$$

Последовательность $\{u_t\}$ в (2.1) – авторегрессионная последовательность с нулевым средним и конечной дисперсией.

Построим по наблюдениям $\{y_t\}$ из (1.2) оценки ненаблюдаемых $\{\varepsilon_t\}$.

Далее Γ , R – любые конечные неотрицательные числа. Пусть $\hat{\mu}_n$ будет любая последовательность, для которой при $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$ последовательность

$$n^{1/2}(\hat{\mu}_n - \mu) = O_P(1), \quad n \rightarrow \infty, \text{ равномерно по } \rho \leq R, \gamma \leq \Gamma. \quad (2.2)$$

Положим

$$\hat{u}_t = y_t - \hat{\mu}_n, \quad t = 1, \dots, n.$$

Пусть $\hat{\beta}_n = (\hat{\beta}_{1n}, \dots, \hat{\beta}_{pn})^T$ будет любая последовательность, для которой при $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$ последовательность

$$n^{1/2}(\hat{\beta}_n - \beta) = O_P(1), \quad n \rightarrow \infty, \text{ равномерно по } \rho \leq R, \gamma \leq \Gamma. \quad (2.3)$$

Примеров подходящих оценок $\hat{\mu}_n, \hat{\beta}_n$ много, широкий класс составляют, например, М-оценки, построенные по $\{y_t\}$ и $\{\hat{u}_t\}$ аналогично тому, как они строятся по неза-соренным данным, см., например, [7]. Результаты для М-оценок при альтернативе $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$ в схеме (1.1)–(1.2) вполне аналогичны изложенным в Разделе 2.4 [2].

Положим

$$\hat{\varepsilon}_t = \hat{u}_t - \hat{\beta}_{1n}\hat{u}_{t-1} - \dots - \hat{\beta}_{pn}\hat{u}_{t-p}, \quad t = 1, \dots, n. \quad (2.4)$$

Величины $\{\hat{\varepsilon}_t\}$ называются остатками.

Ведем остаточную эмпирическую функцию распределения (о.э.ф.р.)

$$\hat{G}_n(x) = n^{-1} \sum_{t=1}^n I(\hat{\varepsilon}_t \leq x), \quad x \in \mathbb{R}^1.$$

Здесь и в дальнейшем $I(\cdot)$ обозначает индикатор события.

Функция $\hat{G}_n(x)$ – аналог гипотетической э.ф.р.

$$G_n(x) = n^{-1} \sum_{t=1}^n I(\varepsilon_t \leq x)$$

ненаблюдаемых величин $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$.

Следствие 2.1 в [4] прямо влечет следующую Теорему 2.1.

Теорема 2.1. *Предположим, что верна альтернатива $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$. Пусть выполнены Условия (i) – (ii), и пусть $\varphi(x)$ будет стандартная гауссовская плотность. Пусть $\Gamma \geq 0, R \geq 0$ будут любые конечные числа. Тогда для любого $\delta > 0$*

$$\sup_{\rho \leq R, \gamma \leq \Gamma} \mathbf{P}(|n^{1/2}[\hat{G}_n(x) - G_n(x)] - \frac{1}{\theta_0} \varphi(\frac{x}{\theta_0}) \hat{\delta}_n n^{1/2}(\hat{\mu}_n - \mu) - \gamma \Delta_0(x, \Pi)| > \delta) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Здесь сдвиг

$$\Delta_0(x, \Pi) = \sum_{j=0}^p [\mathbf{E}G_0(x + \beta_j \xi_1) - G_0(x)], \quad \beta_0 = -1, \quad G_0(x) = \Phi(\frac{x}{\theta_0}),$$

$$a \hat{\delta}_n = 1 - \hat{\beta}_{1n} - \dots - \hat{\beta}_{pn}.$$

При гипотезе $\mathbf{H}_\Phi$ ф.р. $G(x) = \Phi(\frac{x}{\theta_0})$ и, значит, симметрична относительно нуля. Поэтому будем брать оценкой $G(x)$ симметризованную оценку

$$\hat{S}_n(x) := \frac{\hat{G}_n(x) + 1 - \hat{G}_n(-x)}{2}. \quad (2.5)$$

Положим

$$\Delta_S(x, \Pi) := \frac{\Delta_0(x, \Pi) - \Delta_0(-x, \Pi)}{2}. \quad (2.6)$$

Пусть

$$S_n(x) := \frac{G_n(x) + 1 - G_n(-x)}{2}. \quad (2.7)$$

Теорема 2.1 и четность $\varphi(x)$ прямо влекут

Следствие 2.1. *При условиях Теоремы 2.1*

$$\sup_{\rho \leq R, \gamma \leq \Gamma} \mathbb{P}(|n^{1/2}[\hat{S}_n(x) - S_n(x)] - \gamma \Delta_S(x, \Pi)| > \delta) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

2.2 Симметризованный тест типа хи-квадрат Пирсона для $\mathbf{H}_\Phi$

В этом разделе мы построим тест типа хи-квадрат Пирсона для проверки

$$\mathbf{H}_\Phi: G(x) \in \{\Phi(x/\theta), \theta > 0\},$$

где $\Phi(x)$ – стандартная нормальная ф.р. Как отмечалось во Введении, такая гипотеза эквивалентна гауссовости стационарного решения (1.1). Наша цель – найти распределение тестовой статистики при альтернативе $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$ из (1.3).

Напомним, θ_0 истинное и неизвестное значение θ при $\mathbf{H}_\Phi$, тогда при $\mathbf{H}_\Phi$ $G(x) = \Phi(x/\theta_0)$. Для полуинтервалов

$$B_j^+ = (x_{j-1}, x_j], \quad j = 1, \dots, m, \quad m > 2, \quad 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_m = \infty,$$

пусть

$$p_j^+(\theta) = \Phi(x_j/\theta) - \Phi(x_{j-1}/\theta) > 0.$$

При $\mathbf{H}_\Phi$ $\mathbb{P}(\varepsilon_1 \in B_j^+) = p_j^+(\theta_0)$. Если ввести еще симметричные полуинтервалы

$$B_j^- = (-x_j, -x_{j-1}], \quad \text{то при } \mathbf{H}_\Phi$$

$$\mathbb{P}(\varepsilon_1 \in B_j^+ \cup B_j^-) = 2p_j^+(\theta_0) := p_j(\theta_0), \quad \sum_{j=1}^m p_j(\theta_0) = 1.$$

Пусть $\hat{\nu}_j^+$ обозначает число остатков среди $\{\hat{\varepsilon}_t, t = 1, \dots, n\}$, попавших в B_j^+ , а $\hat{\nu}_j^-$ обозначает число остатков, попавших в B_j^- . Тогда

$$\hat{\nu}_j^+ = n[\hat{G}_n(x_j) - \hat{G}_n(x_{j-1})], \quad \hat{\nu}_j^- = n[\hat{G}_n(-x_{j-1}) - \hat{G}_n(-x_j)]. \quad (2.8)$$

Пусть

$$\hat{\nu}_j = \hat{\nu}_j^+ + \hat{\nu}_j^-.$$

Оценкой θ_0 мы возьмем $n^{1/2}$ -состоятельное решение уравнения

$$\sum_{j=1}^m \frac{\hat{\nu}_j}{p_j(\theta)} p_j'(\theta) = 0,$$

в котором штрих означает производную относительно θ . Такое уравнение – аналог обычного уравнения модифицированного метода хи-квадрат, в котором ненаблюдаемые частоты $\nu_1, \dots, \nu_m$ инноваций, попавших в $B_1, \dots, B_m$, $B_j := B_j^+ \cup B_j^-$, заменены их оценками $\hat{\nu}_1, \dots, \hat{\nu}_m$.

Интересующая нас тестовая статистика типа хи-квадрат для $\mathbf{H}_\Phi$ имеет вид

$$\hat{\chi}_n^2 = \sum_{j=1}^m \frac{(\hat{\nu}_j - np_j(\hat{\theta}_n))^2}{np_j(\hat{\theta}_n)}. \quad (2.9)$$

Статистика $\hat{\chi}_n^2$ является функционалом от $\hat{S}_n(x)$. Действительно, в силу (2.5) и (2.8)

$$\begin{aligned} n[\hat{S}_n(x_j) - \hat{S}_n(x_{j-1})] &= \frac{1}{2} \{n[\hat{G}_n(x_j) - \hat{G}_n(x_{j-1})] + n[\hat{G}_n(-x_{j-1}) - \hat{G}_n(-x_j)]\} = \\ &= (\hat{\nu}_j^+ + \hat{\nu}_j^-)/2 = \hat{\nu}_j/2. \end{aligned} \quad (2.10)$$

Будем называть $\hat{\chi}_n^2$ из (2.9) симметризованной статистикой Пирсона.

Чтобы описать асимптотические свойства $\hat{\chi}_n^2$ нам понадобятся некоторые обозначения. Далее $|\cdot|$ означает Евклидову норму вектора или матрицы.

Введем диагональную матрицу

$$\mathbf{P}_0 = \text{diag}\{p_1(\theta_0), \dots, p_m(\theta_0)\}$$

и векторы

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_0 &= (p_1(\theta_0), \dots, p_m(\theta_0))^T, \quad \mathbf{p}'_0 = (p'_1(\theta_0), \dots, p'_m(\theta_0))^T, \\ \mathbf{b}_0 &= \mathbf{P}_0^{-1/2} \mathbf{p}'_0, \quad \alpha_0 = \mathbf{b}_0/|\mathbf{b}_0|, \\ \mathbf{p}_A &= (p_1^A, \dots, p_m^A)^T \text{ с компонентами } p_j^A = 2(A_n(x_j) - A_n(x_{j-1})), \end{aligned}$$

$$\mathbf{p}_H = (p_1^H, \dots, p_m^H)^T, \quad p_j^H := 2(H(x_j) - H(x_{j-1})).$$

Нам понадобится еще вектор

$$\boldsymbol{\delta}(\Pi) = (\delta_1(\Pi), \dots, \delta_m(\Pi))^T \quad \text{с компонентами } \delta_j(\Pi) = 2[\Delta_S(x_j, \Pi) - \Delta_S(x_{j-1}, \Pi)],$$

сдвиг $\Delta_S(x, \Pi)$ определен в (2.6).

Из определения $S_n(x)$ и ν_j аналогично (2.10) следует:

$$n[S_n(x_j) - S_n(x_{j-1})] = \nu_j/2. \quad (2.11)$$

В силу соотношений (2.10) – (2.11), Следствия 2.1 и определения вектора $\delta(\Pi)$ имеем при $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$:

$$\begin{aligned} n^{1/2}(\frac{\hat{\nu}_j}{n} - p_j(\theta_0)) - n^{1/2}(\frac{\nu_j}{n} - p_j(\theta_0)) &= n^{1/2}(\frac{\hat{\nu}_j}{n} - \frac{\nu_j}{n}) = \\ 2n^{1/2}\{[\hat{S}_n(x_j) - \hat{S}_n(x_{j-1})] - [S_n(x_j) - S_n(x_{j-1})]\} &= \gamma\delta_j(\Pi) + o_P(1), \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned} \quad (2.12)$$

Здесь $o_P(1)$ обозначает величину, сходящуюся к нулю по вероятности равномерно по $\rho \leq R$, $\gamma \leq \Gamma$.

Введем вектора

$$\hat{\boldsymbol{\nu}} = (\hat{\nu}_1, \dots, \hat{\nu}_m)^T, \quad \boldsymbol{\nu} = (\nu_1, \dots, \nu_m)^T.$$

В силу (2.12) при $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$

$$n^{1/2}(\frac{\hat{\boldsymbol{\nu}}}{n} - \mathbf{p}_0) = n^{1/2}(\frac{\boldsymbol{\nu}}{n} - \mathbf{p}_A) + \rho(\mathbf{p}_H - \mathbf{p}_0) + \gamma\boldsymbol{\delta}(\Pi) + o_P(1), \quad n \rightarrow \infty. \quad (2.13)$$

Напомним еще известный факт относительно слабой сходимости вектора $\boldsymbol{\nu}$ (см. [5], соотношение (3.10)): при $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$ равномерно по $\rho \leq R$

$$n^{1/2}(\frac{\boldsymbol{\nu}}{n} - \mathbf{p}_A) \rightarrow \mathbf{N}(\mathbf{0}, \mathbf{P}_0 - \mathbf{p}_0\mathbf{p}_0^T), \quad n \rightarrow \infty. \quad (2.14)$$

Соотношений (2.13) – (2.14) достаточно, чтобы следуя схеме доказательства Теоремы 2.2 в [5] доказать наше основное утверждение – Теорему 2.2. В ней $F_{m-2}(x, \hat{\lambda}^2(\rho, \gamma, \Pi))$ означает ф.р. нецентрального хи-квадрата с $m - 2$ степенями свободы и параметром нецентральности $\hat{\lambda}^2(\rho, \gamma, \Pi)$, а $\mathbf{E}_m$ означает единичную матрицу порядка m .

Теорема 2.2. Пусть альтернатива $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$ верна. Пусть выполнены Условия (i)–(iii). Тогда для любых конечных неотрицательных Γ , R

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^1, \rho \leq R, \gamma \leq \Gamma} |\mathbf{P}(\hat{\chi}_n^2 \leq x) - F_{m-2}(x, \hat{\lambda}^2(\rho, \gamma, \Pi))| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Параметр нецентральности равен

$$\hat{\lambda}^2(\rho, \gamma, \Pi) = |(\mathbf{E}_m - \boldsymbol{\alpha}_0\boldsymbol{\alpha}_0^T)\mathbf{P}_0^{-1/2}[\rho(\mathbf{p}_H - \mathbf{p}_0) + \gamma\boldsymbol{\delta}(\Pi)]|^2.$$

В силу Теоремы 2.2 при H_Φ , т.е. при $\rho = 0$, и $\gamma = 0$ предельное распределение нашей тестовой статистики $\hat{\chi}_n^2$ будет обычное (центральное) распределение хи-квадрат с $m - 2$ степенями свободы.

Для заданного $0 < \alpha < 1$ (α – асимптотический уровень в схеме без засорений), мы будем отвергать $\mathbf{H}_\Phi$, когда

$$\hat{\chi}_n^2 > \chi_{m-2}(1 - \alpha), \quad (2.15)$$

$\chi_{m-2}(1 - \alpha)$ – квантиль уровня $1 - \alpha$ распределения хи-квадрат с $m - 2$ степенями свободы. Мощность такого теста равна

$$W_n(\rho, \gamma, \Pi) = P(\hat{\chi}_n^2 > \chi_{m-2}(1 - \alpha)).$$

В силу Теоремы 2.2 эта мощность сходится при $n \rightarrow \infty$ равномерно по $\rho \leq R$, $\gamma \leq \Gamma$ к асимптотической мощности

$$W(\rho, \gamma, \Pi) = 1 - F_{m-2}(\chi_{m-2}(1 - \alpha), \hat{\lambda}^2(\rho, \gamma, \Pi)), \quad W(0, 0, \Pi) = \alpha.$$

Используя неравенство

$$|F_k(x, \lambda_1^2) - F_k(x, \lambda_2^2)| \leq 2 \sup_{x \in \mathbb{R}^1} \varphi(x) |\lambda_1 - \lambda_2|,$$

$\varphi(x)$ стандартная гауссовская плотность, и определение $\hat{\lambda}^2(\rho, \gamma, \Pi)$, получаем:

$$\sup_{\Pi, \rho \geq 0} |W(\rho, \gamma, \Pi) - W(\rho, 0, \Pi)| \leq \gamma \sqrt{2/\pi} |(\mathbf{E}_m - \boldsymbol{\alpha}_0 \boldsymbol{\alpha}_0^T) \mathbf{P}_0^{-1/2}| \sup_{\Pi} |\boldsymbol{\delta}(\Pi)| \rightarrow 0, \quad \gamma \rightarrow 0. \quad (2.16)$$

Соотношение (2.16) означает асимптотическую качественную робастность теста (2.15). Такая робастность означает, что $\mathbf{H}_\Phi$ для малых γ можно проверять примерно с асимптотическим уровнем α , и тест будет иметь примерно такую же асимптотическую мощность при $\mathbf{H}_{1n}(\rho)$ с $\rho > 0$, как в схеме без засорений. И все это независимо от распределения засорений Π .

Список литературы

- [1] Anderson T.V. The Statistical Analysis of time series. Wiley and Sons, Inc., New York, 1971.
- [2] Boldin M.V., Petriev M.N. On the Empirical Distribution Function of Residuals in Autoregression with Outliers and Pearson's Chi-Square type Tests. Math. Methods Statist., 2018, v. 27, No. 4, p. 1–17.
- [3] Boldin M.V. On Symmetrized Pearson's Type Test in Autoregression with Outliers: Robust Testing of Normality. <http://arxiv.org/abs/2003.07878>.
- [4] Boldin M.V. On the Power of Symmetrized Pearson's Type Test under Local Alternatives in Autoregression with Outliers. <http://arxiv.org/abs/2003.13072>.
- [5] Болдин М.В. О проверке нормальности авторегрессии с засорениями критерием Пирсона. Теория вероятн. и ее применения, 2020, т. 65, No 1, с. 126–137.
- [6] Brockwell P.J. and Daviis R.A. Time Series: Theory and Methods. Springer-Verlag, 1987.
- [7] Koul H. L. Weighted Empiricals and Linear Models. MSU, Hayward, California, 1992.
- [8] Martin B.D. and Yohai V.J. Influence functionals for Time Series. The Ann. of Statist., 1986, v. 14, p. 781 –818.