

УДК 517.933

Принцип Даламбера-Лагранжа с точки зрения дифференциальных уравнений

Олег Зубелевич

Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
Москва, ул. Губкина, д. 8
Кафедра теоретической механики и мехатроники,
Механико-математический факультет,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

АННОТАЦИЯ. В статье построена математическая теория идеальных связей и принципа Даламбера-Лагранжа. Принцип Даламбера-Лагранжа рассматривается как система с управлением, роль управления играют реакции идеальных связей, которые обеспечивают движение системы по заданному многообразию в расширенном фазовом пространстве.

Мы обсуждаем ряд новых аспектов принципа Даламбера-Лагранжа, но в целом статья является методической и адресована специалистам по дифференциальным уравнениям, эпизодически сталкивающимся с задачами теоретической механики, а также студентам-математикам, изучающим этот предмет.

1. Введение

Принцип Даламбера-Лагранжа является центральной темой курсов теоретической механики. Его важность обусловлена в первую очередь тем, что он обеспечивает переход от уравнений Ньютона к лагранжевой механике и четко формулирует условия этого перехода: идеальность и голономность связей, а также обобщенная потенциальность активных сил.

Принцип Даламбера-Лагранжа является также одним из основных методов исследования неголономных систем [1].

Тем не менее, практически во всех (во всяком случае, русскоязычных) учебниках этот принцип представляет собой весьма запутанный клубок, состоящий из физических соображений, исторического балласта и, собственно, математической части, в которой очень трудно различить условия теорем, их заключения и что вообще доказывается.

В данной статье мы постараемся, по крайней мере частично, заполнить этот пробел и изложить принцип Даламбера-Лагранжа на уровне строгости, принятом в современной математике.

Отметим наиболее нетрадиционные аспекты данного текста.

Ковариантность является фундаментальным свойством уравнений Лагранжа, но в учебниках по теоретической механике она упоминается лишь вскользь и не используется, сами уравнения Лагранжа выводятся из принципа Даламбера-Лагранжа посредством некоторой архаичной процедуры, восходящей к самому Лагранжу, так, как-будто ковариантность не имеет к этому никакого отношения.

2000 *Mathematics Subject Classification.* 00-01.

Key words and phrases. Обыкновенные дифференциальные уравнения, Классическая механика, принцип Даламбера-Лагранжа.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№. 19-71-30012).

На самом деле именно ковариантность лагранжевой формы принципа Даламбера-Лагранжа и позволяет перейти от уравнений Ньютона к уравнениям Лагранжа на многообразии. Мы показываем это ниже.

Идеальные связи в теоретической механике по существу представляют собой инвариантные многообразия в фазовом пространстве системы. Эти инвариантные многообразия традиционно задаются уравнениями, которые называются уравнениями связей.

Силы реакций идеальных связей представляются в терминах функций, входящих в уравнения связей.

Однако, одно и то же многообразие может быть задано различными уравнениями. Например, прямая $\{x = 0\}$ на плоскости xy может быть задана уравнением $e^x - 1 = 0$.

Возникает естественный вопрос о корректности самого понятия "реакция связи": а не зависят ли реакции связей от функций, задающих связь?

По-видимому, этот вопрос не ставился ранее в литературе. Мы считаем этот вопрос методически важным и обсуждаем его ниже.

Прежде чем переходить к математической части статьи, опишем коротко постановку задачи на физическом языке.

Векторы физического \mathbb{R}^3 обозначаются жирным шрифтом.

Пусть задана система материальных точек с массами m_1, \dots, m_ν . Через $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_\nu$ обозначим радиус-векторы этих точек в некоторой инерциальной системе $OXYZ$:

$$\mathbf{r}_i = (X_i, Y_i, Z_i).$$

Силу, действующую на каждую i -ю точку, представим в виде суммы $\mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i$, где

$$\mathbf{F}_i = (F_i^x, F_i^y, F_i^z), \quad \mathbf{R}_i = (R_i^x, R_i^y, R_i^z).$$

Силы \mathbf{F}_i будем считать заданными и называть активными силами.

Силы \mathbf{R}_i принуждают систему материальных точек двигаться в соответствии с уравнениями

$$\Phi^k(t, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_\nu, \dot{\mathbf{r}}_1, \dots, \dot{\mathbf{r}}_\nu) = 0, \quad k = 1, \dots, n,$$

которые называются уравнениями связей. Силы \mathbf{R}_i называются силами реакции связей. Реакции связей подлежат определению в ходе решения задачи. Если связи отсутствуют, то силы реакций полагают равными нулю.

Таким образом, динамика данной системы описывается дифференциальными уравнениями:

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i(t, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_\nu, \dot{\mathbf{r}}_1, \dots, \dot{\mathbf{r}}_\nu) + \mathbf{R}_i(t, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_\nu, \dot{\mathbf{r}}_1, \dots, \dot{\mathbf{r}}_\nu), \quad i = 1, \dots, \nu. \quad (1)$$

Чтобы перейти к аккуратным формулировкам, введем обозначения:

$$\begin{aligned} G &= \text{diag}(m_1, m_1, m_1, \dots, m_\nu, m_\nu, m_\nu); \quad x = (X_1, Y_1, Z_1, \dots, X_\nu, Y_\nu, Z_\nu)^T; \\ f(t, x, \dot{x}) &= (F_1^x, F_1^y, F_1^z, \dots, F_\nu^x, F_\nu^y, F_\nu^z), \quad N(t, x, \dot{x}) = (R_1^x, R_1^y, R_1^z, \dots, R_\nu^x, R_\nu^y, R_\nu^z); \\ \varphi^k(t, x, \dot{x}) &= \Phi^k(t, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_\nu, \dot{\mathbf{r}}_1, \dots, \dot{\mathbf{r}}_\nu). \end{aligned}$$

2. Принцип Даламбера-Лагранжа для системы материальных точек

Система (1) записывается следующим образом:

$$G\ddot{x} = f^T(t, x, \dot{x}) + N^T(t, x, \dot{x}). \quad (2)$$

Вектор-строки f, N и вектор-столбец $\varphi = (\varphi^1, \dots, \varphi^n)^T$ являются гладкими функциями на прямом произведении $I \times D \times \mathbb{R}^m$. Здесь $D \subset \mathbb{R}^m$ – область,

$$m = 3\nu, \quad x = (x^1, \dots, x^m)^T \in D,$$

и $t \in I = (t_1, t_2)$, $\dot{x} \in \mathbb{R}^m$.

За исключением весьма специальных задач в механике нет смысла привлекать особое внимание к порядку гладкости функций. В задачах теоретической механики, как правило, все функции являются бесконечно гладкими и даже аналитическими.

Матрица G постоянна, симметрична и положительно определена.

Область D называется конфигурационным пространством; область $D \times \mathbb{R}^m \ni (x, \dot{x})$ называется фазовым пространством; область $I \times D \times \mathbb{R}^m \ni (t, x, \dot{x})$ называется расширенным фазовым пространством системы (2).

Система (2) может быть переписана в лагранжевой форме:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial T}{\partial x} = f + N, \quad (3)$$

где

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\nu} m_i |\dot{r}_i|^2 = \frac{1}{2} \dot{x}^T G \dot{x}$$

– кинетическая энергия системы материальных точек.

Функция T называется функцией Лагранжа, или лагранжианом системы (3).

Уравнения

$$\varphi(t, x, \dot{x}) = 0, \quad \text{rang } \varphi_{\dot{x}} = n < m, \quad (4)$$

где

$$\varphi_{\dot{x}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi^1}{\partial \dot{x}^1} & \cdots & \frac{\partial \varphi^1}{\partial \dot{x}^m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi^n}{\partial \dot{x}^1} & \cdots & \frac{\partial \varphi^n}{\partial \dot{x}^m} \end{pmatrix},$$

называются уравнениями связей.

Вектор-строка f называется активной силой и считается заданной. Вектор-строка N называется реакцией связи и подлежит определению.

ТЕОРЕМА 1 (Принцип освобождаемости от связей). *Существует, и притом единственная, вектор-строка $N = N(t, x, \dot{x})$ такая, что*

- 1) Функции φ являются первыми интегралами системы (2);
- 2) условие

$$\varphi_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}) \xi = 0 \quad (5)$$

влечет

$$N(t, x, \dot{x}) \xi = 0. \quad (6)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. *Линейное пространство векторов $\xi \in \mathbb{R}^m$, удовлетворяющих (5), называется пространством виртуальных перемещений. Это пространство отнесено к значениям переменных (t, x, \dot{x}) , либо к значениям переменных (t, x) , если $\varphi_{\dot{x}}$ не зависит от \dot{x} .*

Размерность пространства виртуальных перемещений называется числом степеней свободы системы (2), (4).

Очевидно, число степеней свободы равно $m - n$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. *Если связи (4) реализованы с помощью сил реакций N , указанных в теореме 1, то такие связи называются идеальными, а силы N называются реакциями идеальных связей.*

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Теорема 1 остается в силе, если уравнение (5) заменить на

$$S(t, x, \dot{x})\xi = 0,$$

где оператор $S(t, x, \dot{x}) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ таков, что

$$\det(\varphi_{\dot{x}}G^{-1}S^T) \neq 0.$$

Это приводит, вообще говоря, к другому определению виртуальных перемещений u , соответственно, другому определению сил N , реализующих связи.

Таким образом, одни и те же связи могут быть реализованы различными силами реакций, а определение виртуальных перемещений не зависит от уравнений связей [2].

Ниже обсуждаются только системы с идеальными связями.

На физическом языке уравнение (6) означает, что силы реакции идеальных связей не совершают работу на виртуальных перемещениях.

Отметим, что в классической механике встречаются только связи, являющиеся линейными однородными или неоднородными функциями \dot{x} . См. формулу (11) ниже.

Доказательство теоремы 1. Факт из линейной алгебры:

УТВЕРЖДЕНИЕ 1. Пусть X, Y, Z – векторные пространства и

$$A : X \rightarrow Y, \quad B : X \rightarrow Z$$

– линейные операторы.

Тогда если $\ker A \subset \ker B$, то существует такой оператор $\Lambda : Y \rightarrow Z$, что $B = \Lambda A$.

Отсюда и из формул (5), (6) следует, что найдется вектор-строка $\Lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)(t, x, \dot{x})$ такая, что

$$N = \Lambda \varphi_{\dot{x}}. \quad (7)$$

Продифференцируем φ в силу системы (2) и приравняем результат к нулю:

$$\varphi_t + \varphi_x \dot{x} + \varphi_{\dot{x}} G^{-1}(f^T + N^T) = 0.$$

Подставляя сюда N из формулы (7), находим

$$\Lambda^T = -(\varphi_{\dot{x}} G^{-1} \varphi_{\dot{x}}^T)^{-1} (\varphi_t + \varphi_x \dot{x} + \varphi_{\dot{x}} G^{-1} f^T). \quad (8)$$

Здесь и далее мы используем следующий факт из линейной алгебры.

ЛЕММА 1. Если m -мерная матрица G симметрична и положительно определена, а матрица B состоит из m столбцов и n строк ($m > n$), причем $\text{rang } B = n$, то матрица BGB^T симметрична и положительно определена.

Теорема доказана.

Уравнение (2) с подставленной в него реакцией по формуле (7) называется уравнением Лагранжа первого рода.

ТЕОРЕМА 2. Пусть функция $x(t)$ удовлетворяет (4) и

$$\begin{aligned} \varphi_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t))\xi = 0 &\implies \\ \left(\ddot{x}^T G - f(t, x(t), \dot{x}(t)) \right) \xi = 0. \end{aligned} \quad (9)$$

Тогда $x(t)$ удовлетворяет (2) с реакциями (7), (8).

Уравнение (9) с виртуальными перемещениями ξ называется общим уравнением динамики. В ковариантной форме (об этом ниже) общее уравнение динамики имеет вид

$$\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial T}{\partial x} - f \right) \xi = 0.$$

Доказательство теоремы 2. Действительно, в силу утверждения 1 существует вектор-строка $\tilde{\Lambda}(t)$ такая, что

$$\ddot{x}^T(t)G - f(t, x(t), \dot{x}(t)) = \tilde{\Lambda}(t)\varphi_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)). \quad (10)$$

Продифференцируем уравнение $\varphi(t, x(t), \dot{x}(t)) = 0$:

$$\varphi_t(t, x(t), \dot{x}(t)) + \varphi_x(t, x(t), \dot{x}(t))\dot{x}(t) + \varphi_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t))\ddot{x}(t) = 0.$$

Подставляя сюда \ddot{x} из (10), убеждаемся, что

$$\tilde{\Lambda}(t) = \Lambda(t, x(t), \dot{x}(t)).$$

Теорема доказана.

Следующая теорема очевидна.

ТЕОРЕМА 3. Пусть $x(t)$ удовлетворяет (2) с реакциями (7), (8). Тогда верна импликация

$$\varphi_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t))\xi = 0 \implies \left(\ddot{x}^T G - f(t, x(t), \dot{x}(t)) \right) \xi = 0.$$

Теоремы 1, 2, 3 составляют принцип Даламбера-Лагранжа.

3. О классических обозначениях

Традиционно в механике вектор виртуальных перемещений ξ обозначают так:

$$\xi = (\delta \mathbf{r}_1, \dots, \delta \mathbf{r}_\nu)^T.$$

Тогда уравнения (5) и (6) имеют вид

$$\sum_{i=1}^{\nu} (\Phi_{\mathbf{r}_i}^k, \delta \mathbf{r}_i) = 0, \quad \sum_{i=1}^{\nu} (\mathbf{R}_i, \delta \mathbf{r}_i) = 0$$

соответственно.

Общее уравнение динамики (9) имеет вид

$$\sum_{i=1}^{\nu} (m_i \ddot{\mathbf{r}}_i - \mathbf{F}_i, \delta \mathbf{r}_i) = 0.$$

4. Голономные и неголономные связи

Далее мы будем считать связи линейными по скоростям:

$$\varphi(t, x, \dot{x}) = a(t, x) + A(t, x)\dot{x}. \quad (11)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Связи (4) называются голономными, если найдутся функции

$$g = (g^1, \dots, g^n)^T(t, x), \quad \text{rang } g_x = n$$

такие, что многообразия

$$\{(t, x, \dot{x}) \mid \varphi(t, x, \dot{x}) = 0\}, \quad \{(t, x, \dot{x}) \mid g_t(t, x) + g_x(t, x)\dot{x} = 0\}$$

совпадают.

Связи, не являющиеся голономными, называются неголономными.

Вопрос о голономности связей эквивалентен вопросу об интегрируемости дифференциальной системы на многообразии [3].

Далее мы будем считать связи голономными.

ЛЕММА 2. Многообразия

$$W = \{(t, x, \dot{x}) \mid g_t(t, x) + g_x(t, x)\dot{x} = 0, \quad g(t, x) = 0\}$$

является инвариантным многообразием системы (2) в расширенном фазовом пространстве.

Доказательство леммы 2. Действительно, пусть $x(t)$ – решение системы (2) и $(t_0, x(t_0), \dot{x}(t_0)) \in W$ при некотором t_0 .

Многообразие $\{g_t(t, x) + g_x(t, x)\dot{x} = 0\}$ инвариантно потому, что совпадает с поверхностью уровня первого интеграла φ . Напомним, что силы реакции выбираются в соответствии с теоремой 1.

Теперь, чтобы проверить уравнение $g(t, x(t)) = 0$, надо проинтегрировать равенство

$$\frac{d}{dt}g(t, x(t)) = g_t(t, x(t)) + g_x(t, x(t))\dot{x}(t) = 0$$

по t в пределах $[t_0, t]$.

Лемма доказана.

Легко видеть, что

$$\ker \varphi_{\dot{x}}(t, x, \cdot) = \ker A(t, x) = \ker g_x(t, x). \quad (12)$$

Действительно, последнее равенство следует из того, что всякое решение однородного линейного уравнения можно представить как разность двух решений неоднородного линейного уравнения.

Уравнения $g(t, x) = 0$ называют уравнениями геометрических связей, а связи (4) называют дифференциальными связями.

5. Ковариантность лагранжевой производной

Предположим, что многообразия

$$\Sigma_t = \{x \in D \mid g(t, x) = 0\}$$

является образом гладкого многообразия Y , $\dim Y = r = m - n$ при вложении¹

$$u(t, \cdot) : Y \rightarrow D, \quad \Sigma_t = u(t, Y).$$

Через $y = (y^1, \dots, y^r)^T$ обозначим локальные координаты в Y ;

$$g(t, u(t, y)) = 0, \quad u = (u^1, \dots, u^m)^T, \quad x = u(t, y). \quad (13)$$

Линейное отображение

$$u_y(t, y) : T_y Y \rightarrow T_{u(t, y)} \Sigma_t$$

является изоморфизмом, причем касательное пространство $T_{u(t, y)} \Sigma_t$ совпадает с пространством виртуальных перемещений:

$$T_{u(t, y)} \Sigma_t = \ker (\varphi_{\dot{x}} \mid_{x=u(t, y)}).$$

¹Вложением мы называем гладкое инъективное отображение $u(t, \cdot) : Y \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\text{rang } u_y = r$, такое, что при каждом t его образ $\Sigma_t \subset \mathbb{R}^m$ является гладким многообразием, и в окрестности каждой точки $x \in \Sigma_t$ пространства \mathbb{R}^m существуют локальные координаты z^1, \dots, z^m (зависящие гладко от t), в которых Σ_t задается системой уравнений $z^l = 0$, $l = 1, \dots, n$.

Это ясно, если продифференцировать формулу (13) по y и использовать (12):

$$g_x(t, u(t, y))u_y(t, y) = 0.$$

Рассмотрим гладкую функцию $\mathcal{L}(t, x, \dot{x})$, определенную на расширенном фазовом пространстве.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. *Лагранжевой производной \mathcal{L} называется следующий дифференциальный оператор*

$$[\mathcal{L}] = ([\mathcal{L}]_1, \dots, [\mathcal{L}]_m), \quad [\mathcal{L}]_k = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}^k} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^k}.$$

Очевидно, лагранжева производная является линейной операцией и для любой функции $w = w(t, x)$, $w : I \times D \rightarrow \mathbb{R}$ выполнено тождество

$$\left[\frac{dw}{dt} \right] = 0, \quad \frac{dw}{dt} := w_t + w_x \dot{x}.$$

ТЕОРЕМА 4. *Верно равенство*

$$[\mathcal{L}] \Big|_{x=u(t,y)} u_y(t, y) = [L],$$

где функция $L : I \times TY \rightarrow \mathbb{R}$ (TY – касательное расслоение) определяется формулой

$$L(t, y, \dot{y}) = \mathcal{L} \Big|_{x=u(t,y)} = \mathcal{L}(t, u(t, y), u_t(t, y) + u_y(t, y)\dot{y}). \quad (14)$$

В частности, это означает, что лагранжева производная ведет себя как ковекторное поле относительно замен координат. Что позволяет применить к ней операцию "пул-бэк". Именно это и лежит в основе перехода от уравнений Ньютона к уравнениям Лагранжа на многообразии.

Доказательство теоремы 4. Для большей наглядности проведем вычисления в координатах. По формуле (14) имеем:

$$\frac{\partial L}{\partial y^i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^p} \frac{\partial u^p}{\partial y^i} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}^p} \left(\frac{\partial^2 u^p}{\partial y^l \partial y^i} \dot{y}^l + \frac{\partial^2 u^p}{\partial t \partial y^i} \right);$$

и

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}^i} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}^p} \frac{\partial u^p}{\partial y^i} \right) = \frac{\partial u^p}{\partial y^i} \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}^p} \right) \\ &+ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}^p} \left(\frac{\partial^2 u^p}{\partial y^l \partial y^i} \dot{y}^l + \frac{\partial^2 u^p}{\partial t \partial y^i} \right). \end{aligned}$$

Вычитая из одного равенства другое, получаем требуемый результат.

Теорема доказана.

6. Уравнения Лагранжа для системы материальных точек

Вернемся к системе (3). Положим

$$\mathcal{L} = T = \frac{1}{2} \dot{x}^T G \dot{x}. \quad (15)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5. *Обобщенными силами называются компоненты вектора-строки*

$$Q(t, y, \dot{y}) := f(t, u(t, y), u_t(t, y) + u_y(t, y)\dot{y})u_y(t, y). \quad (16)$$

ТЕОРЕМА 5. Пусть функция $y(t)$ является решением уравнений Лагранжа второго рода

$$[L] = Q, \quad (17)$$

где функция L определена формулами (14), (15).

Тогда функция $x(t) = u(t, y(t))$ является решением уравнений (3).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6. Многообразие Y называется конфигурационным многообразием, а локальные координаты y называются обобщенными координатами системы (17).

Многообразия TU , $I \times TU$ называются фазовым пространством и расширенным фазовым пространством соответственно.

Компоненты вектора \dot{y} называются обобщенными скоростями.

Доказательство теоремы 5. По теореме 4 имеем

$$([L] - f) \Big|_{x=u(t,y(t))} u_y(t, y(t)) = ([L] - Q) \Big|_{y=y(t)} = 0.$$

Как уже отмечалось, образ оператора u_y совпадает с пространством виртуальных перемещений, поэтому в силу теоремы 2 получаем

$$([\mathcal{L}] - f) \Big|_{x=u(t,y(t))} = N.$$

Теорема доказана.

ТЕОРЕМА 6. Функция Лагранжа L имеет вид

$$L(t, y, \dot{y}) = T_2 + T_1 + T_0,$$

где квадратичная форма обобщенных скоростей

$$T_2(t, y, \dot{y}) = \frac{1}{2} \dot{y}^T u_y^T G u_y \dot{y}$$

симметрична и положительно определена; $T_1 = b(t, y) \dot{y}$ – линейная форма обобщенных скоростей; $T_0 = T_0(t, y)$.

Действительно, утверждение следует непосредственно из формул (14), (15) и леммы 1.

Из теоремы 6 вытекает, что уравнения Лагранжа (17) разрешимы относительно старших производных, т.е. представимы в нормальной форме. Поэтому для этих уравнений справедлива теорема существования и единственности Коши.

ТЕОРЕМА 7. Пусть функция $x(t)$ удовлетворяет уравнению (3) и

$$(t_0, x(t_0), \dot{x}(t_0)) \in W.$$

Тогда существует, и притом, единственное решение $y(t)$ уравнений (17) такое, что $x(t) = u(t, y(t))$.

Доказательство теоремы 7. Из леммы 2 заключаем $x(t) \in \Sigma_t$, $t \in I$.

Для любого t уравнение

$$x(t) = u(t, y) \quad (18)$$

однозначно разрешимо относительно y , поскольку $u(t, \cdot) : Y \rightarrow \Sigma_t$ – диффеоморфизм. Обозначим это решение за $y(t)$, $x(t) = u(t, y(t))$.

Покажем, что $y(t)$ – гладкая функция. Действительно, (18) представляет собой систему из m уравнений с r -мерным неизвестным вектором y . Выделим из этой системы r независимых уравнений и применим теорему о неявной функции в части гладкости решения по параметру.

Еще раз используем равенство

$$([\mathcal{L}] - f) \Big|_{x=u(t,y(t))} u_y(t, y(t)) = ([L] - Q) \Big|_{y=y(t)}.$$

Левая часть этого равенства равна нулю в силу условия и теоремы 3. Теорема доказана.

7. Заключительные замечания

7.1. В учебниках по механике вложение u вводят так:

$$u(t, \cdot) : y \mapsto (\mathbf{r}_1(t, y), \dots, \mathbf{r}_\nu(t, y)).$$

Соответственно, обобщенные силы (16) записываются так:

$$Q_j = \sum_{i=1}^{\nu} (\mathbf{F}_i, (\mathbf{r}_i)_{y^j}), \quad Q = (Q_1, \dots, Q_r).$$

7.2. Нас интересует динамика системы (2) не на всем расширенном фазовом пространстве, а только на его $(2m + 1 - n)$ -мерном инвариантном подмногообразии, заданном уравнением (4).

В связи с этим возникает вопрос о корректности: зависят ли силы реакций идеальных связей N от выбора функций φ , задающих это многообразие?

Нет, не зависят. Сформулируем точно это утверждение. Введем вектор гладких функций, определенных на $I \times D \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$:

$$U = (U^1, \dots, U^n)^T(t, x, \dot{x}, z), \quad z \in \mathbb{R}^n,$$

такой, что

$$U(t, x, \dot{x}, z) = 0 \Leftrightarrow z = 0, \quad \det U_z(t, x, \dot{x}, 0) \neq 0, \quad \forall (t, x, \dot{x}) \in I \times D \times \mathbb{R}^m.$$

Определим функции $\psi(t, x, \dot{x}) = U(t, x, \dot{x}, \varphi(t, x, \dot{x}))$, и заменим уравнение (4) на $\psi = 0$.

Легко видеть, что выражение для вектор-строки N , данное формулами (7), (8), не изменится при замене φ на ψ :

$$\begin{aligned} N^T |_{\varphi=0} &= -\varphi_{\dot{x}}^T (\varphi_{\dot{x}} G^{-1} \varphi_{\dot{x}}^T)^{-1} (\varphi_t + \varphi_x \dot{x} + \varphi_{\dot{x}} G^{-1} f^T) |_{\varphi=0} \\ &= -\psi_{\dot{x}}^T (\psi_{\dot{x}} G^{-1} \psi_{\dot{x}}^T)^{-1} (\psi_t + \psi_x \dot{x} + \psi_{\dot{x}} G^{-1} f^T) |_{\varphi=0}. \end{aligned}$$

Действительно, это следует из формулы

$$\psi_t = U_t(t, x, \dot{x}, \varphi) + U_z(t, x, \dot{x}, \varphi) \varphi_t, \quad U_t(t, x, \dot{x}, \varphi) |_{\varphi=0} = 0,$$

и аналогичных формул для $\psi_x, \psi_{\dot{x}}$.

Такая же инвариантность имеет место и в случае, описанном в замечании 1.

7.3. Абстрагируясь от системы материальных точек, отметим, что уравнение (3) сразу может быть введено не в области D , а на произвольном m -мерном многообразии M [4].

При этом кинетическую энергию $T(t, x, \dot{x})$ можно считать гладкой функцией общего вида и не отличать от функции \mathcal{L} .

Для того, чтобы все теоремы остались в силе, надо предположить, что квадратичная форма $\mathcal{L}_{\dot{x}\dot{x}}$ положительно определена.

Отметим, что ряд формул, в частности, формула (8), в общем случае усложняются, хотя и не принципиально.

В эффективной своей части теорема 6 обобщается до следующего утверждения: если квадратичная форма $\mathcal{L}_{\dot{x}\dot{x}}$ положительно определена, то квадратичная форма $L_{\dot{y}\dot{y}}$ тоже положительно определена.

Например, вместо системы материальных точек можно взять твердое тело. Тогда $M = \mathbb{R}^3 \times SO(3)$, и чтобы дальнейшая теория заработала, надо с помощью общих теорем динамики проверить, что уравнения движения твердого тела можно записать в форме (3).

Список литературы

- [1] A. M. Bloch, J. Baillieul, P. Crouch, J. Marsden: Nonholonomic Mechanics and Control (Interdisciplinary Applied Mathematics). Springer, 2000.
- [2] V. V. Kozlov: The Dynamics of Systems with Servoconstraints. I. Regular and Chaotic Dynamics, 2015, vol. 20, no. 3, pp. 205–224.
- [3] S. Sternberg: Lectures on Differential Geometry. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1964.
- [4] O. Zubelevich: The D'Alembert—Lagrange principle: a geometrical aspect. Sib. Zh. Ind. Mat., 2020, Volume 23, Number 3, Pages 31–39.