

УДК 517.518.5

О РАВНОМЕРНЫХ ОЦЕНКАХ ОСЦИЛЛЯТОРНЫХ ИНТЕГРАЛОВ С ГЛАДКОЙ ФАЗОЙ

Исроил Акрамович Икромов, Акбар Рахманович Сафаров

Аннотация. Мы рассмотрим задачу о равномерных оценках осцилляторных интегралов с гладкой фазовой функцией имеющей особенность типа D_∞ . Оценка является точной и является аналогом оценок результата В.Н.Карпушкина.

Abstract. We consider the problem on uniform estimates for an oscillatory integrals with the smooth phase functions having singularities D_∞ . The estimate is sharp and analogy to estimates of the work of V.N.Karpushkin.

Ключевые слова: фаза, деформация, особенность.

Keywords: phase, deformation, singularity.

1. ВВЕДЕНИЕ

Определение 1. *Осцилляторным интегралом с гладкой вещественно-значной фазой f и амплитудой a называется интеграл вида:*

$$J(\lambda, f, a) = \int_{\mathbb{R}^n} a(x) e^{i\lambda f(x)} dx$$

где $a \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ и $\lambda \in \mathbb{R}$.

Пусть $U \subset V \subset \mathbb{R}^2$ —ограниченные окрестности начала координат, $\bar{U}(\bar{V})$ замыкание $U(V)$. Допустим, что функция $f: \bar{V} \rightarrow \mathbb{R}$ (где $f \in C^N(\bar{V})$, $(N \geq 8)$) имеет следующий вид:

$$(1) \quad f(x_1, x_2) = x_1 x_2^2 + g(x_1, x_2),$$

где $g \in C^N(V)$, такая, что $D^\alpha g(0, 0) = 0$ для всех $\alpha_1 + \alpha_2 \leq 3$, здесь D^α означает $D^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2}}$, $\alpha := (\alpha_1, \alpha_2) \in Z_+^2$ —мультииндекс, $Z_+ = \{0\} \cup \mathbb{N}$ неотрицательные целые числа.

Определение 2. Пусть $F \in C^N(\bar{V})$ функция такая, что $\|F\|_{C^N(\bar{V})} < \varepsilon$, где N некоторое натуральное число и ε достаточно малое положительное число, а также $\|F\|_{C^N(\bar{V})} = \max_{\bar{V}} \sum_{|\alpha| \leq N} \left| \frac{\partial^{|\alpha|} F(x_1, x_2)}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2}} \right|$. Функция $f + F$ называется деформацией функции f (см.[6]).

Пусть $\vartheta_{C^8(\bar{V})}(\varepsilon) := \{F \in C^8(\bar{V}), \|F\|_{C^8(\bar{V})} < \varepsilon\}$ Основным результатом работы является следующая

IKROMOV I.A., SAFAROV A.R. UNIFORM ESTIMATES OSCILLATORY INTEGRALS WITH SMOOTH PHASE.

© 2021 ИКРОМОВ И.А., САФАРОВ А.Р. .

Поступила 1 января 2009 г.

Теорема 1. Пусть $f \in C^8(\overline{V})$ имеет вид (1). Тогда найдутся положительные числа ε, C и окрестность $U \subset V$ начала координат, такие, что для произвольных функций $a \in C_0^1(U)$ и $F \in \mathcal{V}_{C^8(\overline{V})}(\varepsilon)$ справедлива следующая оценка:

$$\left| \int_U e^{i\lambda(f+F)} a(x) dx \right| \leq \frac{C \|a\|_{C^1}}{|\lambda|^{\frac{1}{2}}}.$$

1) Теорема является аналогом более общей теоремы В.Н.Карпушкина [6] (а также см.[2]) для достаточно гладких функций.

2) Если $g \equiv 0$, то оценка, полученная в теореме, не улучшаема.

3) Для некоторых g функция f может иметь особенность типа D_k . В этом случае из результатов Дюстермаата [5] можно вывести более точную оценку.

4) Инвариантные оценки с полиномиальной фазой рассмотрены в работе [9].

2. НЕКОТОРЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

Сначала мы приведем несколько простых вспомогательных определений.

Определение 3. [1] Рассмотрим арифметическое пространство $\mathbb{R}^n$ с фиксированными координатами $x_1, x_2, \dots, x_n$. Голomorphicная функция $f : (\mathbb{R}^n, 0) \rightarrow (\mathbb{R}, 0)$ называется квазиоднородной функцией степени d с показателями $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, если при любом $\lambda > 0$ имеем $f(\lambda^{\alpha_1} x_1, \lambda^{\alpha_2} x_2, \dots, \lambda^{\alpha_n} x_n) = \lambda^d f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Показатели α_s называются весами переменных x_s .

Определение 4. Стандартным градиентным идеалом для голоморфного функции $f : (\mathbb{R}^n, 0) \rightarrow (\mathbb{R}, 0)$ называется $I_{\nabla f} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$.

Пусть функция $f(x_1, x_2)$ удовлетворяет следующим условиям:

$$1) \frac{\partial^{|\alpha|} f(0, 0)}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2}} = 0, |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 \leq 2.$$

2) допустим корни уравнения $f_3(x_1, x_2) = 0$ на S_1 (где f_3 отрезок Тейлора функции f порядка 3 и S_1 единичная окружность в $\mathbb{R}^2$ с центром в начале координат) состоят одного простого и двукратного корня.

Тогда функция f , линейным преобразованием, приводится к виду $f(x(u)) = u_1 u_2^2 + g_1(u_1, u_2)$, где $g_1(u_1, u_2)$ - некоторая функция удовлетворяющая условию $D^\alpha g_1(0, 0) = 0$, при всех $|\alpha| \leq 3$, аналогичное утверждение доказано для однородных многочленов третьей степени в работе [1] (стр.147). Главная часть относительно веса $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ функции f обозначается через f_π . Таким образом, без ограничения общности, мы можем считать, что $f_\pi(x_1, x_2) = x_1 x_2^2$.

Следуя [6] обозначим через E_d линейное пространство полиномов степени меньше d относительно веса $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ и $I_{\nabla f_\pi}$ стандартный градиентный идеал функции f_π .

Определение 5. Координатное подпространство $B \subset E_1$ называется нижним версальным, если $(I_{\nabla f_\pi} \cap E_1) \oplus B = E_1$ (т.е. $I_{\nabla f_\pi} \cap E_1 \cap B = 0$, $(I_{\nabla f_\pi} \cap E_1) + B = E_1$)).

Легко показать, что $B = \langle 1, x_1, x_2, x_1^2 \rangle$ является версальным подпространством B для функции $f_\pi(x_1, x_2) = x_1 x_2^2$.

Пусть $\sum_{\frac{m_1}{3} + \frac{m_2}{3} < d} s_m x^m$ отрезок ряда Тейлора в точке 0 функции F . Положим $\pi_d(F) = \sum s_m x^m$, где $0 \leq \frac{m_1}{3} + \frac{m_2}{3} < d$. Таким образом, π_1 определяет отображение пространства $C^N(V)$ на пространство E_d , где $d \leq \frac{N}{3}$.

Следующее предложение о возможности гладко выбрать замену координат является аналогом теоремы версальности. Аналогом деформации функции f является $f + F$, где $F \in \vartheta_{C^8(\overline{V})}(\varepsilon)$ (деформация с бесконечным числом параметров). Аналогом версальной деформации f является $f + F$, где $F \in \vartheta_{C^8(\overline{V})}(\varepsilon)$, $\pi_1 F \in B$. Здесь B — нижнее версальное подпространство [1].

Лемма 1. Пусть $z \in C^8(\overline{V})$ некоторая функция. Функция $(f + F)(y + z(y))$ записывается в виде

$$(f + F)(y + z(y)) = f(0) + F(0) + \alpha_{10}(z)y_1 + \alpha_{01}(z)y_2 + \\ + \alpha_{20}(z)y_1^2 + \alpha_{11}(z)y_1y_2 + \alpha_{02}(z)y_2^2 + \sum_{i_1+i_2=3} \alpha_{i_1i_2}(z)y_1^{i_1}y_2^{i_2} + y_1y_2^2,$$

где $\alpha_{10}, \alpha_{01}, \alpha_{20}$ — функционалы от F и $\alpha_{i_1i_2} : C^3(U) \rightarrow C^3(V)$ операторы причём $2 \leq i_1 + i_2 = 3$, выполняется $\|\alpha_{i_1i_2}\|_{C^2} \leq C\varepsilon$, при условии $F \in \vartheta_{C^8(\overline{V})}(\varepsilon)$.

Доказательство. Представим функцию $f + F$ в следующем виде:

$$f + F = s_{10}x_1 + s_{01}x_2 + s_{20}x_1^2 + 2s_{11}x_1x_2 + s_{02}x_2^2 + s_{30}(x_1, x_2)x_1^3 + \\ + s_{21}(x_1, x_2)x_1^2x_2 + (1 + s_{12}(x_1, x_2))x_1x_2^2 + s_{03}(x_1, x_2)x_2^3,$$

где $s_{10} = \frac{\partial F(0,0)}{\partial x_1}$, $s_{01} = \frac{\partial F(0,0)}{\partial x_2}$, $s_{20} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F(0,0)}{\partial x_1^2}$, $s_{11} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F(0,0)}{\partial x_1 \partial x_2}$, $s_{02} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F(0,0)}{\partial x_2^2}$, $s_{k_1k_2}(x_1, x_2) := s_{k_1k_2} = \int_0^1 (1-u)^2 \frac{\partial^3 (F+g)(ux_1, ux_2)}{\partial x_1^{k_1} \partial x_2^{k_2}} du$, $k_1 + k_2 = 3$.

Сделаем замену $x_1 - z_1(y_1, y_2) = y_1$, $x_2 - z_2(y_1, y_2) = y_2$ и используем следующие разложения

$$z_1(y) = z_1^0 + a_{10}y_1 + a_{01}y_2 + a_{20}y_1^2 + a_{11}y_1y_2 + a_{02}y_2^2 + r(y)$$

и

$$z_2(y) = z_2^0 + b_{10}y_1 + b_{01}y_2 + b_{20}y_1^2 + b_{11}y_1y_2 + b_{02}y_2^2 + r(y),$$

где $z_1^0 = z_1(0,0)$, $a_{10} = \frac{\partial z_1(0,z)}{\partial y_1}$, $a_{20} = \frac{\partial z_1(0,z)}{\partial y_2}$, $a_{20} = \frac{\partial^2 z_1(0,z)}{\partial y_1^2}$, $a_{02} = \frac{\partial^2 z_1(0,z)}{\partial y_2^2}$, $a_{11} = \frac{\partial^2 z_1(0,z)}{\partial y_1 \partial y_2}$, $z_2^0 = z_2(0,0)$, $b_{10} = \frac{\partial z_2(0,z)}{\partial y_1}$, $b_{20} = \frac{\partial z_2(0,z)}{\partial y_2}$, $b_{20} = \frac{\partial^2 z_2(0,z)}{\partial y_1^2}$, $b_{02} = \frac{\partial^2 z_2(0,z)}{\partial y_2^2}$, $b_{11} = \frac{\partial^2 z_2(0,z)}{\partial y_1 \partial y_2}$.

Разложим функцию $(F + g)(y + z(y))$ по формуле Тейлора в точке $(y_1, y_2) = (0, 0)$

Тогда получим

$$(f + F)(y + z(y)) = \alpha_{00}(z) + \alpha_{10}(z)y_1 + \alpha_{01}(z)y_2 + \\ + \alpha_{20}(z)y_1^2 + \alpha_{11}(z)y_1y_2 + \alpha_{02}(z)y_2^2 + \sum_{i_1+i_2=3} \alpha_{i_1i_2}(z)y_1^{i_1}y_2^{i_2} + y_1y_2^2,$$

где $\alpha_{00}(z) = f(0) + F(0)$, $\alpha_{10}(z)$, $\alpha_{01}(z)$, $\alpha_{20}(z)$ некоторые функционалы от z и $\alpha_{02}(z)$, $\alpha_{11}(z) : C^3(U) \rightarrow C^3(V)$ операторы имеющие вид:

$$\alpha_{02}(z) = z_1 + \tilde{\Phi}_1(z, F), \quad \alpha_{11}(z) = 2z_2 + \tilde{\Phi}_2(z, F),$$

здесь $\tilde{\Phi}_j : C^3(U) \rightarrow C^3(V)$ некоторые гладкие операторы, удовлетворяющие условиям $\tilde{\Phi}_j(z, 0) \equiv 0$, ($j = 1, 2$). $\square$

Предложение 1. Существует положительное число $\varepsilon > 0$ такое, что для любого $\|F\|_{C^4(\bar{V})} < \varepsilon$ найдется такое отображение $(z_1, z_2) := (z_1(F), z_2(F)) \in C^4(U \rightarrow \mathbb{R}^2)$, определенное в некоторой окрестности U , для которого справедливо следующее равенство

$$\pi_1(f(y_1 + z_1, y_2 + z_2) + F(y_1 + z_1, y_2 + z_2)) = \tilde{c}_0(F) + \tilde{c}_1(F)y_1 + \tilde{c}_2(F)y_2 + \tilde{c}_3(F)y_1^2,$$

где $\pi_1(\cdot)$ — проектирование пространства $C^4(V)$ на пространство E_1 .

Теперь рассмотрим следующие функциональные уравнения относительно (z_1, z_2) :

$$(2) \quad \Phi_1(y, F, z) := \alpha_{11}(z) = 0, \Phi_2(y, F, z) := \alpha_{02}(z) = 0.$$

Приведем вспомогательную лемму.

Лемма 2. Для непрерывных операторов $\Phi_1(y, F, z)$, $\Phi_2(y, F, z)$ в пространстве $U_1 \times C^4(V_1) \times U_2$ существует частная производная по z и они дифференцируемы по Фреше в точке 0 , где $U_1 \subset \mathbb{R}^2$, $U_2 \subset \mathbb{R}^2$.

Доказательство. Ради определенности, покажем существование частных производных по z и дифференцируемость оператора $\Phi_1(y, F, z)$, для функции $\Phi_2(y, F, z)$ доказательство совершенно аналогично.

Так как функции $F \in C^8(\bar{V})$ и $g \in C^8(\bar{V})$ то отсюда вытекает дифференцируемость оператора $\Phi_1(y, F, z)$.

Существование производных отображения $\Phi_2(y, F, z)$ рассматривается аналогично. $\square$

Лемма 3. Операторы $\Phi_1(y, F, z)$, $\Phi_2(y, F, z)$ удовлетворяют следующим условиям:

$$1) \Phi_1(y, 0, 0) \equiv 0, \Phi_2(y, 0, 0) \equiv 0. \quad 2) \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial \Phi_1}{\partial z_1} & \frac{\partial \Phi_1}{\partial z_2} \\ \frac{\partial \Phi_2}{\partial z_1} & \frac{\partial \Phi_2}{\partial z_2} \end{array} \right| \neq 0.$$

Доказательство. Из явного вида операторов Φ_1, Φ_2 вытекает выполнения соотношения $1) \Phi_1(y, 0, 0) \equiv 0, \Phi_2(y, 0, 0) \equiv 0$. Очевидно, что $\left| \frac{\partial \Phi_1(0)}{\partial z_1} \frac{\partial \Phi_2(0)}{\partial z_2} - \frac{\partial \Phi_1(0)}{\partial z_2} \frac{\partial \Phi_2(0)}{\partial z_1} \right| = 2 \neq 0$ и следовательно выполнено второе утверждение. Лемма 3 доказана.

Перейдем к доказательству предложения. Так как операторы $\Phi_1(y, F, z)$ и $\Phi_2(y, F, z)$, согласно лемм 1 и 2, удовлетворяют условиям теоремы о неявных отображениях, то, согласно этой теореме, найдется решение $z_1 = z_1(y_1, y_2, F(y))$, $z_2 = z_2(y_1, y_2, F(y))$ уравнения (2) и они являются гладкими функциями, в зависимости от гладкости отражения F . $\square$

Замечание 1. Отметим, что если $F \in C^{3+k}$ и $f \in C^{3+k}$ то $z(y) \in C^k$.

3. О РАЗБИЕНИИ ЕДИНИЦЫ

Осцилляторный интеграл оценивается с помощью разбиения единицы.

Пусть $k = (\frac{k_1}{3}, \frac{k_2}{3})$ и $\tau > 0$ фиксированное число. Рассмотрим отображение $\delta_\tau^k : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ определенное формулой:

$$\delta_\tau(x) = (\tau x_1, \tau x_2).$$

Введем функцию $\beta(x)$, удовлетворяющую условиям:

$$1) \beta \in C^\infty(\mathbb{R}^2),$$

2) $0 \leq \beta(x) \leq 1$ для любого $x \in \mathbb{R}^2$,

3) $\beta(x) = \begin{cases} 1, & \text{при } |x| \leq 1, \\ 0, & \text{при } |\delta_{2^{-1}}(x)| \geq 1 \end{cases}$

Существование такой функции доказано в [3] (а также [7]).

Пусть

$$\chi(x) = \beta(x) - \beta(\delta_2(x)).$$

Основные свойства функции $\chi(x)$ содержатся в следующей лемме.

Лемма 4. *Функция $\chi(x)$ удовлетворяет следующим условиям:*

(1) *Для произвольного фиксированного x справедливо равенство*

$$\beta(\delta_{2^{-\nu_0}}(x)) + \sum_{\nu=\nu_0}^{\infty} \chi(\delta_{2^{-\nu}}(x)) = 1.$$

(2) *Для произвольного $x \neq 0$ существует $\nu_0 = \nu_0(x)$ такое, что при любом $\nu \notin [\nu_0, \nu_0 + 4]$*

$$\chi(\delta_{2^\nu}(x)) = 0.$$

(3) *Для произвольного ν_0 существует $\varepsilon > 0$ такое, что $\chi(\delta_{2^\nu}(x)) = 0$ при любом $\nu < \nu_0$ и $|x| \geq \varepsilon$.*

Лемма 4 доказана в работе [7].

4. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОСНОВНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Так как функция имеет вид $f(x_1, x_2) = x_1 x_2^2 + g(x_1, x_2)$, то применяя предложение 1 для $f + F$ и без ограничения общности мы представим коэффициенты s_{ij} без «шапочки» и получим

$$(3) \quad f + F = s_{10}y_1 + s_{01}y_2 + s_{20}y_1^2 + y_1y_2^2 + s_{30}y_1^3 + s_{21}y_1^2y_2 + s_{12}y_1y_2^2 + s_{03}y_2^3 + R_4(y_1, y_2),$$

где $R_4(y_1, y_2)$ остаточный член. Теперь оценим интеграл J . Сначала введем "квазирасстояние" $\rho = |s_{10}|^{\frac{2}{3}} + |s_{01}|^{\frac{2}{3}} + |s_{20}|^3$ и в интеграле (1) с фазовой функцией (5) сделаем замену переменных $y_1 = \rho^{\frac{1}{3}}\tau_1$, $y_2 = \rho^{\frac{1}{3}}\tau_2$. Тогда получим:

$$J(\lambda) = \rho^{\frac{2}{3}} \int_{\mathbb{R}^2} a\left(\rho^{\frac{1}{3}}\tau_1, \rho^{\frac{1}{3}}\tau_2\right) e^{i\lambda\rho\Phi} d\tau,$$

где $\Phi = \frac{s_{10}}{\rho^{\frac{2}{3}}}\tau_1 + \frac{s_{01}}{\rho^{\frac{2}{3}}}\tau_2 + \frac{s_{20}}{\rho^{\frac{2}{3}}}\tau_1^2 + \tau_1\tau_2^2 + s_{30}\tau_1^3 + s_{21}\tau_1^2\tau_2 + s_{12}\tau_1\tau_2^2 + s_{03}\tau_2^3 + \frac{1}{\rho}R_4\left(\rho^{\frac{1}{3}}\tau_1, \rho^{\frac{1}{3}}\tau_2\right)$. Применим лемму 4, т.е. разбиение единицы, для интеграла $J(\lambda)$ и получим разложение в следующем виде:

$$J(\lambda) = J_0(\lambda) + \sum_{k=k_0}^{\infty} J_k(\lambda),$$

где

$$J_k(\lambda) = \rho^{\frac{2}{3}} \int_{\mathbb{R}^2} a\left(\rho^{\frac{1}{3}}\tau_1, \rho^{\frac{1}{3}}\tau_2\right) \chi\left(2^{-\frac{k}{3}}\tau_1, 2^{-\frac{k}{3}}\tau_2\right) e^{i\lambda\rho\Phi} d\tau,$$

$$J_0(\lambda) = \rho^{\frac{2}{3}} \int_{\mathbb{R}^2} a\left(\rho^{\frac{1}{3}}\tau_1, \rho^{\frac{1}{3}}\tau_2\right) \beta_0(\delta_{2^{-k_0}}(x)) e^{i\lambda\rho\Phi} d\tau.$$

Сначала оценим интеграл $J_k(\lambda)$. В этом интеграле $J_k(\lambda)$ сделаем замену переменных $2^{-\frac{k}{3}}\tau_1 = t_1$, $2^{-\frac{k}{3}}\tau_2 = t_2$ и получим

$$J_k(\lambda) = 2^{\frac{2k}{3}}\rho^{\frac{2}{3}} \int_{\mathbb{R}^2} a\left(2^{\frac{k}{3}}\rho^{\frac{1}{3}}t_1, 2^{\frac{k}{3}}\rho^{\frac{1}{3}}t_2\right) \chi(t_1, t_2) e^{i\lambda 2^k \rho \Phi_k(t, s, \rho)} dt,$$

где фазовая функция имеет вид

$$\begin{aligned} \Phi_k(t, s, \rho) = & 2^{-\frac{2k}{3}}\sigma_{10}t_1 + 2^{-\frac{2k}{3}}\sigma_{01}t_2 + 2^{-\frac{k}{3}}\sigma_{20}t_1^2 + t_1t_2^2 + \\ & + s_{30}t_1^3 + s_{21}t_1^2t_2 + s_{12}t_1t_2^2 + s_{03}t_2^3 + 2^{-k}\frac{1}{\rho}R_4\left(2^{\frac{k}{3}}\rho^{\frac{1}{3}}t_1, 2^{\frac{k}{3}}\rho^{\frac{1}{3}}t_2\right), \end{aligned}$$

здесь $\sigma_{10} = \frac{s_{10}}{\rho^{\frac{2}{3}}}$, $\sigma_{01} = \frac{s_{01}}{\rho^{\frac{2}{3}}}$, $\sigma_{20} = \frac{s_{20}}{\rho^{\frac{2}{3}}}$, $R_4\left(2^{\frac{k}{3}}\rho^{\frac{1}{3}}t_1, 2^{\frac{k}{3}}\rho^{\frac{1}{3}}t_2\right) = \frac{2^{\frac{4k}{3}}\rho^{\frac{4}{3}}}{6}(s_{40}t_1^4 + s_{31}t_1^3t_2 + s_{22}t_1^2t_2^2 + s_{13}t_1t_2^3 + s_{04}t_2^4)$, где $s_{40}(t, s, \rho) = \frac{1}{6}\int_0^1(1-u)^3\frac{\partial^4\Phi_k(ut, s, \rho)}{\partial t_1^4}du$, $s_{31}(t, s, \rho) = \frac{1}{6}\int_0^1(1-u)^3\frac{\partial^4\Phi_k(ut, s, \rho)}{\partial t_1^3\partial t_2}du$, $s_{22}(t, s, \rho) = \frac{1}{6}\int_0^1(1-u)^3\frac{\partial^4\Phi_k(ut, s, \rho)}{\partial t_1^2\partial t_2^2}du$, $s_{13}(t, s, \rho) = \frac{1}{6}\int_0^1(1-u)^3\frac{\partial^4\Phi_k(ut, s, \rho)}{\partial t_1\partial t_2^3}du$, $s_{04}(t, s, \rho) = \frac{1}{6}\int_0^1(1-u)^3\frac{\partial^4\Phi_k(ut, s, \rho)}{\partial t_2^4}du$.

Мы можем считать (в зависимости от носителя амплитуды χ_0 , по лемме 4), что число k_0 достаточно большое.

Сначала рассмотрим случай, когда нет осцилляции. Пусть $|2^k\lambda\rho| \leq L$, где L большое фиксированное число. Тогда из тривиальной оценки интеграла получим:

$$(4) \quad |J_k| \leq \frac{2^{\frac{2k}{3}}\rho^{\frac{2}{3}}A}{|2^k\lambda\rho|^{\frac{1}{2}}} = \frac{2^{\frac{k}{6}}\rho^{\frac{1}{6}}A}{|\lambda|^{\frac{1}{2}}}.$$

Пусть теперь $|2^k\lambda\rho| > L$ и $k > k_0$ достаточно большое число. Тогда, по условию, Φ_k может быть рассмотрена как малая деформация функции $\tau_1\tau_2^2$, причем $(\tau_1, \tau_2) \in D := \text{supp}(\chi) = \{\frac{1}{2} \leq |\tau| \leq 2\}$. Очевидно, что если $\tau^0 \in D$ фиксированная точка и $\tau_2^0 \neq 0$, то эта точка не является критической. Если χ^0 срезающая функция (т.е. функция носитель которой находится в достаточно малой окрестности этой точки), то интеграл

$$J_k^{\chi^0}(\lambda) := 2^{\frac{2k}{3}}\rho^{\frac{2}{3}} \int_{\mathbb{R}^2} a\left(2^{\frac{k}{3}}\rho^{\frac{1}{3}}t_1, 2^{\frac{k}{3}}\rho^{\frac{1}{3}}t_2\right) \chi(t_1, t_2) e^{i\lambda 2^k \rho \Phi_k(t, s, \rho)} \chi^0(t) dt,$$

тривиально оценивается интегрированием по частям и имеет место неравенство (4).

Если $\tau_2^0 = 0$, то $\tau_1^0 \neq 0$. В этом случае, используя лемму Ван дер Корпута [4] (более общее утверждение содержит в [8]), снова имеем оценку вида (4).

Так как на носителе амплитуды $2^{\frac{k}{3}}\rho^{\frac{1}{3}} < 1$, то

$$\frac{1}{|\lambda|^{\frac{1}{2}}} \sum_{|2^k\lambda\rho| \leq 1} |J_k| \leq \frac{c}{|\lambda|^{\frac{1}{2}}} \sum_{2^k\rho \leq 1} 2^{\frac{k}{6}}\rho^{\frac{1}{6}} \leq \frac{c}{|\lambda|^{\frac{1}{2}}}.$$

Теперь рассмотрим оценку интеграла $J_0(\lambda)$. Рассмотрим следующие случаи для параметров σ .

Введем квазисферу $\rho(\sigma) := \{|\sigma_{10}|^{\frac{2}{3}} + |\sigma_{01}|^{\frac{2}{3}} + |\sigma_{20}|^{\frac{1}{3}} = 1\}$ и рассмотрим фазовую функцию

$$\begin{aligned} \Phi_0(\tau, \sigma, \rho) = & \sigma_{10}\tau_1 + \sigma_{01}\tau_2 + \sigma_{20}\tau_1^2 + \tau_1\tau_2^2 + s_{30}\tau_1^3 + s_{21}\tau_1^2\tau_2 + s_{12}\tau_1\tau_2^2 \\ & + s_{03}\tau_2^3 + \frac{1}{\rho}\frac{\rho^{\frac{4}{3}}}{6}(s_{40}\tau_1^4 + s_{31}\tau_1^3\tau_2 + s_{22}\tau_1^2\tau_2^2 + s_{13}\tau_1\tau_2^3 + s_{04}\tau_2^4). \end{aligned}$$

Отметим, что на квазисфере $c_1 \leq |\sigma| \leq c_2$, где c_1, c_2 — фиксированные положительные числа. Таким образом пространство параметров и $\text{supp}(\beta(\delta_{2-k_0}(\cdot)))$ компактные множества. Пусть, $\sigma = \sigma^0$, $|\sigma^0| = c$ фиксированный вектор и $\tau = \tau^0$ фиксированная точка. Тогда $\Phi_0(\tau, \sigma, \rho)$ — достаточно малая гладкая деформация следующей функции

$$\Phi = \sigma_{10}^0 \tau_1 + \sigma_{01}^0 \tau_2 + \sigma_{20}^0 \tau_1^2 + \tau_1 \tau_2^2.$$

Если $\frac{\partial \Phi(\tau_1^0, \tau_2^0)}{\partial \tau_1} \neq 0$ или $\frac{\partial \Phi(\tau_1^0, \tau_2^0)}{\partial \tau_2} \neq 0$, то при $|\sigma - \sigma_0| < \varepsilon$ $|s_{30}| + |s_{21}| + |s_{12}| + |s_{03}| < \varepsilon$ справедлива следующая оценка: $|\nabla \Phi_0(\tau, \sigma, s)| > \delta > 0$ для некоторого положительного числа δ .

Применяя формулу интегрирования по частям для интеграла J_0^X , получим:

$$(5) \quad |J_0^X| \leq \frac{c \|a\|_{C^1}}{|\lambda|^{\frac{2}{3}}},$$

где

$$(6) \quad J_0^X(\lambda) = \int_{R^2} \chi(\tau) a(\tau_1, \tau_2) \chi_0(\tau_1, \tau_2) e^{i\lambda \rho \Phi_0(\tau, \sigma, s)} d\tau$$

и χ — гладкая функция сосредоточенная в достаточно малой окрестности точки τ^0 . Достаточно рассмотреть случай когда τ^0 — критическая точка.

Так как τ^0 — критическая точка, то справедливо следующее равенство:

$$\sigma_{10}^0 + 2\sigma_{20}^0 \tau_1^0 + 2(\tau_2^0)^2 = 0, \sigma_{01}^0 + 2\tau_1^0 \tau_2^0 = 0.$$

Для функции Φ в точке (τ_1^0, τ_2^0) матрица Гессе имеет вид:

$$\begin{pmatrix} 2\sigma_{20}^0 & 2\tau_2^0 \\ 2\tau_2^0 & 2\tau_1^0 \end{pmatrix}.$$

Отметим, что это ненулевая матрица, так как если $\sigma_{20}^0 = 0$, то либо $\sigma_{10}^0 \neq 0$, либо $\sigma_{01}^0 \neq 0$, следовательно $\tau_1^0 \neq 0$ или $\tau_2^0 \neq 0$.

Таким образом, ранг матрицы Гессе $\begin{pmatrix} 2\sigma_{20}^0 & 2\tau_2^0 \\ 2\tau_2^0 & 2\tau_1^0 \end{pmatrix}$ не меньше единицы.

Если ранг матрицы равен единице, то, применяя лемму Морса по параметрам, для интеграла J_0 получим следующую оценку

$$|J_0| \leq \frac{c \|a\|_{C^1} \rho^{\frac{1}{6}}}{|\lambda|^{\frac{1}{2}}}.$$

Наконец, суммируя полученные оценки придем к доказательству теоремы

1. Теорема 1 доказана.

В заключении авторы выражает свою глубокую благодарность рецензенту за ценные замечания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Арнольд В.И., Варченко А.Н., Гусейн-заде С.М. *Особенности дифференцируемых отображений. Классификация критических точек, каустик и волновых фронтов*, М.:Наука. 1982.
- [2] Варченко А.Н. *Многогранник Ньютона и оценки осциллирующих интегралов* // Функционал. и его прил. Т.10, вып 5. 1976. С. 13-38.
- [3] Владимиров В.С. *Уравнения математической физики* М.:Наука. 1981.
- [4] Van der Korput. K.G. *Zur Methode der stationaren phase* // Compositio Math. V.1. 1934. P. 15-38.

- [5] Duistermaat J. *Oscillatory integrals Lagrange immersions and unfoldings of singularities* // Comm. Pure.Appl.Math. - 1974. - V.27, № 2. - P.207-281.
- [6] В.Н.Карпушкин. *Равномерные оценки осциллирующих интегралов с параболической или гиперболической фазой* // Труды Семинара имени И.Г.Петровского. вып.9. 1983. С. 3-39.
- [7] Sogge C.D., *Fourier integrals in Classical Analysis*, Cambridge, Cambridge university press, 1993. P.105.
- [8] Carbery A., Christ M., and Wright J. *Multidimensional Van der Korput lemma and sublevel set estimates*// Journal of AMS, V.12. 1999. P.981-1015.
- [9] А.Сафаров *Инвариантные оценки двумерных осцилляторных интегралов* // Математические заметки. Т.104, вып 2. 2018. С. 289-300.

ИСРОИЛ АКРАМОВИЧ ИКРОМОВ,
АКБАР РАХМАНОВИЧ САФАРОВ,
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ ИМЕНИ В.И.РОМАНОВСКОГО,
УЛ.УНИВЕРСИТЕТСКИЙ БУЛЬВАР, 15,
140104, Г. САМАРКАНД, УЗБЕКИСТАН
Email address: safarov-akbar@mail.ru