

известные модели: квазисвободной частицы в «ящике» и квантового гармонического осциллятора (Ф. Блох, 1932).

**Ключевые слова:** гармонический квантовый осциллятор, квантовая частица в ящике.

## Poeschl – Teller quantum oscillator and its limiting cases

*Yuri G. Rudoy (1) (rudikar@mail.ru),  
Enock O. Oladimedji (2) (nockjnr@gmail.com)*

*(1,2) People's Friendship University of Russia,  
Department of Theoretical Physics and Mechanics*

*Abstract.* One of the most interesting models of the nonrelativistic quantum mechanics (in one-dimensional case) introduced by G. Poeschl and E.Teller at 1933 is considered. It is shown that this model possesses as its limiting cases two most popular quantum models: the quasi-free quantum particle in the box as well as the quantum harmonic oscillator introduced by F. Bloch at 1932.

**Keywords:** quantum harmonic oscillator, quantum particle in the box.

**ВВЕДЕНИЕ.** В связи с интенсивным развитием нанотехнологий (см., например, [1]), в настоящее время вновь повысился интерес к описанию квантовых объектов, состоящих из одной или нескольких микрочастиц и находящихся во внешнем силовом потенциале. Если ранее подобные задачи встречались в основном в физике атомного ядра и элементарных частиц, то сейчас они стали характерны для проблем физики конденсированного состояния, а также для объектов, находящихся в искусственных квантовых ловушках. Типичным примером могут служить *квантовые точки* в гетероструктурах [1], причем подобные квантовые объекты являются, как правило, низкоразмерными  $D < 3$  (ниже мы ограничимся одномерным случаем  $D=1$ ). Для указанного класса задач представляет интерес, во-первых, наличие т.н. *управляющих параметров* – например, массы частицы  $m$  и интенсивность потенциала  $V_0$ , и, во-вторых, возможность «термодинамической» постановки всей задачи в целом. Последнее предполагает пространственную ограниченность, или *конфайнмент*, квантового объекта в области с характерной шириной  $L$ , а также возможность помещения указанного квантового объекта в термостат с температурой  $T$  (по шкале Кельвина). Существенно, что лишь для ограниченных объектов (с конечным  $L$ ) имеется возможность введения понятия *механического давления*  $P$ , что делает «термодинамическую» постановку задачи более последовательной – в частности, позволяет проводить замкнутые термодинамические циклы.

Наиболее известными (см., например, [2-4]) – и притом точно решаемыми – задачами одномерной квантовой механики, являются следующие две задачи: 1) задача о (квази)свободной частице в «ящике» шириной  $L$ , а также 2) задача о гармоническом квантовом осцилляторе с собственной частотой  $\omega_0$ , определенная на всей оси ( $L \rightarrow \infty$ ) – т.н. «осциллятор Блоха», введенный Ф. Блохом в 1932 году. Очевидно, что лишь первая из задач обладает конфайнментом (и, следовательно, давлением), который обеспечивается непроницаемыми для частицы стенками «ящика», что формально соответствует т.н. *дельтаобразному* потенциальному, бесконечно высокому на стенах и равному нулю внутри ящика; разумеется, подобный потенциал носит несколько искусственный характер, но допускает приближенный термодинамический анализ. Что касается второй задачи, то ее решение в «термодинамическом» варианте при ненулевой температуре  $T$  является одним из немногих (если не единственным) примером *точного* квантово-статистического расчета (см., например, [5], §37). В связи с изложенным, на наш взгляд, представляет несомненный интерес рассмотрение еще одной одномерной кван-

тово-механической задачи с потенциалом, предложенным Пёшлем и Теллером в 1933 году, который объединяет две указанные выше задачи и при этом допускает точное решение, описанное в двух широко известных учебных пособиях по квантовой механике [2-4]. Заметим, что с математической точки зрения задача об осцилляторе Пёшля-Теллера не намного сложнее по сравнению, например, с задачей об осцилляторе Блоха, однако с физической точки зрения указанная задача является значительно более общей и содержательной.

**ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.** В нерелятивистской квантовой механике в одномерном случае волновая функция  $\psi(x)$  и энергетический спектр частицы  $E_n$  описывается стационарным уравнением Шредингера с потенциалом  $V(x)$ . Если потенциал  $V(x)$  не ограничен сверху и стремится к *бесконечным* значениям на концах области определения – например, на всей оси  $x$  для осциллятора Блоха (БО) или на каком-либо отрезке с конечной шириной  $L$  для «свободной» частицы в ящике (СЧ), то волновая функция  $\psi(x)$  обращается в нуль при  $x \rightarrow \pm\infty$  (для случая БО) или при  $x_{\pm}(L) = \pm\frac{1}{2}L$  (для случая СЧ). Благодаря этому спектр  $E_n$  является чисто *дискретным* и, как и потенциал  $V(x)$ , также неограниченным сверху, так что главное квантовое число  $n$  принимает все значения от 0 (или 1) до  $\infty$ . Именно подобная ситуация в целом характерна для модели сильно нелинейного (по существу, даже сингулярного) осциллятора Пёшля–Теллера (ОПТ), потенциал которого имеет следующий вид, где *эффективная ширина*  $L$  имеет смысл управляющего параметра:

$$V_{\text{ПТ}}(x;L) = V_0 \operatorname{tg}^2[\alpha(L)x], \quad 0 \leq V_0 < \infty; \quad \alpha(L) = \pi/L; \quad x_{-}(L) \leq x \leq x_{+}(L), \quad x_{\pm}(L) = \pm\frac{1}{2}L, \quad 0 < L < \infty. \quad (1)$$

Потенциал  $V(x;L)$  обладает рядом весьма простых и полезных свойств, которые существенно упрощают решение уравнения Шредингера для ПТ-осциллятора. Прежде всего, потенциал  $V(x;L) = V(-x;L)$  является *симметричным*, или четным, относительно точки  $x=0$ , причем эта точка является единственным (и, следовательно, абсолютным) *минимумом*, в котором  $V(0;L)=0$  для всех  $L$ ; кроме того, потенциал  $V(x;L)$  обладает парой симметричных *сингулярностей*  $V(x;L) \rightarrow \infty$  для значений  $x_{\pm}(L)$ , поскольку  $\operatorname{tg}(\pi/2) \rightarrow \infty$ . Наконец, потенциал  $V(x;L)$  и все его производные  $V^{(n)}(x;L)$  по  $x$  порядка  $n \geq 1$  являются *гладкими* для всех значений  $x_{-}(L) < x < x_{+}(L)$  при всех отличных от нуля значениях *эффективной ширины*  $L$ , имеющего смысл управляющего параметра. Заметим, что зависимость величины  $\alpha(L) = \pi/L$ ,  $0 < \alpha(L) < \infty$ , непосредственно определяющей потенциал  $V(x;L)$  из (1), имеет свойство убывания при возрастании ширины  $L$ , так что  $d\alpha(L)/dL = -\alpha(L)/L < 0$  для всех  $L$ , причем  $\alpha_{\min}(\infty) = 0$  при  $L \rightarrow \infty$ . Покажем теперь, что модель ПТО при определенных условиях сводится к ранее упомянутым известным моделям, а именно к модели БО вблизи точки  $x=0$  для малых значений  $x/L \ll 1$  и, соответственно, к модели СЧ в ящике вблизи точек  $x_{\pm}(L)$ , т.е. при малых значениях  $|y|/L = |x|/L - \frac{1}{2} \ll 1$ ; рассмотрим эти два случая последовательно.

**МЕТОДИКА.** 1. Переход от осциллятора Пёшля–Теллера к осциллятору Блоха. Учтем, что при фиксированном значении  $\alpha(L) = \pi/L$  и при малых значениях  $\alpha(L)x \ll 1$  имеет место разложение  $\operatorname{tg}[\alpha(L)x] \approx \alpha(L)x + \frac{1}{3}[\alpha(L)x]^3 + \dots$ , так что вблизи минимума  $x=0$ , т.е. для значений  $|x|/L \ll 1$ , потенциал  $V_{\text{ПТ}}(x;L)$  принимает вид:

$$V_{\text{ПТ}}(x;L) \approx V_0 [\alpha(L)x]^2 \{1 + \frac{1}{3}[\alpha(L)x]^2 + \dots\}. \quad (2)$$

Очевидно, что потенциал (2) учитывает не только слагаемое вида  $x^2$ , обеспечивающее поведение типа гармонического осциллятора, но также и относительно малое слагаемое вида  $x^4$ , обеспечивающее поведение типа *ангармонического* осциллятора.

Потенциал (2) является интересным объектом исследования, однако здесь важно, что в (2) предполагается *конечное* значение ширины  $L$  (и, соответственно,  $\alpha(L)$ ), тогда как осциллятор Блоха определен только на всей оси  $x$ ; последнее означает переход к пределу  $L \rightarrow \infty$  и, следовательно,  $\alpha(L) \rightarrow 0$ .

Однако если ограничиться только этим пределом, то из (2) следует, что  $V(x;L) \rightarrow 0$  при всех  $x$ , что не представляет интереса в термодинамическом контексте, поскольку такой предел соответствует случаю полностью свободной частицы, которая описывается волной де-Броиля и непрерывным спектром энергии. Однако ситуация изменяется, если *одновременно* с пределом  $L \rightarrow \infty$  и  $\alpha(L) \rightarrow 0$  перейти к пределу  $V_0 \rightarrow \infty$ , так чтобы предел произведения  $V_0 \alpha^2(L)$  был *конечен*. Положив его равным  $\frac{1}{2}k = \text{const}$ , где  $k$  – эффективный коэффициент упругости, нетрудно прийти к решению для осциллятора Блоха, обладающего собственной частотой  $\omega_0 = (k/m)^{\frac{1}{2}}$ .

Таким образом, предельный переход от осциллятора Пёшля–Теллера к осциллятору Блоха описывается выражением для чисто параболического потенциала на всей оси  $x$ :

$$V_{\text{ПТ}}(x;L) \rightarrow V_{\text{ПТ}}(x;\infty) \equiv V_{\text{Бо}}(x) = \frac{1}{2}kx^2 \quad (-\infty < x < \infty); \quad k = 2\pi^2 (V_0/L)^2 = \text{const} \text{ при } V_0, L \rightarrow \infty. \quad (3)$$

2. Переход от осциллятора Пёшля–Теллера к квазисвободной частице в ящике. Как уже отмечалось выше, исходный потенциал (1) становится *сингулярным* в двух точках  $x_{\pm}(L)$ , что фактически означает переход к условиям обычного ящика с непроницаемыми стенками. С физической точки зрения модель Пёшля–Теллера предпочтительнее указанного «ящика», поскольку в ПТ-модели потенциал (1) сам «регулирует» поведение квантовой частицы и не нуждается в дополнительном введении весьма искусственных «стенок». Как известно (см., например, [2-4]), в модели «ящика» внутри него вообще отсутствует какой-либо потенциал, а квантование энергии частицы всецело определяется *физическими граничными условиями*, согласно которым волновая функция  $\psi(x)$  строго обращается в нуль в точках  $x_{\pm}(L)$ . Заметим, что квантование энергии – прежде всего, строгую положительность энергии  $E_1(L)$  основного состояния частицы в ящике и дискретность всего спектра  $E_n(L)$

$$E_1(L) \equiv W(L) = (\hbar^2/2m)\alpha^2(L), \quad E_n(L) = E_1(L)n^2 \quad (n=1,2,\dots) \quad (4)$$

можно объяснить на основе соотношения неопределенностей в форме Гейзенберга (см., например, [2-4]). Напомним, что *формально* потенциал (квази)свободной частицы в ящике может быть описан выражением

$$V_{\text{СЧ}}(x;L) = \frac{1}{2}\{\delta[x - x_+(L)] + \delta[x - x_-(L)]\} = \delta\{x^2 - [x_{\pm}(L)]^2\} = \delta[x^2 - \frac{1}{4}L^2], \quad x_+(L) = -x_-(L) = \frac{1}{2}L. \quad (5)$$

Обратим внимание на то, что в выражение (5) вообще не входит какая-либо «амплитуда» потенциала, что означает возможность вообще положить ее равной нулю  $V_0=0$ ; действительно, внутри ящика это так (по определению модели), а на стенах сингулярность потенциала  $V_{\text{СЧ}}(x;L)$  столь сильна, что перекрывает любой предел  $V_0 \rightarrow 0$ .

С учетом этих соображений аппроксимируем исходный потенциал ПТ-модели (1) вблизи граничных точек  $x_{\pm}(L)$ , перейдя к новой переменной  $y_{\pm} = [x - x_{\pm}(L)]$ , которая, очевидно, мала вблизи точек  $x_{\pm}(L)$ . Учтем далее, что  $\alpha(L)x = \alpha(L)[y + x_{\pm}(L)] = \alpha(L)y \pm \pi/2$ , причем  $\text{ctg}(\pi/2) = 0$ , так что

$$\text{tg}[\alpha(L)x] = \text{tg}[\alpha(L)y \pm \pi/2] = \{\text{ctg}[\alpha(L)y] \pm [\text{ctg}(\pi/2)]\} \{\text{ctg}[\alpha(L)y] \text{ctg}(\pi/2) \pm 1\}^{-1} = \pm \text{ctg}[\alpha(L)y]. \quad (6)$$

Поскольку вблизи граничных точек величина  $\alpha(L)y=\pi(y/L)\ll 1$ , приближенное разложение для (6) имеет вид  $\operatorname{ctg}[\alpha(L)y] \approx [\alpha(L)y]^{-1} - \frac{1}{3}[\alpha(L)y]^3 + \dots$ . Учитывая здесь в качестве основного только первое (расходящееся) слагаемое, получаем для потенциала (1) ПТ-модели (вблизи граничных точек) следующее приближенное выражение:

$$\begin{aligned} V_{\text{ПТ}}(x;L) &\rightarrow V_{\text{ПТ}}(x \rightarrow x_{\pm}(L);L) = V_{\text{СЧ}}(y;L) \approx V_0(L/\pi)^2 [1/(y_+)^2 + 1/(y_-)^2] = \\ &= V_0(L/\pi)^2 [(x_{\pm}(L)-x)^{-2} + (x_{\mp}(L)-x)^{-2}] = \\ &= V_0(L/\pi)^2 \{(x_{\pm}(L)-x)^2 + (x_{\pm}(L)+x)^2\} [(x_{\pm}(L)-x)^{-2} (x_{\pm}(L)+x)^{-2}]^{-1} = V_0(L^4/\pi^2) \{x^2 - [x_{\pm}(L)]^2\}^{-2}. \quad (7) \end{aligned}$$

Завершая достаточно протяженный (хотя и вполне элементарный) расчет (7), получаем следующий результат:

$$V_{\text{ПТ}}(x;L) \rightarrow V_{\text{ПТ}}(x \rightarrow x_{\pm}(L);L) = V_{\text{СЧ}}(x;L) \approx V_0(L^4/\pi^2) [x^2 - \frac{1}{4}L^2]^{-2}; \quad (8)$$

сравнивая выражение (8) для потенциала частицы в ящике с его «точным» выражением (5), нетрудно видеть, что потенциал (8) обладает достаточно ярко выраженную сингулярность, по структуре совпадающую с (5), так что в пределе  $|x| \rightarrow \frac{1}{2}L$  можно одновременно принять  $V_0 \rightarrow 0$  (сравните с аналогичным двойным пределом в выражении (3)).

3. Волновые функции и энергетический спектр квантовой модели Пёшля–Теллера. Уравнение Шредингера для одномерной модели ПТ-осциллятора имеет, как обычно, вид дифференциального уравнения 2-го порядка  $(d^2/dx^2) + (2m/\hbar^2)[E - V_{\text{ПТ}}(x;L)]\psi(x) = 0$  с потенциалом  $V_{\text{ПТ}}(x;L)$  из (1), точное решение которого можно найти в [2-4]. Наметим основные этапы и результат этого решения. Переходя к безразмерным переменным

$$\xi = \alpha(L)x = (\pi/L)x, \nu(L) = V_0/W(L), \epsilon(L) = (E + V_0)/W(L) = [E/W(L)] + \nu(L), \quad (9)$$

где  $W(L)$  – энергия основного состояния (4) для частицы в ящике. Тогда с учетом равенства  $\operatorname{tg}^2 \xi = (1/\cos^2 \xi) - 1$  уравнение Шредингера для волновой функции основного состояния  $\psi_0(\xi)$  принимает вид

$$d^2\psi/d\xi^2 + [\epsilon(L) - \nu(L)/\cos^2 \xi]\psi = 0. \quad (10)$$

Для свободной частицы (при  $V_0=0, \nu(L)=0$ ) в ящике с конечной шириной  $L$  решением (10) является  $\psi_0(\xi) = \cos \xi$ . Соответственно, при  $\nu(L) \neq 0$  решение (10) должно иметь вид  $\psi(\xi) = (\cos \xi)^{\lambda(L)}$ , где показатель  $\lambda(L) > 0$ , поскольку согласно граничным условиям при  $x=x_{\pm}(L)$  функция  $\psi_0(\xi)$  должна обращаться в нуль при  $\xi_{\pm} = \pm(\pi/2)$ ; из (10) видно, что показатель  $\lambda(L) > 0$  (в частности,  $\lambda(L) = 1$  при  $\nu(L) = 0$ ) должен удовлетворять условию

$$\lambda(L)[\lambda(L) - 1] = \nu(L), \lambda(L) = \frac{1}{2}\{1 + [1 + 4\nu(L)]^{1/2}\}, d\lambda(L)/dL = (1/L)\{2\nu(L)[1 + 4\nu(L)]^{-1/2}\}. \quad (11)$$

Для общего случая возбужденных состояний можно показать [2-4], что полная волновая функция  $\Psi_n(\xi)$  может быть представлена в виде произведения  $\Psi_n(\xi) = C_n(\lambda(L))(\cos \xi)^{\lambda(L)} G_n^{[\lambda(L)]}(\sin \xi)$ , где  $G_n$  – полиномы Гегенбауэра,  $C_n$  – нормировочные постоянные, однако для дальнейших термодинамических вычислений существенно знание только энергетического спектра  $E_n^{\text{ПТ}}(L)$ , который является чисто дискретным и неограниченным сверху ( $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ ):

$$E_n^{\text{ПТ}}(L) = E_n^{\text{СЧ}}(L) + E_n^{\text{ГО}}(L), E_n^{\text{СЧ}}(L) = W(L)n^2, E_n^{\text{ГО}}(L) = \hbar\omega(L)(n + \frac{1}{2}), \hbar\omega(L) = 2W(L)\lambda(L). \quad (12)$$

Учитывая определения (9) и (11), можно представить энергетический спектр (5) в более компактном виде

$$E_n^{\text{ПТ}}(L)=W(L)[n^2+2\lambda(L)n+\lambda(L)]=W(L)\{[n+\lambda(L)]^2-\lambda(L)[\lambda(L)-1]\}, \\ \text{откуда } \varepsilon_n(L)=[n+\lambda(L)]^2 \quad (13)$$

Нетрудно показать, что предельные случаи квантовой модели Пёшля–Теллера, рассмотренные в предыдущем разделе, а именно модель и модель гармонического осциллятора Блоха, имеют место не только на уровне разложения потенциала, но и на уровне энергетического спектра  $E_n^{\text{ПТ}}(L)$ . Действительно, модель свободной частицы в ящике соответствует *конечному* значению  $L$  и отсутствию потенциала внутри ящика ( $V_0 \rightarrow 0$ ), откуда из (11) следует, что  $\lambda(L)=1$ , тогда как  $W(L)$  вообще не меняется. При этом из (12) формально следует, что  $E_n^{\text{СЧ}}(L)=W(L)n^2$  ( $n=0,1,\dots$ ), что дает для энергии основного состояния (при  $n=0$ ) неверное значение  $E_0^{\text{СЧ}}(L)=0$ . Однако, как показано в предыдущем разделе (см. формулу (8) и дальнейший текст), в пределе  $V_0 \rightarrow 0$  энергией свободной частицы в ящике является вся энергия  $E_n^{\text{ПТ}}(L)$ , так что указанный выше промежуточный результат должен быть поправлен за счет вклада слагаемого  $E_n^{\text{ГО}}(L)$ . Действительно, для рассматриваемого случая  $\lambda(L)=1$  получаем из (12), что  $\hbar\omega(L)=2W(L)\lambda(L)=2W(L)$ , откуда сразу следует, что  $E_n^{\text{ГО}}(L)=\hbar\omega(L)(n+\frac{1}{2})=2W(L)(n+\frac{1}{2})$ . Тогда окончательно находим  $E_n^{\text{ПТ}}(L)=W(L)(n^2+2n+1)=W(L)(n+1)^2$  ( $n=0,1,\dots$ ), или в более привычном и естественном виде  $E_n^{\text{СЧ}}(L)=W(L)n^2$  ( $n=1,2,\dots$ ), где  $W(L)$  – известный результат для основного состояния.

Модель осциллятора Блоха получается несколько более сложным путем; действительно, в пределе  $L \rightarrow \infty$ ,  $a(L) \rightarrow 0$  имеем согласно (4)  $W(L)=(\hbar^2/2m)a^2(L) \rightarrow 0$ , так что  $E_n^{\text{СЧ}}(L)=W(L)n^2 \rightarrow 0$ , т.е. вклад в спектр, *квадратичный* по главному квантовому числу  $n$  и характерный для свободной частицы в ящике, полностью исчезает. При этом в полном спектре (12) остается только *линейный* по  $n$  вклад  $E_n^{\text{ГО}}(L)$ , характерный для гармонического осциллятора, причем в блоховском пределе (т.е. при  $L \rightarrow \infty$ ,  $V_0 \rightarrow \infty$ , см. предыдущий раздел) частота этого осциллятора  $\omega(L)$  должна перейти в блоховскую  $\omega_{БО}=(k/m)^{\frac{1}{2}}$ , где величина  $k$  определена в (3). Действительно, для осциллятора Блоха согласно условиям (3) имеем  $v(L)=V_0/W(L) \rightarrow \infty$ , откуда согласно (11) находим  $\lambda(L) \approx (\frac{1}{2})2v(L)^{\frac{1}{2}}=[V_0/W(L)]^{\frac{1}{2}} \rightarrow \infty$ , а с учетом определения (3) получаем окончательно ожидаемый результат:

$$\hbar\omega(L)=2W(L)\lambda(L) \approx 2[V_0W(L)]^{\frac{1}{2}}=2(\hbar^2/2m)^{\frac{1}{2}}[V_0a^2(L)]^{\frac{1}{2}}=2(\hbar^2/2m)^{\frac{1}{2}}[\frac{1}{2}k]^{\frac{1}{2}}=\hbar(k/m)^{\frac{1}{2}} \equiv \hbar\omega_{БО}. \quad (14)$$

**ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.** Было бы интересно более подробно изучить энергетический спектр потенциала ангармонического осциллятора с ангармонизмом четвертого порядка (малым при больших значениях эффективной ширины  $L$ ). Эта модель играет роль промежуточной между двумя предельными случаями свободной частицы и блоховского осциллятора, и мы оставляем соответствующий расчет заинтересованному читателю. Заметим лишь, что влияние ангармонизма существенно изменяет характер энергетического спектра, который перестает быть линейным (и, следовательно, эквидистантным); точнее, к линейному спектру  $E_n^{\text{ГО}}(L)=\hbar\omega(L)(n+\frac{1}{2})$  в низшем порядке теории возмущений добавляется слагаемое  $\Delta E_n(L)=W(L)(n^2+n+\frac{1}{2})$  (см., например, [2-4]). Правда, в более высоких порядках теории возмущений добавляются «нефизические» слагаемые порядка  $n^3$ ,  $n^4$ , ..., отсутствующие в *точном* выражении (12), что явно свидетельствует об ограниченной применимости теории возмущений применительно к сингулярным потенциалам, к которым относится потенциал модели Пёшля–Теллера.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ.** Содержание данной статьи можно кратко резюмировать следующим образом. Как видно из выражений (3) и (8), модель нелинейного сингулярного квантового осциллятора Пёшля–Теллера действительно объединяет две основных модели квантовой механики (в одном измерении), а именно: при низких энергиях (вблизи центра «эффективного ящика») модель ПТ-осциллятора воспроизводит модель линейного гармонического осциллятора Блоха, тогда как при высоких энергиях (вблизи стенок «эффективного ящика») модель ПТ-осциллятора воспроизводит модель (квази)свободной частицы в ящике. Эти выводы подтверждаются точным решением уравнения Шредингера

*Список использованной литературы*

1. Рамбиди Н.Г. От молекул доnanoансамблей. М.: Наука, 2009. – 312 стр.
2. Гольдман И.И., Кривченков В.Д. Сборник задач по квантовой механике. – М.: ГИТТЛ, 1957. – 275 стр.
3. Флюгге З. Задачи по квантовой механике. Том 1. – М.: Мир, 1974. – 378 стр. Зад. 58.
4. Елютин В.П., Кривченков В.Д. Квантовая механика. – М.: Наука, 1976. – 267 стр. Зад. 11.
5. Леонович М.А. Введение в термодинамику. Статистическая физика. М: Наука, 1983. – 416 стр.

УДК ????

**Обобщенный закон Дарси в теории фильтрации:  
пристеночный эффект**

*Rybakov Ю.П. (1) ([soliton4@mail.ru](mailto:soliton4@mail.ru)),  
Семенова Н.В. (1) ([dobroe\\_slovo@inbox.ru](mailto:dobroe_slovo@inbox.ru))  
(1) Российский университет дружбы народов,  
факультет физико-математических и естественных наук*

*Аннотация.* Рассматривается течение жидкости в пористой среде для случая аксиальной симметрии. Оценивается эффективность фильтрации для фильтров двух возможных геометрий: цилиндрической и радиальной. Предлагается обобщение закона фильтрации Дарси и объясняется так называемый пристеночный эффект.

*Ключевые слова:* закон Дарси, фильтрация, поперечная диффузия, пористые среды.

**Generalized Darcy's law in filtration theory: the “near-wall” effect**

*Rybakov Yu.P. (1) ([soliton4@mail.ru](mailto:soliton4@mail.ru)),  
Semenova N.V. (1) ([dobroe\\_slovo@inbox.ru](mailto:dobroe_slovo@inbox.ru))  
(1) Peoples' Friendship University of Russia, Faculty of Science*

*Abstract.* The liquid flow in a porous medium is considered for the axially-symmetric case. The filtration efficiency is estimated for filters of two possible geometries: cylindrical and radial ones. The generalization of the Darcy's filtration law is suggested and the explanation of the so-called “near-wall” effect is given.

*Keywords:* Darcy's law, filtration, transverse diffusion, porous media.