RÉSULTATS SUR QUELQUES OPÉRATEURS DANS L'ESPACE DE HILBERT À POIDS $L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$.

SOUHAIBOU SAMBOU

RÉSUMÉ. Par la L^2 -méthode de Hörmander, on étudie quelques opérateurs dans l'espace de Hilbert à poids $L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$. On prouve dans chaque cas d'opérateur l'existence de son inverse à droite qui est aussi un opérateur borné.

Mots clés: Les opérateurs $\alpha\Delta + c$, $\alpha D^k + c$, $\alpha\bar{\partial}^k + c$ et $\alpha\partial^k\bar{\partial}^k + c$, espace de Hilbert à poids $L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$, L^2 -méthode de Hörmander.

Mathematics Subject Classification (2010) . 32F32.

1. INTRODUCTION

De ce travail, on s'intéresse à une série de conséquences de quelques opérateurs réels et complexes.

Dans le cas réel, on s'intéresse en première partie à l'étude de l'opérateur $\alpha\Delta + c$ où α est une constante réel tel que $|\alpha| \geq 1$ dans l'espace $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$. On a ainsi le résultat suivant:

Théorème 1.1. *Pour tout $f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$, il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$ de l'équation*

$$\alpha\Delta u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-x^2} dx \leq \frac{\alpha^2}{8} \int_{\mathbb{R}} f^2 e^{-x^2} dx.$$

Ce résultat est une conséquence du Théorème 1.1 de [3].

En deuxième partie, on s'intéresse à l'étude de l'opérateur $\alpha D^k + c$ où α est une constante réel tel que $|\alpha| \geq 1$ et $D^k = \frac{d^k}{dx^k}$ dans $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$. Le résultat est le suivant:

Théorème 1.2. *Pour tout $f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$, il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$ de l'équation*

$$\alpha D^k u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-x^2} dx \leq \frac{\alpha^2}{2^k k!} \int_{\mathbb{R}} f^2 e^{-x^2} dx.$$

Ce résultat est une conséquence du Théorème 1.1 de [1].
 Dans le complexe, on s'intéresse en première partie à l'étude de l'opérateur $\alpha\bar{\partial}^k + c$ où α est une constante complexe tel que $|\alpha| \geq 1$ et $\bar{\partial}^k = \frac{\partial^k}{\partial \bar{z}^k}$ dans $L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$. Le résultat est le suivant:

Théorème 1.3. *Pour tout $f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$, il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$ de l'équation*

$$\alpha\bar{\partial}^k u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-|z|^2} d\sigma \leq \frac{|\alpha|^2}{(k!)} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-|z|^2} d\sigma$$

Ce résultat est une conséquence du Théorème 1.1 de [2].
 Et pour finir en dernière partie par l'étude de l'opérateur $\alpha\partial^k\bar{\partial}^k + c$ où α est une constante complexe tel que $|\alpha| \geq 1$, $\bar{\partial}^k = \frac{\partial^k}{\partial \bar{z}^k}$ et $\partial^k = \frac{\partial^k}{\partial z^k}$ dans $L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$. Le résultat est le suivant:

Théorème 1.4. *Pour tout $f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$, il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$ de l'équation*

$$\alpha\partial^k\bar{\partial}^k u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-|z|^2} d\sigma \leq \frac{|\alpha|^2}{(k!)^2} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-|z|^2} d\sigma$$

Ce résultat est une conséquence du Théorème 1.1 de [4].

2. CAS RÉEL

2.1. L'opérateur $\alpha\Delta + c$. Preuve: (Théorème 1.1) Soit $f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$, d'après le Théorème 1.1 de [3], il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$ de l'équation

$$\Delta u + c'u = f$$

où $c' = \frac{c}{\alpha}$ avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-x^2} dx \leq \frac{1}{8} \int_{\mathbb{R}} f^2 e^{-x^2} dx$$

donc

$$\alpha\Delta u + cu = \alpha f.$$

Or $\alpha^2 \geq 1$ donc

$$\frac{1}{8} \int_{\mathbb{R}} f^2 e^{-x^2} dx \leq \frac{\alpha^2}{8} \int_{\mathbb{R}} f^2 e^{-x^2} dx$$

Ainsi

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-x^2} dx \leq \frac{\alpha^2}{8} \int_{\mathbb{R}} f^2 e^{-x^2} dx$$

□

Theorem 2.1. *Il existe un opérateur linéaire et borné*

$$T : L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2}) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$$

tel que

$$(\alpha\Delta + c)T = I$$

avec l'estimation de la norme

$$\|T\|_\varphi \leq \frac{1}{\sqrt{8}}$$

où $\|T\|_\varphi$ est la norme de T dans $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$.

Preuve: Soit $f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$. D'après le théorème 1.1, il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$ telle que

$$\alpha\Delta u + cu = \alpha f$$

avec l'estimation de la norme

$$\|u\|_\varphi \leq \frac{|\alpha|}{\sqrt{8}} \|f\|_\varphi$$

Or $\alpha f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$
donc

$$(\alpha\Delta + c)T(\alpha f) = \alpha f$$

avec

$$\|T(\alpha f)\|_\varphi \leq \frac{|\alpha|}{\sqrt{8}} \|f\|_\varphi.$$

Ainsi

$$(\alpha\Delta + c)T = I$$

avec

$$\|T\|_\varphi \leq \frac{1}{\sqrt{8}}.$$

□

2.2. Quelques conséquences du cas de l'opérateur $\alpha\Delta + c$. Soient $\lambda > 0$ et $x_0 \in \mathbb{C}$. Posons $\varphi = \lambda(x - x_0)^2$, on obtient le corollaire du Théorème 1.1 suivant:

Corollaire 2.2. *Soit $f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-\lambda(x-x_0)^2})$, il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{R}, e^{-\lambda(x-x_0)^2})$ de l'équation*

$$\alpha\Delta u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-\lambda(x-x_0)^2} dx \leq \frac{\alpha^2}{8\lambda^2} \int_{\mathbb{R}} f^2 e^{-\lambda(x-x_0)^2} dx$$

Preuve: Soit $f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-\lambda(x-x_0)^2})$, on a

$$\int_{\mathbb{R}} f^2(x) e^{-\lambda(x-x_0)^2} dx < +\infty.$$

Posons $x = \frac{y}{\sqrt{\lambda}} + x_0$ et $g(y) = f(x) = f(\frac{y}{\sqrt{\lambda}} + x_0)$ alors

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} \int_{\mathbb{R}} g^2(y) e^{-y^2} dy < +\infty.$$

donc $g \in L^2(\mathbb{R}, e^{-y^2})$. D'après le Théorème 1.1, il existe une solution faible $v \in L^2(\mathbb{R}, e^{-y^2})$ de l'équation

$$\alpha \Delta v + \frac{c}{\lambda} v = \alpha g$$

avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{R}} v^2(y) e^{-y^2} dy \leq \frac{\alpha^2}{8} \int_{\mathbb{R}} g^2(y) e^{-y^2} dy.$$

Posons $u(x) = \frac{1}{\lambda} v(y) = \frac{1}{\lambda} v(\sqrt{\lambda}(x-x_0))$.

Alors

$$\alpha \Delta u + cu = \alpha f$$

avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-\lambda(x-x_0)^2} dx \leq \frac{\alpha^2}{8\lambda^2} \int_{\mathbb{R}} f^2 e^{-\lambda^2(x-x_0)^2} dx.$$

□

Comme conséquence du Corollaire 2.6 on a

Corollaire 2.3. *Soit $U \in \mathbb{R}$ un ouvert borné.*

Soit $f \in L^2(U)$, il existe une solution faible $u \in L^2(U)$ de l'équation

$$\alpha \Delta u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et

$$\|u\|_{L^2(U)} \leq \left(\frac{e^{|U|^2} \alpha^2}{8} \right) \|f\|_{L^2(U)}$$

où $|U|$ est le diamètre de U .

Preuve: Soient $x_0 \in U$ et $f \in L^2(U)$, on a

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in U \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus U \end{cases}$$

Donc $\tilde{f} \in L^2(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R}, e^{-(x-x_0)^2})$. D'après le Corollaire 2.6, il existe une solution faible $\tilde{u} \in L^2(\mathbb{R}, e^{-(x-x_0)^2})$ de l'équation

$$\alpha \Delta \tilde{u} + c\tilde{u} = \alpha \tilde{f}$$

avec

$$\int_{\mathbb{R}} \tilde{u}^2 e^{-(x-x_0)^2} dx \leq \frac{\alpha^2}{8} \int_{\mathbb{R}} \tilde{f}^2 e^{-(x-x_0)^2} dx$$

donc

$$\int_{\mathbb{R}} \tilde{u}^2 e^{-(x-x_0)^2} dx \leq \frac{\alpha^2}{8} \int_U f^2 dx$$

or

$$\int_{\mathbb{R}} \tilde{u}^2 e^{-(x-x_0)^2} dx \geq e^{-|U|^2} \int_U \tilde{u}^2 dx$$

ainsi

$$\int_U \tilde{u}^2 dx \leq \left(\frac{e^{|U|^2} \alpha^2}{8} \right) \int_U f^2 dx$$

or $\tilde{u}|_U = u$ alors on a

$$\alpha \Delta u + cu = \alpha f$$

avec

$$\|u\|_{L^2(U)} \leq \left(\frac{e^{|U|^2} \alpha^2}{8} \right) \|f\|_{L^2(U)}.$$

□

2.3. L'opérateur $\alpha D^k + c$. Preuve: (Théorème 1.2) Soit $f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$, d'après le théorème 1.1 de [1], il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$ de l'équation

$$D^k u + c'u = f$$

où $c' = \frac{c}{\alpha}$ avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-x^2} dx \leq \frac{1}{2^k k!} \int_{\mathbb{R}} f^2 e^{-x^2} dx$$

donc

$$\alpha D^k u + cu = \alpha f.$$

Or $\alpha^2 \geq 1$ donc

$$\frac{1}{2^k k!} \int_{\mathbb{R}} f^2 e^{-x^2} dx \leq \frac{\alpha^2}{2^k k!} \int_{\mathbb{R}} f^2 e^{-x^2} dx$$

Ainsi

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-x^2} dx \leq \frac{\alpha^2}{2^k k!} \int_{\mathbb{R}} f^2 e^{-x^2} dx$$

□

Theorem 2.4. *Il existe un opérateur linéaire et borné*

$$T_k : L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2}) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$$

tel que

$$(\alpha D^k + c)T_k = I$$

avec l'estimation de la norme

$$\|T_k\|_{\varphi} \leq \frac{1}{\sqrt{2^k k!}}$$

où $\|T_k\|_{\varphi}$ est la norme de T_k dans $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$.

Preuve: Soit $f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$. D'après le théorème 1.2, il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$ telle que

$$\alpha D^k u + cu = \alpha f$$

avec l'estimation de la norme

$$\|u\|_\varphi \leq \frac{|\alpha|}{\sqrt{2^k k!}} \|f\|_\varphi$$

Or $\alpha f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$

donc

$$(\alpha D^k + c)T_k(\alpha f) = \alpha f$$

avec

$$\|T_k(\alpha f)\|_\varphi \leq \frac{|\alpha|}{\sqrt{2^k k!}} \|f\|_\varphi.$$

Ainsi

$$(\alpha D^k + c)T_k = I$$

avec

$$\|T_k\|_\varphi \leq \frac{1}{\sqrt{2^k k!}}.$$

□

Théorème 2.5. Soit $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$ une fonction strictement convexe. Pour tout $f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-\varphi})$ telle que

$$\frac{f}{\sqrt{D^2\varphi}} \in L^2(\mathbb{R}, e^{-\varphi}),$$

il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{R}, e^{-\varphi})$ de l'équation

$$\alpha D^1 u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-\varphi} dx \leq \alpha^2 \int_{\mathbb{R}} \frac{f^2}{D^2\varphi} e^{-\varphi} dx.$$

Preuve: Soit $f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-\varphi})$ telle que

$$\frac{f}{\sqrt{D^2\varphi}} \in L^2(\mathbb{R}, e^{-\varphi}),$$

d'après le théorème 1.2 de [1], il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{R}, e^{-\varphi})$ de l'équation

$$D^1 u + c'u = f$$

où $c' = \frac{c}{\alpha}$ avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-\varphi} dx \leq \int_{\mathbb{R}} \frac{f^2}{D^2\varphi} e^{-\varphi} dx.$$

donc

$$\alpha D^1 u + cu = \alpha f.$$

Or $|\alpha| \geq 1$ donc

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{f^2}{D^2\varphi} e^{-\varphi} dx \leq \alpha^2 \int_{\mathbb{R}} \frac{f^2}{D^2\varphi} e^{-\varphi} dx.$$

Ainsi

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-\varphi} dx \leq \alpha^2 \int_{\mathbb{R}} \frac{f^2}{D^2\varphi} e^{-\varphi} dx.$$

□

2.4. Quelques conséquences du cas de l'opérateur $\alpha D^k + c$. Soient $\lambda > 0$ et $x_0 \in \mathbb{R}$. Posons $\varphi = \lambda(x - x_0)^2$, on obtient le corollaire du Théorème 1.2 suivant:

Corollaire 2.6. *Soit $f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-\lambda(x-x_0)^2})$, il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{R}, e^{-\lambda(x-x_0)^2})$ de l'équation*

$$\alpha D^k u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-\lambda(x-x_0)^2} dx \leq \frac{\alpha^2}{(2\lambda)^k k!} \int_{\mathbb{R}} f^2 e^{-\lambda(x-x_0)^2} dx$$

Preuve: Soit $f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-\lambda(x-x_0)^2})$, on a

$$\int_{\mathbb{R}} f^2(x) e^{-\lambda(x-x_0)^2} dx < +\infty.$$

Posons $x = \frac{y}{\sqrt{\lambda}} + x_0$ et $g(y) = f(x) = f(\frac{y}{\sqrt{\lambda}} + x_0)$ alors

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} \int_{\mathbb{R}} g^2(y) e^{-y^2} dy < +\infty.$$

donc $g \in L^2(\mathbb{R}, e^{-y^2})$. D'après le Théorème 1.2, il existe une solution faible $v \in L^2(\mathbb{R}, e^{-y^2})$ de l'équation

$$\alpha D^k v + \frac{c}{(\sqrt{\lambda})^k} v = \alpha g$$

avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{R}} v^2(y) e^{-y^2} dy \leq \frac{\alpha^2}{2^k k!} \int_{\mathbb{R}} g^2(y) e^{-y^2} dy.$$

Posons $u(x) = \frac{1}{(\sqrt{\lambda})^k} v(y) = \frac{1}{(\sqrt{\lambda})^k} v(\sqrt{\lambda}(x - x_0))$.

Alors

$$\alpha D^k u + cu = \alpha f$$

avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-\lambda(x-x_0)^2} dx \leq \frac{\alpha^2}{(2\lambda)^k k!} \int_{\mathbb{R}} f^2 e^{-\lambda(x-x_0)^2} dx.$$

□

Comme conséquence du Corollaire 2.6 on a

Corollaire 2.7. Soit $U \in \mathbb{R}$ un ouvert borné.

Soit $f \in L^2(U)$, il existe une solution faible $u \in L^2(U)$ de l'équation

$$\alpha D^k u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et

$$\|u\|_{L^2(U)} \leq \left(\frac{e^{|U|^2} \alpha^2}{(2\lambda)^k k!} \right) \|f\|_{L^2(U)}$$

où $|U|$ est le diamètre de U .

Preuve: Soient $x_0 \in U$ et $f \in L^2(U)$, on a

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in U \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus U \end{cases}$$

Donc $\tilde{f} \in L^2(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R}, e^{-(x-x_0)^2})$. D'après le Corollaire 2.6, il existe une solution faible $\tilde{u} \in L^2(\mathbb{R}, e^{-(x-x_0)^2})$ de l'équation

$$\alpha D^k \tilde{u} + c\tilde{u} = \alpha \tilde{f}$$

avec

$$\int_{\mathbb{R}} \tilde{u}^2 e^{-(x-x_0)^2} dx \leq \frac{\alpha^2}{(2\lambda)^k k!} \int_{\mathbb{R}} \tilde{f}^2 e^{-(x-x_0)^2} dx$$

donc

$$\int_{\mathbb{R}} \tilde{u}^2 e^{-(x-x_0)^2} dx \leq \frac{\alpha^2}{(2\lambda)^k k!} \int_U f^2 dx$$

or

$$\int_{\mathbb{R}} \tilde{u}^2 e^{-(x-x_0)^2} dx \geq e^{-|U|^2} \int_U \tilde{u}^2 dx$$

ainsi

$$\int_U \tilde{u}^2 dx \leq \left(\frac{e^{|U|^2} \alpha^2}{(2\lambda)^k k!} \right) \int_U f^2 dx$$

or $\tilde{u}|_U = u$ alors on a

$$\alpha D^k u + cu = \alpha f$$

avec

$$\|u\|_{L^2(U)} \leq \left(\frac{e^{|U|^2} \alpha^2}{(2\lambda)^k k!} \right) \|f\|_{L^2(U)}.$$

□

3. CAS COMPLEXE

3.1. L'opérateur $\alpha \bar{\partial}^k + c$. **Preuve:** (Théorème 1.3) Soit $f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$, d'après le théorème 1.1 de [2], il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$ de l'équation

$$\bar{\partial}^k u + c'u = f$$

où $c' = \frac{c}{\alpha}$ avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-|z|^2} d\sigma \leq \frac{1}{(k!)} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-|z|^2} d\sigma$$

donc

$$\alpha \bar{\partial}^k u + cu = \alpha f.$$

Or $|\alpha| \geq 1$ donc

$$\frac{1}{(k!)} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-|z|^2} d\sigma \leq \frac{|\alpha|^2}{(k!)} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-|z|^2} d\sigma$$

Ainsi

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-|z|^2} d\sigma \leq \frac{|\alpha|^2}{(k!)} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-|z|^2} d\sigma$$

□

Theorem 3.1. *Il existe un opérateur linéaire et borné*

$$T_k : L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2}) \longrightarrow L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$$

tel que

$$(\alpha \bar{\partial}^k + c)T_k = I$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et l'estimation de la norme

$$\|T_k\|_{\varphi} \leq \frac{1}{(k!)}$$

où $\|T_k\|_{\varphi}$ est la norme de T_k dans $L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$.

Preuve: Soit $f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$. D'après le théorème 1.3, il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$ telle que

$$\alpha \bar{\partial}^k u + cu = \alpha f$$

avec l'estimation de la norme

$$\|u\|_{\varphi} \leq \frac{|\alpha|^2}{(k!)} \|f\|_{\varphi}$$

Or $\alpha f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$

donc

$$(\alpha \bar{\partial}^k + c)T_k(\alpha f) = \alpha f$$

avec

$$\|T_k(\alpha f)\|_{\varphi} \leq \frac{|\alpha|^2}{(k!)} \|f\|_{\varphi}.$$

Ainsi

$$(\alpha \bar{\partial}^k + c)T_k = I$$

avec

$$\|T_k\|_{\varphi} \leq \frac{1}{(k!)}.$$

□

Théorème 3.2. *Soit φ une fonction lisse et strictement positive sur $\mathbb{C}$ avec $\Delta\varphi > 0$. Pour tout $f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\varphi})$ telle que*

$$\frac{f}{\sqrt{\Delta\varphi}} \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\varphi}),$$

il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\varphi})$ de l'équation

$$\alpha\bar{\partial}^1 u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-\varphi} d\sigma \leq 4|\alpha|^2 \int_{\mathbb{C}} \frac{|f|^2}{\Delta\varphi} e^{-\varphi} d\sigma.$$

Preuve: Soit $f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\varphi})$ telle que

$$\frac{f}{\sqrt{\Delta\varphi}} \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\varphi}),$$

d'après le théorème 1.2 de [2], il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\varphi})$ de l'équation

$$\bar{\partial}^1 u + c'u = f$$

où $c' = \frac{c}{\alpha}$ avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-\varphi} d\sigma \leq 4 \int_{\mathbb{C}} \frac{|f|^2}{\Delta\varphi} e^{-\varphi} d\sigma.$$

donc

$$\alpha\bar{\partial}^1 u + cu = \alpha f.$$

Or $|\alpha| \geq 1$ donc

$$4 \int_{\mathbb{C}} \frac{|f|^2}{\Delta\varphi} e^{-\varphi} d\sigma \leq 4|\alpha|^2 \int_{\mathbb{C}} \frac{|f|^2}{\Delta\varphi} e^{-\varphi} d\sigma.$$

Ainsi

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-\varphi} d\sigma \leq 4|\alpha|^2 \int_{\mathbb{C}} \frac{|f|^2}{\Delta\varphi} e^{-\varphi} d\sigma.$$

□

3.2. Quelques conséquences du cas de l'opérateur $\alpha\bar{\partial}^k + c$. Soient $\lambda > 0$ et $z_0 \in \mathbb{C}$. Posons $\varphi = \lambda|z - z_0|^2$, on obtient le corollaire du Théorème 1.3 suivant:

Corollaire 3.3. *Soit $f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\lambda|z-z_0|^2})$, il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\lambda|z-z_0|^2})$ de l'équation*

$$\alpha\bar{\partial}^k u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-\lambda|z-z_0|^2} d\sigma \leq \frac{|\alpha|^2}{\lambda^k k!} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-\lambda|z-z_0|^2} d\sigma$$

Preuve: Soit $f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\lambda|z-z_0|^2})$, on a

$$\int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-\lambda|z-z_0|^2} d\sigma < +\infty.$$

Posons $z = \frac{w}{\lambda} + z_0$ et $g(w) = f(z) = f(\frac{w}{\lambda} + z_0)$ alors

$$\frac{1}{\lambda} \int_{\mathbb{C}} |g|^2 e^{-|w|^2} d\sigma(w) < +\infty.$$

donc $g \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|w|^2})$. D'après le Théorème 1.3, il existe une solution faible $v \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|w|^2})$ de l'équation

$$\alpha \bar{\partial}^k v + \frac{c}{(\sqrt{\lambda})^k} v = \alpha g$$

avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{C}} |v|^2 e^{-|w|^2} d\sigma(w) \leq \frac{|\alpha|^2}{k!} \int_{\mathbb{C}} |g|^2 e^{-|w|^2} d\sigma(w).$$

Posons $u(z) = \frac{1}{(\sqrt{\lambda})^k} v(w) = \frac{1}{(\sqrt{\lambda})^k} v(\sqrt{\lambda}(z - z_0))$.

Alors

$$\alpha \bar{\partial}^k u + cu = \alpha f$$

avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-\lambda|z-z_0|^2} d\sigma \leq \frac{|\alpha|^2}{\lambda^k k!} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-\lambda|z-z_0|^2} d\sigma.$$

□

Comme conséquence du Corollaire 3.3 on a

Corollaire 3.4. *Soit $U \in \mathbb{C}$ un ouvert borné.*

Soit $f \in L^2(U)$, il existe une solution faible $u \in L^2(U)$ de l'équation

$$\alpha \bar{\partial}^k u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et

$$\|u\|_{L^2(U)} \leq \left(\frac{e^{|U|^2} |\alpha|^2}{k!} \right) \|f\|_{L^2(U)}$$

où $|U|$ est le diamètre de U .

Preuve: Soient $z_0 \in U$ et $f \in L^2(U)$, on a

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} f(z) & \text{si } z \in U \\ 0 & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus U \end{cases}$$

Donc $\tilde{f} \in L^2(\mathbb{C}) \subset L^2(\mathbb{C}, e^{-|z-z_0|^2})$. D'après le Corollaire 3.3, il existe une solution faible $\tilde{u} \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z-z_0|^2})$ de l'équation

$$\alpha \bar{\partial}^k \tilde{u} + c\tilde{u} = \alpha \tilde{f}$$

avec

$$\int_{\mathbb{C}} |\tilde{u}|^2 e^{-|z-z_0|^2} d\sigma \leq \frac{|\alpha|^2}{k!} \int_{\mathbb{C}} |\tilde{f}|^2 e^{-|z-z_0|^2} d\sigma$$

donc

$$\int_{\mathbb{C}} |\tilde{u}|^2 e^{-|z-z_0|^2} d\sigma \leq \frac{|\alpha|^2}{k!} \int_U |f|^2 d\sigma$$

or

$$\int_{\mathbb{C}} |\tilde{u}|^2 e^{-|z-z_0|^2} d\sigma \geq e^{-|U|^2} \int_U |\tilde{u}|^2 d\sigma$$

ainsi

$$\int_U |\tilde{u}|^2 d\sigma \leq \left(\frac{e^{|U|^2} |\alpha|^2}{k!} \right) \int_U |f|^2 d\sigma$$

or $\tilde{u}|_U = u$ alors on a

$$\alpha \bar{\partial}^k u + cu = \alpha f$$

avec

$$\|u\|_{L^2(U)} \leq \left(\frac{e^{|U|^2} |\alpha|^2}{k!} \right) \|f\|_{L^2(U)}.$$

□

3.3. L'opérateur $\alpha \bar{\partial}^k \bar{\partial}^k + c$. Preuve: (Théorème 1.4) Soit $f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$, d'après le théorème 1.1 de [4], il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$ de l'équation

$$\partial^k \bar{\partial}^k u + c'u = f$$

où $c' = \frac{c}{\alpha}$ avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-|z|^2} d\sigma \leq \frac{1}{(k!)^2} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-|z|^2} d\sigma$$

donc

$$\alpha \bar{\partial}^k \bar{\partial}^k u + cu = \alpha f.$$

Or $|\alpha| \geq 1$ donc

$$\frac{1}{(k!)^2} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-|z|^2} d\sigma \leq \frac{|\alpha|^2}{(k!)^2} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-|z|^2} d\sigma$$

Ainsi

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-|z|^2} d\sigma \leq \frac{|\alpha|^2}{(k!)^2} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-|z|^2} d\sigma$$

□

Theorem 3.5. *Il existe un opérateur linéaire et borné*

$$T_k : L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2}) \longrightarrow L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$$

tel que

$$(\alpha \bar{\partial}^k \bar{\partial}^k + c)T_k = I$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et l'estimation de la norme

$$\|T_k\|_{\varphi} \leq \frac{1}{(k!)^2}$$

où $\|T_k\|_{\varphi}$ est la norme de T_k dans $L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$.

Preuve: Soit $f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$. D'après le théorème 1.4, il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$ telle que

$$\alpha \partial^k \bar{\partial}^k u + cu = \alpha f$$

avec l'estimation de la norme

$$\|u\|_\varphi \leq \frac{|\alpha|^2}{(k!)^2} \|f\|_\varphi$$

Or $\alpha f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$

donc

$$(\alpha \partial^k \bar{\partial}^k + c) T_k(\alpha f) = \alpha f$$

avec

$$\|T_k(\alpha f)\|_\varphi \leq \frac{|\alpha|^2}{(k!)^2} \|f\|_\varphi.$$

Ainsi

$$(\alpha \partial^k \bar{\partial}^k + c) T_k = I$$

avec

$$\|T_k\|_\varphi \leq \frac{1}{(k!)^2}.$$

□

Théorème 3.6. Soit φ une fonction lisse et strictement positive sur $\mathbb{C}$ avec $\Delta(e^\varphi \Delta e^{-\varphi}) > 0$. Pour tout $f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\varphi})$ telle que

$$\frac{f}{\sqrt{\Delta(e^\varphi \Delta e^{-\varphi})}} \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\varphi}),$$

il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\varphi})$ de l'équation

$$\alpha \partial^1 \bar{\partial}^1 u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-\varphi} d\sigma \leq 16 |\alpha|^2 \int_{\mathbb{C}} \frac{|f|^2}{\Delta(e^\varphi \Delta e^{-\varphi})} e^{-\varphi} d\sigma.$$

Preuve: Soit $f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\varphi})$ telle que

$$\frac{f}{\sqrt{\Delta(e^\varphi \Delta e^{-\varphi})}} \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\varphi}),$$

d'après le théorème 1.2 de [4], il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\varphi})$ de l'équation

$$\partial^1 \bar{\partial}^1 u + c'u = f$$

où $c' = \frac{c}{\alpha}$ avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-\varphi} d\sigma \leq 16 \int_{\mathbb{C}} \frac{|f|^2}{\Delta(e^\varphi \Delta e^{-\varphi})} e^{-\varphi} d\sigma.$$

donc

$$\alpha \partial^1 \bar{\partial}^1 u + cu = \alpha f.$$

Or $|\alpha| \geq 1$ donc

$$16 \int_{\mathbb{C}} \frac{|f|^2}{\Delta(e^\varphi \Delta e^{-\varphi})} e^{-\varphi} d\sigma \leq 16|\alpha|^2 \int_{\mathbb{C}} \frac{|f|^2}{\Delta(e^\varphi \Delta e^{-\varphi})} e^{-\varphi} d\sigma.$$

Ainsi

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-\varphi} d\sigma \leq 16|\alpha|^2 \int_{\mathbb{C}} \frac{|f|^2}{\Delta(e^\varphi \Delta e^{-\varphi})} e^{-\varphi} d\sigma.$$

□

3.4. Quelques conséquences du cas de l'opérateur $\alpha \partial^k \bar{\partial}^k + c$. Soient $\lambda > 0$ et $z_0 \in \mathbb{C}$. Posons $\varphi = \lambda^2 |z - z_0|^2$, on obtient le corollaire du Théorème 1.4 suivant:

Corollaire 3.7. *Soit $f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\lambda^2 |z - z_0|^2})$, il existe une solution faible $u \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\lambda^2 |z - z_0|^2})$ de l'équation*

$$\alpha \partial^k \bar{\partial}^k u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-\lambda^2 |z - z_0|^2} d\sigma \leq \frac{|\alpha|^2}{(\lambda^k k!)^2} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-\lambda^2 |z - z_0|^2} d\sigma$$

Preuve: Soit $f \in L^2(\mathbb{C}, e^{-\lambda^2 |z - z_0|^2})$, on a

$$\int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-\lambda^2 |z - z_0|^2} d\sigma < +\infty.$$

Posons $z = \frac{w}{\lambda} + z_0$ et $g(w) = f(z) = f(\frac{w}{\lambda} + z_0)$ alors

$$\frac{1}{\lambda^2} \int_{\mathbb{C}} |g|^2 e^{-|w|^2} d\sigma(w) < +\infty.$$

donc $g \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|w|^2})$. D'après le Théorème 1.4, il existe une solution faible $v \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|w|^2})$ de l'équation

$$\alpha \partial^k \bar{\partial}^k v + \frac{c}{\lambda^k} v = \alpha g$$

avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{C}} |v|^2 e^{-|w|^2} d\sigma(w) \leq \frac{|\alpha|^2}{(k!)^2} \int_{\mathbb{C}} |g|^2 e^{-|w|^2} d\sigma(w).$$

Posons $u(z) = \frac{1}{\lambda^k} v(w) = \frac{1}{\lambda^k} v(\lambda(z - z_0))$.

Alors

$$\alpha \partial^k \bar{\partial}^k u + cu = \alpha f$$

avec l'estimation de la norme

$$\int_{\mathbb{C}} |u|^2 e^{-\lambda^2 |z - z_0|^2} d\sigma \leq \frac{|\alpha|^2}{(\lambda^k k!)^2} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-\lambda^2 |z - z_0|^2} d\sigma.$$

□

Comme conséquence du Corollaire 3.7 on a

Corollaire 3.8. *Soit $U \in \mathbb{C}$ un ouvert borné.*

Soit $f \in L^2(U)$, il existe une solution faible $u \in L^2(U)$ de l'équation

$$\alpha \partial^k \bar{\partial}^k u + cu = \alpha f$$

avec $|\alpha| \geq 1$ et

$$\|u\|_{L^2(U)} \leq \left(\frac{e^{|U|^2} |\alpha|^2}{(k!)^2} \right) \|f\|_{L^2(U)}$$

où $|U|$ est le diamètre de U .

Preuve: Soient $z_0 \in U$ et $f \in L^2(U)$, on a

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} f(z) & \text{si } z \in U \\ 0 & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus U \end{cases}$$

Donc $\tilde{f} \in L^2(\mathbb{C}) \subset L^2(\mathbb{C}, e^{-|z-z_0|^2})$. D'après le Corollaire 3.7, il existe une solution faible $\tilde{u} \in L^2(\mathbb{C}, e^{-|z-z_0|^2})$ de l'équation

$$\alpha \partial^k \bar{\partial}^k \tilde{u} + c\tilde{u} = \alpha \tilde{f}$$

avec

$$\int_{\mathbb{C}} |\tilde{u}|^2 e^{-|z-z_0|^2} d\sigma \leq \frac{|\alpha|^2}{(k!)^2} \int_{\mathbb{C}} |\tilde{f}|^2 e^{-|z-z_0|^2} d\sigma$$

donc

$$\int_{\mathbb{C}} |\tilde{u}|^2 e^{-|z-z_0|^2} d\sigma \leq \frac{|\alpha|^2}{(k!)^2} \int_U |f|^2 d\sigma$$

or

$$\int_{\mathbb{C}} |\tilde{u}|^2 e^{-|z-z_0|^2} d\sigma \geq e^{-|U|^2} \int_U |\tilde{u}|^2 d\sigma$$

ainsi

$$\int_U |\tilde{u}|^2 d\sigma \leq \left(\frac{e^{|U|^2} |\alpha|^2}{(k!)^2} \right) \int_U |f|^2 d\sigma$$

or $\tilde{u}|_U = u$ alors on a

$$\alpha \partial^k \bar{\partial}^k u + cu = \alpha f$$

avec

$$\|u\|_{L^2(U)} \leq \left(\frac{e^{|U|^2} |\alpha|^2}{(k!)^2} \right) \|f\|_{L^2(U)}.$$

□

REFERENCES

- [1] S. Dai, Y. Pan, A right inverse of differential operator $\frac{d^k}{dx^k} + a$ in Weighted Hilbert space $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$, J. Math. Anal. Appl. 486 (2020) 123890.
- [2] S. Dai, Y. Pan, A right inverse of Cauchy-Riemann operator $\bar{\partial}^k + a$ in Weighted Hilbert space $L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$, a paraitre aux Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse.
- [3] S. Dai, Y. Liu, Y. Pan, A right inverse of differential operator $\Delta + a$ in Weighted Hilbert space $L^2(\mathbb{R}^n, e^{-x^2})$, *arXiv* : 1909.12477v1.

- [4] S. Sambou, P. Badiane, E. Bodian, W. O. Ingoba, S. Sambou, Etude de l'opérateur $\partial^k \bar{\partial}^k + c$ dans l'espace de Hilbert à poids $L^2(\mathbb{C}, e^{-|z|^2})$

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES, UFR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES,
UNIVERSITÉ ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR, BP: 523 (SÉNÉGAL)
Email address: s.sambou1440@zig.univ.sn