

**LA MATRICE DE LOGARITHME EN TERMES DE CHIFFRES
 p -ADIQUES
 (THE LOGARITHM MATRIX IN TERMS OF p -ADIC DIGITS)**

FLORIAN SPRUNG

RÉSUMÉ. Nous donnons une nouvelle description de la matrice de logarithme d'une forme modulaire en termes de distributions, généralisant le travail de Dion et Lei pour le cas $a_p = 0$. Ce qui nous permet d'inclure le cas $a_p \neq 0$ est une nouvelle définition, celle d'une matrice de distributions, et la caractérisation de cette matrice par de chiffres p -adiques. On peut appliquer ces méthodes au cas correspondant d'une distribution à plusieurs variables.

(We give a new description of the logarithm matrix of a modular form in terms of distributions, generalizing the work of Dion and Lei for the case $a_p = 0$. What allows us to include the case $a_p \neq 0$ is a new definition, that of a distribution matrix, and the characterization of this matrix by p -adic digits. One can apply these methods to the corresponding case of distributions in multiple variables.)

1. INTRODUCTION

Soit $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ une forme parabolique de poids 2 propre pour les opérateurs de Hecke telle que $a_1 = 1$ et de Nebentypus ϵ . Soit p un nombre premier tel que p ne divise pas le conducteur de f . Par exemple, on peut prendre pour f la forme associée à une courbe elliptique telle qu'elle ait bonne réduction en p (ordinaire ou supersingulière). Une construction due à Mazur–Swinnerton-Dyer, Amice–Vélu et Višik [6, 1, 11] nous permet d'associer des fonctions L p -adiques L_λ pour chaque racine λ du polynôme $X^2 - a_p X + \epsilon(p)p$ de Hecke telle que $v_p(\lambda) < 1$, où v_p et la valuation p -adique telle que $v_p(p) = 1$.

Dans le cas ordinaire, où $v_p(\lambda) = 0$, on peut utiliser L_λ pour formuler une conjecture principale d'Iwasawa, voir par exemple [6]. Dans le cas supersingulier, où $v_p(\lambda) > 0$, la situation n'est pas idéale : Il y a deux choix α et β pour la racine λ , et les deux fonctions L_α et L_β sont analytiques, mais ne sont pas bornées sur le disque compact \mathbf{Z}_p comme dans le cas ordinaire. Néanmoins, il existe une factorisation de type distribution=mesure \times distribution

$$(L_\alpha, L_\beta) = (L_\sharp, L_\flat) \mathcal{L}og_{a_p}$$

où $\mathcal{L}og_{a_p}$ est une matrice de dimension 2×2 . Comme les deux fonctions L_\sharp et L_\flat sont des fonctions analytiques bornées sur \mathbf{Z}_p , elles sont plus convenables pour formuler des conjectures principales, voir [4] pour le cas $a_p = 0$ et [10] pour le cas général pour les courbes elliptiques.

Les coefficients de $\mathcal{L}og_{a_p}$ (la matrice de logarithme) sont des distributions (après avoir identifié ces fonctions analytiques avec leurs distributions, voir [2, Théorème 1.3]) de mêmes ordres que celles de L_α et L_β . Dans le cas $a_p = 0$, les coefficients

de $\mathcal{L}og_{a_p}$ sont des produits infinis de polynômes cyclotomiques, les logarithmes p -adiques signés dus à Pollack [7]. Dion et Lei [3] ont donné une description concrète des distributions dont la transformée d'Amice–Mahler sont ces logarithmes signés.

Dans le cas général, on peut définir $\mathcal{L}og_{a_p}$ comme un produit infini de matrices [9] qui contient les polynômes cyclotomiques. Dans le cas ordinaire, seulement les termes de la première colonne de $\mathcal{L}og_{a_p}$ convergent.

Le résultat principal généralise le résultat de Dion–Lei au cas général et nous fournit une caractérisation de la matrice $\mathcal{L}og_{a_p}$ par des chiffres p -adiques.

On appelle une matrice $\begin{pmatrix} \mu_{11} & \mu_{12} \\ \mu_{21} & \mu_{22} \end{pmatrix}$ de distributions μ_{11} , etc. une *matrice de distributions*. Pour simplifier la version du théorème dans l'introduction, on suppose ici que $\epsilon(p) = 1$.

Théorème 1.1. *Soit $b \in \mathbf{Z}_p$ tel que*

$$b \equiv b_0 + b_1 p^1 + \cdots + b_{n-1} p^{n-1} \pmod{p^n} \text{ avec } b_i \in \{0, \dots, p-1\}.$$

Soit μ_{a_p} la matrice des distributions dont sa transformée est $\mathcal{L}og_{a_p}$. (Dans le cas ordinaire, on ignore simplement la deuxième colonne.)

On dénote par m_1, \dots, m_l les longueurs des chaînes des chiffres $= 0$:

$$(b_0, \dots, b_{n-1}) = \underbrace{(0, \dots, 0)}_{m_1}, \neq 0, \underbrace{0, \dots, 0}_{m_2}, \neq 0, \dots, \neq 0, \underbrace{0, \dots, 0}_{m_l}$$

Alors la matrice μ_{a_p} est caractérisée par

$$\mu_{a_p}(b + p^n \mathbf{Z}_p) = \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{m_1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{m_2} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{m_l} R_n,$$

c.-à-d. la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ représente un chiffre non nul et la matrice $\begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ représente le chiffre 0. (Dans le cas ordinaire, cela caractérise la première colonne, comme on a ignoré la deuxième.)

Pour la définition de R_n , voir Section 2. Si p est impair, on a $R_n = \frac{1}{p^{2+n}} \begin{pmatrix} -\beta^{n+2} & -\alpha^{n+2} \\ \beta^{n+3+n} & \alpha^{n+3} \end{pmatrix}$.

Quelques observations sur le produit des matrices :

- (1) On a $\mu_{a_p}(b + p^n \mathbf{Z}_p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ si on a deux chiffres non nuls consécutifs.
- (2) Si $a_p = 0$, on a $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{m_i} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ pour m_i pair. Par conséquent, si un nombre pair de 0s sépare deux chiffres non nuls, on a automatiquement $\mu_{a_p}(b + p^n \mathbf{Z}_p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Mais si m_2, \dots, m_l sont tous impairs, le produit n'est pas $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. (On obtient $\begin{pmatrix} 0 & \pm 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} R_n$ ou $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} R_n$.) C'est-à-dire, $\mu_{a_p}(b + p^n \mathbf{Z}_p)$ peut être non nulle si et seulement si tous les chiffres impairs de b sont 0 ou tous les chiffres pairs le sont. Cela explique la définition des ensembles S_n^\pm dans [3].

Il y existe divers analogues de la matrice de logarithme qui jouent un rôle important dans les travaux de Lei, Loeffler, Zerbes et Büyükboduk (mais la construction est différente – ils utilisent la théorie de modules de Wach). Voir par exemple [8] pour une théorie récente. La question d'étudier leurs matrices de distributions provenant de la théorie des modules de Wach semble très intéressante.

2. DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS DE LA MATRICE À LOGARITHME

Nous rappelons la définition de la matrice de logarithme définie dans [9]. Soit $\Phi_{p^n}(X) = \sum_{i \geq 0}^{p-1} X^{ip^{n-1}}$ le p^n -ième polynôme cyclotomique. Nous dénotons $\epsilon(p) = \pm 1$ simplement par ϵ . On pose

$$\mathcal{L}og_{a_p}^{(n)}(1+T) := \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -\epsilon \Phi_p(1+T) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -\epsilon \Phi_{p^2}(1+T) & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -\epsilon \Phi_{p^n}(1+T) & 0 \end{pmatrix} R_n$$

où R_n dénote la matrice de racines. Cette matrice dépend des racines α et β du polynôme de Hecke $X^2 - a_p X + \epsilon p = 0$ que l'on choisit telles que $|\alpha| \geq |\beta|$ pour une valeur absolue p -adique quelconque. La matrice R_n est définie par

$$R_n := \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -\epsilon p & 0 \end{pmatrix}^{-2-n} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} = \frac{1}{p^{2+n}} \begin{pmatrix} -\beta^{2+n} & -\alpha^{2+n} \\ \beta^{3+n} & \alpha^{3+n} \end{pmatrix}$$

si $p \geq 3$, et

$$R_n := \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -\epsilon p & 0 \end{pmatrix}^{-3-n} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} = \frac{1}{p^{3+n}} \begin{pmatrix} -\beta^{3+n} & -\alpha^{3+n} \\ \beta^{4+n} & \alpha^{4+n} \end{pmatrix}$$

si $p = 2$.¹

Définition 2.1. La matrice de logarithme est $\mathcal{L}og_{a_p}(1+T) := \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{L}og_{a_p}^{(n)}(1+T)$.

Lemme 2.2. Les termes de $\mathcal{L}og_{a_p}(1+T)$ convergent vers des séries dans $\mathbb{Q}_p(\alpha)[[T]]$ si $|a_p| > 0$ (cas supersingulier) et on peut dire de même sur les termes dans la première colonne si $|a_p| = 0$. De plus, on sait évaluer $\mathcal{L}og_{a_p}(T)$ au point $T = \zeta_k - 1$, où ζ_k dénote une racine p^k -ième primitive :

$$\mathcal{L}og_{a_p}(\zeta_k) = \mathcal{L}og_{a_p}^{(k)}(\zeta_k)$$

Démonstration. [9, Lemma 4.8] ou [10, Lemma 4.4] ; l'observation clé est que $\Phi_{p^i}(\zeta_k) = p$ si $i > k$. \square

3. MATRICES À DISTRIBUTION

Définition 3.1. La *transformée* (d'Amice–Mahler) d'une distribution μ sur \mathbb{Z}_p est

$$A_\mu(T) = \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x \mu(x).$$

Définition 3.2. Étant donné $n \times n$ distributions $\mu_{11}, \mu_{12}, \dots, \mu_{1n}, \mu_{21}, \dots, \mu_{nn}$, la *matrice de distributions* est la matrice

$$\mu := \begin{pmatrix} \mu_{11} & \mu_{12} & \cdots & \mu_{1n} \\ \mu_{21} & \cdots & \cdots & \mu_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \mu_{n1} & \cdots & \cdots & \mu_{nn} \end{pmatrix}.$$

¹Il nous semble qu'il y a une très petite erreur dans [3] : Dans [3], tous les résultats nécessitent l'hypothèse $p > 2$. (La première formule [3, Formule 1] est incorrecte si $p = 2$. La formule correcte de Pollack est $L_\lambda = \log_p^- L_+ + \frac{1}{2} \log_p^+ L_-$ si $p = 2$, voir [7, Theorem 5.6].)

Définition 3.3. La *transformée* d'une matrice de distributions μ comme ci-dessus est

$$A_\mu(T) := \int_{\mathbf{Z}_p} (1+T)^x \mu(x) := \begin{pmatrix} \int_{\mathbf{Z}_p} (1+T)^x \mu_{11}(x) & \int_{\mathbf{Z}_p} (1+T)^x \mu_{12}(x) & \cdots & \int_{\mathbf{Z}_p} (1+T)^x \mu_{1n}(x) \\ \int_{\mathbf{Z}_p} (1+T)^x \mu_{21}(x) & \cdots & \cdots & \int_{\mathbf{Z}_p} (1+T)^x \mu_{2n}(x) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \int_{\mathbf{Z}_p} (1+T)^x \mu_{n1}(x) & \cdots & \cdots & \int_{\mathbf{Z}_p} (1+T)^x \mu_{nn}(x) \end{pmatrix}.$$

4. LE THÉORÈME

Théorème 4.1. Soit $b \in \mathbf{Z}_p$ tel que

$$b \equiv b_0 + b_1 p^1 + \cdots + b_{n-1} p^{n-1} \pmod{p^n} \text{ avec } b_i \in \{0, \dots, p-1\}.$$

Soit μ_{a_p} la matrice des distributions dont sa transformée est Log_{a_p} . (Dans le cas ordinaire, on ignore simplement la deuxième colonne.)

On dénote par m_1, \dots, m_l les longueurs des chaînes des chiffres $= 0$:

$$(b_0, \dots, b_{n-1}) = (\underbrace{0, \dots, 0}_{m_1}, \neq 0, \underbrace{0, \dots, 0}_{m_2}, \neq 0, \dots, \neq 0, \underbrace{0, \dots, 0}_{m_l})$$

Alors on a

$$\mu_{a_p}(b + p^n \mathbf{Z}_p) = \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -\epsilon & 0 \end{pmatrix}^{m_1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\epsilon & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -\epsilon & 0 \end{pmatrix}^{m_2} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\epsilon & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\epsilon & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -\epsilon & 0 \end{pmatrix}^{m_l} R_n,$$

c.-à-d. la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\epsilon & 0 \end{pmatrix}$ représente un chiffre non nul et la matrice $\begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -\epsilon & 0 \end{pmatrix}$ représente le chiffre 0. (Dans le cas ordinaire, on ignore la deuxième colonne après avoir calculé le produit des matrices.)

De plus, la matrice μ_{a_p} est caractérisée par ce théorème si $|a_p| > 0$, c.-à-d. dans le cas supersingulier. Dans le cas ordinaire, on peut dire de même sur les termes de la première colonne de la matrice μ_{a_p} .

Démonstration. Soit $\mathbb{1}_{b+p^n \mathbf{Z}_p}(x)$ la fonction caractéristique de $b + p^n \mathbf{Z}_p$. On a

$$\mathbb{1}_{b+p^n \mathbf{Z}_p}(x) = \frac{1}{p^n} \sum_{\zeta \in \mu_{p^n}} \zeta^{x-b}.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \mu_{a_p}(b + p^n \mathbf{Z}_p) &= \int_{\mathbf{Z}_p} \mathbb{1}_{b+p^n \mathbf{Z}_p}(x) \mu_{a_p}(x) = \sum_{\zeta \in \mu_{p^n}} \frac{1}{p^n} \int_{\mathbf{Z}_p} \zeta^{x-b} \mu_{a_p}(x) \\ &= \frac{1}{p^n} \sum_{\zeta \in \mu_{p^n}} \zeta^{-b} \int_{\mathbf{Z}_p} \zeta^x \mu_{a_p}(x) = \frac{1}{p^n} \sum_{\zeta \in \mu_{p^n}} \zeta^{-b} \text{Log}_{a_p}(\zeta). \end{aligned}$$

Pour calculer cette somme, on utilise la Proposition 4.2 ci-dessous. La caractérisation suit du fait que les entrées dans Log_{a_p} (dans le cas supersingulier) et les entrées dans la première colonne de Log_{a_p} (cas ordinaire) sont des distributions d'ordre $o(\log_p(1+T))$, voir [9, Proposition 4.20]. \square

Proposition 4.2. *Soit $b = b_0 + b_1p^1 + \dots + b_{n-1}p^{n-1}$ avec $b_i \in \{0, \dots, p-1\}$. Pour chaque b_i , on définit (sa représentation chromatique) par*

$$Y_i = \begin{cases} \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -\varepsilon & 0 \end{pmatrix} & \text{si } b_i = 0 \text{ et} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -\varepsilon & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\varepsilon & 0 \end{pmatrix} & \text{si } b_i \neq 0. \end{cases}$$

Alors

$$\sum_{\zeta \in \mu_{p^n}} \zeta^{-b} \mathcal{L}og_{a_p}(\zeta) = p^n Y_0 Y_1 \dots Y_{n-1} R_n.$$

5. DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION

Lemme 5.1. *Soit*

$$P(x) = \sum_{\substack{i \leq p^n - 1 \\ i \geq -(p^n - 1)}} c_i x^i \in \mathbb{C}_p[x, x^{-1}],$$

où \mathbb{C}_p dénote les nombres complexes p -adiques. On a alors

$$\sum_{\zeta \in \mu_{p^n}} P(\zeta) = c_0 p^n.$$

Démonstration. On a $\sum_{\zeta \in \mu_{p^n}} \zeta^k = \begin{cases} p^n & \text{si } k \equiv 0 \pmod{p^n} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$ □

Démonstration de la Proposition. Il suit du Lemme 2.2 que

$$\zeta^{-b} \mathcal{L}og_{a_p}(\zeta) = \zeta^{-b} \mathcal{L}og_{a_p}^{(n)}(\zeta),$$

alors chaque terme est de la forme $P(\zeta)$ pour des polynômes de Laurent $P(x)$ comme dans le Lemme 5.1 (où l'on autorise les puissances négatives). En appliquant ce lemme 5.1, on voit que

$$\sum_{\zeta \in \mu_{p^n}} \zeta^{-b} \mathcal{L}og_{a_p}(\zeta) = p^n \times \text{matrice des termes constants dans } x^{-b} \mathcal{L}og_{a_p}^{(n)}(x).$$

Montrons alors que les termes constants sont donnés comme dans l'énoncé de la proposition. Posons

$$\varphi_i(x) := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \Phi_{p^i}(x) \end{pmatrix} \text{ et } Y := \begin{pmatrix} a_p & 1 \\ -\varepsilon & 0 \end{pmatrix}.$$

Par définition, on a

$$\mathcal{L}og_{a_p}^{(n)}(x) = \varphi_0(x) Y \varphi_1(x) \dots Y \varphi_{n-1}(x) Y R_n,$$

et aussi

$$x^{-b} = x^{-b_0} x^{-b_1 p} \dots x^{-b_{n-1} p^{n-1}}.$$

En combinant ces deux observations, on a

$$x^{-b} \mathcal{L}og_{a_p}^{(n)}(x) = x^{-b_0} \varphi_0(x) Y x^{-b_1 p} \varphi_1(x) \dots Y x^{-b_{n-1} p^{n-1}} \varphi_{n-1}(x) Y R_n.$$

En notant que

$$x^{-b_i} \varphi_{i+1} = \begin{pmatrix} x^{-b_i} & 0 \\ 0 & \sum_{k \geq 0}^{p-1} x^{(k-b_i)p^i} \end{pmatrix},$$

on voit que les termes dans $x^{-b}\mathcal{L}og_{a_p}^{(n)}(x)$ sont des combinaisons linéaires des termes de la forme $x^{j_i p^i}$ avec $j_i \in \{-(p-1), \dots, 0, \dots, (p-1)\}$.

Mais on cherche les termes constants, c.-à-d. la contribution des (multiples des) termes $x^{j_i p^i}$ avec $j_i = 0$.

Comme il n'y a pas d'annulation des puissances de x dans les divers termes de la forme $x^{-b_i p^i} \varphi_i(x)Y$, on peut analyser chaque terme $x^{-b_i p^i} \varphi_i(x)Y$ pour ses contributions au terme constant :

$$\text{Cette contribution est exactement } Y_i = \begin{cases} 1 \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times Y & \text{si } b_i = 0 \\ x^{-b_i p^i} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & x^{b_i p^i} \end{pmatrix} \times Y & \text{si } b_i \neq 0. \end{cases} \quad \square$$

Remarque 5.2. *On peut appliquer les méthodes du théorème au cas d'un produit de Kronecker des matrices à logarithmes à plusieurs variables. Dans le cas supersingulier de deux variables, cela donne une description en termes de chiffres p -adiques de la matrice de logarithme de Lei [5], généralisant [3, Section 4].*

RÉFÉRENCES

- [1] Yvette AMICE et Jacques VÉLU : Distributions p -adiques associées aux séries de Hecke. pages 119–131. Astérisque, Nos. 24–25, 1975.
- [2] Pierre COLMEZ : Fonctions L p -adiques. Numéro 266, pages Exp. No. 851, 3, 21–58. 2000. Séminaire Bourbaki, Vol. 1998/99.
- [3] Cédric DION et Antonio LEI : Plus and minus logarithms and Amice transform. *C. R. Math. Acad. Sci. Paris*, 355(9):942–948, 2017.
- [4] Shin-ichi KOBAYASHI : Iwasawa theory for elliptic curves at supersingular primes. *Invent. Math.*, 152(1):1–36, 2003.
- [5] Antonio LEI : Factorisation of two-variable p -adic L -functions. *Canad. Math. Bull.*, 57(4):845–852, 2014.
- [6] Barry MAZUR : Rational points of abelian varieties with values in towers of number fields. *Invent. Math.*, 18:183–266, 1972.
- [7] Robert POLLACK : On the p -adic L -function of a modular form at a supersingular prime. *Duke Math. J.*, 118(3):523–558, 2003.
- [8] Gautier PONSINET : On the structure of signed Selmer groups. *Math. Z.*, 294(3-4):1635–1658, 2020.
- [9] Florian SPRUNG : On pairs of p -adic L -functions for weight-two modular forms. *Algebra Number Theory*, 11(4):885–928, 2017.
- [10] Florian E. Ito SPRUNG : Iwasawa theory for elliptic curves at supersingular primes : a pair of main conjectures. *J. Number Theory*, 132(7):1483–1506, 2012.
- [11] M. M. VIŠIK : Nonarchimedean measures associated with Dirichlet series. *Mat. Sb. (N.S.)*, 99(141)(2):248–260, 296, 1976.

FLORIAN SPRUNG, SCHOOL OF MATHEMATICAL AND STATISTICAL SCIENCES, ARIZONA STATE UNIVERSITY, TEMPE, AZ 85287-1804, USA

Email address: florian.sprung@asu.edu