

Fonctions de structure polaris es¹ ou ou se cache le spin du proton?

Bernard PIRE

Centre de Physique Th eorique², Ecole Polytechnique
91128 PALAISEAU Cedex

Il n'est pas question ici de faire une revue extensive de tout ce que l'on connaît des réactions inclusives polarisées mais seulement une br ve pr sentation si possible p dagogique des fonctions de structure polaris es puis quelques remarques sur le sujet neuf du spin transverse [AEL].

1 D finitions

1.1 Factorisation leptonique-hadronique

On considère la diffusion inélastique de leptons polarisés longitudinalement sur des nucléons polarisés. On note m la masse du lepton, k (k^0) la 4-impulsion du lepton initial (nal) et s (s^0) son 4-vecteur spin covariant, tel que $s \cdot k = 0$ ($\hat{s} \cdot \hat{k} = 0$) et $s \cdot s = 1$ ($\hat{s} \cdot \hat{s} = 1$); la masse du nucléon est M , sa 4-impulsion et son spin sont P et S . On suppose la dominance de l'échange d'un seul photon et la section efficace différentielle pour détecter le lepton nal polarisé dans l'angle solide $d\Omega$ et dans l'intervalle d'énergie $(E^0; E^0 + dE^0)$ dans le rep re du laboratoire, $P = (M; 0)$; $k = (E; \vec{k})$; $k^0 = (E^0; \vec{k}^0)$, s'écrit

¹Cours donn e   la 27^{ me} Ecole d' t  de Physique des Particules, Clermont-Ferrand 1995.

²Unit  propre 14 du Centre National de la Recherche Scientifique.

comme :

$$\frac{d^2}{dE^0} = \frac{2}{2M q^4} \frac{E^0}{E} L \cdot W ; \quad (1)$$

avec $q = k - k^0$.

Dans l'Eq. (1) le tenseur leptonique L est

$$L(k; s; k^0; s^0) = [u(k^0; s^0) \cdot u(k; s)] [u(k^0; s^0) \cdot u(k; s)] \quad (2)$$

que l'on separe en parties symetrique (S) et antisymetrique (A) par rapport a l'interchange k, s :

$$L(k; s; k^0; s^0) = L^{(S)}(k; k^0) + iL^{(A)}(k; s; k^0) + L^{0(S)}(k; s; k^0; s^0) + iL^{0(A)}(k; k^0; s^0) \quad (3)$$

avec

$$L^{(S)}(k; k^0) = k \cdot k^0 + k^0 k \cdot g(k \cdot k - m^2) \quad (4)$$

$$L^{(A)}(k; s; k^0) = m \cdot s(k \cdot k^0) \quad (5)$$

$$L^{0(S)}(k; s; k^0; s^0) = (k \cdot s)(k^0 \cdot s^0 + s \cdot k^0 - g(k \cdot k^0 - s^0)) + (k \cdot k - m^2)(s \cdot s^0 + s^0 \cdot s - g(s \cdot s^0)) + (k^0 \cdot s)(s \cdot k + k \cdot s^0) - (s \cdot s^0)(k \cdot k^0 + k^0 \cdot k) \quad (6)$$

$$L^{0(A)}(k; k^0; s^0) = m \cdot s^0(k \cdot k^0) : \quad (7)$$

Si on somme l'Eq. (3) par rapport a s^0 et qu'on moyenne par rapport a s on retrouve le tenseur leptonique non polarise, $2L^{(S)}$. Si on ne somme que sur s^0 , on obtient $2L^{(S)} + 2iL^{(A)}$.

Le tenseur hadronique W est defini de la même façon en termes de quatre fonctions de structure :

$$W(q; P; S) = W^{(S)}(q; P) + iW^{(A)}(q; P; S) \quad (8)$$

avec

$$\frac{1}{2M} W^{(S)}(q; P) = g + \frac{q \cdot q}{q^2} W_1(P, q^2) + \frac{P \cdot q}{q^2} W_2(P, q^2) + \frac{P \cdot q}{q^2} W_3(P, q^2) + \frac{P \cdot q}{q^2} W_4(P, q^2) \quad (9)$$

$$\frac{1}{2M} W^{(A)}(q; P; S) = \frac{1}{q^2} M S G_1(P, q; q) + [(P - q)S - (S - q)P] \frac{G_2(P, q; q)}{M} : \quad (10)$$

On a donc

$$\frac{d^2}{d^2 dE_0} = \frac{2}{2M q^4} \frac{E_0}{E} L^{(S)} W^{(S)} + L^{(S)} W^{(S)} + L^{(A)} W^{(A)} + L^{(A)} W^{(A)} : \quad (11)$$

On peut étudier chaque terme en considérant des sections e caces ou des différences de sections e caces. Par exemple, la section e cace non polarisée habituelle est proportionnelle à $L^{(S)} W^{(S)}$

$$\begin{aligned} \frac{d^2_{\text{unp}}}{d^2 dE_0}(k; P; k^0) &= \frac{1}{4} \sum_{s, s^0, S} \frac{d^2}{d^2 dE_0}(k; s; P; S; k^0; s^0) \\ &= \frac{2}{2M q^4} \frac{E_0}{E} 2L^{(S)} W^{(S)} ; \end{aligned} \quad (12)$$

tandis que des différences de sections e caces avec des valeurs opposées de spins de la cible ne dépendent que du terme $L^{(A)} W^{(A)}$:

$$\begin{aligned} \sum_{s^0} \frac{d^2}{d^2 dE_0}(k; s; P; -S; k^0; s^0) - \sum_{s^0} \frac{d^2}{d^2 dE_0}(k; s; P; S; k^0; s^0) \\ = \frac{2}{2M q^4} \frac{E_0}{E} 4L^{(A)} W^{(A)} : \end{aligned} \quad (13)$$

1.2 Fonctions de Structure et scaling de Bjorken

La section e cace non polarisée s'écrit

$$\frac{d^2_{\text{unp}}}{d^2 dE_0} = \frac{4}{q^4} \frac{E_0^2}{E} 2W_1 \sin^2 \frac{\theta}{2} + W_2 \cos^2 \frac{\theta}{2} \quad (14)$$

où θ est l'angle de diffusion (dans le laboratoire) du lepton. Cela permet de mesurer les fonctions de structure: $W_1(P, q; q)$ and $W_2(P, q; q)$:

Dans la limite de Bjorken (Deep Inelastic Scattering (DIS) regime),

$$Q^2 = Q^2 \rightarrow 1 \quad = E - E^0 \rightarrow 1 \quad x = \frac{Q^2}{2P \cdot q} = \frac{Q^2}{2M} ; \quad x \rightarrow 1 \quad (15)$$

on a une invariance d'échelle:

$$\begin{aligned} \lim_{Bj} M W_1(P, q; Q^2) &= F_1(x) \\ \lim_{Bj} W_2(P, q; Q^2) &= F_2(x); \end{aligned} \quad (16)$$

ou $F_{1,2}$ varie très lentement avec Q^2 à $x \rightarrow 1$.

De la même façon, on a

$$\begin{aligned} x \frac{d^2}{dE_0^2} (k; s; P; S; k^0; s^0) &= \frac{d^2}{dE_0^2} (k; s; P - S; k^0; s^0) \\ &= \frac{d^2}{dE_0^2} (s; S) = \frac{d^2}{dE_0^2} (s; S) = \\ &= \frac{8m^2 E^0}{q^4 E} (q - S)(q - s) + 2Qs - S) M G_1 + Q^2 (s - S)(P - q) - (q - S)(P - q) \frac{G_2}{M} \end{aligned} \quad (17)$$

qui permet de mesurer les fonctions de structure polarisées $G_1(P, q; Q^2)$ and $G_2(P, q; Q^2)$. Elles aussi "scale" approximativement:

$$\begin{aligned} \lim_{Bj} \frac{(P - q)}{M} G_1(P, q; Q^2) &= g_1(x) \\ \lim_{Bj} (P - q) G_2(P, q; Q^2) &= g_2(x); \end{aligned} \quad (18)$$

En termes of $g_{1,2}$ l'expression de $W^{(A)}$ devient

$$W^{(A)}(q; P; s) = \frac{2M}{P \cdot q} \left[(q - S) g_1(x; Q^2) + S \frac{(S - q) P}{(P - q)} g_2(x; Q^2) \right]; \quad (19)$$

1.3 Comment mesurer g_1 ?

Lorsque les nucléons sont polarisés le long () ou opposé (() a la direction du lepton initial, on a

$$\frac{d^2 \sigma}{dE' d\Omega} = \frac{4}{Q^2} \frac{E'}{E} (E + E' \cos \theta) M G_1 - Q^2 G_2 : \quad (20)$$

Si les nucléons sont polarisés de façon transverse, le spin du nucléon étant perpendiculaire a la direction du lepton entrant, on a:

$$\frac{d^2 \sigma}{dE' d\Omega} = \frac{4}{Q^2} \frac{E'}{E} \sin \theta \cos \theta (M G_1 + 2E G_2) : \quad (21)$$

On réécrit souvent l'asymétrie:

$$\frac{M - Q^2 E}{2 E' (E + E' \cos \theta)} \frac{d^2 \sigma_{\text{unp}}}{dE' d\Omega} A_k = g_1 - \frac{2xM}{E + E' \cos \theta} g_2 \quad (22)$$

soit

$$g_1 - g_2 = 2K \frac{d^2 \sigma_{\text{unp}}}{dE' d\Omega} A_k \quad (23)$$

avec

$$K = \frac{M - Q^2 E}{4 E' (E + E' \cos \theta)} = \frac{E E' \cos^2 \theta (= 2)}{2x_{\text{Mott}} (E + E' \cos \theta)} \quad (24)$$

ou

$$x_{\text{Mott}} = \frac{\cos^2 \theta (= 2)}{2E \sin^2 \theta (= 2)}$$

La mesure de A_k (et de $d^2 \sigma_{\text{unp}}$) nous permet donc d'extraire la combinaison $g_1 - g_2$. Il se trouve qu'on peut dans un premier temps négliger le terme en g_2 car le coefficient cinématique est minuscule a haute énergie. On en conclut que la mesure de l'asymétrie longitudinale est une détermination satisfaisante de la fonction de structure g_1 .

2 le Modèle des Partons dans le DIS polarisé

Dans sa version la plus simple (voir par exemple [LP]), le Modèle des Partons décrit le proton comme une superposition de constituants libres colinéaires, transportant chacun une fraction x^0 de la 4-impulsion du nucléon. La diffusion inélastique profonde lepton-nucléon est alors décrite comme la somme incohérente d'interactions lepton-quark et le tenseur hadronique $W(N)$ s'exprime en termes de tenseurs élémentaires w calculés au niveau des quarks:

$$\begin{aligned} W(q;P;S) &= W^{(S)}(q;P) + iW^{(A)}(q;P;S) \\ &= \sum_{q,s} e_q^2 \frac{1}{2P} \int_0^1 \frac{dx^0}{x^0} (x^0 - x) n_q(x^0; s; S) w(x^0; q; s) \end{aligned} \quad (25)$$

où $n_q(x^0; s; S)$ est la densité des quarks q de charge e_q , fraction de 4-impulsion x^0 et spin s dans un nucléon de spin S et de 4-impulsion P ; la somme $\sum_q$ agit sur les quarks et les antiquarks; x est la variable de Bjorken et le tenseur $w(x; q; s)$ est déduit du tenseur leptonique L en remplaçant $k \rightarrow xP$; $k^0 \rightarrow xP^0 + q$ et en sommant sur les états de spin (s^0) non observés du quark final. On a donc:

$$w(x; q; s) = w^{(S)}(x; q) + i w^{(A)}(x; q; s) \quad (26)$$

avec

$$w^{(S)}(x; q) = 2 [x^2 P \cdot P + xP \cdot q + xq \cdot P - x(P \cdot q)g] \quad (27)$$

$$w^{(A)}(x; q; s) = 2m_q \gamma_5 \gamma_s q \quad (28)$$

et on doit prendre pour être cohérent la masse du quark $m_q = xM$, avant et après l'interaction avec le photon virtuel.

On obtient de ces équations les prédictions du Modèle des Partons Naïf pour les fonctions de structure non polarisées du nucléon:

$$F_1(x) = \frac{1}{2} \sum_q e_q^2 q(x) \quad (29)$$

$$F_2(x) = x \sum_q e_q^2 q(x) = 2xF_1(x); \quad (30)$$

ou les densités non polarisées de nombre de quarks $q(x)$ sont définies comme

$$q(x) = \sum_s n_q(x; s; S) : \quad (31)$$

On obtient de la même façon les fonctions de structure polarisées:

$$g_1(x) = \frac{1}{2} \sum_q e_q^2 q(x; S) \quad (32)$$

$$g_2(x) = 0 \quad (33)$$

avec

$$q(x; S) = n_q(x; S; S) - n_q(x; -S; S) \quad (34)$$

la différence entre la densité de quarks avec le spin parallèle au spin du nucléon ($s = S$) et celle avec le spin antiparallèle ($s = -S$).

Le fait que g_2 soit nul dans le modèle des partons montre qu'il sera difficile de se faire une image physique des contributions à cette quantité. On ne reviendra pas sur ce point délicat mais extrêmement intéressant dans ce cours.

3 Règles de somme

Si on intègre sur x la relation (32), on obtient

$$\int_0^1 g_1(x) dx = \frac{1}{2} \sum_q e_q^2 q \quad (35)$$

avec

$$q = \int_0^1 (n_q(x; S; S) - n_q(x; -S; S)) \quad (36)$$

et donc

$$\int_0^1 g_1^p(x) dx = \frac{2}{9} u + \frac{1}{18} d + \frac{1}{18} s \quad (37)$$

3.1 La règle de somme de Bjorken

Lorsqu'on fait la différence entre les intégrales de g_1 pour le proton et le neutron, on obtient:

$$\int_0^1 (g_1^p(x) - g_1^n(x)) dx = \frac{1}{6} (u - d) \quad (38)$$

Il se trouve que les techniques de l'algèbre des courants et les propriétés d'invariance par rapport aux rotations d'isospin des courants électromagnétiques et faibles permettent de relier cette différence aux paramètres de la désintégration du neutron. Bjorken [BJO] a ainsi établi que

$$\int_0^1 (g_1^p(x) - g_1^n(x)) dx = \frac{1}{6} \frac{g_A}{g_V} \quad (39)$$

Cette conclusion n'est pas altérée lorsqu'on se place dans le cadre de la QCD, à de petites corrections près. La vérification expérimentale de cette règle de somme est évidemment un défi puisque'il faut extraire la fonction de structure du neutron. On utilise pour cela des noyaux de deutérium ou d'hélium 3. Les résultats d'une telle analyse sont montrés sur la figure 1.

Fig.1: Test expérimental de la règle de somme de Bjorken.

3.2 La règle de somme de Ellis-Jaffe

Il est naturel d'introduire les quantités singlet, triplet et octet (selon $SU(3)_{\text{savoir}}$) définies dans le modèle des quarks par:

$$a_0 = \int_0^{Z_1} dx \quad (x) \quad (40)$$

avec

$$(x) = u(x) + \bar{u}(x) + d(x) + \bar{d}(x) + s(x) + \bar{s}(x) : \quad (41)$$

$$a_3 = \int_0^{Z_1} dx [u(x) + \bar{u}(x) - d(x) - \bar{d}(x)] \quad (42)$$

et

$$a_8 = \frac{1}{3} \int_0^{Z_1} dx [u(x) + \bar{u}(x) + d(x) + \bar{d}(x) - 2s(x) - 2\bar{s}(x)] : \quad (43)$$

Si on suppose maintenant que l'on peut négliger la contribution de la mer étrange, on obtient la règle de somme de Ellis-Jaffe [EJ]:

$$\int_0^1 g_1^p(x) dx = \frac{1}{12} \left(a_3 + \frac{5}{3} a_8 \right) = 0.188 \pm 0.004 \quad (44)$$

où la valeur numérique vient de la détermination à partir des désintégrations des hyperons des quantités a_3 et a_8 . Sans entrer dans les détails, disons que les hypothèses permettant d'extraire ces quantités sont principalement:

- a) que les huit hyperons de spin 1/2 forment un octet selon $SU(3)_F$;
- b) que les courants J^j ; J_5^j ($j = 1, \dots, 8$) se transforment comme un octet sous $SU(3)_F$, J^j ; J_5^j étant conservés;
- c) que les impulsions transférées et les différences de masse dans les transitions hadroniques ont des effets négligeables;

C'est la violente violation expérimentale de cette règle de somme qui, sous le nom accrocheur de crise du spin a réveillé l'intérêt de la communauté pour les variables polarisées.

Des résultats expérimentaux sur g_1^p ont été d'abord obtenus à SLAC [ALG] en 1978 avec un faisceau d'électrons. La collaboration SLAC-Yale continua ce travail en 1983 [BAU]. Plus récemment, la collaboration EMC (European Muon Collaboration) [ASH] a utilisé un faisceau de muons longitudinalement polarisés d'énergie 100-200 GeV sur une cible d'hydrogène

longitudinalement polarisé. La collaboration SMC au CERN [ADA] et les expériences E142 - E143 au SLAC [ANT], ont en outre de façon remarquable les résultats en incluant, pour la première fois, des données sur le neutron.

La Figure 2 montre l'état actuel des données.

Fig 2: La fonction de structure $g_1(x; Q^2)$ mesurée à SLAC et au CERN.

On exprime souvent de manière un peu différente les mêmes données en écrivant

$$a_0 = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{2} a_1 + \frac{1}{3} a_3 \right) \quad (45)$$

que l'expérience nous donne :

$$a_0 = 0.06 \pm 0.12 \pm 0.17 \quad (46)$$

Un raisonnement dans le cadre du modèle des quarks aurait impliqué $a_0 \approx 1$. D'où la surprise sinon la crise.

On peut même décomposer cette structure en spin du proton en utilisant les valeurs de a_3 et a_8 venant des désintégrations des hyperons. On obtient:

$$\begin{aligned} u &= 0.79 \quad 0.03 \quad 0.04 \\ d &= 0.47 \quad 0.03 \quad 0.04 \\ s &= 0.26 \quad 0.06 \quad 0.09 \end{aligned} \quad (47)$$

4 Corrections radiatives

4.1 Les équations d'évolution

On sait bien que les corrections radiatives de QCD induisent des violations logarithmiques de l'invariance d'échelle de Bjorken. L'expression de P_1 par exemple est modifiée en

$$P_1(Q^2) = \frac{1}{12} \left(a_3 + \frac{1}{3} a_8 E_{NS}(Q^2) + \frac{4}{3} a_0 E_S(Q^2) \right) \quad (48)$$

où les coefficients E_{NS} and E_S peuvent être calculés perturbativement [KOD]; on les connaît maintenant jusqu'à l'ordre s^2 and s^3 respectivement [LAR]

$$E_{NS}(Q^2) = 1 - \frac{s}{3.25} + \frac{s^2}{13.85} \quad (49)$$

$$E_S(Q^2) = 1 - 0.040 \frac{s}{N_f} + 0.07 \frac{s^2}{N_f^2} \quad (50)$$

avec $s = s(Q^2)$ et $N_f = 3$. On doit tenir compte de ces corrections perturbatives lorsqu'on analyse des données prises à des Q^2 différents.

Au niveau des logarithmes dominants, l'expression des a_j en termes de densités de quarks $q(x)$ est simplement modifiée en remplaçant

$$q(x) \rightarrow q(x; Q^2) \quad (51)$$

où l'évolution en Q^2 des quantités $q(x; Q^2)$ est contrôlée par les équations d'Altarelli-Parisi [AP] dans leur version spin-dépendante. Dans le secteur

singulet par exemple, elles s'écrivent:

$$\frac{d \langle x; t \rangle}{d \ln Q^2} = \frac{s}{2} R_{x/y}^1 \frac{dy}{y}^h P_{qq}^s \left(\frac{x}{y}; s \right) \langle y; t \rangle + 2n_f P_{qg} \left(\frac{x}{y}; s \right) g(y; t) \quad (52)$$

$$\frac{d \langle g(x; t) \rangle}{d \ln Q^2} = \frac{s}{2} R_{x/y}^1 \frac{dy}{y}^h P_{gq} \left(\frac{x}{y}; s \right) \langle y; t \rangle + P_{gg} \left(\frac{x}{y}; s \right) g(y; t) \quad (53)$$

ou on a noté P ce qui est parfois noté P . La fonction P_{qq} est en fait égale à P_{qq} puisque l'hélicité d'un quark non massif est conservée lors de l'émission d'un gluon. A ce niveau, la prise en compte des corrections radiatives n'est rien de plus qu'une modification mineure et on trouve par exemple pour $Q^2 \sim 10 \text{ (GeV/c)}^2$:

$$a_0 = 0.17 \pm 0.12 \pm 0.17 \quad (54)$$

ou, en décomposant comme plus haut sur les différents saveurs:

$$\begin{aligned} u &= 0.32 \pm 0.03 \pm 0.04 \\ d &= 0.44 \pm 0.03 \pm 0.04 \\ s &= 0.21 \pm 0.06 \pm 0.09 \end{aligned} \quad (55)$$

Mais il existe une et plus subtil et en même temps plus violent des corrections radiatives: c'est celle liée à l'anomalie axiale.

4.2 L'effet de l'anomalie

La mesure de $\langle J_5^0 \rangle$ est interprétée comme une mesure effective de a_0 qui est proportionnelle à la valeur moyenne dans le proton du courant axial singulet de saveur J_5^0

$$J_5^0 = \sum_f \bar{\psi}_f \gamma_5 \psi_f \quad (56)$$

Il se trouve que ce courant, s'il est conservé au niveau classique (en négligeant les masses des quarks) a une divergence non nulle au niveau quantique: c'est ce qu'on appelle l'anomalie triangulaire (on n'a pas la place ici de développer la théorie assez subtile de l'anomalie, voir tout bon livre de théorie des champs) qui s'écrit comme:

$$\partial J_5^0 = -N_f \text{tr} F \tilde{F} : \quad (57)$$

L'une de cette anomalie est de mélanger les gluons au courant axial singulet des quarks. Par contre, elle ne modifie en rien les courants non singulets.

Il s'ensuit que la relation entre a_0 and α_s est assez différente de ce que nous disait le modèle naïf des partons, puisqu'on a maintenant:

$$a_0(Q^2) = \frac{3}{2} \frac{\alpha_s(Q^2)}{g(Q^2)} \quad (58)$$

On peut introduire un courant axial gluonique

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} \text{Tr} (A^a G^a - \frac{g}{3} f_{abc} A^b A^c) \\ &= \text{Tr} (A G) + \frac{i}{3} g [A, A] \end{aligned} \quad (59)$$

avec la matrice $A = \frac{1}{2} A^a \lambda^a$, et on a alors

$$\partial K = \frac{1}{2} G^a \mathcal{G}_a = \text{Tr} (G \mathcal{G}) : \quad (60)$$

Le courant modifié

$$\mathcal{J}_5^f = J_5^f - \frac{\alpha_s}{2} K \quad (61)$$

est donc conservé, $\partial \mathcal{J}_5^f = 0$.

Les éléments de matrice du courant singlet axial modifié

$$\mathcal{J}_5^0 = J_5^0 - N_f \frac{\alpha_s}{2} K \quad (62)$$

devraient correspondre aux valeurs obtenues dans le Modèle des Quarks

$$\langle p; S | \mathcal{J}_5^0 | p; S \rangle = 2M a_0 S ; \quad (63)$$

Il est important de noter que a_0 est indépendant de Q^2 . Cela provient³

³ Considérons la charge axiale $\mathcal{Q}_5$ associée au courant conservé $\mathcal{J}_5^0$, soit $\mathcal{Q}_5 = \int d^3x \mathcal{J}_{50}^0(\mathbf{x};t)$. Comment $\mathcal{Q}_5$ peut-il dépendre de l'échelle de renormalisation μ^2 , dans une théorie sans masse? La seule façon serait via la variable t et une telle dépendance induirait une dépendance en t . Mais on sait que la charge associée à un courant local conservé est indépendante du temps. Donc $\mathcal{Q}_5$ doit être indépendant de l'échelle de renormalisation, et a_0 est indépendante de Q^2 . Donc α_s est indépendant de Q^2 puisque $a_0 = (\frac{3}{2} \frac{\alpha_s}{g}) + 3 \frac{\alpha_s}{2} g = \dots$

de ce que a_0 est relié au courant conserve J_5^0 et est donc indépendant de l'échelle de renormalisation Q^2 (ou Q^2).

Il est tout à fait surprenant que le terme gluonique survive à grand Q^2 , puisque cela semble être une correction en α_s qui devrait disparaître lorsque $Q^2 \rightarrow \infty$. En fait, la fraction de spin emportée par le gluon se comporte plutôt comme $[\alpha_s(Q^2)]^2$ lorsque $Q^2 \rightarrow \infty$. On peut le voir sur les équations d'Altarelli-Parisi pour les premiers moments qui s'écrivent

$$\frac{d}{d \ln Q^2} \langle Q^2 \rangle = \frac{\alpha_s}{2} P_{qq}^S(Q^2) + 2n_f P_{qg}(Q^2) \quad (64)$$

$$\frac{d}{d \ln Q^2} g(Q^2) = \frac{\alpha_s}{2} P_{gq}(Q^2) + P_{gg}(Q^2) \quad (65)$$

où les deux points cruciaux sont que:

1. P_{qq}^S et P_{qg} sont nuls à l'ordre d'une boucle.

2. $\frac{3}{2} \alpha_s(Q^2) g(Q^2)$ est un vecteur propre.

On peut donc écrire:

$$\frac{d}{d \ln Q^2} \left(\frac{3}{2} \alpha_s(Q^2) g(Q^2) \right) = \gamma_s \left(\frac{3}{2} \alpha_s(Q^2) g(Q^2) \right) \quad (66)$$

où γ_s est la dimension anormale de J_5^0 .

Ceci reste standard mais le développement en série de γ_s ne commence qu'au second ordre [KOD] i.e.

$$\gamma_s = \frac{\alpha_s}{4} \gamma_2 + \dots \quad (67)$$

avec

$$\gamma_2 = 16N_f : \quad (68)$$

La solution de cette évolution est donc

$$\left(\frac{3}{2} \alpha_s(Q^2) g(Q^2) \right) = \left(\frac{3}{2} \alpha_{s_0}(Q_0^2) g(Q_0^2) \right) \exp \left[\frac{\alpha_{s_0}^2}{4} \gamma_2 \ln \left(\frac{Q^2}{Q_0^2} \right) \right] \quad (69)$$

où on a noté comme d'habitude: $\alpha_0 = 11 \frac{2}{3} N_f$.

La quantité

$$\left(\frac{3}{2} \alpha_s(Q^2) g(Q^2) \right) = \left(\frac{3}{2} \alpha_{s_0}(Q_0^2) g(Q_0^2) \right) \exp \left[\frac{\alpha_{s_0}^2}{4} \gamma_2 \ln \left(\frac{Q^2}{Q_0^2} \right) \right] \quad (70)$$

est donc indépendante de Q^2 . Appelons la C .

Dans la limite $Q^2 \rightarrow 1$, comme α_s est indépendante de Q^2 et que $\alpha_s(Q^2) \rightarrow 0$ on obtient:

$$\lim_{Q^2 \rightarrow 1} \frac{3 \alpha_s(Q^2)}{2} g(Q^2) = C : \quad (71)$$

Donc $g(Q^2)$ doit croître comme $[\alpha_s(Q^2)]^{-1}$ i.e. $\ln(Q^2)$ lorsque Q^2 augmente.

4.3 conclusion

L'anomalie a donc généré une interaction ponctuelle effective entre le photon virtuel et les gluons et la surprenante petite valeur de a_0 peut être comprise comme venant de la compensation entre α_s et la contribution Q^2 -dépendante des gluons via la combinaison $(3 \alpha_s(Q^2) = 2) g(Q^2)$.

Quantitativement si on prend $a_0 \approx 0.17$ à $Q^2 = 10 \text{ (GeV/c)}^2$ et $\alpha_s \approx 0.24$ on peut considérer que les quarks portent quelques 60% du spin du proton i.e. choisir $\Delta = 0.6$ et obtenir

$$g(Q^2 = 10 \text{ (GeV/c)}^2) \approx 3.8 : \quad (72)$$

Même si cela peut paraître trop grand, il ne faut peut-être pas y attacher une trop grande signification physique puisque cette valeur dépend cruciallement de Q^2 . Un exercice pour s'en convaincre et d'évaluer ce $g(Q^2)$ jusqu'à une échelle plus proche du régime du Modèle des Quarks. Si on ose descendre jusqu'à $Q^2 = 4 Q_{CD}^2$ ou $\alpha_s \approx 1$, on trouve

$$g(4 Q_{CD}^2) \approx 0.7 ; \quad (73)$$

ce qui est plus raisonnable.

Même si on comprend beaucoup mieux maintenant la situation, on ne peut être satisfait du tableau d'ensemble puisqu'on ne sait toujours pas où se cache le spin du proton. D'autres expériences complémentaires, hors de la diffusion complètement inclusive profonde, sont nécessaires pour par exemple mesurer la contribution des gluons. L'électroproduction de saveurs lourdes est une piste possible.

Sur le plan théorique, les résultats expérimentaux ont été l'occasion d'une intense activité. Maintenant que le rôle de l'anomalie est clarifié, les théoriciens

s'attachent à comprendre dans des modèles non perturbatifs encore bien imparfaits la partition du spin du proton entre ses constituants. Des estimations dans le modèle de Skyrme aux calculs sur réseaux, le panorama est riche et divers, et encore en pleine évolution.

5 spin transverse

L'histoire du spin transverse [AM, CPR], ou comme certains [JJ] préfèrent l'appeler, de la transversité, a été l'occasion, pire encore que celle de l'hélicité rappelée plus haut, d'étonnantes contre-sens et oublis. La place prépondérante de la diffusion inélastique profonde lepton-nucléon (complètement inclusive) et de la description dans le cadre du développement en produits d'opérateurs, dans la maturation de la description des processus durs en chromodynamique quantique a fait oublier que d'autres opérateurs polarisés existaient à côté de l'hélicité et que rien n'empêchait de parler de partons dans des états de spin transverse (transverse signifie toujours par rapport à la direction de propagation du nucléon).

5.1 définitions

Il n'est pas inutile de rappeler qu'on peut définir deux états de spin transverse pour une particule de spin $1/2$ à partir des états d'hélicité $|j^+ \rangle$ et $|j^- \rangle$ par :

$$\begin{aligned} |j^+ \rangle_x &= \frac{1}{2^{1/2}} (|j^+ \rangle + e^i |j^- \rangle) \\ |j^- \rangle_x &= \frac{1}{2^{1/2}} (|j^+ \rangle - e^i |j^- \rangle) \end{aligned} \quad (74)$$

où ϕ est un azimuth qui dépend un peu des conventions. Cela implique que les observables "de spin transverse" joueront le rôle d'observables "de renversement d'hélicité". Or un renversement d'hélicité est notoirement difficile pour un fermion sans masse et le spin transverse est ainsi un révélateur de la brisure de la symétrie chirale dans la chromodynamique réaliste (celle où les quarks sont ce qu'ils sont). Un opérateur relevant sera donc nécessairement impair sous une transformation de chiralité.

Si dans le cas de l'hélicité, les densités partoniques étaient définies à partir des éléments de matrice du courant axial, comme

$$2M_S [q_f(x) + \bar{q}_f(x)] = \int_{-1}^1 dy e^{ixy} h_P; S j_f(0) (0 + z) x s_f(y) \mathcal{P}; S i; \quad (75)$$

pour les densités transverses, on a un courant différent:

$$2M_{S_x} [q_T(x) - \bar{q}_T(x)] = \int_{-1}^1 dy e^{ixy} h_P; S j_f(0) (0 + z) x s_f(y) \mathcal{P}; S i; \quad (76)$$

Le nombre de matrices explicite le caractère chiral de cette densité transverse. Le signe entre la contribution des quarks et celle des antiquarks marque son caractère impair par conjugaison de charge.

La détermination non perturbative des densités polarisées transversalement de quarks et de gluons peut a priori se faire par calcul sur les réseaux comme explique par O. Pene dans son cours pour la quantité 1. Il suffit de prendre l'opérateur adéquat indiqué ci-dessus. Bien qu'il n'existe actuellement, à ma connaissance, aucun résultat, une détermination expérimentale amènerait sans aucun doute les théoriciens à redoubler leurs efforts dans ce sens.

Notons tout de même l'existence d'une borne déduite de considérations de positivité et reliant densité transverse et densité longitudinale [50].

5.2 corrections radiatives

Les corrections radiatives s'étudient de la manière habituelle et aucune subtilité ne vient compliquer l'application d'équations d'évolution de type Altarelli-Parisi. En particulier et contrairement au cas longitudinal, aucune anomalie ne vient mélanger de façon étonnante gluons et partie singulet des quarks.

5.3 recherche expérimentale

Différents axes de recherche ont été proposés pour lever le voile de la dernière quantité (au twist dominant) décrivant le proton. La plus prometteuse est sans aucun doute la production de Drell-Yan, production d'une paire de leptons de grande masse invariante Q^2 dans la collision de deux hadrons polarisés transversalement [CPR]. Cet axe sera exploré de façon prioritaire au RHIC de Brookhaven dans sa version de collisionneur proton-proton polarisés

et on peut donc raisonnablement s'attendre aux premiers résultats sur la contenu en spin transverse des protons vers l'an 2000.

On peut aussi tenter de combiner polarisation initiale et polarisation finale dans des réactions lepton-nucléon semi-inclusives [HERMES, ELFE] ou par exemple un π^0 serait produit; on a aussi proposé des quantités construites à partir des impulsions des mésons de l'état final (la variable de "handedness" de Nachtmann et Efrimov et al, la variable de Collins...) [NEC] Mais il faudrait alors s'assurer que la fragmentation ne dilue pas trop l'information sur le spin transverse du parton produit ou utilisé.

6 Références

Références

- [1] [ADA] D Adams et al, Phys Lett B 329 (1994) 399.
- [2] [AEL] On pourra pour plus de détails, se reporter au récent Physics Report de M Anselmino, A Efrimov et E Leader, Physics Report (1995), et aux revues plus anciennes de C Bourelly et al, Phys. Rep. 177 (1989) 319 et de N S Craigie et al, Phys. Rep. 99 (1983) 69.
- [3] [ALG] M J. Alguard et al, Phys. Rev. Lett. 41 (1978) 70.
- [4] [AM] X Artru et M Mekhjian, Z. Phys C 45 (1990) 669.
- [5] [ANT] D L. Anthony et al, Phys. Rev. Lett. 71 (1993) 759.
- [6] [AP] G. Altarelli et G. Parisi, Nucl. Phys B 126 (1977) 298.
- [7] [ASH] J. Ashman et al, Phys Lett B 206 (1988) 354.
- [8] [BAU] G Baum et al, Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 1135. V W Hughes et al, Phys. Lett B 212 (1988) 511.
- [9] [BJO] J D Bjorken, Phys. Rev. 148 (1966) 1467.
- [10] [CPR] J L Cortes, B. Pire et J P Ralston, Z. Phys C 55 (1992) 409.

- [11] [ELFE] the ELFE Project Conference Proceedings, Vol.44, Italian Physical Society, Bologna, Italy (1993) edited by J. Arvieux et E. De Sanctis; J. Arvieux et B. Pire, Progress in Particle and Nuclear Physics, 30, 299 (1995).
- [12] [EJ] J. Ellis et R. L. Jaffe, Phys. Rev. D 9 (1974) 1444.
- [13] [HERMES] Hermes proposal, Report DESY {PRC 90/01.
- [14] [JJ] R. L. Jaffe et X. Ji, Nucl. Phys. B 375 (1992) 527.
- [15] [KOD] J. Kondeira, Nucl. Phys. B 165 (1980) 129.
- [16] [LAR] S. A. Larin, Phys. Lett. B 334 (1994) 192.
- [17] [LP] E. Leader et E. Predazzi, Gauge Theories and the New Physics (Cambridge University Press, Cambridge, 1982).
- [18] [NEC] O. Nachtmann, Nucl. Phys. B 127 (1977) 314; A. V. Efremov et al., Phys. Lett. B 284 (1992) 394; J. C. Collins, Nucl. Phys. B 396 (1993) 161.
- [19] [SO] J. Soer, preprint CPT .94/P .3059.
- [20] [VOS] R. Voss, Proceedings of DIS 95, Ed. du bicentenaire, Paris.