

# Approximative characteristics of classes of functions $S_{p,\theta}^\Omega B(\mathbb{R}^d)$ with a given majorant of mixed modulus of smoothness

## Апроксимативні характеристики функцій з класів $S_{p,\theta}^\Omega B(\mathbb{R}^d)$ із заданою мажорантою мішаних модулів неперервності

S. Ya. Yanchenko, S. A. Stasyuk  
*Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, Kyiv*

С. Я. Янченко, С. А. Стасюк  
*Інститут математики НАН України, Київ*

### Анотація

We obtain order estimates of approximation of functions from the classes  $S_{p,\theta}^\Omega B(\mathbb{R}^d)$  in the space  $L_q(\mathbb{R}^d)$ ,  $1 < p < q < \infty$ , by entire functions of exponential type with supports of their Fourier transforms in sets generated by the level surfaces of a function  $\Omega$ .

Одержано точні за порядком оцінки наближення функцій з класів  $S_{p,\theta}^\Omega B(\mathbb{R}^d)$  у просторі  $L_q(\mathbb{R}^d)$ ,  $1 < p < q < \infty$ , за допомогою цілих функцій експоненціального типу з носіями їх перетворень Фур'є на множинах, які породжуються поверхнями рівня функції  $\Omega$ .

**1. Означення класів функцій та апроксимативних характеристик.** У статті продовжено дослідження апроксимативних характеристик функцій з класів Нікольського–Бесова  $S_{p,\theta}^\Omega B(\mathbb{R}^d)$  у просторі  $L_q(\mathbb{R}^d)$  [1], [2]. Встановлено точні за порядком оцінки наближення таких функцій за допомогою цілих функцій експоненціального типу з носіями їх перетворень Фур'є на множинах, які породжуються поверхнями рівня функції  $\Omega$  у випадку, коли  $1 < p < q < \infty$ .

Нехай  $\mathbb{R}^d$  —  $d$ -вимірний евклідов простір з елементами  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$  і  $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + \dots + x_d y_d$ . Через  $L_q(\mathbb{R}^d)$ ,  $1 \leq q \leq \infty$ , позначимо простір вимірних на  $\mathbb{R}^d$  функцій зі скінченною нормою

$$\|f\|_{L_q} := \|f\|_q := \left( \int_{\mathbb{R}^d} |f(\mathbf{x})|^q d\mathbf{x} \right)^{\frac{1}{q}}, \quad 1 \leq q < \infty,$$

$$\|f\|_{L_\infty} := \|f\|_\infty := \operatorname{ess\,sup}_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d} |f(\mathbf{x})|.$$

Для функції  $f \in L_q(\mathbb{R}^d)$  розглянемо різницю  $l$ -го порядку,  $l \in \mathbb{N}$ , за змінною  $x_j$  з кроком  $h_j$ , яка визначається таким чином:

$$\Delta_{h_j}^l f(\mathbf{x}) := \sum_{n=0}^l (-1)^{l-n} C_l^n f(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j + nh_j, x_{j+1}, \dots, x_d).$$

Також означимо мішану кратну різницю  $l$ -го порядку функції  $f$  з векторним кроком  $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_d)$ :

$$\Delta_{\mathbf{h}}^l f(\mathbf{x}) = \Delta_{h_d}^l (\Delta_{h_{d-1}}^l \dots (\Delta_{h_1}^l f(\mathbf{x}))).$$

Мішаний модуль неперервності порядку  $l$  функції  $f \in L_q(\mathbb{R}^d)$  визначається згідно з формулою

$$\Omega_l(f, \mathbf{t})_q := \sup_{|\mathbf{h}| \leq \mathbf{t}} \|\Delta_{\mathbf{h}}^l f(\cdot)\|_q,$$

де  $|\mathbf{h}| = (|h_1|, \dots, |h_d|)$ , а нерівності типу  $\mathbf{a} \leq \mathbf{b}$  ( $\mathbf{a} > \mathbf{b}$ ) для векторів  $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_d)$  та  $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_d)$  тут і надалі розуміємо покоординатно, тобто  $a_j \leq b_j$  ( $a_j > b_j$ ),  $j = \overline{1, d}$ . Також будемо використовувати запис  $\mathbf{t} \geq \mathbf{0}$ , якщо  $t_j \geq 0$ ,  $j = \overline{1, d}$ .

Нехай  $\Omega(\mathbf{t})$ ,  $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_d)$  — функція типу мішаного модуля неперервності порядку  $l$ , тобто функція, яка визначена і неперервна на  $\mathbb{R}_+^d$ , що задовольняє такі умови:

- 1)  $\Omega(\mathbf{t}) > 0$ ,  $\mathbf{t} > \mathbf{0}$  і  $\Omega(\mathbf{t}) = 0$ , якщо  $\prod_{j=1}^d t_j = 0$ ;
- 2)  $\Omega(\mathbf{t})$  неспадна за кожною змінною;
- 3)  $\Omega(m_1 t_1, \dots, m_d t_d) \leq \left( \prod_{j=1}^d m_j \right)^l \Omega(\mathbf{t})$ ,  $m_j \in \mathbb{N}$ ,  $j = \overline{1, d}$ .

Множину таких функцій  $\Omega$  позначимо через  $\Psi_l$ .

Додатково будемо вимагати, щоб функція  $\Omega$  задовольняла умови  $(S^\alpha)$  та  $(S_l)$ , які називають умовами Барі–Стечка [3]. Сформулюємо їх:

- а) функція однієї змінної  $\varphi(\tau) \geq 0$  задовольняє умову  $(S^\alpha)$ , якщо існує таке  $\alpha > 0$ , що  $\varphi(\tau)/\tau^\alpha$  майже зростає, тобто існує така незалежна від  $\tau_1$  і  $\tau_2$  стала  $C_1 > 0$ , що

$$\frac{\varphi(\tau_1)}{\tau_1^\alpha} \leq C_1 \frac{\varphi(\tau_2)}{\tau_2^\alpha}, \quad 0 < \tau_1 \leq \tau_2 \leq 1;$$

- б) функція однієї змінної  $\varphi(\tau) \geq 0$  задовольняє умову  $(S_l)$ , якщо існує таке  $\gamma$ ,  $0 < \gamma < l$ , що  $\varphi(\tau)/\tau^{l-\gamma}$  майже спадає, тобто існує така незалежна від  $\tau_1$  і  $\tau_2$  стала  $C_2 > 0$ , що

$$\frac{\varphi(\tau_1)}{\tau_1^{l-\gamma}} \geq C_2 \frac{\varphi(\tau_2)}{\tau_2^{l-\gamma}}, \quad 0 < \tau_1 \leq \tau_2 \leq 1.$$

Будемо вважати, що  $\Omega$  задовольняє умови  $(S^\alpha)$  та  $(S_l)$ , якщо  $\Omega$  задовольняє ці умови за кожною змінною  $t_j$  при всіх фіксованих значеннях змінних  $t_i$ ,  $i \neq j$ . У випадку, коли для  $\Omega$  виконана умова  $(S^\alpha)$ , будемо говорити, що  $\Omega$  належить множині

$S^\alpha$ , а якщо умова  $(S_l)$ , то — множині  $S_l$ . Стверджуючи це (також і для функції  $\omega$  однієї змінної), використовуватимемо запис  $\Omega \in \Phi_{\alpha,l}$ , ( $\omega \in \Phi_{\alpha,l}$ ),  $l \in \mathbb{N}$ , де множина  $\Phi_{\alpha,l}$  визначається співвідношенням  $\Phi_{\alpha,l} = \Psi_l \cap S^\alpha \cap S_l$ .

Зазначимо, що до множини  $\Phi_{\alpha,l}$  належать, наприклад, функції

$$\Omega(\mathbf{t}) = \Omega(t_1, \dots, t_d) = \begin{cases} \prod_{j=1}^d \frac{t_j^{r_j}}{\left\{ \log \frac{1}{t_j} \right\}_+^{b_j}}, & \text{при } t_j > 0, j = \overline{1, d}; \\ 0, & \text{при } \prod_{j=1}^d t_j = 0, \end{cases}$$

де  $\{\log \tau\}_+ = \max\{1; \log_2 \tau\}$ ,  $r_j, b_j \in \mathbb{R}$ ,  $0 < r_j < l$ ,  $j = \overline{1, d}$ .

Нехай, далі,  $e_d := \{1, 2, \dots, d\}$ ,  $d \in \mathbb{N}$ , і  $e := \{j_1, \dots, j_m\}$ ,  $m \leq d$ ,  $m \in \mathbb{N}$ ,  $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_m \leq d$ ,  $\mathbf{t}^e = (t_{j_1}, \dots, t_{j_m})$ ,  $\bar{\mathbf{t}}^e := (\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_d)$ , де

$$\bar{t}_i = \begin{cases} t_i, & i \in e, \\ 1, & i \in e_d \setminus e. \end{cases}$$

Простори  $S_{p,\theta}^\Omega B(\mathbb{R}^d)$  для  $1 \leq p, \theta \leq \infty$  і  $\Omega \in \Psi_l$  означаються таким чином (див., наприклад, [1])

$$S_{p,\theta}^\Omega B(\mathbb{R}^d) := \left\{ f \in L_p(\mathbb{R}^d) : \|f\|_{S_{p,\theta}^\Omega B(\mathbb{R}^d)} < \infty \right\},$$

де

$$\|f\|_{S_{p,\theta}^\Omega B(\mathbb{R}^d)} := \|f\|_p + \sum_{\substack{e \subset e_d \\ e \neq \emptyset}} \left( \int_0^2 \dots \int_0^2 \left( \frac{\Omega_{l^e}(f, \mathbf{t}^e)_p}{\Omega(\bar{\mathbf{t}}^e)} \right)^\theta \prod_{j \in e} \frac{dt_j}{t_j} \right)^{\frac{1}{\theta}},$$

якщо  $1 \leq \theta < \infty$ , та

$$\|f\|_{S_{p,\infty}^\Omega B(\mathbb{R}^d)} := \|f\|_p + \sum_{\substack{e \subset e_d \\ e \neq \emptyset}} \sup_{\mathbf{t}^e > 0} \frac{\Omega_{l^e}(f, \mathbf{t}^e)_p}{\Omega(\bar{\mathbf{t}}^e)},$$

де

$$\Omega_{l^e}(f, \mathbf{t}^e)_q := \sup_{|\mathbf{h}^e| \leq \mathbf{t}^e} \|\Delta_{\mathbf{h}^e}^{l^e} f(\mathbf{x})\|_q, \quad \mathbf{h}^e := (h_{j_1}, \dots, h_{j_m}),$$

$$\Delta_{\mathbf{h}^e}^{l^e} f(\mathbf{x}) = \Delta_{h_{j_m}}^{l^e} (\Delta_{h_{j_{m-1}}}^{l^e} \dots (\Delta_{h_{j_1}}^{l^e} f(\dots, x_{j_1}, \dots, x_{j_m}, \dots))).$$

Зауважимо, що простори функцій  $S_{p,\theta}^\Omega B(\mathbb{R}^d)$  є узагальненням відомих просторів  $S_{p,\theta}^r B(\mathbb{R}^d)$  [4], [5], що визначаються при явному заданні функції  $\Omega$ , а саме  $\Omega(\mathbf{t}) = \mathbf{t}^r = t_1^{r_1} \dots t_d^{r_d}$ ,  $0 < r_j < l$ ,  $j = \overline{1, d}$ . Нагадаємо, що простори  $S_p^r H(\mathbb{R}^d) = S_{p,\infty}^r B(\mathbb{R}^d)$  були вперше розглянуті С. М. Нікольським [4], простори  $S_{p,\theta}^r B(\mathbb{R}^d)$ , при  $1 \leq \theta < \infty$  були введені Т. І. Амановим [5] (див. також [6]). Надалі будемо використовувати скорочені позначення  $S_{p,\theta}^\Omega B$ ,  $S_{p,\theta}^r B$  і  $S_p^r H$  відповідно для  $S_{p,\theta}^\Omega B(\mathbb{R}^d)$ ,  $S_{p,\theta}^r B(\mathbb{R}^d)$  та  $S_p^r H(\mathbb{R}^d)$ .

Дослідження класів Нікольського–Бесова з домінуючою мішаною похідною  $S_{p,\theta}^r B$ , з точки зору знаходження порядкових оцінок деяких апроксимативних характеристик проводилися, зокрема, у роботах Wang Heping і Sun Yongsheng [7], Wang Heping [8]. З основними результатами щодо дослідження класів Нікольського–Бесова з домінуючою мішаною похідною у періодичному випадку можна ознайомитися в монографії В. Н. Темлякова [9], якщо  $\theta = \infty$  (для класів Нікольського), та у монографії А. С. Романюка [10], якщо  $1 \leq \theta < \infty$  (для класів Бесова). На даний час є значний інтерес до дослідження різних аналогів класів Нікольського–Бесова, які визначаються гладкішим параметром  $\Omega$ , що підпорядкований деяким додатковим умовам: Н. Н. Пустовойтов [11], [12], Wang Heping і Sun Yongsheng [13], Liqin Duan [14] та ін.

В [1] встановлено еквівалентне нормування лінійних просторів  $S_{p,\theta}^\Omega B$  опосередковано через, так зване, декомпозиційне представлення елементів цих просторів (див. нижче Теорему А). Зазначимо, що для просторів Нікольського–Бесова функцій мішаної гладкості, вперше декомпозиційне представлення та відповідне йому нормування з'явилося у роботі С. М. Нікольського та П. І. Лізоркіна [15] і, як з'ясувалося пізніше, відіграло ключову роль у дослідженнях, які пов'язані з апроксимацією класів функцій. Оскільки у формулюванні результату з [1], щодо нормування простору  $S_{p,\theta}^\Omega B$ , присутні величини, які означаються за допомогою перетворення Фур'є функцій, що визначені на  $\mathbb{R}^d$ , то наведемо відповідні означення.

Нехай  $S = S(\mathbb{R}^d)$  — простір Л. Шварца основних нескінченно диференційовних на  $\mathbb{R}^d$  комплекснозначних функцій  $\varphi$ , що спадають на нескінченності разом зі своїми похідними швидше за будь-який степінь функції  $(x_1^2 + \dots + x_d^2)^{-\frac{1}{2}}$  (див., наприклад, [16]). Через  $S'$  позначимо простір лінійних неперервних функціоналів над  $S$ . Зазначимо, що елементами простору  $S'$  є узагальнені функції повільного росту. Якщо  $f \in S'$ , то  $\langle f, \varphi \rangle$  позначає значення функціонала  $f$  на пробній функції  $\varphi \in S$ .

Перетворення Фур'є  $\mathfrak{F}\varphi : S \rightarrow S$  визначається згідно з формулою:

$$(\mathfrak{F}\varphi)(\boldsymbol{\lambda}) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(\mathbf{t}) e^{-i(\boldsymbol{\lambda}, \mathbf{t})} d\mathbf{t} \equiv \tilde{\varphi}(\boldsymbol{\lambda}).$$

Обернене перетворення Фур'є задається таким чином:

$$(\mathfrak{F}^{-1}\varphi)(\mathbf{t}) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(\boldsymbol{\lambda}) e^{i(\boldsymbol{\lambda}, \mathbf{t})} d\boldsymbol{\lambda} \equiv \hat{\varphi}(\mathbf{t}).$$

Перетворення Фур'є (обернене перетворення Фур'є) узагальнених функцій  $f \in S'$  визначається згідно з формулою

$$\langle \mathfrak{F}f, \varphi \rangle = \langle f, \mathfrak{F}\varphi \rangle, \quad \langle \tilde{f}, \varphi \rangle = \langle f, \tilde{\varphi} \rangle, \quad \varphi \in S,$$

$$\langle (\mathfrak{F}^{-1}f), \varphi \rangle = \langle f, \mathfrak{F}^{-1}\varphi \rangle, \quad \langle \hat{f}, \varphi \rangle = \langle f, \hat{\varphi} \rangle, \quad \varphi \in S.$$

Носієм узагальненої функції  $f$  будемо називати замикання  $\overline{\mathfrak{N}}$  такої множини точок  $\mathfrak{N} \subset \mathbb{R}^d$ , що для довільної  $\varphi \in S$ , яка дорівнює нулю в  $\overline{\mathfrak{N}}$ , виконується рівність  $\langle f, \varphi \rangle = 0$ . Носій узагальненої функції  $f$  будемо позначати через  $\text{supp } f$ . Також будемо говорити, що функція  $f$  зосереджена на множині  $G$ , якщо  $\text{supp } f \subseteq G$ .

Зазначимо, що для  $1 \leq p \leq \infty$  існує природне неперервне вкладення  $L_p(\mathbb{R}^d)$  в  $S'$  і в цьому сенсі функції з  $L_p(\mathbb{R}^d)$  отожднюються з елементами з  $S'$ .

Далі, для кожного вектора  $\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_d)$ ,  $s_j \in \mathbb{Z}_+$ ,  $j = \overline{1, d}$ , розглянемо множину

$$Q_{2^{\mathbf{s}}}^* := Q^*(\mathbf{s}) := \left\{ \boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_d) : \eta(s_j)2^{s_j-1} \leq |\lambda_j| < 2^{s_j}, \right. \\ \left. \lambda_j \in \mathbb{R}, j = \overline{1, d} \right\},$$

де  $\eta(0) = 0$  і  $\eta(t) = 1$ ,  $t > 0$ .

Нехай  $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^d$  — деяка вимірنا множина. Позначимо через  $\chi_{\mathcal{A}}$  характеристичну функцію множини  $\mathcal{A}$  і для  $f \in L_p(\mathbb{R}^d)$  покладемо

$$\delta_{\mathbf{s}}^*(f, \mathbf{x}) = \mathfrak{F}^{-1}(\chi_{Q_{2^{\mathbf{s}}}^*} \cdot \mathfrak{F}f).$$

**Теорема А ([1]).** *Нехай  $1 < p < \infty$  і  $\Omega \in \Phi_{\alpha, l}$ . Функція  $f$  належить простору  $S_{p, \theta}^{\Omega} B$ ,  $1 \leq \theta < \infty$ , тоді і тільки тоді, коли*

$$\left\{ \sum_{\mathbf{s} \geq 0} (\Omega(2^{-\mathbf{s}}))^{-\theta} \|\delta_{\mathbf{s}}^*(f, \cdot)\|_p^{\theta} \right\}^{\frac{1}{\theta}} < \infty,$$

до того ж

$$\|f\|_{S_{p, \theta}^{\Omega} B} \asymp \left\{ \sum_{\mathbf{s} \geq 0} (\Omega(2^{-\mathbf{s}}))^{-\theta} \|\delta_{\mathbf{s}}^*(f, \cdot)\|_p^{\theta} \right\}^{\frac{1}{\theta}}, \quad (1)$$

де  $\Omega(2^{-\mathbf{s}}) = \Omega(2^{-s_1}, \dots, 2^{-s_d})$ .

Функція  $f$  належить простору  $S_{p, \infty}^{\Omega} B$ , тоді і тільки тоді, коли

$$\sup_{\mathbf{s} \geq 0} \frac{\|\delta_{\mathbf{s}}^*(f, \cdot)\|_p}{\Omega(2^{-\mathbf{s}})} < \infty,$$

до того ж

$$\|f\|_{S_{p, \infty}^{\Omega} B} \asymp \sup_{\mathbf{s} \geq 0} \frac{\|\delta_{\mathbf{s}}^*(f, \cdot)\|_p}{\Omega(2^{-\mathbf{s}})}. \quad (2)$$

Тут і надалі по тексту для додатних величин  $A$  і  $B$  використовується запис  $A \asymp B$ , який означає, що існують такі додатні сталі  $C_3$  та  $C_4$ , які не залежать від одного істотного параметра у величинах  $A$  і  $B$  (наприклад, у вище наведених співвідношеннях (1) і (2) — від функції  $f$ ), що  $C_3 A \leq B \leq C_4 A$ . Якщо тільки  $B \leq C_4 A$  ( $B \geq C_3 A$ ), то пишемо  $B \ll A$  ( $B \gg A$ ). Всі сталі  $C_i$ ,  $i = 1, 2, \dots$ , які зустрічаються у роботі, залежать, можливо, лише від параметрів, що входять в означення класу, метрики, в якій оцінюється похибка наближення, та розмірності простору  $\mathbb{R}^d$ .

Під класом  $S_{p, \theta}^{\Omega} B$  будемо розуміти множину функцій  $f \in L_p(\mathbb{R}^d)$  для яких  $\|f\|_{S_{p, \theta}^{\Omega} B} \leq 1$  і при цьому збережемо для класів  $S_{p, \theta}^{\Omega} B$  ті ж самі позначення, що і для просторів  $S_{p, \theta}^{\Omega} B$ .

Перейдемо до означення апроксимативних характеристик.

Нехай  $\mathcal{L} \subset \mathbb{Z}_+^d$  — деяка обмежена множина. Покладемо

$$Q(\mathcal{L}) = \bigcup_{s \in \mathcal{L}} Q^*(s)$$

і позначимо

$$G(Q(\mathcal{L})) = \left\{ f \in L_q(\mathbb{R}^d) : \text{supp } \mathfrak{F}f \subseteq Q(\mathcal{L}) \right\}.$$

Відомо, що елементами множини  $G(Q(\mathcal{L}))$  є цілі функції експоненціального типу.

Для  $f \in L_q(\mathbb{R}^d)$ ,  $1 \leq q \leq \infty$ , означимо величину

$$E(f, G(Q(\mathcal{L})))_q := E_{Q(\mathcal{L})}(f)_q := \inf_{g \in G(Q(\mathcal{L}))} \|f(\cdot) - g(\cdot)\|_q,$$

яка називається найкращим наближенням функції  $f$  цілими функціями з множини  $G(Q(\mathcal{L}))$ . Якщо  $F \subset L_q(\mathbb{R}^d)$  — деякий функціональний клас, то покладемо

$$E_{Q(\mathcal{L})}(F)_q = \sup_{f \in F} E_{Q(\mathcal{L})}(f)_q. \quad (3)$$

Далі для  $f \in L_q(\mathbb{R}^d)$ ,  $1 \leq q \leq \infty$ , покладемо

$$S_{Q(\mathcal{L})}f(\mathbf{x}) = S_{Q(\mathcal{L})}(f, \mathbf{x}) = \sum_{s \in \mathcal{L}} \delta_s^*(f, \mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$$

і означимо

$$\mathcal{E}_{Q(\mathcal{L})}(f)_q = \|f(\cdot) - S_{Q(\mathcal{L})}f(\cdot)\|_q, \quad \mathcal{E}_{Q(\mathcal{L})}(F)_q = \sup_{f \in F} \mathcal{E}_{Q(\mathcal{L})}(f)_q. \quad (4)$$

Наші дослідження величин (3) та (4) проводяться у випадку, коли  $F = S_{p,\theta}^\Omega B$ , а множина  $\mathcal{L}$  певним чином пов'язана з функцією  $\Omega$ .

Для будь-якого  $N \in \mathbb{N}$ ,  $1 < p < q < \infty$  покладемо

$$\kappa(\Omega, N) := \kappa(N) := \left\{ \mathbf{s} = (s_1, \dots, s_d) \in \mathbb{Z}_+^d : \Omega(2^{-\mathbf{s}}) 2^{\|\mathbf{s}\|_1 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)} \geq \frac{1}{N} \right\},$$

$$Q(\kappa(N)) := Q(N) =: \bigcup_{\mathbf{s} \in \kappa(N)} Q^*(\mathbf{s}),$$

де  $\|\mathbf{s}\|_1 = s_1 + \dots + s_d$ .

Зазначимо, що множини  $Q(N)$  породжуються поверхнями рівня функції  $\Omega(\mathbf{t}) \mathbf{t}^{-\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)}$ ,  $\Omega(\mathbf{t}) \in \Phi_{\alpha,l}$ ,  $\alpha > \frac{1}{p} - \frac{1}{q}$ . Якщо

$$\Omega(\mathbf{t}) = \Omega_1(\mathbf{t}) / \prod_{j=1}^d t_j^{-\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)}$$

і  $\Omega_1(\mathbf{t}) = \prod_{j=1}^d t_j^{r_j}$ ,  $0 < r_j < l$ ,  $j = \overline{1, d}$ , одержимо множини  $Q(N)$ , які називаються східчастими гіперболічними хрестами.

Зазначимо, що наближення класів Нікольського–Бесова періодичних функцій мішаної гладкості тригонометричними поліномами зі спектром у східчастому гіперболічному хресті та у множинах  $Q(N)$  розглядалися, зокрема, у роботах [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23]. З детальною історією питання можна ознайомитися в оглядовій статті [24].

Формулювання допоміжних результатів та доведення основних потребує означення ще деяких множин в  $\mathbb{Z}_+^d$ .

Покладемо

$$\kappa^\perp(\Omega, N) := \kappa^\perp(N) := \left\{ \mathbf{s} = (s_1, \dots, s_d) \in \mathbb{Z}_+^d : \Omega(2^{-\mathbf{s}}) 2^{\|\mathbf{s}\|_1 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)} < \frac{1}{N} \right\},$$

$$\Theta(N) := \kappa^\perp(N) \setminus \kappa^\perp(2^l N),$$

тобто

$$\Theta(N) = \left\{ \mathbf{s} = (s_1, \dots, s_d) \in \mathbb{Z}_+^d : \frac{1}{2^l N} \leq \Omega(2^{-\mathbf{s}}) 2^{\|\mathbf{s}\|_1 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)} < \frac{1}{N} \right\} \quad (5)$$

У [20] показано, що має місце співвідношення

$$|\Theta(N)| \asymp (\log_2 N)^{d-1}, \quad (6)$$

де через  $|A|$  позначено кількість елементів скінченної множини  $A$ .

Мають місце такі твердження.

**Лема А** ([20]). *Нехай  $\Omega$  – функція типу мішаного модуля неперервності порядку  $l$ , яка задовольняє умову  $(S^\alpha)$ ,  $\alpha > 0$ . Тоді для  $0 < \mu < \infty$*

$$\sum_{\mathbf{s} \in \kappa^\perp(N)} (\Omega(2^{-\mathbf{s}}))^\mu \ll \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} (\Omega(2^{-\mathbf{s}}))^\mu. \quad (7)$$

**Лема Б** ([20]). *Нехай  $\Omega$  – функція типу мішаного модуля неперервності порядку  $l$ , яка задовольняє умову  $(S^\alpha)$ , при  $\alpha > \beta > 0$ . Тоді для  $0 < \mu < \infty$*

$$\sum_{\mathbf{s} \in \kappa^\perp(N)} (\Omega(2^{-\mathbf{s}}) 2^{\|\mathbf{s}\|_1 \beta})^\mu \ll \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} (\Omega(2^{-\mathbf{s}}) 2^{\|\mathbf{s}\|_1 \beta})^\mu. \quad (8)$$

Як наслідок з (7), (8), (5) та (6) для  $0 < \mu < \infty$  маємо

$$\begin{aligned} \sum_{\mathbf{s} \in \kappa^\perp(N)} \left( \Omega(2^{-\mathbf{s}}) 2^{\|\mathbf{s}\|_1 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)} \right)^\mu &\ll \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} \left( \Omega(2^{-\mathbf{s}}) 2^{\|\mathbf{s}\|_1 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)} \right)^\mu < \\ &< \left( \frac{1}{N} \right)^\mu \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} 1 = \left( \frac{1}{N} \right)^\mu |\Theta(N)| \asymp \left( \frac{1}{N} \right)^\mu (\log_2 N)^{d-1}. \end{aligned} \quad (9)$$

**Теорема Б** (Літлвуда–Пелі) (див., наприклад, [25, с. 81], [26]). *Нехай задано  $1 < p < \infty$ . Існують такі додатні числа  $C_5, C_6$ , що для кожної функції  $f \in L_p(\mathbb{R}^d)$  виконуються співвідношення*

$$C_5 \|f\|_p \leq \left\| \left( \sum_{\mathbf{s} \geq 0} |\delta_{\mathbf{s}}^*(f, \cdot)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_p \leq C_6 \|f\|_p.$$

У подальших міркуваннях нами буде використана лема, яка є аналогом відповідної леми у періодичному випадку [9, гл. 1, § 3].

**Лема В** ([7]). *Нехай задано  $1 < p < q < \infty$  і  $f \in L_p(\mathbb{R}^d)$ . Тоді*

$$\|f\|_q \ll \left( \sum_{s \geq 0} \|\delta_s^*(f, \cdot)\|_p^q 2^{\|s\|_1 (\frac{1}{p} - \frac{1}{q})q} \right)^{\frac{1}{q}}.$$

**2. Порядкові оцінки апроксимативних характеристик класів  $S_{p,\theta}^\Omega B(\mathbb{R}^d)$  у метриці простору  $L_q(\mathbb{R}^d)$ ,  $1 < p < q < \infty$ .** Наша мета полягає у встановленні порядкових по параметру  $N$  оцінок величин  $E_{Q(\mathcal{L})}(F)_q$  та  $\mathcal{E}_{Q(\mathcal{L})}(F)_q$  для  $F = S_{p,\theta}^\Omega B$  у випадку, коли  $\mathcal{L} = \kappa(N)$ , при певних обмеженнях на параметри  $p, q, \theta$  та  $\Omega$ .

При цьому зазначимо, що при  $1 < q < \infty$  і  $f \in L_q(\mathbb{R}^d)$  має місце співвідношення (див., наприклад, [15])

$$E_{Q(\mathcal{L})}(f)_q \leq \mathcal{E}_{Q(\mathcal{L})}(f)_q \leq C E_{Q(\mathcal{L})}(f)_q, \quad (10)$$

де  $C \geq 1$  — деяка стала.

**Теорема 1.** *Нехай  $1 < p < q < \infty$ ,  $1 \leq \theta \leq \infty$ ,  $\Omega \in \Phi_{\alpha,l}$ , з деяким  $\alpha > \frac{1}{p} - \frac{1}{q}$ , тоді мають місце порядкові оцінки*

$$\mathcal{E}_{Q(N)}(S_{p,\theta}^\Omega B)_q \asymp E_{Q(N)}(S_{p,\theta}^\Omega B)_q \asymp \frac{1}{N} (\log_2 N)^{(d-1)(\frac{1}{q} - \frac{1}{\theta})_+}, \quad (11)$$

де  $a_+ = \max\{0, a\}$ .

Зауважимо, що умова  $\Omega \in \Phi_{\alpha,l}$ , з деяким  $\alpha > \beta = \frac{1}{p} - \frac{1}{q}$  забезпечує те, що для  $f \in S_{p,\theta}^\Omega B$  маємо  $f \in S_{q,\theta}^{\Omega_1} B \subset L_q$ ,  $\Omega_1(\mathbf{t}) = \Omega(\mathbf{t})\mathbf{t}^{-\beta}$  і  $\|f\|_{S_{q,\theta}^{\Omega_1} B} \ll \|f\|_{S_{p,\theta}^\Omega B}$  (див., наприклад, [27]).

**Доведення.** Спочатку встановимо в (11) оцінки зверху. Нехай  $f \in S_{p,\theta}^\Omega B$  і  $1 < p < q < \infty$ . Тоді, скориставшись співвідношенням (10) і лемою В, можемо записати

$$\begin{aligned} E_{Q(N)}(f)_q &\asymp \mathcal{E}_{Q(N)}(f)_q = \left\| f(\cdot) - \sum_{s \in \kappa(N)} \delta_s^*(f, \cdot) \right\|_q = \left\| \sum_{s \in \kappa^\perp(N)} \delta_s^*(f, \cdot) \right\|_q \ll \\ &\ll \left( \sum_{s \in \kappa^\perp(N)} \|\delta_s^*(f, \cdot)\|_p^q 2^{\|s\|_1 (\frac{1}{p} - \frac{1}{q})q} \right)^{\frac{1}{q}}. \end{aligned} \quad (12)$$

Далі розглянемо декілька співвідношень між параметрами  $q$  і  $\theta$ .

1) Нехай  $q < \theta$ . Тоді, для  $1 < \theta < \infty$ , застосувавши до (12) нерівність Гельдера з показником  $\frac{\theta}{q}$  та співвідношення (9), одержуємо

$$E_{Q(N)}(f)_q \ll \left( \sum_{s \in \kappa^\perp(N)} \|\delta_s^*(f, \cdot)\|_p^\theta (\Omega(2^{-s}))^{-\theta} \right)^{\frac{1}{\theta}} \times$$



$$\begin{aligned}
& \times \left( \sum_{\mathbf{s} \in \kappa^\perp(N)} \left( 2^{\|\mathbf{s}\|_1 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)} \Omega(2^{-s}) \right)^{\frac{q\theta}{\theta-q}} \right)^{\frac{1}{q} - \frac{1}{\theta}} \leq \\
& \leq \|f\|_{S_{p,\theta}^\Omega B} \left( \sum_{\mathbf{s} \in \kappa^\perp(N)} \left( 2^{\|\mathbf{s}\|_1 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)} \Omega(2^{-s}) \right)^{\frac{q\theta}{\theta-q}} \right)^{\frac{1}{q} - \frac{1}{\theta}} \ll \\
& \ll \frac{1}{N} |\Theta(N)|^{\frac{1}{q} - \frac{1}{\theta}} \asymp \frac{1}{N} (\log_2 N)^{(d-1)\left(\frac{1}{q} - \frac{1}{\theta}\right)}
\end{aligned}$$

Якщо ж  $\theta = \infty$ , то для  $f \in S_{p,\infty}^\Omega B$ , згідно з теоремою А, має місце співвідношення  $\|\delta_s^*(f, \cdot)\|_p \ll \Omega(2^{-s})$ . Тому, скориставшись (9), будемо мати

$$\begin{aligned}
E_{Q(N)}(f)_q & \ll \left( \sum_{\mathbf{s} \in \kappa^\perp(N)} \left( 2^{\|\mathbf{s}\|_1 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)} \Omega(2^{-s}) \right)^q \right)^{\frac{1}{q}} \ll \frac{1}{N} |\Theta(N)|^{\frac{1}{q}} \asymp \\
& \asymp \frac{1}{N} (\log_2 N)^{\frac{d-1}{q}}.
\end{aligned}$$

2) Нехай тепер  $1 \leq \theta \leq q < \infty$ ,  $q \neq 1$ . Скориставшись нерівністю

$$\left( \sum_k |a_k|^{v_2} \right)^{\frac{1}{v_2}} \leq \left( \sum_k |a_k|^{v_1} \right)^{\frac{1}{v_1}}, \quad 0 < v_1 \leq v_2 < \infty,$$

(див., [28, с. 43]), беручи до уваги, що  $\Omega \in \Phi_{\alpha,l}$  з  $\alpha > \frac{1}{p} - \frac{1}{q}$  та врахувавши (5), із (12) отримуємо

$$\begin{aligned}
E_{Q(N)}(f)_q & \ll \left( \sum_{\mathbf{s} \in \kappa^\perp(N)} \|\delta_s^*(f, \cdot)\|_p^\theta (\Omega(2^{-s}))^{-\theta} 2^{\|\mathbf{s}\|_1 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)\theta} (\Omega(2^{-s}))^\theta \right)^{\frac{1}{\theta}} \ll \\
& \ll \left( \sum_{\mathbf{s} \in \kappa^\perp(N)} \|\delta_s^*(f, \cdot)\|_p^\theta (\Omega(2^{-s}))^{-\theta} \right)^{\frac{1}{\theta}} \sup_{\mathbf{s} \in \kappa^\perp(N)} 2^{\|\mathbf{s}\|_1 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)} \Omega(2^{-s}) \leq \\
& \leq \|f\|_{S_{p,\theta}^\Omega B} \sup_{\mathbf{s} \in \kappa^\perp(N)} 2^{\|\mathbf{s}\|_1 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)} \Omega(2^{-s}) \ll \frac{1}{N}.
\end{aligned}$$

Оцінки зверху в теоремі встановлено.

Перейдемо до встановлення оцінок знизу. Для цього при певних значеннях параметрів  $p$ ,  $q$  і  $\theta$  достатньо вказати функції  $f \in S_{p,\theta}^\Omega B$ , для яких оцінки знизу величин  $\mathcal{E}_{Q(N)}(f)_q$  співпадають за порядком з оцінками знизу величин  $\mathcal{E}_{Q(N)}(S_{p,\theta}^\Omega B)_q$  в (11). Спочатку означимо функцію, на основі якої буде здійснюватися побудова таких функцій  $f$ .

Для  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$  покладемо

$$D_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = \prod_{j=1}^d D_{k_j}(x_j), \quad \mathbf{k} \in \mathbb{Z}_+^d,$$

де

$$D_{k_j}(x_j) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left( 2 \sin \frac{x_j}{2} \cos \frac{2k_j + 1}{2} x_j \right) \cdot x_j^{-1}.$$

У роботі [7] показано, що для перетворення Фур'є функції  $D_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$  справедлива рівність

$$\mathfrak{F} D_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = \chi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = \prod_{j=1}^d \chi_{k_j}(x_j),$$

де

$$\chi_n(\lambda_j) = \begin{cases} 1, & a_j^{n-1} < |\lambda_j| < a_j^n, \\ \frac{1}{2}, & |\lambda_j| = a_j^{n-1} \text{ або } |\lambda_j| = a_j^n, \\ 0 & \text{— в інших випадках,} \end{cases}$$

$$\chi_0(x_j) = \begin{cases} 1, & |\lambda_j| < 1; \\ \frac{1}{2}, & |\lambda_j| = 1; \\ 0, & |\lambda_j| > 1. \end{cases}$$

Для оберненого перетворення будемо мати

$$\mathfrak{F}^{-1} \chi_{\mathbf{k}}(\mathbf{t}) = D_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}).$$

Зазначимо, що має місце оцінка [7]

$$\left\| \sum_{\mathbf{k} \in \rho_+(\mathbf{s})} D_{\mathbf{k}}(\cdot) \right\|_p \asymp 2^{\|\mathbf{s}\|_1 (1 - \frac{1}{p})}, \quad (13)$$

де

$$\rho_+(\mathbf{s}) := \left\{ \mathbf{k} = (k_1, \dots, k_d) : \eta(s_j) 2^{s_j-1} \leq k_j < 2^{s_j}, k_j \in \mathbb{Z}_+^d, j = \overline{1, d} \right\}.$$

Далі розглянемо декілька випадків у залежності від значень параметрів  $p$ ,  $q$  і  $\theta$ . Нехай  $\theta = \infty$ . Розглянемо функцію

$$f_1(\mathbf{x}) = C_7 \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} \Omega(2^{-\mathbf{s}}) 2^{-\|\mathbf{s}\|_1 (1 - \frac{1}{p})} \sum_{\mathbf{k} \in \rho_+(\mathbf{s})} D_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}).$$

При певному виборі сталої  $C_7 > 0$  дана функція належить до класу  $S_{p, \theta}^\Omega B$  оскільки, скориставшись оцінкою (13), можемо записати

$$\begin{aligned} \|f_1(\cdot)\|_{S_{p, \infty}^\Omega B} &= \sup_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} \frac{\|\delta_{\mathbf{s}}^*(f_1, \cdot)\|_p}{\Omega(2^{-\mathbf{s}})} = \\ &= \sup_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} C_7 \frac{\left\| \Omega(2^{-\mathbf{s}}) 2^{-\frac{\|\mathbf{s}\|_1}{p}} \sum_{\mathbf{k} \in \rho_+(\mathbf{s})} D_{\mathbf{k}}(\cdot) \right\|_p}{\Omega(2^{-\mathbf{s}})} \leq C_8, \quad C_8 > 0. \end{aligned}$$

Для  $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_+^d$  покладемо

$$\Delta(\mathbf{s}) = \left\{ \mathbf{x} : 2^{-s_j-1} \leq x_j < 2^{-s_j}, j = \overline{1, d} \right\},$$

і зауважимо, що  $\Delta(\mathbf{s}) \cap \Delta(\mathbf{s}') = \emptyset$ , якщо  $\mathbf{s} \neq \mathbf{s}'$ . Таким чином, беручи до уваги, що  $S_{Q(N)}(f_1, \cdot) = 0$ , скориставшись теоремою Б та врахувавши, що (див., наприклад, [7])

$$\begin{aligned} \left| \sum_{\mathbf{k} \in \rho(\mathbf{s})} D_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \right| &= \left| \sum_{\mathbf{k} \in \rho(\mathbf{s})} \prod_{j=1}^d D_{k_j}(x_j) \right| = \left| \prod_{j=1}^d \sum_{k=\eta(s_j)2^{s_j-1}}^{2^{s_j}-1} D_{k_j}(x_j) \right| = \\ &= \left| \prod_{j=1}^d \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin 2^{s_j} x_j - \sin \eta(s_j) 2^{s_j-1} x_j}{x_j} \right|, \end{aligned}$$

а також (5) і (6), будемо мати

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{Q(N)}(S_{p,\theta}^\Omega B)_q &\geq \mathcal{E}_{Q(N)}(f_1)_q = \|f_1(\cdot)\|_q \gg \\ &\gg \left\| \left( \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} |\delta_{\mathbf{s}}^*(f_1, \cdot)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_q \geq \left( \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} \int_{\Delta(\mathbf{s})} |\delta_{\mathbf{s}}^*(f_1, \mathbf{x})|^q d\mathbf{x} \right)^{\frac{1}{q}} \gg \\ &\gg \left( \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} \int_{\Delta(\mathbf{s})} \left| \Omega(2^{-\mathbf{s}}) 2^{-\|\mathbf{s}\|_1(1-\frac{1}{p})} \sum_{\mathbf{k} \in \rho_+(\mathbf{s})} D_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \right|^q d\mathbf{x} \right)^{\frac{1}{q}} = \\ &= \left( \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} \left( \Omega(2^{-\mathbf{s}}) 2^{-\|\mathbf{s}\|_1(1-\frac{1}{p})} \right)^q \int_{\Delta(\mathbf{s})} \left| \sum_{\mathbf{k} \in \rho_+(\mathbf{s})} D_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \right|^q d\mathbf{x} \right)^{\frac{1}{q}} \gg \\ &\gg \left( \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} \left( \Omega(2^{-\mathbf{s}}) 2^{\|\mathbf{s}\|_1(\frac{1}{p}-\frac{1}{q})} \right)^q \right)^{\frac{1}{q}} \geq \frac{1}{2^l N} |\Theta(N)|^{\frac{1}{q}} \asymp \\ &\asymp \frac{1}{N} (\log_2 N)^{\frac{d-1}{q}}. \end{aligned} \tag{14}$$

Нехай тепер  $1 \leq \theta \leq q < \infty$ ,  $q \neq 1$ . Розглянемо функцію

$$f_2(\mathbf{x}) := C_9 \Omega(2^{-\tilde{\mathbf{s}}}) 2^{-\|\tilde{\mathbf{s}}\|_1(1-\frac{1}{p})} \sum_{\mathbf{k} \in \rho_+(\tilde{\mathbf{s}})} D_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}), \quad \tilde{\mathbf{s}} \in \Theta(N), \quad C_9 > 0.$$

Згідно з (13) маємо

$$\begin{aligned} \|f_2(\cdot)\|_{S_{p,\theta}^\Omega B} &\asymp \left( \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} (\Omega(2^{-\mathbf{s}}))^{-\theta} \|\delta_{\mathbf{s}}^*(f_2, \cdot)\|_p^\theta \right)^{\frac{1}{\theta}} \ll \\ &\ll \left( (\Omega(2^{-\tilde{\mathbf{s}}}))^{-\theta} (\Omega(2^{-\tilde{\mathbf{s}}}))^\theta 2^{-\theta \|\tilde{\mathbf{s}}\|_1(1-\frac{1}{p})} \left\| \sum_{\mathbf{k} \in \rho_+(\tilde{\mathbf{s}})} D_{\mathbf{k}}(\cdot) \right\|_p^\theta \right)^{\frac{1}{\theta}} \asymp \end{aligned}$$

$$\asymp \left( 2^{-\theta \|\bar{s}\|_1 (1-\frac{1}{p})} 2^{\theta \|\bar{s}\|_1 (1-\frac{1}{p})} \right)^{\frac{1}{\theta}} = 1,$$

а отже,  $f_2 \in S_{p,\theta}^\Omega B$  при певному значенні сталої  $C_9$ .

Врахувавши, що  $S_{Q(N)}(f_2, \cdot) = 0$ , (13) та (5), отримуємо

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{Q(N)}(S_{p,\theta}^\Omega B)_q &\geq \mathcal{E}_{Q(N)}(f_2)_q = \|f_2(\cdot)\|_q \gg \\ &\gg \Omega(2^{-\bar{s}}) 2^{-\|\bar{s}\|_1 (1-\frac{1}{p})} \left\| \sum_{\mathbf{k} \in \rho_+(\bar{s})} D_{\mathbf{k}}(\cdot) \right\|_q \asymp \\ &\asymp \Omega(2^{-\bar{s}}) 2^{-\|\bar{s}\|_1 (1-\frac{1}{p})} 2^{\|\bar{s}\|_1 (1-\frac{1}{q})} = \Omega(2^{-\bar{s}}) 2^{\|\bar{s}\|_1 (\frac{1}{p}-\frac{1}{q})} \geq \frac{1}{2^l N}. \end{aligned}$$

У випадку  $1 < q < \theta < \infty$  для функції

$$f_3(\mathbf{x}) = C_{10} |\Theta(N)|^{-\frac{1}{\theta}} \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} \Omega(2^{-\mathbf{s}}) 2^{-\|\mathbf{s}\|_1 (1-\frac{1}{p})} \sum_{\mathbf{k} \in \rho_+(\mathbf{s})} D_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}),$$

скориставшись співвідношенням (13), отримаємо

$$\begin{aligned} \|f_3(\cdot)\|_{S_{p,\theta}^\Omega B} &\asymp |\Theta(N)|^{-\frac{1}{\theta}} \left( \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} (\Omega(2^{-\mathbf{s}}))^{-\theta} \|\delta_{\mathbf{s}}^*(f_3, \cdot)\|_p^\theta \right)^{\frac{1}{\theta}} \asymp \\ &\asymp |\Theta(N)|^{-\frac{1}{\theta}} \left( \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} (\Omega(2^{-\mathbf{s}}))^{-\theta} (\Omega(2^{-\mathbf{s}}))^\theta 2^{-\|\mathbf{s}\|_1 \theta (1-\frac{1}{p})} \times \right. \\ &\quad \left. \times \left\| \sum_{\mathbf{k} \in \rho_+(\mathbf{s})} D_{\mathbf{k}}(\cdot) \right\|_p^\theta \right)^{\frac{1}{\theta}} \ll \\ &\ll |\Theta(N)|^{-\frac{1}{\theta}} \left( \sum_{\mathbf{s} \in \Theta(N)} 2^{-\|\mathbf{s}\|_1 \theta (1-\frac{1}{p})} 2^{\|\mathbf{s}\|_1 \theta (1-\frac{1}{p})} \right)^{\frac{1}{\theta}} = 1. \end{aligned}$$

Отже,  $f_3 \in S_{p,\theta}^\Omega B$  для деякого значення  $C_{10} > 0$ .

Враховуючи, що  $S_{Q(N)}(f_3, \cdot) = 0$ , та провівши міркування, аналогічні до тих, що використовувалися для встановлення оцінки (14), одержимо

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{Q(N)}(S_{p,\theta}^\Omega B)_q &\geq \mathcal{E}_{Q(N)}(f_3)_q = \|f_3(\cdot)\|_q \gg \frac{1}{N} |\Theta(N)|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{\theta}} \asymp \\ &\asymp \frac{1}{N} (\log_2 N)^{(d-1)(\frac{1}{q}-\frac{1}{\theta})}. \end{aligned}$$

Оцінки знизу в (11) встановлено. Теорему 1 доведено.

На завершення зробимо коментарі щодо одержаних результатів.

Нехай  $\omega(\tau)$  — функція однієї змінної,  $\omega \in \Phi_{\alpha,l}$ ,  $\alpha > 0$ , і функція типу мішаного модуля неперервності порядку  $l$  задається таким чином

$$\Omega(\mathbf{t}) = \Omega(t_1, \dots, t_d) = \omega\left(\prod_{j=1}^d t_j\right), \quad \Omega \in \Phi_{\alpha,l}, \quad \alpha > 0.$$

При такому вигляді функціонального параметру  $\Omega$  оцінки величини  $E_{\bar{Q}_n}(S_{p,\theta}^\Omega B)_q$ , у випадку  $1 < p < q < \infty$ ,  $\alpha > \frac{1}{p} - \frac{1}{q}$ , де  $\bar{Q}_n = \bigcup_{\|\mathbf{s}\|_1 < n} Q(\mathbf{s})$ , встановлено у роботі [27] і,

зокрема, у випадку  $\Omega(\mathbf{t}) = \prod_{j=1}^d t_j^r$ ,  $\frac{1}{p} - \frac{1}{q} < r < l$  — в [7]. Зазначимо, що в [7] розглядався також випадок, коли  $\mathbf{r} = (r_1, \dots, r_d)$ ,  $r_j > \frac{1}{p} - \frac{1}{q}$ ,  $j = \overline{1, d}$ .

Автори висловлюють вдячність А. С. Романюку та В. С. Романюку за їх увагу до роботи та обговорення одержаних результатів.

## Література

- [1] S. A. Stasyuk, S.Ya. Yachenko, *Approximation of functions from Nikolskii–Besov type classes of generalized mixed smoothness* // Anal. Math., **41**, (2015), 311–334.
- [2] С. Я. Янченко, *Порядкові оцінки апроксимативних характеристик функцій із класів  $S_{p,\theta}^\Omega B(\mathbb{R}^d)$  із заданою мажорантою мішаних модулів неперервності у рівномірній метриці* // Укр. мат. журн., **68**, (2016), № 12, 1705–1714.
- [3] Н. К. Бари, С. Б. Стечкин, *Наилучшие приближения и дифференциальные свойства двух сопряженных функций* // Тр. Моск. мат. о-ва., **5**, (1956), 483–522.
- [4] С. М. Никольский, *Функции с доминирующей смешанной производной, удовлетворяющей кратному условию Гельдера* // Сиб. мат. журн., **4**, (1963), № 6, 1342–1364.
- [5] Т. И. Аманов, *Теоремы представления и вложения для функциональных пространств  $S_{p,\theta}^{(r)} B(\mathbb{R}_n)$  и  $S_{p,\theta}^{(r)*} B$ , ( $0 \leq x_j \leq 2\pi$ ;  $j = 1, \dots, n$ )* // Тр. Мат. ин-та АН СССР., **77**, (1965), 5–34.
- [6] Т. И. Аманов, *Пространства дифференцируемых функций с доминирующей смешанной производной*, Казах. ССР, Алма-Ата, Наука, 1976.
- [7] Wang Heping, Sun Yongsheng, *Approximation of multivariate functions with a certain mixed smoothness by entire functions* // Northeast. Math. J., **11**, (1995), № 4, 454–466.
- [8] Heping Wang, *Representation and approximation of multivariate function with bounded mixed smoothness by hyperbolic wavelets* // J. Math. Anal. Appl., **291**, (2004), 698–715.

- [9] В. Н. Темляков, *Приближение функций с ограниченной смешанной производной* // Тр. Мат. ин-та АН СССР., **178**, (1986), 1–112.
- [10] А. С. Романюк, *Аппроксимативные характеристики классов периодических функций многих переменных*, Киев, Ин-тут математики НАН Украины, 2012.
- [11] Н. Н. Пустовойтов, *Представление и приближение периодических функций многих переменных с заданным смешанным модулем непрерывности* // Anal. Math., **20**, (1994), 35–48.
- [12] Н. Н. Пустовойтов, *О поперечниках по Колмогорову классов функций с заданным смешанным модулем непрерывности* // Anal. Math., **38**, (1994), № 1, 41–64.
- [13] Wang Sun Yongsheng and Wang Heping, *Representation and approximation of multivariate periodic functions with bounded mixed moduli of smoothness* // Тр. Мат. ин-та РАН., **219**, (1997), 356–377.
- [14] Liqin Duan, *The best  $m$ -term approximations on generalized Besov classes  $MB_{q,\theta}^\Omega$  with regard to orthogonal dictionaries* // J. of Approx. Theory, **162**, (2010), 1964–1981.
- [15] П. И. Лизоркин, С. М. Никольский, *Пространства функций смешанной гладкости с декомпозиционной точки зрения* // Тр. Мат. ин-та АН СССР, **187**, (1989), 143–161.
- [16] П. И. Лизоркин, *Обобщенное ливиллевское дифференцирование и метод мультипликаторов в теории вложений классов дифференцируемых функций* // Тр. Мат. ин-та АН СССР, **105**, (1969), 89–167.
- [17] Динь Зунг, *Приближение функций многих переменных на торе тригонометрическими полиномами* // Мат. сб., **131(173)**, (1986), № 2(10), 251–271
- [18] А. С. Романюк, *Приближение классов Бесова периодических функций многих переменных в пространстве  $L_q$*  // Укр. мат. журн., **43**, (1991), № 10, 1398–1408.
- [19] А. С. Романюк, *О приближении классов периодических функций многих переменных* // Укр. мат. журн., **44**, (1992), № 5, 662–672.
- [20] Н. Н. Пустовойтов, *Приближение многомерных функций с заданной мажорантой смешанных модулей непрерывности* // Мат. заметки, **65**, (1999), № 1, 107–117.
- [21] С. А. Стасюк, *Наилучшие приближения периодических функций многих переменных из классов  $B_{p,\theta}^\Omega$*  // Мат. заметки, **87**, (2010), № 1, 108–121.
- [22] С. А. Стасюк, *Приближение суммами Фурье и колмогоровские поперечники классов  $MB_{p,\theta}^\Omega$  периодических функций нескольких переменных* // Тр. Ин-та математики и механики УрО РАН, **20**, (2014), № 1, 247–257.

- [23] Ш. А. Балгимбаева, Т. И. Смирнов, *Оценки поперечников Фурье классов периодических функций со смешанным модулем гладкости* // Тр. Ин-та математики и механики УрО РАН, **21**, (2015), № 4, 78–94.
- [24] Dinh Dũng, Vladimir N. Temlyakov, Tino Ullrich, *Hyperbolic Cross Approximation*, arXiv:1601.03978v3 [math.NA] 21 Apr 2017.
- [25] С. М. Никольский, *Приближение функций многих переменных и теоремы вложения*, М.: Наука, 1969.
- [26] П. И. Лизоркин, *Теорема типа Литтльвуда–Палея для кратных интегралов Фурье* // Тр. Мат. ин-та АН СССР, **89**, (1967), 214–230.
- [27] С. Я. Янченко, *Наближення класів  $B_{p,\theta}^\Omega$  функцій багатьох змінних у просторі  $L_q(\mathbb{R}^d)$*  // Укр. мат. журн., **62**, (2010), № 1, 123–135.
- [28] Г. Г. Харди, Дж. Е. Литтльвуд, Г. Полия, *Неравенства*, М.: Изд-во иностр. лит., 1948.

**Contact information:** Department of the Theory of Functions, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 3, Tereshenkivska st., 01004, Kyiv, Ukraine.

E-mail: [Yan.Sergiy@gmail.com](mailto:Yan.Sergiy@gmail.com), [sergstas@ukr.net](mailto:sergstas@ukr.net)