

Représentations de réflexion de groupes de Coxeter

Deuxième partie: outils pour des exemples

François ZARA

Résumé

Cette partie est composée de trois sections. Dans la première section, nous étudions la famille de polynômes dont les racines sont $4 \cos^2 \frac{k\pi}{n}$, ($n \geq 3, 1 \leq k < \frac{n}{2}$). Nous obtenons ainsi une famille de polynômes orthogonaux. Cela nous permettra d'étudier en détail les exemples qui suivent. Dans la deuxième section nous donnons des formules techniques pour ne pas refaire les calculs à chaque fois. Dans la troisième section nous donnons des applications, d'abord lorsque le corps K est un sous-corps de \mathbb{R} (étude de présentations de $W(H_3)$ et $W(H_4)$) et ensuite dans le cas complexe (étude des groupes de réflexion complexes $G(p, p, n)$, G_{24} et G_{27}).

Abstract

This part is made of three sections. In the first section we study the family of polynomials whose roots are $4 \cos^2 \frac{k\pi}{n}$, ($n \geq 3, 1 \leq k < \frac{n}{2}$). We obtain in this manner a family of orthogonal polynomials. This will permit us to study in details all the examples which follow. In the second section, we give technical formulae in order not to repeat calculations. In the third section, we give applications, first when the field K is a sub-field of \mathbb{R} (presentations of $W(H_3)$ and $W(H_4)$) then in the complex case (study of the complex reflection group $G(p, p, n)$, G_{24} and G_{27}).

1 Une famille de polynômes orthogonaux

On donne quelques formules concernant les polynômes $u_n(X)$ et leurs racines qui nous seront utiles pour étudier les exemples.

Mots clés et phrases : groupes de Coxeter, groupes de réflexion, polynômes orthogonaux.
 Mathematics Subject Classification. 20F55, 22E40, 51F15, 33C45.

1.1 Les polynômes $u_n(X)$.

On commence par rappeler quelques résultats de [9]. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes à coefficients entiers :

$$u_{2n+1}(X) := \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{2n-k}{k} X^{n-k} \quad (n \geq 0), \quad (1)$$

$$u_{2n+2}(X) := \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{2n+1-k}{k} X^{n-k} \quad (n \geq 0), \quad (2)$$

$$u_0(X) := 0. \quad (3)$$

Les premiers polynômes sont : $u_0(X) = 0$, $u_1(X) = u_2(X) = 1$, $u_3(X) = X - 1$, $u_4(X) = X - 2$, $u_5(X) = X^2 - 3X + 1$, $u_6(X) = X^2 - 4X + 3$, $u_7(X) = X^3 - 5X^2 + 6X - 1$, etc. ...

Nous définissons $u_n(X)$ pour $n < 0$ par $u_n(X) = -u_{-n}(X)$.

Proposition 1. 1) Nous avons les formules de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad u_{2n+2}(X) - u_{2n+1}(X) + u_{2n}(X) = 0; \quad (\text{A1})$$

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad u_{2n+1}(X) - Xu_{2n}(X) + u_{2n-1}(X) = 0. \quad (\text{A2})$$

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad u_{n+2}(X) - (X-2)u_{n+1}(X) + u_n(X) = 0. \quad (\text{AR})$$

Les suites $n \mapsto (u_{2n}(X))$ et $n \mapsto (u_{2n+1}(X))$ forment chacune une base du \mathbb{Z} -module des solutions de la récurrence (R).

Proposition 2. 1) Nous avons :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad u_{2n+1}(4 \cos^2 \theta) = \frac{\sin(2n+1)\theta}{\sin \theta}, \quad (4)$$

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad u_{2n}(4 \cos^2 \theta) = \frac{\sin(2n)\theta}{\sin 2\theta}, \quad (5)$$

2) Pour chaque entier n , les racines de $u_{2n+1}(X)$ dans \mathbb{R} sont $4 \cos^2 \frac{k\pi}{2n+1}$ ($1 \leq k \leq n$) et celles de $u_{2n}(X)$ sont $4 \cos^2 \frac{k\pi}{2n}$ ($1 \leq k \leq n-1$).

Nous allons maintenant obtenir une factorisation en facteurs irréductibles de $u_n(X)$ dans $\mathbb{Z}[X]$.

Soit n un entier ≥ 1 . Nous définissons

— si n est impair $P_n(X) := \frac{X^n - 1}{X - 1}$,

— si n est pair $P_n(X) := \frac{X^n - 1}{X^2 - 1}$.

Alors les $P_n(X)$ sont des polynômes symétriques et

- si n est impair, $n = 2m + 1$, $\frac{1}{X^m}P_n(X)$ est un polynôme en $X + X^{-1}$,
- si n est pair, $n = 2m$, $\frac{1}{X^{m-1}}P_n(X)$ est un polynôme en $X + X^{-1}$.

Soit ζ une racine primitive n -ième de l'unité, par exemple $\zeta = \exp 2i\pi/n$, alors ζ est une racine de $P_n(X)$ car, pour $n > 2$, $\zeta \neq -1$. Nous avons $\zeta + \zeta^{-1} = 2 \cos 2\pi/n$ et $\gamma = \zeta + \zeta^{-1} + 2 = 4 \cos^2 \pi/n$. Nous voyons ainsi que γ est une racine de $u_n(X)$ et les autres racines de $u_n(X)$ sont obtenues en prenant les autres racines n -ièmes de l'unité ($\neq \pm 1$).

Proposition 3. *Avec les hypothèses et notations précédentes, nous avons :*

1. L'application $\delta : \zeta \mapsto \zeta + \zeta^{-1} + 2$ induit une bijection entre l'ensemble des racines de $P_n(X)$ et l'ensemble des racines de $u_n(X)$ (on définit $P_0(X) := 0$).
2. δ induit une bijection Δ entre l'ensemble des facteurs unitaires de $P_n(X)$ dans $\mathbb{Z}[X]$ et l'ensemble des facteurs unitaires de $u_n(X)$ dans $\mathbb{Z}[X]$.
3. Soit $\Phi_n(X)$ le n -ième polynôme cyclotomique. On pose $v_n(X) := \Delta(\Phi_n(X))$. Alors :

$$P_n(X) = \prod_{d|n, n \geq 3} \Phi_d(X) \quad \text{et} \quad u_n(X) = \prod_{d|n, n \geq 3} v_d(X).$$

On appelle $v_n(X)$ le *facteur primitif* de $u_n(X)$.

On définit une application $n \mapsto n' : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ de la manière suivante : $n' = 2n$ si n est impair ; $n' = \frac{n}{2}$ si $n \equiv 2 \pmod{4}$; $n' = n$ si $n \equiv 0 \pmod{4}$.

Il est facile de vérifier que si $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ est le n -ième corps cyclotomique, alors $\mathbb{Q}(\zeta_{n'}) = \mathbb{Q}(\zeta_n)$.

Si α est une racine de $v_n(X)$, alors $\alpha' = 4 - \alpha$ est une racine de $v_{n'}(X)$ et l'application $\alpha \mapsto \alpha'$ établit une bijection entre l'ensemble des racines de $v_n(X)$ et l'ensemble des racines de $v_{n'}(X)$.

On donne maintenant des propriétés de la suite $(u_n(X))_{n \in \mathbb{Z}}$ dont on aura besoin dans la suite.

Proposition 4. *On a les formules : $\forall (n, m) \in \mathbb{Z}^2$,*

$$u_{n+2m}(X) + u_{n-2m}(X) = (u_{2m+1}(X) - u_{2m-1}(X))u_n(X); \quad (6)$$

$$u_{n+2m+1}(X) + u_{n-(2m+1)}(X) = X(u_{2m+2}(X) - u_{2m}(X))u_n(X) \text{ si } n \text{ est pair} \quad (7)$$

$$u_{n+2m+1}(X) + u_{n-(2m+1)}(X) = (u_{2m+2}(X) - u_{2m}(X))u_n(X) \text{ si } n \text{ est impair.} \quad (8)$$

Corollaire 1. On a les formules $\forall n \in \mathbb{Z}$:

$$u_{2n}(X) = (u_{n+1}(X) - u_n(X))u_n(X); \quad (9)$$

$$u_{2n}(X) = u_{n+1}(X)(u_n(X) - u_{n-2}(X)) - 1 \quad (10)$$

$$= u_{n-1}(X)(u_{n+2}(X) - u_n(X)) + 1; \quad (11)$$

si n est pair

$$u_{2n+1}(X) = u_{n+1}(X)(u_{n+1}(X) - u_{n-1}(X)) - 1 \quad (12)$$

$$= Xu_n(X)(u_{n+2}(X) - u_n(X)) + 1 \quad (13)$$

si n est impair

$$u_{2n+1}(X) = Xu_{n+1}(X)(u_{n+1}(X) - u_{n-1}(X)) - 1 \quad (14)$$

$$= u_n(X)(u_{n+2}(X) - u_n(X)) + 1. \quad (15)$$

Démonstration. □

Les résultats qui suivent seront utilisés dans différentes parties du travail.

Proposition 5. On a la formule :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, u_{2n}(X) = (-1)^{n-1}u_{2n}(4 - X). \quad (16)$$

Démonstration. On procède par récurrence sur n si n est positif, la formule pour n négatif se déduisant immédiatement de celle pour n positif car $u_{-n}(X) = -u_n(X)$. Si $n = 0$, le résultat est vrai car $u_0(X) = 0$. Si $n = 1$, le résultat est vrai car $u_2(X) = 1$. On suppose le résultat vrai pour tout p , ($0 \leq p \leq n$).

On a la relation (R) : $u_{2n+2}(X) = (X - 2)u_{2n}(X) - u_{2n-2}(X)$. Nous transformons de deux manières le deuxième membre de cette égalité.

Posons $Y := 4 - X$. Nous obtenons

$$u_{2n+2}(4 - Y) = (2 - Y)u_{2n}(4 - Y) - u_{2n-2}(4 - Y),$$

d'où :

$$u_{2n+2}(4 - X) = (2 - X)u_{2n}(X) - u_{2n-2}(4 - X).$$

D'un autre coté, d'après l'hypothèse de récurrence, nous avons :

$$u_{2n+2}(X) = (X - 2)(-1)^{n-1}u_{2n}(4 - X) + (-1)^{n-1}u_{2n-2}(4 - X)$$

$$u_{2n+2}(X) = (-1)^{n-1}((X - 2)u_{2n}(4 - X) + u_{2n-2}(4 - X))$$

$$u_{2n+2}(X) = (-1)^n((2 - X)u_{2n}(4 - X) - u_{2n-2}(4 - X))$$

$$u_{2n+2}(X) = (-1)^n u_{2n+2}(4 - X).$$

Le résultat est donc vrai pour tout n . □

Corollaire 2. Si p est impair, on a :

$$u_{2p}(X) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}u_p(X)u_p(4 - X). \quad (17)$$

Démonstration. On a $u_{2p}(X) = u_p(X)(u_{p+1}(X) - u_{p-1}(X))$ (formule (A5)). Si $p = 2q+1$, alors $u_{p+1}(X) = u_{2q+2}(X) = (-1)^q u_{2q+2}(4-X)$ et $u_{p-1}(X) = u_{2q}(X) = (-1)^{q-1} u_{2q}(4-X)$ donc $u_{p+1}(X) - u_{p-1}(X) = (-1)^q (u_{2q+2}(4-X) + u_{2q}(4-X)) = (-1)^q u_{2q+1}(4-X)$ d'après (A1).

Finalement, $u_{2p}(X) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} u_p(X) u_p(4-X)$ \square

Corollaire 3. *Si α est une racine de $v_n(X)$, alors $4 - \alpha$ est une racine de $v_{n'}(X)$*

Démonstration. C'est clair d'après la proposition 5 et les corollaires 1 et 2. \square

Proposition 6. *On a les formules : $\forall (n, p) \in \mathbb{Z}^2$,*

$$u_{2n}(X) = u_p(X)u_{2n+1-p}(X) - u_{p-1}(X)u_{2n-p}(X). \quad (18)$$

$$\begin{aligned} u_{2n+1}(X) &= u_{2p+1}(X)u_{2n+1-2p}(X) - Xu_{2p}(X)u_{2n-2p}(X) \\ &= Xu_{2p+2}(X)u_{2n-2p}(X) - u_{2p+1}(X)u_{2n-2p-1}(X) \end{aligned} \quad (19)$$

$$\begin{aligned} u_{2n-1}(X) &= u_{2p-1}(X)u_{2n+1-2p}(X) - Xu_{2p-2}(X)u_{2n-2p}(X) \\ &= Xu_{2p}(X)u_{2n-2p}(X) - u_{2p-1}(X)u_{2n-2p-1}(X). \end{aligned} \quad (20)$$

Démonstration. 1) On pose, pour cette démonstration seulement,

$$u_{2n,p}(X) := u_p(X)u_{2n+1-p}(X) - u_{p-1}(X)u_{2n-p}(X)$$

et on montre que $u_{2n,p}(X)$ ne dépend pas de p . Nous distinguons deux cas suivant la parité de p .

— Si p est pair, on a $u_p(X) = u_{p-1}(X) - u_{p-2}(X)$ d'après (A1) donc

$$\begin{aligned} u_{2n,p}(X) &= (u_{p-1}(X) - u_{p-2}(X))u_{2n+1-p}(X) - u_{p-1}(X)u_{2n-p}(X) \\ &= u_{p-1}(X)(u_{2n+1-p}(X) - u_{2n-p}(X)) - u_{p-2}(X)u_{2n+1-p}(X) \\ &= u_{p-1}(X)u_{2n+2-p}(X) - u_{p-2}(X)u_{2n+1-p}(X) \\ &= u_{2n,p-1}(X) \end{aligned}$$

en utilisant (A1).

— Si p est impair, on a $u_p(X) = Xu_{p-1}(X) - u_{p-2}(X)$ d'après (A2) donc

$$\begin{aligned} u_{2n,p}(X) &= (Xu_{p-1}(X) - u_{p-2}(X))u_{2n+1-p}(X) - u_{p-1}(X)u_{2n-p}(X) \\ &= u_{p-1}(X)(Xu_{2n+1-p}(X) - u_{2n-p}(X)) - u_{p-2}(X)u_{2n+1-p}(X) \\ &= u_{p-1}(X)u_{2n+2-p}(X) - u_{p-2}(X)u_{2n+1-p}(X) \\ &= u_{2n,p-1}(X) \end{aligned}$$

en utilisant (A2).

Il en résulte que $u_{2n,p}(X)$ ne dépend pas de p . Comme $u_{2n,0}(X) = u_0(X)u_{2n+1}(X) - u_{-1}(X)u_{2n}(X) = u_{2n}(X)$ car $u_0(X) = 0$ et $-u_{-1}(X) = u_1(X) = 1$, nous avons le résultat.

2) On pose, pour cette démonstration seulement,

$$u_{2n+1,2q}(X) := u_{2q+1}(X)u_{2n+1-2q}(X) - Xu_{2q}(X)u_{2n-2q}(X)$$

et

$$u_{2n+1,2q-1}(X) := Xu_{2q}(X)u_{2n+2-2q}(X) - u_{2q-1}(X)u_{2n+1-2q}(X).$$

Comme $u_{2q+1}(X) = Xu_{2q}(X) - u_{2q-1}(X)$, nous obtenons

$$\begin{aligned} u_{2n+1,2q}(X) &= Xu_{2q}(X)(u_{2n+1-2q}(X) - u_{2n-2q}(X)) - u_{2q-1}(X)u_{2n+1-2q}(X) \\ &= Xu_{2q}(X)u_{2n+2-2q}(X) - u_{2q-1}(X)u_{2n+1-2q}(X) \\ &= u_{2n,2q-1}. \end{aligned}$$

Comme $u_{2q}(X) = u_{2q-1}(X) - u_{2q-2}(X)$, nous obtenons

$$\begin{aligned} u_{2n+1,2q-1}(X) &= X(u_{2q-1}(X) - u_{2q-2}(X))u_{2n+2-2q}(X) - u_{2q-1}(X)u_{2n+1-2q}(X) \\ &= u_{2q-1}(X)(Xu_{2n+2-2q}(X) - u_{2n+1-2q}(X)) - Xu_{2q-2}(X)u_{2n+2-2q}(X) \\ &= u_{2q-1}(X)u_{2n+3-2q}(X) - Xu_{2q-2}(X)u_{2n+2-2q}(X) \\ &= u_{2n+1,2(q-1)}(X). \end{aligned}$$

Il en résulte que $u_{2n+1,p}(X)$ (p pair ou impair) ne dépend pas de p . Nous avons

$$u_{2n+1,0}(X) = u_1(X)u_{2n+1}(X) - Xu_0(X)u_{2n}(X) = u_{2n+1}(X)$$

d'où le résultat.

3) A partir des formules (19), on change n en $n - 1$ et p en $p - 2$ pour obtenir les formules (20). \square

Corollaire 4. On a les formules : $\forall n \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} u_{4n+1}(X) &= u_{2n+1}^2(X) - Xu_{2n}^2(X) \\ &= Xu_{2n+2}(X)u_{2n}(X) - u_{2n+1}(X)u_{2n-1}(X) \end{aligned} \quad (21)$$

$$\begin{aligned} u_{4n-1}(X) &= Xu_{2n}^2(X) - u_{2n-1}^2(X) \\ &= u_{2n+1}(X)u_{2n-1}(X) - Xu_{2n}(X)u_{2n-2}(X). \end{aligned} \quad (22)$$

Démonstration. Pour (21), on prend $n = 2p$ dans (19). La formule (22) s'obtient à partir de (21) en changeant n en $-n$. \square

Proposition 7. On a les formules : $\forall n \in \mathbb{Z}$,

$$u_{2n+1}^2(X) - 1 = Xu_{2n}(X)u_{2n+2}(X) \quad (23)$$

$$Xu_{2n}^2(X) - 1 = u_{2n-1}(X)u_{2n+1}(X). \quad (24)$$

Démonstration. La formule (24) est conséquence immédiate des formules (21) et (23).

Pour démontrer (23), on procède par récurrence sur n si $n \geq 0$.

Si $n = 0$, $1^2 - 1 = 0 = Xu_0(X)u_2(X)$ car $u_0(X) = 0$.

Supposons (23) vraie pour n : $u_{2n+1}^2(X) - 1 = Xu_{2n}(X)u_{2n+2}(X)$. Nous avons :

$$\begin{aligned}
u_{2n+3}^2(X) - 1 &= (Xu_{2n+2}(X) - u_{2n+1}(X))^2 - 1 \\
&= X^2u_{2n+2}^2(X) - 2Xu_{2n+2}(X)u_{2n+1}(X) + u_{2n+1}^2(X) - 1 \\
&= X^2u_{2n+2}^2(X) - 2Xu_{2n+2}(X)u_{2n+1}(X) + Xu_{2n}(X)u_{2n+2}(X) \\
&= Xu_{2n+2}(X)(Xu_{2n+2}(X) - 2u_{2n+1}(X) + u_{2n}(X)) \\
&= Xu_{2n+2}(X)(Xu_{2n+2}(X) - u_{2n+1}(X) - (u_{2n+1}(X) - u_{2n}(X))) \\
&= Xu_{2n+2}(X)(u_{2n+3}(X) - u_{2n+2}(X)) \\
&= Xu_{2n+2}(X)u_{2n+4}(X)
\end{aligned}$$

en utilisant (A1) et (A2).

Comme $u_{-m}(X) = -u_m(X)$, on vérifie sans peine que (23) est vraie pour n négatif. \square

Corollaire 5. On a les formules : $\forall n \in \mathbb{Z}$,

$$u_{4n+1}(X) - u_{4n-1}(X) = 2 - X(4 - X)u_{2n}^2(X); \quad (25)$$

$$u_{4n+3}(X) - u_{4n+1}(X) = 2 - (4 - X)u_{2n+1}^2(X). \quad (26)$$

Démonstration. D'après les formules (21) et (22) nous avons :

$$\begin{aligned}
u_{4n+1}(X) - u_{4n-1}(X) &= Xu_{2n}(X)(u_{2n+2}(X) + u_{2n-2}(X)) - 2u_{2n+1}(X)u_{2n-1}(X) \\
&= X(X - 2)u_{2n}^2(X) - 2u_{2n+1}(X)u_{2n-1}(X)
\end{aligned}$$

en utilisant la relation (AR).

D'après (24), on a $2u_{2n+1}(X)u_{2n-1}(X) = 2Xu_{2n}^2(X) - 2$ donc

$$u_{4n+1}(X) - u_{4n-1}(X) = 2 + X(X - 4)u_{2n}^2(X) = 2 - X(4 - X)u_{2n}^2(X).$$

De même nous avons :

$$\begin{aligned}
u_{4n+3}(X) - u_{4n+1}(X) &= u_{2n+3}(X)u_{2n+1}(X) + u_{2n+1}(X)u_{2n-1}(X) - 2Xu_{2n+2}(X)u_{2n}(X) \\
&= u_{2n+1}(X)(u_{2n+3}(X) + u_{2n+1}(X)) - 2(u_{2n+1}^2(X) - 1) \\
&= 2 - (4 - X)u_{2n+1}^2(X)
\end{aligned}$$

en procédant comme ci-dessus. \square

Proposition 8. *On a les formules : $\forall n \in \mathbb{Z}$: Si n est pair*

$$u_{n-1}(X)u_{2n}(X) - u_n(X)u_{2n-1}(X) = -u_n(X). \quad (27)$$

$$Xu_n(X)u_{2n}(X) - u_{n+1}(X)u_{2n-1}(X) = -u_{n-1}(X). \quad (28)$$

Si n est impair

$$Xu_{n-1}(X)u_{2n}(X) - u_n(X)u_{2n-1}(X) = -u_n(X), \quad (29)$$

$$u_n(X)u_{2n}(X) - u_{n+1}(X)u_{2n-1}(X) = -u_{n-1}(X). \quad (30)$$

Démonstration. 1) on suppose que n est pair.

Posons, pour cette démonstration seulement,

$$A := u_{n-1}(X)u_{2n}(X) - u_n(X)u_{2n-1}(X).$$

Comme $u_{2n}(X) = u_n(X)(u_{n+1}(X) - u_{n-1}(X))$, nous obtenons

$$A = u_n(X)(u_{n+1}(X)u_{n-1}(X) - u_{n-1}^2(X) - u_{2n-1}(X)).$$

D'après (22), $u_{2n-1}(X) + u_{n-1}^2(X) = Xu_n^2(X)$ donc

$$A = u_n(X)(u_{n+1}(X)u_{n-1}(X) - Xu_n^2(X)) = -u_n(X).$$

Posons :

$$B := Xu_n(X)u_{2n}(X) - u_{n+1}(X)u_{2n-1}(X).$$

Alors :

$$\begin{aligned} B &= Xu_n^2(X)(u_{n+1}(X) - u_{n-1}(X)) - u_{n+1}(X)u_{2n-1}(X) \\ &= u_{n+1}(X)(Xu_n^2(X) - u_{2n-1}(X)) - Xu_n^2(X)u_{n-1}(X) \\ &= u_{n+1}(X)u_{n-1}^2(X) - Xu_n^2(X)u_{n-1}(X) \\ &= u_{n-1}(X)(u_{n+1}(X)u_{n-1}(X) - Xu_n^2(X)) \\ &= -u_{n-1}(X). \end{aligned}$$

2) On suppose que n est impair.

Posons :

$$C := u_{n-1}(X)u_{2n}(X) - u_n(X)u_{2n-1}(X).$$

Alors :

$$\begin{aligned} C &= Xu_{n-1}(X)u_n(X)(u_{n+1}(X) - u_{n-1}(X)) - u_n(X)u_{2n-1}(X) \\ &= u_n(X)(Xu_{n-1}(X)u_{n+1}(X) - Xu_{n-1}^2(X) - u_{2n-1}(X)) \\ &= u_n(X)(-1 + u_n^2(X) - Xu_{n-1}^2(X) - u_{2n-1}(X)) \\ &= -u_n(X). \end{aligned}$$

Posons :

$$D := u_n(X)u_{2n}(X) - u_{n+1}(X)u_{2n-1}(X).$$

Alors :

$$\begin{aligned} D &= u_n^2(X)(u_{n+1}(X) - u_{n-1}(X)) - u_{n+1}(X)u_{2n-1}(X) \\ &= u_{n+1}(X)(u_n^2(X) - u_{2n-1}(X)) - u_n^2(X)u_{n-1}(X) \\ &= u_{n+1}(X)Xu_{n-1}^2(X) - u_n^2(X)u_{n-1}(X) \\ &= u_{n-1}(X)(Xu_{n+1}(X)u_{n-1}(X) - u_n^2(X)) \\ &= -u_{n-1}(X) \end{aligned}$$

en utilisant (23) et (21). □

1.2 Propriétés des racines de $v_p(X)$.

Soit n un entier et soit $v_n(X)$ le facteur primitif de $u_n(X)$.

- Si $n = 2p + 1$, les racines de $v_n(X)$ sont les $4 \cos^2 \frac{k\pi}{2p+1}$ avec $1 \leq k \leq p$ et $(k, 2p+1) = 1$;
- si $n = 2p$, les racines de $v_n(X)$ sont les $4 \cos^2 \frac{k\pi}{2p}$ avec $1 \leq k \leq p-1$ et $(k, 2p) = 1$.

Proposition 9. Soient p un entier ≥ 2 et γ une racine de $v_{2p}(X)$. Alors :

1. $\forall k, 0 \leq k \leq p, u_{2p-k}(\gamma) = u_k(\gamma)$;
2. $\forall k, 0 \leq k < p, \forall l \in \mathbb{N}, u_{2lp+k}(\gamma) = (-1)^l u_k(\gamma)$.

Démonstration. 1) On a $u_{2p}(\gamma) = u_p(\gamma)(u_{p+1}(\gamma) - u_{p-1}(\gamma))$ (formule (9)), donc comme $u_p(\gamma) \neq 0$ et $u_{2p}(\gamma) = v_{2p}(\gamma) = 0$, nous obtenons $u_{p+1}(\gamma) = u_{p-1}(\gamma)$.

Pour obtenir le résultat, nous effectuons une récurrence descendante sur k . Si $k = p$, $2p - k = p$ et si $k = p - 1$, c'est la remarque initiale.

Supposons le résultat vrai pour tout $l, k + 1 \leq l \leq p : u_{2p-l}(\gamma) = u_l(\gamma)$.

- Si k est pair,

$$\begin{aligned} u_{2p-k}(\gamma) &= u_{2p-(k+1)}(\gamma) - u_{2p-(k+2)}(\gamma) \\ &= u_{k+1}(\gamma) - u_{k+2}(\gamma) \\ &= u_k(\gamma) \end{aligned}$$

en utilisant (A1).

- Si k est impair,

$$\begin{aligned} u_{2p-k}(\gamma) &= \gamma u_{2p-(k+1)}(\gamma) - u_{2p-(k+2)}(\gamma) \\ &= \gamma u_{k+1}(\gamma) - u_{k+2}(\gamma) \\ &= u_k(\gamma) \end{aligned}$$

en utilisant (A2).

2) On voit ainsi que $u_{2p-1}(\gamma) = u_1(\gamma) = 1$ et, comme $0 = u_{2p+1}(\gamma) - \gamma u_{2p}(\gamma) + u_{2p-1}(\gamma)$, nous obtenons $u_{2p+1}(\gamma) = -1$.

D'après les formules(6) et (7), nous avons $\forall m \in \mathbb{Z}, u_{p+2m}(\gamma) + u_{p-2m}(\gamma) = 0$.

Si $0 < m < 2p$, nous en déduisons que $u_{2p+m}(\gamma) = -u_{2p-m}(\gamma) = -u_m(\gamma)$.

Nous supposons que $2p$ ne divise pas m et que $2p < m$. Divisons m par $2p$: $m = 2qp + r$ avec $0 < r < 2p$. Nous obtenons alors :

$$u_{2p+m}(\gamma) = u_{2p(q+1)+r}(\gamma) = -u_{2p-2qp-r}(\gamma) = u_{2p(q-1)+r}(\gamma).$$

Si q est pair, nous aurons $u_{2p+m}(\gamma) = u_{2p+r}(\gamma) = -u_r(\gamma)$ tandis que si q est impair, nous aurons $u_{2p+m}(\gamma) = u_r(\gamma)$.

Donc $u_{2p(q+1)}(\gamma) = (-1)^{q+1}u_r(\gamma)$. comme $u_{2p-r}(\gamma) = u_r(\gamma)$ d'après le 1), nous avons le résultat. \square

Proposition 10. *Soit γ une racine de $v_{2p}(X)$. Alors :*

1) *Si p est impair, on a pour $k \in \{0, 1, \dots, p\}$,*

$$\left(\frac{4-\gamma}{2}\right) u_p(\gamma)u_{p-k}(\gamma) = u_{k+1}(\gamma) - u_{k-1}(\gamma). \quad (31)$$

En particulier $(4-\gamma)u_p^2(\gamma) = 4$ et $(4-\gamma)u_p(\gamma)u_{p-1}(\gamma) = 2$.

2) *Si p est pair, on a pour $0 \leq k < \frac{p}{2}$,*

$$\frac{\gamma(4-\gamma)}{2} u_p(\gamma)u_{p-2k}(\gamma) = u_{2k+1}(\gamma) - u_{2k-1}(\gamma) \quad (32)$$

et

$$\left(\frac{4-\gamma}{2}\right) u_p(\gamma)u_{p-(2k+1)}(\gamma) = u_{2k+2}(\gamma) - u_{2k}(\gamma) \quad (33)$$

En particulier $\gamma(4-\gamma)u_p^2(\gamma) = 4$ et $(4-\gamma)u_p(\gamma)u_{p-1}(\gamma) = 2$.

Démonstration. 1) Supposons p impair. Nous montrons la relation par récurrence sur k .

On a $u_{p-1}(\gamma) = u_{p+1}(\gamma)$ et, comme p est impair, $u_p(\gamma) = 2u_{p-1}(\gamma)$ en utilisant (A1).

Maintenant $4u_p^2(\gamma) - 4 = 4\gamma u_{p-1}(\gamma)u_{p+1}(\gamma)$ (formule (23)), d'où $4u_p^2(\gamma) - 4 = \gamma u_p^2(\gamma)$ et nous avons le résultat $(4-\gamma)u_p^2(\gamma) = 4$.

Comme $u_1(\gamma) - u_{-1}(\gamma) = 2$, c'est la formule cherchée pour $k = 0$.

Remplaçons $u_p(\gamma)$ par $2u_{p-1}(\gamma)$ dans la formule ci-dessus

pour obtenir $(4-\gamma)u_p(\gamma)u_{p-1}(\gamma) = 2$.

Comme $u_2(\gamma) - u_0(\gamma) = 1$, nous obtenons le résultat pour $k = 1$.

Nous supposons maintenant le résultat vrai jusqu'à k .

Si k est pair, $p - (k + 1)$ est pair, donc $u_{p-(k+1)}(\gamma) = u_{p-k}(\gamma) - u_{p-(k-1)}(\gamma)$, d'où

$$\begin{aligned} \left(\frac{4-\gamma}{2}\right) u_p(\gamma) u_{p-(k+1)}(\gamma) &= \left(\frac{4-\gamma}{2}\right) u_p(\gamma) (u_{p-k}(\gamma) - u_{p-(k-1)}(\gamma)) \\ &= (u_{k+1}(\gamma) - u_{k-1}(\gamma)) - (u_k(\gamma) - u_{k-2}(\gamma)) \\ &= u_{k+2}(\gamma) - u_k(\gamma). \end{aligned}$$

Si k est impair, $p - (k + 1)$ est impair, donc $u_{p-(k+1)}(\gamma) = \gamma u_{p-k}(\gamma) - u_{p-(k-1)}(\gamma)$, d'où

$$\begin{aligned} \left(\frac{4-\gamma}{2}\right) u_p(\gamma) u_{p-(k+1)}(\gamma) &= \left(\frac{4-\gamma}{2}\right) u_p(\gamma) (\gamma u_{p-k}(\gamma) - u_{p-(k-1)}(\gamma)) \\ &= (\gamma u_{k+1}(\gamma) - \gamma u_{k-1}(\gamma)) - (u_k(\gamma) - u_{k-2}(\gamma)) \\ &= u_{k+2}(\gamma) - u_k(\gamma). \end{aligned}$$

Le résultat est donc vrai pour tout k .

2) Supposons p pair. Comme ci-dessus on a $u_{p-1}(\gamma) = u_{p+1}(\gamma)$ et, comme p est pair, $\gamma u_p(\gamma) = 2u_{p-1}(\gamma)$.

Maintenant $4\gamma u_p^2(\gamma) - 4 = \gamma^2 u_p^2(\gamma)$ et nous avons le résultat : $\gamma(4 - \gamma)u_p^2(\gamma) = 4$. C'est la formule annoncée pour $k = 0$.

Pour obtenir le cas $k = 1$, on remplace $\gamma u_p(\gamma)$ par $2u_{p-1}(\gamma)$ dans la formule ci-dessus.

Nous montrons les relations par récurrence sur k . Nous supposons maintenant le résultat vrai jusqu'à $k - 1$.

Nous avons $u_{p-2k}(\gamma) = u_{p-(2k-1)}(\gamma) - u_{p-(2k-2)}(\gamma)$ donc

$$\begin{aligned} u_p(\gamma) u_{p-2k}(\gamma) &= u_p(\gamma) u_{p-(2k-1)}(\gamma) - u_p(\gamma) u_{p-(2k-2)}(\gamma) \\ &= \left(\frac{2}{4-\gamma}\right) (u_{2k}(\gamma) - u_{2k-2}(\gamma)) - \frac{2}{\gamma(4-\gamma)} (u_{2k-1}(\gamma) - u_{2k-3}(\gamma)) \\ &= \frac{2}{\gamma(4-\gamma)} ((\gamma u_{2k}(\gamma) - u_{2k-1}(\gamma)) - (\gamma u_{2k-2}(\gamma) - u_{2k-3}(\gamma))) \\ &= \frac{2}{\gamma(4-\gamma)} (u_{2k+1}(\gamma) - u_{2k-1}(\gamma)). \end{aligned}$$

Nous avons $u_{p-(2k+1)}(\gamma) = \gamma u_{p-2k}(\gamma) - u_{p-(2k-1)}(\gamma)$ donc

$$\begin{aligned} u_p(\gamma) u_{p-(2k+1)}(\gamma) &= \left(\frac{2}{4-\gamma}\right) (u_{2k+1}(\gamma) - u_{2k-1}(\gamma)) - \left(\frac{2}{4-\gamma}\right) (u_{2k}(\gamma) - u_{2k-2}(\gamma)) \\ &= \left(\frac{2}{4-\gamma}\right) ((u_{2k+1}(\gamma) - u_{2k}(\gamma)) - (u_{2k-1}(\gamma) - u_{2k-2}(\gamma))) \\ &= \left(\frac{2}{4-\gamma}\right) (u_{2k+2}(\gamma) - u_{2k}(\gamma)). \end{aligned}$$

Le résultat est donc vrai pour tout k .

□

Proposition 11. Soit γ une racine de $v_r(X)$ avec $r = 2r_1 + 1$. :

1) Pour $0 \leq k \leq r_1 - 1$ on a

$$\begin{aligned} u_{r-(2k+1)}(\gamma) &= u_{2k+1}(\gamma)u_{r-1}(\gamma); \\ u_{r-(2k+2)}(\gamma) &= \gamma u_{2k+2}(\gamma)u_{r-1}(\gamma). \end{aligned}$$

2) On se place dans un sous-corps de \mathbb{R} . alors si $\gamma = 4 \cos^2 \frac{k\pi}{r}$

(i) on a $\sqrt{\gamma}u_{r-1}(\gamma) = (-1)^{k-1}$ où $\sqrt{\gamma} > 0$.

(ii) Supposons que $r \equiv 1 \pmod{4}$: $r = 4r_2 + 1$, alors on a pour $0 \leq l \leq r_2$:

$$u_{\frac{r-1}{2}-2l}(\gamma) = (u_{2l+1}(\gamma) - (-1)^{(k-1)}\sqrt{\gamma}u_{2l}(\gamma))u_{\frac{r-1}{2}}(\gamma); \quad (34)$$

$$u_{\frac{r-1}{2}-(2l-1)}(\gamma) = (\gamma u_{2l}(\gamma) - (-1)^{(k-1)}\sqrt{\gamma}u_{2l-1}(\gamma))u_{\frac{r-1}{2}}(\gamma). \quad (35)$$

Supposons que $r \equiv 3 \pmod{4}$: $r = 4r_2 + 3$, alors on a pour $0 \leq l \leq \frac{r-3}{8}$:

$$u_{\frac{r-1}{2}-2l}(\gamma) = (u_{2l+1}(\gamma) - (-1)^{(k-1)}\sqrt{\gamma}u_{2l}(\gamma))u_{\frac{r-1}{2}}(\gamma); \quad (36)$$

$$u_{\frac{r-1}{2}-(2l-1)}(\gamma) = (u_{2l}(\gamma) - (-1)^{(k-1)}\frac{1}{\sqrt{\gamma}}u_{2l-1}(\gamma))u_{\frac{r-1}{2}}(\gamma). \quad (37)$$

Démonstration. 1) On procède par récurrence sur k en utilisant les relations (A1) et (A2). Si $k = 0$, $u_{r-1}(\gamma) = u_1(\gamma)u_{r-1}(\gamma)$ car $u_1(X) = 1$; $u_{r-2}(\gamma) = \gamma u_{r-1}(\gamma) - u_r(\gamma) = \gamma u_{r-1}(\gamma)$ car $u_r(\gamma) = 0$.

Supposons le résultat vrai pour $k \geq 1$. On a

$$\begin{aligned} u_{r-(2k+3)}(X) &= u_{r-(2k+2)}(X) - u_{r-(2k+1)} \text{ d'après (A1) donc} \\ u_{r-(2k+3)}(\gamma) &= \gamma u_{2k+2}(\gamma)u_{r-1}(\gamma) - u_{2k+1}(\gamma)u_{r-1}(\gamma) \\ &= (\gamma u_{2k+2}(\gamma) - u_{2k+1}(\gamma))u_{r-1}(\gamma) \\ &= u_{2k+3}(\gamma)u_{r-1}(\gamma) \text{ d'après (A2)}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_{r-(2k+4)}(X) &= Xu_{r-(2k+3)}(X) - u_{r-(2k+2)}(X) \text{ d'après (A2) donc} \\ u_{r-(2k+4)}(\gamma) &= \gamma u_{r-(2k+3)}(\gamma) - u_{r-(2k+2)}(\gamma) \\ &= \gamma u_{2k+3}(\gamma)u_{r-1}(\gamma) - \gamma u_{2k+2}(\gamma)u_{r-1}(\gamma) \\ &= \gamma(u_{2k+3}(\gamma) - u_{2k+2}(\gamma))u_{r-1}(\gamma) \\ &= \gamma u_{2k+4}(\gamma)u_{r-1}(\gamma) \text{ d'après (A1)}. \end{aligned}$$

Le résultat est donc vrai pour tout k .

- 2) On suppose que nous sommes dans un sous-corps de \mathbb{R} .
(i) Les racines de $u_{r-1}(X)$ encadrent les racines de $u_r(X)$. Plus précisément on a

$$\forall l, \quad \frac{2l\pi}{r-1} < \frac{(2l+1)\pi}{r} < \frac{(2l+1)\pi}{r-1}$$

d'où, comme l'application \cos est décroissante :

$$4 \cos^2 \frac{(2l+1)\pi}{r-1} < 4 \cos^2 \frac{(2l+1)\pi}{r} < 4 \cos^2 \frac{2l\pi}{r-1}.$$

Le polynôme $u_{r-1}(X)$ n'a que des racines simples et $u_{r-1}(4) > 0$, nous obtenons :

$$\begin{aligned} u_{r-1}(a) > 0 & \quad \text{si} \quad a \in \left] 4 \cos^2 \frac{(2l+1)\pi}{r-1}, 4 \cos^2 \frac{2l\pi}{r-1} \right[; \\ u_{r-1}(a) < 0 & \quad \text{si} \quad a \in \left] 4 \cos^2 \frac{(2l+2)\pi}{r-1}, 4 \cos^2 \frac{(2l+1)\pi}{r-1} \right[. \end{aligned}$$

D'après la formule (25) nous avons $\gamma u_{r-1}^2(\gamma) = 1$ et de ce qui précède, nous déduisons que $\sqrt{\gamma} u_{r-1}(\gamma) = (-1)^{k-1}$.

(ii) La démonstration se fait par récurrence sur l et n'offre pas de difficultés en utilisant la relation (\mathcal{R})

□

Proposition 12. Soient K un corps et K' un sur-corps de K . Soit φ un élément de K^* . Alors :

1) Si $a \in K' - K$ satisfait à $a^2 = \varphi a + 1$, on a $\forall n \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} a^{2n} &= (-1)^{n-1} \varphi u_{2n}(-\varphi^2) a + (-1)^{n-1} u_{2n-1}(-\varphi^2), \\ a^{2n+1} &= (-1)^n u_{2n+1}(-\varphi^2) a + (-1)^{n-1} \varphi u_{2n}(-\varphi^2). \end{aligned}$$

En particulier, $a^n \in K$ si et seulement si $u_n(-\varphi^2) = 0$.

2) Si $a \in K' - K$ satisfait à $a^2 = \varphi a - 1$, on a $\forall n \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} a^{2n} &= \varphi u_{2n}(\varphi^2) a - u_{2n-1}(\varphi^2), \\ a^{2n+1} &= u_{2n+1}(\varphi^2) a - \varphi u_{2n}(\varphi^2). \end{aligned}$$

En particulier, $a^n \in K$ si et seulement si $u_n(\varphi^2) = 0$.

3) On suppose que K est un sous-corps de \mathbb{C} et que $a \in K' - K$ satisfait à $a^2 = \varphi a + 1$. Alors :

- Si $-\varphi^2$ est racine de $v_{2n+1}(X)$, il existe $\epsilon \in \{-1, +1\}$ et un entier k , premier à $2n+1$, tels que $\varphi = 2\epsilon i \cos \frac{k\pi}{2n+1}$ et l'on a

$$a^{2n+1} = (-1)^{n+k} \epsilon i, \quad a^{2(2n+1)} = -1 \quad \text{et} \quad a^{4(2n+1)} = 1.$$

— Si $-\varphi^2$ est racine de $v_{2n}(X)$, il existe $\epsilon \in \{-1, +1\}$ et un entier k , premier à $2n$ tels que $\varphi = 2\epsilon \cos \frac{k\pi}{2n}$ et l'on a $a^{2n} = (-1)^{n-1}$.

4) On suppose que K est un sous-corps de \mathbb{R} et que $a \in K' - K$ satisfait à $a^2 = \varphi a - 1$. Alors :

— Si φ^2 est racine de $v_{2n+1}(X)$, il existe $\epsilon \in \{-1, +1\}$ et un entier k , premier à $2n + 1$, tels que $\varphi = 2\epsilon \cos \frac{k\pi}{2n+1}$ et l'on a

$$a^{2n+1} = \epsilon(-1)^k \quad \text{et} \quad a^{2(2n+1)} = 1.$$

— Si φ^2 est racine de $v_{2n}(X)$, il existe $\epsilon \in \{-1, +1\}$ et un entier k , premier à $2n$, tels que $\varphi = 2\epsilon \cos \frac{k\pi}{2n}$ et l'on a

$$a^{2n} = -1 \quad \text{et} \quad a^{4n} = 1.$$

Démonstration. 1) On suppose d'abord $n \geq 0$. La preuve se fait par récurrence sur n .

Si $n = 0$, $u_0(-\varphi^2) = 0$, $u_{-1}(-\varphi^2) = -1$, $u_1(-\varphi^2) = 1$ d'où le résultat dans ce cas.

Si $n = 1$, nous avons $a^2 = \varphi u_2(-\varphi^2)a + u_1(-\varphi^2) = \varphi a + 1$ et

$a^3 = \varphi a^2 + a = \varphi(\varphi a + 1) + a = (\varphi^2 + 1)a + \varphi = -u_3(-\varphi^2)a + \varphi u_2(-\varphi^2)$ car $u_3(X) = X - 1$ et $u_2(X) = 1$.

Supposons que l'on ait $a^{2n} = (-1)^{n-1}\varphi u_{2n}(-\varphi^2)a + (-1)^{n-1}u_{2n-1}(-\varphi^2)$. Alors :

$$\begin{aligned} a^{2n+1} &= (-1)^{n-1}\varphi u_{2n}(-\varphi^2)(\varphi a + 1) + (-1)^{n-1}u_{2n-1}(-\varphi^2)a \\ &= (-1)^{n-1}(\varphi^2 u_{2n}(-\varphi^2) + u_{2n-1}(-\varphi^2))a + (-1)^{n-1}\varphi u_{2n}(-\varphi^2) \\ &= (-1)^n((-\varphi^2)u_{2n}(-\varphi^2) - u_{2n-1}(-\varphi^2))a + (-1)^{n-1}\varphi u_{2n}(-\varphi^2) \\ &= (-1)^n u_{2n+1}(-\varphi^2)a + (-1)^{n-1}\varphi u_{2n}(-\varphi^2) \end{aligned}$$

en utilisant (A2).

Supposons que l'on ait $a^{2n+1} = (-1)^n\varphi u_{2n+1}(-\varphi^2)a + (-1)^{n-1}\varphi u_{2n}(-\varphi^2)$. Alors :

$$\begin{aligned} a^{2n+2} &= (-1)^n\varphi u_{2n+1}(-\varphi^2)(\varphi a + 1) + (-1)^{n-1}\varphi u_{2n}(-\varphi^2)a \\ &= (-1)^n\varphi(u_{2n+1}(-\varphi^2) - u_{2n}(-\varphi^2))a + (-1)^n u_{2n+1}(-\varphi^2) \\ &= (-1)^n\varphi u_{2n+2}(-\varphi^2)a + (-1)^n u_{2n+1}(-\varphi^2) \end{aligned}$$

en utilisant (A1).

Le résultat est donc vrai pour tout entier positif ou nul.

Dans l'expression de a^{2n} , nous changeons n en $-n$ pour obtenir :

$$b := (-1)^n\varphi u_{2n}(-\varphi^2)a + (-1)^n u_{2n+1}(-\varphi^2)$$

car par définition, $u_{-n}(X) = -u_n(X)$. nous avons alors :

$$\begin{aligned} ba^{2n} &= (-1)(\varphi^2 u_{2n}^2(-\varphi^2)a^2 + \varphi u_{2n}(-\varphi^2)(u_{2n+1}(-\varphi^2) + u_{2n-1}(-\varphi^2))a \\ &\quad + u_{2n+1}(-\varphi^2)u_{2n-1}(-\varphi^2)) \end{aligned}$$

Nous avons $a^2 = \varphi a + 1$, $u_{2n+1}(-\varphi^2) + u_{2n-1}(-\varphi^2) = -\varphi^2 u_{2n}(-\varphi^2)$ d'après (A2), et $u_{2n+1}(-\varphi^2)u_{2n-1}(-\varphi^2) = -1 - \varphi^2 u_{2n}^2(-\varphi^2)$ d'après (A15) donc

$$ba^{2n} = (-1)(\varphi^3 u_{2n}^2(-\varphi^2)a + \varphi^2 u_{2n}^2(-\varphi^2) - \varphi^3 u_{2n}^2(-\varphi^2) - \varphi^2 u_{2n}^2(-\varphi^2) - 1,$$

donc $ba^{2n} = 1$ et $b = a^{-2n}$.

Nous procédons de même pour $a^{-(2n+1)}$.

2) La preuve est la même que la précédente, en un peu plus simple car ici, il n'y a pas de questions de signes.

3) Si $-\varphi^2$ est racine de $v_{2n+1}(X)$, alors il existe $\epsilon \in \{-1, +1\}$ et un entier k premier à $2n+1$ tels que $\varphi = 2\epsilon i \cos \frac{k\pi}{2n+1}$. Nous avons :

$$u_{2n}(4 \cos^2 \frac{k\pi}{2n+1}) = \frac{\sin \frac{2nk\pi}{2n+1}}{\sin \frac{2k\pi}{2n+1}}$$

d'après la proposition 19. Nous avons :

$$\sin \frac{2nk\pi}{2n+1} = \sin(k\pi - \frac{k\pi}{2n+1}) = (-1)^{k-1} \sin \frac{k\pi}{2n+1}$$

d'où :

$$u_{2n}(4 \cos^2 \frac{k\pi}{2n+1}) = (-1)^{k-1} \frac{1}{2 \cos \frac{k\pi}{2n+1}}.$$

Il en résulte que $a^{2n+1} = (-1)^{n-1} \epsilon i (-1)^{k-1} = (-1)^{n+k} \epsilon i$, d'où $a^{2(2n+1)} = -1$ et $a^{4(2n+1)} = 1$.

Si $-\varphi^2$ est racine de $v_{2n}(X)$, comme $a^{2n} = (-1)^{n-1} u_{2n-1}(-\varphi^2)$ d'après la proposition 9, $u_{2n-1}(-\varphi^2) = 1$ et $a^{2n} = (-1)^{n-1}$.

4) La preuve est la même que celle du 3). □

Notation 1. Soit K un corps commutatif. Si $P(X) \in K[X]$, on note $\theta(P(X))$ le produit des racines de $P(X)$.

Il est clair que si $P(X)$ et $Q(X)$ sont deux éléments de $K[X]$, on a $\theta(P(X)Q(X)) = \theta(P(X))\theta(Q(X))$.

On applique ce qui précède à la famille des polynômes $u_n(X)$, $n \in \mathbb{N}$.

On voit que $\theta(u_{2n+1}(X)) = 1$ et $\theta(u_{2n}(X)) = n$. On a la décomposition en produit de facteurs irréductibles de $u_n(X)$ dans $\mathbb{Z}[X]$:

$$u_n(X) = \prod_{d|n, d>0} v_d(X)$$

où $v_1(X) = v_2(X) = 1$ et chaque $v_n(X)$ est un polynôme unitaire.

Le but de la proposition suivante est de calculer $\theta(v_n(X))$ pour tout n .

Proposition 13.

1. Si $n = 2p^m$ avec p premier et $m \geq 1$, on a $\theta(v_n(X)) = p$.
2. Si n n'est pas de la forme précédente, on a $\theta(v_n(X)) = 1$.

Démonstration. Nous pouvons remarquer que comme $v_n(X)$ est un polynôme à coefficients entiers et comme toutes les racines de $v_n(X)$ sont strictement positives, on a $\theta(v_n(X)) \in \mathbb{N} - \{0\}$.

D'après la remarque initiale, si n est impair, on a $\theta(v_n(X)) = 1$.

1) Nous montrons par récurrence sur m , que si $n = 2p^m$ avec p premier, alors $\theta(v_n(X)) = p$.

supposons d'abord que $m = 1$.

Si $p = 2$, $u_4(X) = X - 2 = v_4(X)$ et $\theta(v_4(X)) = 2$.

Si $p > 2$, alors $u_{2p}(X) = v_1(X)v_2(X)v_p(X)v_{2p}(X)$. D'après la remarque initiale, nous savons que $\theta(u_{2p}(X)) = p$ et que $\theta(v_1(X)) = \theta(v_2(X)) = \theta(v_p(X)) = 1$, donc $\theta(v_{2p}(X)) = p$.

Supposons maintenant $m > 1$ et le résultat vrai pour tout entier m' tel que $1 \leq m' < m$.

Si $p = 2$,

$$u_{2^{m+1}}(X) = \prod_{i=0}^{m+1} v_{2^i}(X) = \left(\prod_{i=0}^m v_{2^i}(X) \right) v_{2^{m+1}}(X) = u_{2^m}(X) v_{2^{m+1}}(X).$$

Nous avons $\theta(u_{2^m}(X)) = 2^{m-1}$ et $\theta(u_{2^{m+1}}(X)) = 2^m$, donc $\theta(v_{2^{m+1}}(X)) = 2$.

Si $p > 2$,

$$u_{2p^m}(X) = u_{p^m}(X) \prod_{i=0}^m v_{2p^i}(X)$$

d'où :

$$\theta(u_{2p^m}(X)) = p^m = \theta(u_{p^m}(X)) \left(\prod_{i=0}^{m-1} \theta(v_{2p^i}(X)) \right) \theta(v_{2p^m}(X)).$$

Nous avons $\theta(u_{p^m}(X)) = 1$ et, par hypothèse de récurrence, $\theta(v_{2p^i}(X)) = p$ pour $1 \leq i \leq m-1$, d'où $\theta(v_{2p^m}(X)) = p$.

2) Supposons que $n = 2^\beta p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$, les p_i étant des nombres premiers impairs, distincts deux à deux, $k \geq 1$, $\beta \geq 1$ ou $\beta \geq 2$ si $k = 1$ et $\alpha_i \geq 1$ pour tout i .

Parmi les diviseurs de n , il y a tous les 2^γ , $1 \leq \gamma \leq \beta$ et nous avons vu que $\theta(v_{2^\gamma}(X)) = 2$ ($2 \leq \gamma \leq \beta$) donc, dans le produit $\prod_{d|n, d>1} \theta(v_d(X))$, le produit $\prod_{1 \leq \gamma \leq \beta} \theta(v_{2^\gamma}(X))$ contribue $2^{\beta-1}$.

Parmi les diviseurs de n , il y a aussi tous les $2p_i^{\beta_i}$ ($1 \leq i \leq k$, $1 \leq \beta_i \leq \alpha_i$) et pour chacun de ces diviseurs, on a $\theta(v_{2p_i^{\beta_i}}(X)) = p_i$, donc dans $\theta(u_n(X))$, ils contribuent

$$\prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}.$$

En combinant ces résultats, nous voyons que tous ces diviseurs donnent une contribution de $2^{\beta-1} p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k} = \theta(u_n(X))$. Il en résulte que pour tous les autres facteurs $v_d(X)$, on a $\theta(v_d(X)) = 1$. En particulier $\theta(v_n(X)) = 1$. \square

Nous en déduisons le résultat suivant :

Corollaire 6. *Soit γ une racine de $v_r(X)$. Alors :*

1. (a) *Si r est impair, γ est inversible dans K_0 et l'on a $\gamma u_{r-1}^2(\gamma) = 1$.*
 (b) *Si r est pair,*
 - *si $r = 2r_1$, avec r_1 puissance d'un nombre premier p , alors γ n'est pas inversible et $N_{K_0/\mathbb{Q}}(\gamma) = p$: il existe un polynôme unitaire $P(X) \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $\gamma P(\gamma) = p$;*
 - *si r_1 n'est pas une puissance d'un nombre premier, alors γ est inversible et il existe un polynôme unitaire $P(X) \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $\gamma P(\gamma) = 1$.*
2. *$4 - \gamma$ n'est pas inversible si et seulement si r est une puissance d'un nombre premier. Si $r = p^n$ avec p premier, il existe un polynôme unitaire $P(X) \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $(4 - \gamma)P(\gamma) = p$.
 Si r n'est pas une puissance d'un nombre premier, il existe un polynôme unitaire $P(X) \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $(4 - \gamma)P(\gamma) = 1$.*

Démonstration. Le 1) est une conséquence immédiate de la proposition 13 et du fait que tous les conjugués de γ sont des polynômes en γ car l'extension K_0/\mathbb{Q} est cyclique.

2) Il existe un entier k tel que $(r, k) = 1$, $1 \leq k < \frac{r}{2}$ et $\gamma = 4 \cos^2 \frac{k\pi}{r}$. Nous avons alors :

$$4 - \gamma = 4 \sin^2 \frac{k\pi}{r} = 4 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{k\pi}{r} \right) = 4 \cos^2 \left(\frac{r - 2k}{2r} \right) \pi.$$

- Si r est impair, alors $(r - 2k, 2r) = 1$ et $4 - \gamma$ est racine de $v_{2r}(X)$.
- Si r est pair, $r = 2r_1$, $4 - \gamma = 4 \cos^2 \left(\frac{r_1 - k}{r} \right) \pi$, $(k, r_1) = 1$ et k est impair.
 - Si r_1 est impair, $2|(r_1 - k)$, donc $4 - \gamma$ est racine de $v_{r_1}(X)$.
 - Si r_1 est pair, $r_1 - k$ est impair, donc $4 - \gamma$ est racine de $v_r(X)$.

De ceci on déduit tous les résultats de l'énoncé. \square

Proposition 14. *Soient p, q, r des entiers ≥ 3 . Soient α une racine de $v_p(X)$, β une racine de $v_q(X)$ et γ une racine de $v_r(X)$.*

- 1) *On suppose que $\alpha\beta = 4\gamma$. Alors on a $p = q = 4$, $r = 3$, $\alpha = \beta = 2$ et $\gamma = 1$.*
- 2) *On suppose que $4 - \alpha - \beta - \gamma = 0$. Alors on a deux possibilités (à l'ordre près de p, q, r).*

1.

$$p = 4, q = r = 3, \alpha = 2, \beta = \gamma = 1$$

2.

$$p = q = 5, r = 3, \alpha = \tau, \beta = 3 - \tau, \gamma = 1$$

où $\tau = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ est une racine du polynôme $u_5(X)$.

Démonstration. 1) Comme $\alpha\beta = 4\gamma$, on voit que 2 divise $N_{K_0/\mathbb{Q}}(\alpha)$ et $N_{K_0/\mathbb{Q}}(\beta)$ donc $N_{K_0/\mathbb{Q}}(\alpha) = N_{K_0/\mathbb{Q}}(\beta) = 2$ et p et q sont des puissances de 2 et nous pouvons supposer que $p \leq q$; on voit aussi que, dans ces conditions, γ est inversible, donc r n'est pas une puissance de 2. α et β sont des éléments d'un sous-corps K réel d'un corps cyclotomique $\mathbb{Q}(\zeta)$ où ζ est une racine primitive q -ième de l'unité. On a $\gamma \in K$ par hypothèse, mais $v_r(X)$ reste irréductible dans K , donc $v_r(X)$ est de degré 1 : $v_r(X) = X - 1$, $r = 3$ et $\gamma = 1$. On a alors $\alpha = \beta = 2$.

2) Supposons d'abord que $r = 3$. Alors $\gamma = 1$ et on a la relation : $\alpha + \beta = 3$. On peut avoir $\alpha = 2$ et $\beta = 1$ donc $p = 4$ et $q = 3$, ou bien $p = q = 5$, $\alpha = \tau$, $\beta = 3 - \tau$. Si l'un de p, q, r est dans $\{3, 4, 6\}$ on est dans l'un des cas précédents, nous pouvons donc supposer que p, q, r sont ≥ 5 mais alors aucune somme $\alpha + \beta + \gamma$ n'est entière (égale à 4). \square

2 Formules en rang 3

Dans cette section on suppose que $(W(p, q, r), S)$ est un système de Coxeter de rang 3. On pose $S := \{s_1, s_2, s_3\}$. Soit $R \rightarrow GL(M)$ une représentation de réflexion. Le but de cette section est, entre autres, de donner des formules pour les éléments

$(s_i s_j)^k, s_i (s_i s_j)^k, t_k := s_1 (s_2 s_3)^k, x_k := s_2 (s_3 s_1)^k, y_k := s_3 (s_1 s_2)^k$, qui nous seront utiles dans les exemples étudiés.

Il faut remarquer que les formules obtenues sont valables sans hypothèses sur α, β et γ .

Proposition 15. *On a les formules : $\forall k \in \mathbb{Z}$,*

1)

$$(s_1 s_2)^{2k} = \begin{pmatrix} u_{4k+1}(\alpha) & -\alpha u_{4k}(\alpha) & \beta \alpha u_{2k}^2(\alpha) + \alpha l u_{2k+1}(\alpha) u_{2k}(\alpha) \\ u_{4k}(\alpha) & -u_{4k-1}(\alpha) & \alpha l u_{2k}^2(\alpha) + \beta u_{2k}(\alpha) u_{2k-1}(\alpha) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (38)$$

$$(s_1 s_2)^{2k+1} = \begin{pmatrix} u_{4k+3}(\alpha) & -\alpha u_{4k+2}(\alpha) & \beta u_{2k+1}^2(\alpha) + \alpha l u_{2k+2}(\alpha) u_{2k+1}(\alpha) \\ u_{4k+2}(\alpha) & -u_{4k+1}(\alpha) & l u_{2k+1}^2(\alpha) + \beta u_{2k+1}(\alpha) u_{2k}(\alpha) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (39)$$

En particulier si p est pair : $p = 2p_1$, on a :

$$(s_1 s_2)^{p_1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \frac{2(2\beta+\alpha l)}{4-\alpha} \\ 0 & -1 & \frac{2(\beta+2l)}{4-\alpha} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (40)$$

2)

$$(s_1 s_3)^{2k} = \begin{pmatrix} u_{4k+1}(\beta) & \alpha\beta u_{2k}^2(\beta) + \beta m u_{2k+1}(\beta) u_{2k}(\beta) & -\beta u_{4k}(\beta) \\ 0 & 1 & 0 \\ u_{4k}(\beta) & \beta m u_{2k}^2(\beta) + \alpha u_{2k}(\beta) u_{2k-1}(\beta) & -u_{4k-1}(\beta) \end{pmatrix} \quad (41)$$

$$(s_1 s_3)^{2k+1} = \begin{pmatrix} u_{4k+3}(\beta) & \alpha u_{2k+1}^2(\beta) + \beta m u_{2k+2}(\beta) u_{2k+1}(\beta) & -\beta u_{4k+2}(\beta) \\ 0 & 1 & 0 \\ u_{4k+2}(\beta) & m u_{2k+1}^2(\beta) + \alpha u_{2k+1}(\beta) u_{2k}(\beta) & -u_{4k+1}(\beta) \end{pmatrix}. \quad (42)$$

En particulier si q est pair : $q = 2q_1$, on a :

$$(s_1 s_3)^{q_1} = \begin{pmatrix} -1 & \frac{2(2\alpha+\beta m)}{4-\beta} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{2(\alpha+2m)}{4-\beta} & -1 \end{pmatrix}. \quad (43)$$

3)

$$(s_2 s_3)^{2k} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \gamma u_{2k}^2(\gamma) + l u_{2k+1}(\gamma) u_{2k}(\gamma) & u_{4k+1}(\gamma) & -l u_{4k}(\gamma) \\ \gamma u_{2k}^2(\gamma) + m u_{2k}(\gamma) u_{2k-1}(\gamma) & m u_{4k}(\gamma) & -u_{4k-1}(\gamma) \end{pmatrix} \quad (44)$$

$$(s_2 s_3)^{2k+1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ u_{2k+1}^2(\gamma) + l u_{2k+2}(\gamma) u_{2k+1}(\gamma) & u_{4k+3}(\gamma) & -l u_{4k+2}(\gamma) \\ u_{2k+1}^2(\gamma) + m u_{2k+1}(\gamma) u_{2k}(\gamma) & m u_{4k+2}(\gamma) & -u_{4k+1}(\gamma) \end{pmatrix}. \quad (45)$$

En particulier si r est pair : $r = 2r_1$, on a :

$$(s_2 s_3)^{r_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2(l+2)}{4-\gamma} & -1 & 0 \\ \frac{2(m+2)}{4-\gamma} & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (46)$$

Démonstration. Nous ne démontrons que les formules du 1), les autres se montrant de manière analogue.

Nous supposons d'abord $k \geq 0$ et nous procédons par récurrence sur k .

Nous avons :

$$s_1 = \begin{pmatrix} -1 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad s_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & l \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad s_1 s_2 = \begin{pmatrix} \alpha - 1 & -\alpha & \alpha l + \beta \\ 1 & -1 & l \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Lorsque $k = 0$, $u_{4k+1}(\alpha) = u_1(\alpha) = 1$, $u_{4k}(\alpha) = u_0(\alpha) = 0$, $u_{4k-1}(\alpha) = -u_1(\alpha) = -1$, $u_{2k}(\alpha) = 0$, donc le résultat est vrai pour $k = 0$.

Comme $u_3(\alpha) = \alpha - 1$ et $u_2(\alpha) = 1$, le résultat est aussi vrai pour $k = 1$.

Nous posons $(s_1 s_2)^k = (a_{ij}(k))_{1 \leq i, j \leq 3}$.

Il est clair que pour tout k , $a_{31}(k) = a_{32}(k) = 0$ et $a_{33}(k) = 1$.

Les calculs pour a_{11} , a_{21} , a_{12} , et a_{22} ont déjà été faits dans [9].

Soit $k \geq 1$. Supposons que $(s_1 s_2)^{2k}$ a la forme indiquée.

Avons nous :

$$a_{13}(2k+1) = (l\alpha + \beta)a_{11}(2k) + la_{12}(2k) + a_{13}(2k)?$$

On montre que

$$\begin{aligned} \beta u_{2k}^2(\alpha) + l\alpha u_{2k+2}(\alpha)u_{2k+1}(\alpha) = \\ (l\alpha + \beta)u_{4k+1}(\alpha) - l\alpha u_{4k}(\alpha) + \beta u_{2k+1}^2(\alpha) + l\alpha u_{2k+1}(\alpha)u_{2k}(\alpha) \end{aligned}$$

ce qui est équivalent à

$$\begin{aligned} l\alpha[u_{4k+1}(\alpha) - u_{4k}(\alpha) - u_{2k+2}(\alpha)u_{2k+1}(\alpha) + u_{2k+1}(\alpha)u_{2k}(\alpha)] \\ + \beta[u_{4k+1}(\alpha) + \alpha u_{2k}^2(\alpha) - u_{2k+1}^2(\alpha)] = 0. \end{aligned}$$

Dans cette égalité, le coefficient de β est 0 par (21). Nous avons :

$$u_{4k+1}(\alpha) - u_{4k}(\alpha) - u_{2k+1}(\alpha)(u_{2k+2}(\alpha) - u_{2k}(\alpha)) = u_{4k+1}(\alpha) - u_{4k}(\alpha) - u_{4k+2}(\alpha) = 0$$

en utilisant (9) puis (A1). Il en résulte que $a_{13}(2k+1)$ a bien la forme indiquée. Nous procédons de même pour a_{23} . Enfin c'est la même méthode pour passer de $(s_1 s_2)^{2k-1}$ à $(s_1 s_2)^{2k}$ en utilisant (9), (A2) et (22).

Les formules pour $k < 0$ s'obtiennent à partir des formules précédentes en changeant k en $-k$ comme on le vérifie en utilisant (21), (22), (23) et (24). □

Du résultat précédent, nous déduisons les matrices des réflexions contenues dans les sous-groupes paraboliques $\langle s_i, s_j \rangle$ ($1 \leq i < j \leq 3$).

Proposition 16. *On a les formules : $\forall k \in \mathbb{Z}$,*

1)

$$\begin{aligned}
s_1(s_1s_2)^{2k} &= \begin{pmatrix} u_{4k-1}(\alpha) & -\alpha u_{4k-2}(\alpha) & u_{2k-1}(\alpha)(\alpha l u_{2k}(\alpha) + \beta u_{2k-1}(\alpha)) \\ u_{4k}(\alpha) & -u_{4k-1}(\alpha) & u_{2k}(\alpha)(\alpha l u_{2k}(\alpha) + \beta u_{2k-1}(\alpha)) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
s_1(s_1s_2)^{2k+1} &= \begin{pmatrix} u_{4k+1}(\alpha) & -\alpha u_{4k}(\alpha) & \alpha u_{2k}(\alpha)(\beta u_{2k}(\alpha) + l u_{2k+1}(\alpha)) \\ u_{4k+2}(\alpha) & -u_{4k+1}(\alpha) & u_{2k+1}(\alpha)(\beta u_{2k}(\alpha) + l u_{2k+1}(\alpha)) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
H(s_1(s_1s_2)^{2k}) &= \langle b_3, \alpha(u_{2k}(\alpha) - u_{2k-2}(\alpha))a_1 + (u_{2k+1}(\alpha) - u_{2k-1}(\alpha))a_2 \rangle \\
v_{s_1(s_1s_2)^{2k}}^- &= u_{2k-1}(\alpha)a_1 + u_{2k}(\alpha)a_2 \\
H(s_1(s_1s_2)^{2k+1}) &= \langle b_3, (u_{2k+1}(\alpha) - u_{2k-1}(\alpha))a_1 + (u_{2k+2}(\alpha) - u_{2k}(\alpha))a_2 \rangle \\
v_{s_1(s_1s_2)^{2k+1}}^- &= \alpha u_{2k}(\alpha)a_1 + u_{2k+1}(\alpha)a_2.
\end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned}
s_1(s_1s_3)^{2k} &= \begin{pmatrix} u_{4k-1}(\beta) & u_{2k-1}(\beta)(\alpha u_{2k-1}(\beta) + \beta m u_{2k}(\beta)) & -\beta u_{4k-2}(\beta) \\ 0 & 1 & 0 \\ u_{4k}(\beta) & u_{2k}(\beta)(\alpha u_{2k-1}(\beta) + \beta m u_{2k}(\beta)) & -u_{4k-1}(\beta) \end{pmatrix} \\
s_1(s_1s_3)^{2k+1} &= \begin{pmatrix} u_{4k+1}(\beta) & \beta u_{2k}(\beta)(m u_{2k+1}(\beta) + \alpha u_{2k}(\beta)) & -\beta u_{4k}(\beta) \\ 0 & 1 & 0 \\ u_{4k+2}(\beta) & u_{2k+1}(\beta)(m u_{2k+1}(\beta) + \alpha u_{2k}(\beta)) & -u_{4k+1}(\beta) \end{pmatrix} \\
H(s_1(s_1s_3)^{2k}) &= \langle b_2, \beta(u_{2k}(\beta) - u_{2k-2}(\beta))a_1 + (u_{2k+1}(\beta) - u_{2k-1}(\beta))a_3 \rangle \\
v_{s_1(s_1s_3)^{2k}}^- &= u_{2k-1}(\beta)a_1 + u_{2k}(\beta)a_3 \\
H(s_1(s_1s_3)^{2k+1}) &= \langle b_2, (u_{2k+1}(\beta) - u_{2k-1}(\beta))a_1 + (u_{2k}(\beta) - u_{2k-2}(\beta))a_2 \rangle \\
v_{s_1(s_1s_3)^{2k+1}}^- &= \beta u_{2k}(\beta)a_1 + u_{2k+1}(\beta)a_3.
\end{aligned}$$

3)

$$\begin{aligned}
s_2(s_2s_3)^{2k} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ u_{2k-1}(\gamma)(u_{2k-1}(\gamma) + l u_{2k}(\gamma)) & u_{4k-1}(\gamma) & -l u_{4k-2}(\gamma) \\ m u_{2k}(\gamma)(u_{2k-1}(\gamma) + l u_{2k}(\gamma)) & m u_{4k}(\gamma) & -u_{4k-1}(\gamma) \end{pmatrix} \\
s_2(s_2s_3)^{2k+1} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l u_{2k}(\gamma)(u_{2k+1}(\gamma) + m u_{2k}(\gamma)) & u_{4k+1}(\gamma) & -l u_{4k}(\gamma) \\ u_{2k+1}(\gamma)(u_{2k+1}(\gamma) + m u_{2k}(\gamma)) & m u_{4k+2}(\gamma) & -u_{4k+1}(\gamma) \end{pmatrix} \\
H(s_2(s_2s_3)^{2k}) &= \langle b_1, l(u_{2k}(\gamma) - u_{2k-2}(\gamma))a_2 + (u_{2k+1}(\gamma) - u_{2k-1}(\gamma))a_3 \rangle \\
v_{s_2(s_2s_3)^{2k}}^- &= u_{2k-1}(\gamma)a_2 + m u_{2k}(\gamma)a_3 \\
H(s_2(s_2s_3)^{2k+1}) &= \langle b_1, (u_{2k+1}(\gamma) - u_{2k-1}(\gamma))a_2 + m(u_{2k+2}(\gamma) - u_{2k}(\gamma))a_3 \rangle \\
v_{s_2(s_2s_3)^{2k+1}}^- &= l u_{2k}(\gamma)a_2 + u_{2k+1}(\gamma)a_3.
\end{aligned}$$

Démonstration. Elle ne présente pas de difficultés en utilisant la proposition 32 et les formules de la section 1. □

Remarque 1. Soit s une réflexion de $G(\alpha, \beta, \gamma; l)$. On suppose que $v^-(s) = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3$. Alors on a :

$$s = Id_M + \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c(s, s_1) & c(s, s_2) & c(s, s_3) \\ c(s, s_1) & c(s, s_2) & c(s, s_3) \\ c(s, s_1) & c(s, s_2) & c(s, s_3) \end{pmatrix}$$

Démonstration. On a $s(a_i) = a_i + c(s, s_i)v^-(s)$ par définition et on en déduit tout de suite le résultat. □

Proposition 17. On a $\forall k \in \mathbb{Z}$:

1.

$$C(s_3, s_1(s_1 s_2)^{2k}) = (u_{2k-1}(\alpha) + mu_{2k}(\alpha))(lu_{2k}(\alpha) + \beta u_{2k-1}(\alpha)) \quad (47)$$

$$= \alpha \gamma u_{2k}^2(\alpha) + \beta u_{2k-1}^2(\alpha) + (\alpha l + \beta m)u_{2k}(\alpha)u_{2k-1}(\alpha) \quad (48)$$

$$C(s_3, s_1(s_1 s_2)^{2k+1}) = (\alpha u_{2k}(\alpha) + mu_{2k+1}(\alpha))(\beta u_{2k}(\alpha) + lu_{2k+1}(\alpha)) \quad (49)$$

$$= \gamma u_{2k+1}^2(\alpha) + \alpha \beta u_{2k}^2(\alpha) + (\alpha l + \beta m)u_{2k+1}(\alpha)u_{2k}(\alpha) \quad (50)$$

En particulier si p est pair : $p = 2p_1$, on a :

$$C(s_3, s_1(s_1 s_2)^{p_1}) = 4 - \beta - \frac{2\Delta}{4 - \alpha} \quad (51)$$

$$C(s_3, s_2(s_1 s_2)^{p_1}) = 4 - \gamma - \frac{2\Delta}{4 - \alpha} \quad (52)$$

2.

$$C(s_2, s_1(s_1 s_3)^{2k}) = (u_{2k-1}(\beta) + lu_{2k}(\beta))(\alpha u_{2k-1}(\beta) + \beta mu_{2k}(\beta)) \quad (53)$$

$$= \beta \gamma u_{2k}^2(\beta) + \alpha u_{2k-1}^2(\beta) + (\alpha l + \beta m)u_{2k}(\beta)u_{2k-1}(\beta) \quad (54)$$

$$C(s_2, s_1(s_1 s_3)^{2k+1}) = (\beta u_{2k}(\beta) + lu_{2k+1}(\beta))(mu_{2k+1}(\beta) + \alpha u_{2k}(\beta)) \quad (55)$$

$$= \gamma u_{2k+1}^2(\beta) + \alpha \beta u_{2k}^2(\beta) + (\alpha l + \beta m)u_{2k+1}(\beta)u_{2k}(\beta) \quad (56)$$

En particulier si q est pair : $q = 2q_1$, on a :

$$C(s_2, s_1(s_1s_3)^{q_1}) = 4 - \alpha - \frac{2\Delta}{4 - \beta} \quad (57)$$

$$C(s_2, s_3(s_1s_3)^{q_1}) = 4 - \gamma - \frac{2\Delta}{4 - \beta} \quad (58)$$

$$(59)$$

3.

$$C(s_1, s_2(s_2s_3)^{2k}) = (\alpha u_{2k-1}(\gamma) + \beta m u_{2k}(\gamma))(u_{2k-1}(\gamma) + l u_{2k}(\gamma)) \quad (60)$$

$$= \beta \gamma u_{2k}^2(\gamma) + \alpha u_{2k-1}^2(\gamma) + (\alpha l + \beta m) u_{2k}(\gamma) u_{2k-1}(\gamma) \quad (61)$$

$$C(s_1, s_2(s_2s_3)^{2k+1}) = (\alpha l u_{2k}(\gamma) + \beta u_{2k+1}(\gamma))(u_{2k+1}(\gamma) + m u_{2k}(\gamma)) \quad (62)$$

$$= \beta u_{2k+1}^2(\gamma) + \alpha \gamma u_{2k}^2(\gamma) + (\alpha l + \beta m) u_{2k+1}(\gamma) u_{2k}(\gamma) \quad (63)$$

En particulier si r est pair : $r = 2r_1$, on a :

$$C(s_1, s_2(s_2s_3)^{r_1}) = 4 - \alpha - \frac{2\Delta}{4 - \gamma} \quad (64)$$

$$C(s_1, s_3(s_2s_3)^{r_1}) = 4 - \beta - \frac{2\Delta}{4 - \gamma} \quad (65)$$

$$(66)$$

4. On suppose que p et q sont pairs : $p = 2p_1$ et $q = 2q_1$, alors on a :

$$\begin{aligned}
C(s_1(s_1s_2)^{p_1}, s_1(s_1s_3)^{q_1}) &= 4 \left(\frac{\beta + 2l}{4 - \alpha} \right) \left(\frac{\alpha + 2m}{4 - \beta} \right) \\
&= 4 - \frac{8\Delta}{(4 - \alpha)(4 - \beta)}; \\
C(s_1(s_1s_2)^{p_1}, s_3(s_1s_3)^{q_1}) &= \beta \left(\frac{\beta + 2l}{4 - \alpha} \right) \left(\frac{\alpha + 2m}{4 - \beta} \right) \\
&= \beta - \frac{2\beta\Delta}{(4 - \alpha)(4 - \beta)}; \\
C(s_2(s_1s_2)^{p_1}, s_1(s_1s_3)^{q_1}) &= \alpha \left(\frac{\beta + 2l}{4 - \alpha} \right) \left(\frac{\alpha + 2m}{4 - \beta} \right) \\
&= \alpha - \frac{2\alpha\Delta}{(4 - \alpha)(4 - \beta)}; \\
C(s_2(s_1s_2)^{p_1}, s_3(s_1s_3)^{q_1}) &= \left(\frac{-8 + 2\alpha + 2\beta + \alpha l}{4 - \alpha} \right) \left(\frac{-8 + 2\alpha + 2\beta + \beta m}{4 - \beta} \right) \\
&= \gamma + \frac{\Delta(8 - 2\alpha - 2\beta)}{(4 - \alpha)(4 - \beta)}.
\end{aligned}$$

5. On suppose que p et r sont pairs : $p = 2p_1$ et $r = 2r_1$, alors on a :

$$\begin{aligned}
C(s_1(s_1s_2)^{p_1}, s_2(s_2s_3)^{r_1}) &= \alpha \left(\frac{2\beta + \alpha l}{4 - \alpha} \right) \left(\frac{m + 2}{4 - \beta} \right) \\
&= \alpha - \frac{2\alpha\Delta}{(4 - \alpha)(4 - \beta)}; \\
C(s_1(s_1s_2)^{p_1}, s_3(s_2s_3)^{r_1}) &= \left(\frac{-8 + 2\alpha + 2\gamma + \beta m}{4 - \alpha} \right) \left(\frac{-8 + 2\alpha + 2\gamma + \alpha l}{4 - \gamma} \right) \\
&= \beta + \frac{\Delta(8 - 2\alpha - 2\gamma)}{(4 - \alpha)(4 - \gamma)}; \\
C(s_2(s_1s_2)^{p_1}, s_2(s_2s_3)^{r_1}) &= 4 \left(\frac{2\beta + \alpha l}{4 - \alpha} \right) \left(\frac{m + 2}{4 - \gamma} \right) \\
&= 4 - \frac{8\Delta}{(4 - \alpha)(4 - \gamma)}; \\
C(s_2(s_1s_2)^{p_1}, s_3(s_2s_3)^{r_1}) &= \gamma \left(\frac{2\beta + \alpha l}{4 - \alpha} \right) \left(\frac{m + 2}{4 - \beta} \right) \\
&= \gamma - \frac{2\gamma\Delta}{(4 - \alpha)(4 - \gamma)}.
\end{aligned}$$

6. On suppose que q et r sont pairs : $q = 2q_1$ et $r = 2r_1$, alors on a :

$$\begin{aligned}
C(s_1(s_1s_3)^{q_1}, s_2(s_2s_3)^{r_1}) &= \left(\frac{-8 + 2\beta + 2\gamma + \alpha l}{4 - \beta} \right) \left(\frac{-8 + 2\beta + 2\gamma + \beta m}{4 - \gamma} \right) \\
&= \alpha + \frac{\Delta(8 - 2\beta - 2\gamma)}{(4 - \beta)(4 - \gamma)}; \\
C(s_1(s_1s_3)^{q_1}, s_3(s_2s_3)^{r_1}) &= \beta \left(\frac{2\alpha + \beta m}{4 - \beta} \right) \left(\frac{l + 2}{4 - \gamma} \right) \\
&= \beta - \frac{2\beta\Delta}{(4 - \beta)(4 - \gamma)}; \\
C(s_3(s_1s_3)^{q_1}, s_2(s_2s_3)^{r_1}) &= \gamma \left(\frac{2\alpha + \beta m}{4 - \beta} \right) \left(\frac{l + 2}{4 - \gamma} \right) \\
&= \gamma - \frac{2\gamma\Delta}{(4 - \beta)(4 - \gamma)}; \\
C(s_3(s_1s_3)^{q_1}, s_3(s_2s_3)^{r_1}) &= 4 \left(\frac{2\alpha + \beta m}{4 - \beta} \right) \left(\frac{l + 2}{4 - \gamma} \right) \\
&= 4 - \frac{8\Delta}{(4 - \beta)(4 - \gamma)}.
\end{aligned}$$

Démonstration. Les calculs se font sans difficultés en utilisant la remarque 3. Pour les formules lorsque p (ou q , ou r) est pair ($p = 2p_1$) nous ne montrons que

$$C(s_3, s_1(s_1s_2)^{p_1}) = 4 - \beta - \frac{2\Delta}{4 - \alpha}$$

avec p_1 pair, les autres cas se traitant de la même manière. On a :

$$C(s_3, s_1(s_1s_2)^{p_1}) = \gamma \alpha u_{p_1}^2(\alpha) + \beta u_{p_1-1}^2(\alpha) + (\alpha l + \beta m) u_{p_1}(\alpha) u_{p_1-1}(\alpha).$$

D'après la proposition 10 nous avons : $\alpha u_{p_1}^2(\alpha) = \frac{4}{4-\alpha}$, $u_{p_1-1}^2(\alpha) = \frac{\alpha}{4-\alpha}$ et $u_{p_1}(\alpha) u_{p_1-1}(\alpha) = \frac{2}{4-\alpha}$ donc

$$C(s_3, s_1(s_1s_2)^{p_1}) = \left(\frac{1}{4 - \alpha} \right) (4\gamma + \alpha\beta + 2(\alpha l + \beta m)).$$

Mais $\Delta = 8 - 2\alpha - 2\beta - 2\gamma - (\alpha l + \beta m)$ donc $4\gamma + 2(\alpha l + \beta m) = 16 - 4\alpha - 4\beta - 2\Delta$ et

$$C(s_3, s_1(s_1s_2)^{p_1}) = \left(\frac{1}{4 - \alpha} \right) (16 - 4\alpha - 4\beta + \alpha\beta - 2\Delta)$$

Comme $16 - 4\alpha - 4\beta + \alpha\beta = (4 - \alpha)(4 - \beta)$ nous avons le résultat.

Les démonstrations de toutes les formules en 4), 5), 6) sont semblables. Nous ne démontrons que la quatrième du 4). On a dans la base \mathcal{A} de M :

$$s_2(s_1s_2)^{p_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & l \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & \frac{2\beta + \alpha l}{4 - \alpha} \\ 0 & -1 & \frac{2(\beta + 2l)}{4 - \alpha} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \frac{2(2\beta + \alpha l)}{4 - \alpha} \\ -1 & 1 & \frac{2\beta + \alpha l}{4 - \alpha} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et nous obtenons :

$$\begin{aligned} s_2(s_1 s_2)^{p_1}(a_1) &= a_1 - (2a_1 + a_2) \\ s_2(s_1 s_2)^{p_1}(a_2) &= a_2 \\ s_2(s_1 s_2)^{p_1}(a_3) &= a_3 + \left(\frac{2\beta + \alpha l}{4 - \alpha} \right) (2a_1 + a_2). \end{aligned}$$

Nous voyons de la même manière que l'on a :

$$\begin{aligned} s_3(s_1 s_3)^{q_1}(a_1) &= a_1 - (2a_1 + a_3) \\ s_3(s_1 s_3)^{q_1}(a_2) &= a_2 + \left(\frac{2\alpha + \beta m}{4 - \beta} \right) (2a_1 + a_3) \\ s_3(s_1 s_3)^{q_1}(a_3) &= a_3. \end{aligned}$$

Nous obtenons :

$$\begin{aligned} s_2(s_1 s_2)^{p_1}(2a_1 + a_3) &= (2a_1 + a_3) + \left(\frac{-8 + 2\alpha + 2\beta + \alpha l}{4 - \alpha} \right) (2a_1 + a_2) \\ s_3(s_1 s_3)^{q_1}(2a_1 + a_2) &= (2a_1 + a_2) \left(\frac{-8 + 2\alpha + 2\beta + \beta m}{4 - \beta} \right) (2a_1 + a_3). \end{aligned}$$

Nous avons alors :

$$C(s_2(s_1 s_2)^{p_1}, s_3(s_1 s_3)^{q_1}) = \left(\frac{-8 + 2\alpha + 2\beta + \alpha l}{4 - \alpha} \right) \left(\frac{-8 + 2\alpha + 2\beta + \beta m}{4 - \beta} \right)$$

et un calcul simple donne le résultat :

$$C(s_2(s_1 s_2)^{p_1}, s_3(s_1 s_3)^{q_1}) = \gamma + \frac{\Delta(8 - 2\alpha - 2\beta)}{(4 - \alpha)(4 - \beta)}.$$

□

Notation 2. 1. Pour tout k dans \mathbb{Z} , on pose $t_k := s_1(s_2 s_3)^k$, $x_k := s_2(s_3 s_1)^k$ et $y_k := s_3(s_1 s_2)^k$.

2. On pose $\theta := -4 + \alpha + \beta + \gamma + \alpha l$ et $\theta' := 4 - \alpha - \beta - \gamma - \beta m$.

On peut remarquer que $\theta' - \theta = \Delta$ et que $\alpha l - \beta m = \theta + \theta'$. Il en résulte que $\Delta = 0$ équivaut à $\theta' = \theta$.

Proposition 18. 1. *Le polynôme caractéristique de t_k (resp. de x_k , resp. de y_k) est :*

$$P_{t_{2k}}(X) = X^3 - (1 + \theta\gamma u_{2k}^2(\gamma) - (\theta + \theta')u_{2k}(\gamma)u_{2k-1}(\gamma))X^2 + (-1 + \theta'\gamma u_{2k}^2(\gamma) - (\theta + \theta')u_{2k}(\gamma)u_{2k-1}(\gamma))X + 1 \quad (67)$$

$$P_{t_{2k+1}}(X) = X^3 - (1 + \theta u_{2k+1}^2(\gamma) - (\theta + \theta')u_{2k+1}(\gamma)u_{2k}(\gamma))X^2 + (-1 + \theta' u_{2k+1}^2(\gamma) - (\theta + \theta')u_{2k+1}(\gamma)u_{2k}(\gamma))X + 1 \quad (68)$$

$$P_{x_{2k}}(X) = X^3 - (1 + \theta\beta u_{2k}^2(\beta) - (\theta + \theta')u_{2k}(\beta)u_{2k-1}(\beta))X^2 + (-1 + \theta'\beta u_{2k}^2(\beta) - (\theta + \theta')u_{2k}(\beta)u_{2k-1}(\beta))X + 1 \quad (69)$$

$$P_{x_{2k+1}}(X) = X^3 - (1 + \theta u_{2k+1}^2(\beta) - (\theta + \theta')u_{2k+1}(\beta)u_{2k}(\beta))X^2 + (-1 + \theta' u_{2k+1}^2(\beta) - (\theta + \theta')u_{2k+1}(\beta)u_{2k}(\beta))X + 1 \quad (70)$$

$$P_{y_{2k}}(X) = X^3 - (1 + \theta\alpha u_{2k}^2(\alpha) - (\theta + \theta')u_{2k}(\alpha)u_{2k-1}(\alpha))X^2 + (-1 + \theta'\alpha u_{2k}^2(\alpha) - (\theta + \theta')u_{2k}(\alpha)u_{2k-1}(\alpha))X + 1 \quad (71)$$

$$P_{y_{2k+1}}(X) = X^3 - (1 + \theta u_{2k+1}^2(\alpha) - (\theta + \theta')u_{2k+1}(\alpha)u_{2k}(\alpha))X^2 + (-1 + \theta' u_{2k+1}^2(\alpha) - (\theta + \theta')u_{2k+1}(\alpha)u_{2k}(\alpha))X + 1 \quad (72)$$

2. *Valeur en 1 des polynômes caractéristiques.*

$$\begin{aligned} P_{t_{2k}}(1) &= \Delta\gamma u_{2k}^2(\gamma), & P_{t_{2k+1}}(1) &= \Delta u_{2k+1}^2(\gamma); \\ P_{x_{2k}}(1) &= \Delta\beta u_{2k}^2(\beta), & P_{x_{2k+1}}(1) &= \Delta u_{2k+1}^2(\beta); \\ P_{y_{2k}}(1) &= \Delta\alpha u_{2k}^2(\alpha), & P_{y_{2k+1}}(1) &= \Delta u_{2k+1}^2(\alpha). \end{aligned}$$

En particulier, si $\Delta = 0$, c'est à dire si la représentation $R(\alpha, \beta, \gamma; l)$ est réductible, on a :

$$P_{t_k}(X) = (X - 1)(X^2 - \theta u_{2k}(\gamma)X - 1); \quad (73)$$

$$P_{x_k}(X) = (X - 1)(X^2 - \theta u_{2k}(\beta)X - 1); \quad (74)$$

$$P_{y_k}(X) = (X - 1)(X^2 - \theta u_{2k}(\alpha)X - 1). \quad (75)$$

3. *Valeur en -1 des polynômes caractéristiques.*

$$P_{t_k}(-1) = -(\alpha l - \beta m)u_{2k}(\gamma);$$

$$P_{x_k}(-1) = -(\alpha l - \beta m)u_{2k}(\beta);$$

$$P_{y_k}(-1) = -(\alpha l - \beta m)u_{2k}(\alpha).$$

En particulier si $\alpha l = \beta m$, on a :

$$\begin{aligned} P_{t_{2k}}(X) &= (X+1)(X^2 - (2 + \theta\gamma u_{2k}^2(\gamma))X + 1), \\ P_{t_{2k+1}}(X) &= (X+1)(X^2 - (2 + \theta u_{2k+1}^2(\gamma))X + 1); \\ P_{x_{2k}}(X) &= (X+1)(X^2 - (2 + \theta\beta u_{2k}^2(\beta))X + 1), \\ P_{x_{2k+1}}(X) &= (X+1)(X^2 - (2 + \theta u_{2k+1}^2(\beta))X + 1); \\ P_{y_{2k}}(X) &= (X+1)(X^2 - (2 + \theta\alpha u_{2k}^2(\alpha))X + 1), \\ P_{y_{2k+1}}(X) &= (X+1)(X^2 - (2 + \theta u_{2k+1}^2(\alpha))X + 1). \end{aligned}$$

De même, si $r = 2r_1$ est pair (resp. $p = 2p_1$, resp. $q = 2q_1$), on a

$$P_{t_{r_1}}(X) = (X+1)(X^2 - 2\left(1 - \frac{\Delta}{4-\gamma}\right)X + 1)$$

(resp.

$$P_{x_{q_1}}(X) = (X+1)(X^2 - 2\left(1 - \frac{\Delta}{4-\beta}\right)X + 1),$$

resp.

$$P_{y_{p_1}}(X) = (X+1)(X^2 - 2\left(1 - \frac{\Delta}{4-\alpha}\right)X + 1)).$$

Démonstration. 1) On ne fait les calculs que pour $P_{t_k}(X)$, car ceux pour $P_{x_k}(X)$ et $P_{y_k}(X)$ sont complètement similaires.

On a

$$t_k = s_1(s_2s_3)^k = \begin{pmatrix} -1 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & c & e \\ b & d & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + \alpha a + \beta b & \alpha c + \beta d & \alpha e + \beta f \\ a & c & e \\ b & d & f \end{pmatrix}$$

où les valeurs de a, b, c, d, e, f sont données par (voir la proposition 15) :

- si k est pair : $a = \gamma u_k^2(\gamma) + lu_{k+1}(\gamma)u_k(\gamma)$, $b = \gamma u_k^2(\gamma) + mu_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma)$,
 $c = u_{2k+1}(\gamma)$, $d = mu_{2k}(\gamma)$, $e = -lu_k(\gamma)$, $f = -u_{2k-1}(\gamma)$;
- si k est impair $a = u_k^2(\gamma) + lu_{k+1}(\gamma)u_k(\gamma)$, $b = u_k^2(\gamma) + mu_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma)$,
 $c = u_{2k+1}(\gamma)$, $d = mu_{2k}(\gamma)$, $e = -lu_{2k}(\gamma)$, $f = -u_{2k-1}(\gamma)$.

Nous avons $P_{t_k}(X) = X^3 - tr^{(1)}(t_k)X^2 + tr^{(2)}(t_k)X + 1$ où

$$tr^{(1)}(t_k) = -1 + c + f + \alpha a + \beta b,$$

$$tr^{(2)}(t_k) = \begin{vmatrix} -1 + \alpha a + \beta b & \alpha c + \beta d \\ a & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 + \alpha a + \beta b & \alpha e + \beta f \\ b & f \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & e \\ d & f \end{vmatrix}$$

car $\det t_k = -1$. Pour calculer $tr^{(1)}(t_k)$ et $tr^{(2)}(t_k)$, nous distinguons deux cas suivant la parité de k . Si k est pair, $c + f = 2 - 4\gamma(4 - \gamma)u_k^2(\gamma)$ d'après (25), d'où

$$\begin{aligned} tr^{(1)}(t_k) &= 1 - \gamma(4 - \gamma)u_k^2(\gamma) + \alpha\gamma u_k^2(\gamma) + \alpha l u_{k+1}(\gamma)u_k(\gamma) + \beta\gamma u_k^2(\gamma) \\ &\quad + \beta m u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma) \\ &= 1 + \gamma(-4 + \gamma + \alpha + \beta)u_k^2(\gamma) + \alpha l u_k(\gamma)(\gamma u_k(\gamma) - u_{k-1}(\gamma)) \\ &\quad + \beta m u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma) \\ &= 1 + \gamma(-4 + \alpha + \beta + \gamma + \alpha l)u_k^2(\gamma) + (\beta m - \alpha l)u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma) \end{aligned}$$

donc

$$tr^{(1)}(t_k) = 1 + \theta\gamma u_k^2(\gamma) - (\theta + \theta')u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma).$$

Nous avons :

$$\begin{aligned} tr^{(2)}(t_k) &= \begin{vmatrix} -1 + \beta b & \beta d \\ a & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 + \alpha a & \alpha e \\ b & f \end{vmatrix} + cf - de \\ &= cf - de - (c + f) + \alpha(af - be) + \beta(bc - ad). \end{aligned}$$

Nous avons :

$$cf - de = \gamma u_k^2(\gamma) - u_{2k+1}(\gamma)u_{2k-1}(\gamma) = 1$$

d'après (24).

Nous avons :

$$\begin{aligned} \alpha(af - be) &= \alpha\gamma u_k(\gamma)(u_{k-1}(\gamma)u_{2k}(\gamma) - u_k(\gamma)u_{2k-1}(\gamma)) \\ &\quad + \alpha l u_k(\gamma)(\gamma u_k(\gamma)u_{2k}(\gamma) - u_{k+1}(\gamma)u_{2k-1}(\gamma)). \end{aligned}$$

Nous avons, d'après (25) et (26) :

$$\alpha(af - be) = -\alpha\gamma u_k^2(\gamma) - \alpha l u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma).$$

Nous avons :

$$\begin{aligned} \beta(bc - ad) &= \beta\gamma u_k^2(\gamma)u_{2k+1}(\gamma) + \beta m u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma)u_{2k+1}(\gamma) \\ &\quad - \beta\gamma u_{k+1}(\gamma)u_k(\gamma)u_{2k}(\gamma) - \beta m \gamma u_k^2(\gamma)u_{2k}(\gamma) \\ &= \beta\gamma u_k(\gamma)(u_k(\gamma)u_{2k+1}(\gamma) - u_{k+1}(\gamma)u_{2k}(\gamma)) \\ &\quad + \beta m u_k(\gamma)(u_{k-1}(\gamma)u_{2k+1}(\gamma) - \gamma u_k(\gamma)u_{2k}(\gamma)) \\ &= \beta\gamma u_k(\gamma)A' + \beta m u_k(\gamma)B'. \end{aligned}$$

En changeant n en $-n$ dans (25) (resp. dans (26)), nous trouvons que $A' = -u_k(\gamma)$ et $B' = -u_{k+1}(\gamma)$. Il en résulte que :

$$\beta(bc - ad) = -\beta\gamma u_k^2(\gamma) - \beta m u_{k+1}(\gamma)u_k(\gamma).$$

Nous obtenons ainsi :

$$\begin{aligned}
tr^{(2)}(t_k) &= -1 + \gamma(4 - \gamma)u_k^2(\gamma) - \alpha\gamma u_k^2(\gamma) - \alpha l u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma) - \beta\gamma u_k^2(\gamma) \\
&\quad - \beta m u_{k+1}(\gamma)u_k(\gamma) \\
&= -1 + \gamma(4 - \alpha - \beta - \gamma)u_k^2(\gamma) - \beta m u_{k+1}(\gamma)u_k(\gamma) - \alpha l u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma) \\
&= -1 + \gamma(4 - \alpha - \beta - \gamma - \beta m)u_k^2(\gamma) + (\beta m - \alpha l)u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma) \\
&= -1 + \theta' \gamma u_k^2(\gamma) - (\theta + \theta')u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma).
\end{aligned}$$

Nous avons ainsi le résultat annoncé pour $P_{t_k}(X)$ lorsque k est pair.

Si k est impair, $c + f = 2 - (4 - \gamma)u_k^2(\gamma)$ d'après (26), d'où

$$\begin{aligned}
tr^{(1)}(t_k) &= 1 - (4 - \gamma)u_k^2(\gamma) + \alpha u_k^2(\gamma) + \alpha l u_{k+1}(\gamma)u_k(\gamma) + \beta u_k^2(\gamma) \\
&\quad + \beta m u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma) \\
&= 1 + (-4 + \alpha + \beta + \gamma)u_k^2(\gamma) + \alpha l u_{k+1}(\gamma)u_k(\gamma) + \beta m u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma) \\
&= 1 + (-4 + \alpha + \beta + \gamma + \alpha l)u_k^2(\gamma) + (\beta m - \alpha l)u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma) \\
&= 1 + \theta u_k^2(\gamma) - (\theta + \theta')u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma).
\end{aligned}$$

Nous avons

$$tr^{(2)}(t_k) = (cf - de) - (c + f) + \alpha(af - be) + \beta(bc - ad).$$

D'après (26), $cf - de = \gamma u_{2k}^2(\gamma) - u_{2k+1}(\gamma)u_{2k-1}(\gamma) = 1$.

Nous avons :

$$\begin{aligned}
\alpha(af - be) &= -\alpha u_k^2(\gamma)u_{2k-1}(\gamma) - \alpha l u_{k+1}(\gamma)u_k(\gamma)u_{2k-1}(\gamma) \\
&\quad + \alpha \gamma u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma)u_{2k}(\gamma) + \alpha l u_k^2(\gamma)u_{2k}(\gamma) \\
&= \alpha u_k(\gamma)(-u_k(\gamma)u_{2k-1}(\gamma) + \gamma u_{k-1}(\gamma)u_{2k}(\gamma) \\
&\quad + \alpha l u_k(\gamma)(u_k(\gamma)u_{2k}(\gamma) - u_{k+1}(\gamma)u_{2k-1}(\gamma) \\
&= -\alpha u_k^2(\gamma) - \alpha l u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma)
\end{aligned}$$

en utilisant (33).

Nous avons :

$$\begin{aligned}
\beta(bc - ad) &= \beta u_k^2(\gamma)u_{2k+1}(\gamma) + \beta m u_k(\gamma)u_{k-1}(\gamma)u_{2k+1}(\gamma) \\
&\quad - \beta \gamma u_{k+1}(\gamma)u_k(\gamma)u_{2k}(\gamma) - \beta m u_k^2(\gamma)u_{2k}(\gamma) \\
&= \beta u_k(\gamma)(u_k(\gamma)u_{2k+1}(\gamma) - \gamma u_{k+1}(\gamma)u_{2k}(\gamma)) \\
&\quad + \beta m u_k(\gamma)(u_{k-1}(\gamma)u_{2k+1}(\gamma) - u_k(\gamma)u_{2k}(\gamma)) \\
&= \beta u_k(\gamma)C + \beta m u_k(\gamma)D.
\end{aligned}$$

En changeant n en $-n$ dans (33) (resp. (34)), nous voyons que $C = -u_k(\gamma)$ et $D = -u_{k+1}(\gamma)$. Il en résulte que :

$$\beta(bc - ad) = -\beta u_k^2(\gamma) - \beta m u_{k+1}(\gamma) u_k(\gamma)$$

Nous obtenons ainsi, de la même manière que dans le cas k pair :

$$tr(2)(t_k) = -1 + \theta' u_{k^2}(\gamma) - (\theta + \theta') u_k(\gamma) u_{k-1}(\gamma).$$

Nous avons le résultat pour $P_{t_k}(X)$ lorsque k est impair.

Les calculs pour trouver $P_{x_k}(X)$ et $P_{y_k}(X)$ sont identiques à ceux faits pour $P_{t_k}(X)$.

2) Nous avons :

$$\begin{aligned} P_{t_{2k}}(1) &= -\theta \gamma u_k^2(\gamma) + (\theta + \theta') u_{2k}(\gamma) u_{2k-1}(\gamma) + \theta' \gamma u_{2k}^2(\gamma) - (\theta + \theta') u_{2k}(\gamma) u_{2k-1}(\gamma) \\ &= (\theta' - \theta) \gamma u_{2k}^2(\gamma) \\ &= \Delta \gamma u_{2k}^2(\gamma). \end{aligned}$$

On trouve de même $P_{t_{2k+1}}(1) = \Delta u_{2k+1}^2(\gamma)$. Si $\Delta = 0$, alors $P_{t_k}(1) = 0$ et nous obtenons sans difficultés :

- $P_{t_k}(X) = (X - 1)(X^2 - \theta u_{2k}(\gamma)X - 1)$;
- $P_{x_k}(X) = (X - 1)(X^2 - \theta u_{2k}(\beta)X - 1)$;
- $P_{y_k}(X) = (X - 1)(X^2 - \theta u_{2k}(\alpha)X - 1)$.

3) Les calculs ne présentent pas de difficultés :

$$\begin{aligned} P_{t_{2k}}(-1) &= -1 - (1 + \theta \gamma u_{2k}^2(\gamma) - (\theta + \theta') u_{2k}(\gamma) u_{2k-1}(\gamma) \\ &\quad - (-1 + \theta' \gamma u_{2k}^2(\gamma) - (\theta + \theta') u_{2k}(\gamma) u_{2k-1}(\gamma)) + 1 \\ &= -(\theta + \theta') \gamma u_{2k}^2(\gamma) + 2(\theta + \theta') u_{2k}(\gamma) u_{2k-1}(\gamma) \\ &= -(\theta + \theta') u_{2k}(\gamma) (\gamma u_{2k}(\gamma) - u_{2k-1}(\gamma) - u_{2k-1}(\gamma)) \\ &= -(\theta + \theta') u_{2k}(\gamma) (u_{2k+1}(\gamma) - u_{2k-1}(\gamma)) \\ &= -(\theta + \theta') u_{4k}(\gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{t_{2k+1}}(-1) &= -1 - (1 + \theta u_{2k+1}^2(\gamma) - (\theta + \theta') u_{2k+1}(\gamma) u_{2k}(\gamma) \\ &\quad - (-1 + \theta' u_{2k+1}^2(\gamma) - (\theta + \theta') u_{2k+1}(\gamma) u_{2k}(\gamma)) + 1 \\ &= -(\theta + \theta') u_{2k+1}(\gamma) (u_{2k+1}(\gamma) - u_{2k}(\gamma) - u_{2k}(\gamma)) \\ &= -(\theta + \theta') u_{4k+2}(\gamma). \end{aligned}$$

Comme $\theta + \theta' = \alpha l - \beta m$, nous en déduisons toutes les formules annoncées.

Nous supposons maintenant que r est pair : $r = 2r'$ et nous ne faisons les calculs que pour $t_{r'}$ car ceux pour $x_{q'}$ et $y_{p'}$ (avec $q = 2q'$ et $p = 2p'$) sont identiques.

Nous avons en effectuant la division de $P_{t_k}(X)$ par $X + 1$:

$$P_{t_k}(X) = (X + 1)(X^2 - (2 + \theta\gamma u_{2k}^2(\gamma) - (\theta + \theta')u_{2k}(\gamma)u_{2k-1}(\gamma))X + 1 + (\theta + \theta')u_{4k}(\gamma)) - (\theta + \theta')u_{4k}(\gamma)$$

$$P_{t_{2k+1}}(X) = (X + 1)(X^2 - (2 + \theta u_{2k+1}^2(\gamma) - (\theta + \theta')u_{2k+1}(\gamma)u_{2k}(\gamma))X + 1 + (\theta + \theta')u_{4k+2}(\gamma)) - (\theta + \theta')u_{4k+2}(\gamma).$$

Si $r = 4k$, alors

$$P_{t_k}(X) = (X + 1)(X^2 - (2 + \theta\gamma u_{2k}^2(\gamma) - (\theta + \theta')u_{2k}(\gamma)u_{2k-1}(\gamma))X + 1)$$

d'après la proposition 10, nous avons $\gamma u_{2k}^2(\gamma) = \frac{4}{4-\gamma}$ et $u_{2k}(\gamma)u_{2k-1}(\gamma) = \frac{2}{4-\gamma}$, nous obtenons ainsi

$$P_{t_k}(X) = (X + 1)(X^2 - 2 \left(1 - \frac{\Delta}{4 - \gamma}\right) X + 1)$$

car $\Delta = \theta - \theta'$.

Si $r = 4k + 2$, alors

$$P_{t_{2k+1}}(X) = (X + 1)(X^2 - (2 + \theta u_{2k+1}^2(\gamma) - (\theta + \theta')u_{2k+1}(\gamma)u_{2k}(\gamma))X + 1)$$

d'après la proposition 10, nous avons $u_{2k+1}^2(\gamma) = \frac{4}{4-\gamma}$ et $u_{2k+1}(\gamma)u_{2k}(\gamma) = \frac{2}{4-\gamma}$, nous obtenons ainsi

$$P_{t_{2k+1}}(X) = (X + 1)(X^2 - 2 \left(1 - \frac{\Delta}{4 - \gamma}\right) X + 1).$$

Il en résulte que si $r = 2r'$, nous avons :


$$P_{r'}(X) = (X + 1)(X^2 - 2 \left(1 - \frac{\Delta}{4 - \gamma}\right) X + 1).$$

□

3 Exemples lorsque le corps K est réel.

Dans cette section on donne quelques exemples de groupes de réflexion finis réels de petit rang pour montrer comment la théorie précédente s'applique et ceci uniquement lorsque la représentation R est irréductible. Les autres parties de ce travail seront consacrées au cas où R est réductible.

Dans la suite, nous nous intéresserons **principalement** au cas où le groupe de Coxeter W est de rang 3. On a $S := \{s_1, s_2, s_3\}$ et



Pour préciser dans la notation l'ordre de $s_i s_j$, nous notons $W(p, q, r)$ le groupe W avec $p := m_{s_1 s_2}$, $q := m_{s_1 s_3}$ et $r := m_{s_2 s_3}$. On a $p, q \geq 3$ et $r \geq 2$. Ayant choisi α une racine de $V_p(X)$, β une racine de $v_q(X)$ et γ une racine de $v_r(X)$ et l et m dans $K = K_0(l)$ tels que $lm = \gamma$ (si $r = 2$, $l = m = \gamma = 0$), on a la représentation de réflexion $R \rightarrow GL(M)$ obtenue grâce à la construction fondamentale. On pose $G := \text{Im } R = G(\alpha, \beta, \gamma; l)$ et $R := R(\alpha, \beta, \gamma; l)$ et on appelle $P(G) := P(\alpha, \beta, \gamma; \alpha l, \beta m)$ le système de paramètres de la représentation R de W (ce qui représente une légère modification de la définition initiale). On a :

$$\Delta = \Delta(G) = 8 - 2\alpha - 2\beta - 2\gamma - (\alpha l + \beta m).$$

On a vu dans les sections précédentes les résultats suivants :

Proposition 19.

1. (a) $Z(G)$ est un groupe cyclique d'ordre un diviseur de 6 ; de plus $Z(G) \cap G^+ \subset Z(G^+)$ est cyclique d'ordre 1 ou 3.
- (b) Si $\Delta(G) = 0$, $Z(G) = \{1\}$.
2. Si $\dim \Phi = 1$ et $\Phi = \langle \varphi \rangle$ alors :
 - (a) Les deux conditions suivantes sont équivalentes :
 - i. φ est symétrique et $\theta = \text{id}_K$;
 - ii. $\alpha l = \beta m$
 - (b) φ est dégénérée si et seulement si $\Delta(G) = 0$.
3. On suppose que $\alpha l = \beta m$, alors $K \subset \mathbb{R}$ et :
 - (a) $\dim \Phi = 1$;
 - (b) φ est symétrique et $\theta = \text{id}_K$;
 - (c) i. si $\Delta > 0$, φ est définie positive ;
 - ii. si $\Delta = 0$, φ est positive dégénérée, de noyau $C_M(G)$;
 - iii. si $\Delta < 0$, φ est de signature $(2, 1)$.
4. On suppose que $\Delta(G) = 0$ et que $l \notin K_0$. Alors on a :

- (a) $\dim\Phi = 1$;
(b) K est un corps de décomposition du polynôme

$$Q(X) = X^2 - 2(4 - \alpha - \beta - \gamma)X + \alpha\beta\gamma$$

sur le corps K_0 et θ est l'élément générateur du groupe de Galois $\mathcal{G}(K/K_0)$.

5. Le système de paramètres de la représentation contragrédiente R^* est :
 $P(G) := P(\alpha, \beta, \gamma; \beta m, \alpha l)$ si R est irréductible.

Dans toute la suite nous utiliserons de nombreux résultats des sections 1 et 2.

3.1 Questions de fidélité.

Nous gardons les hypothèses et notations précédentes. En général, nous ne savons pas si la représentation R est fidèle.

Proposition 20. *Le sous-groupe $\ker R$ de W est sans torsion.*

Démonstration. Soit H un sous-groupe fini de $\ker R$. Alors d'après [1] (page 130, exercice 2 d)), il existe i, j ($i \neq j$), il existe $g \in W$ tels que $gHg^{-1} \subset \langle s_i, s_j \rangle$. Mais l'hypothèse faite sur $R : \langle R(s_i), R(s_j) \rangle \simeq \langle s_i, s_j \rangle$ si $i \neq j$ montre que $\ker R \cap \langle s_i, s_j \rangle = 1$. Il en résulte aussitôt que $H = 1$. \square

Proposition 21. *Soit $W(p, q, r, S)$ un système de Coxeter de rang 3 avec $p, q, r \geq 3$. On pose $S := \{s_1, s_2, s_3\}$. Soit s une réflexion de $W(p, q, r)$ contenue dans $\langle s_j, s_k \rangle - \{s_j, s_k\}$. Alors $s_i s$ est d'ordre infini si $|\{i, j, k\}| = 3$.*

Démonstration. Soit $R(\alpha, \beta, \gamma; l)$ une représentation de réflexion de $W(p, q, r)$ qui satisfait aux conditions (R). Supposons, pour fixer les idées, que $i = 1$. Il existe un entier k tel que $s = s_2(s_2s_3)^k$. On a (voir la section 2) :

$$C(s_1, s_2(s_2s_3)^{2k}) = \beta\gamma u_{2k}^2(\gamma) + \alpha u_{2k-1}^2(\gamma) + (\alpha l + \beta m)u_{2k}(\gamma)u_{2k-1}(\gamma)$$

$$C(s_1, s_2(s_2s_3)^{2k+1}) = \beta u_{2k+1}^2(\gamma) + \alpha\gamma u_{2k}^2(\gamma) + (\alpha l + \beta m)u_{2k+1}(\gamma)u_{2k}(\gamma).$$

Avec les hypothèses faites, on a toujours $u_{2k}(\gamma)u_{2k-1}(\gamma)u_{2k+1}(\gamma) \neq 0$. En effet s_2s_3 est d'ordre r et comme $s \notin \{s_2, s_3\}$, nécessairement $2k-1$, $2k$ et $2k+1$ sont différents de 0 et de r . Le produit des deux réflexions s_1 et s est d'ordre fini si et seulement si il existe un nombre rationnel n , $0 \leq n < \frac{1}{2}$ tel que $C(s_1, s) = 4 \cos^2 \pi n$. Nous pouvons choisir l (donc aussi m puisque $lm = \gamma$) de telle sorte que $C(s_1, s)$ ne soit pas de la forme $4 \cos^2 \pi n$. Il en résulte que dans G , s_1s est d'ordre infini. Il en est de même dans $W(p, q, r)$. \square

Corollaire 7. (De la démonstration de la proposition 21.) Soit $(W(p, q, r), S)$ un système de Coxeter de rang 3 avec $p, q, r \geq 3$. Il y a une infinité dénombrable au moins de représentations de réflexion de $W(p, q, r)$ qui ne sont pas fidèles.

Démonstration. Dans la démonstration précédente, nous prenons n rationnel tel que $0 < n < \frac{1}{2}$ et nous calculons l de telle sorte que $C(s_1, s) = 4 \cos^2 n\pi$. Cela nous donne une ou deux valeurs pour l car alors nous connaissons $\alpha l + \beta m$ et $\alpha l \beta m = \alpha \beta \gamma$. \square

3.2 Un résultat général.

Dans toute la suite nous aurons besoin des formules suivantes démontrées dans la section 2 (formules \mathcal{C}_i).

$$C(s_1, s_2^{s_3}) = C(s_2, s_1^{s_3}) = (l+1)(\alpha + \beta m) = \alpha + \beta \gamma + (\alpha l + \beta m) \quad (76)$$

$$C(s_1, s_3^{s_2}) = C(s_3, s_1^{s_2}) = (m+1)(\beta + \alpha l) = \beta + \alpha \gamma + (\alpha l + \beta m) \quad (77)$$

$$C(s_2, s_3^{s_1}) = C(s_3, s_2^{s_1}) = (\alpha + m)(\beta + l) = \gamma + \alpha \beta + (\alpha l + \beta m) \quad (78)$$

$$C(s_1, s_2^{s_3 s_2}) = (l + u_3(\gamma))(\beta m + \alpha u_3(\gamma)) = \beta \gamma + \alpha u_3(\gamma)^2 + u_3(\gamma)(\alpha l + \beta m) \quad (79)$$

$$C(s_1, s_3^{s_2 s_3}) = (m + u_3(\gamma))(\alpha l + \beta u_3(\gamma)) = \alpha \gamma + \beta u_3(\gamma)^2 + u_3(\gamma)(\alpha l + \beta m) \quad (80)$$

$$C(s_2, s_1^{s_3 s_1}) = (l + u_3(\beta))(\beta m + \alpha u_3(\beta)) = \beta \gamma + \alpha u_3(\beta)^2 + u_3(\beta)(\alpha l + \beta m) \quad (81)$$

$$C(s_2, s_3^{s_1 s_3}) = (\beta + l u_3(\beta))(\alpha + m u_3(\beta)) = \alpha \beta + \gamma u_3(\beta)^2 + u_3(\beta)(\alpha l + \beta m) \quad (82)$$

$$C(s_3, s_1^{s_2 s_1}) = (\beta u_3(\alpha) + \alpha l)(m + u_3(\alpha)) = \alpha \gamma + \beta u_3(\alpha)^2 + u_3(\alpha)(\alpha l + \beta m) \quad (83)$$

$$C(s_3, s_2^{s_1 s_2}) = (\alpha + m u_3(\alpha))(\beta + l u_3(\alpha)) = \alpha \beta + \gamma u_3(\alpha)^2 + u_3(\alpha)(\alpha l + \beta m) \quad (84)$$

Si $\Delta(G) = 0$ et si

$$p = 2p_1, C(s_3, s_1(s_1 s_2)^{p_1}) = 4 - \beta, C(s_3, s_2(s_1 s_2)^{p_1}) = 4 - \gamma$$

$$q = 2q_1, C(s_2, s_1(s_1 s_3)^{q_1}) = 4 - \alpha, C(s_2, s_1(s_1 s_3)^{q_1}) = 4 - \gamma$$

$$r = 2r_1, C(s_1, s_2(s_2 s_3)^{r_1}) = 4 - \alpha, C(s_1, s_3(s_2 s_3)^{r_1}) = 4 - \beta.$$

L'un des buts de ce numéro est de démontrer le résultat suivant :

Théorème 1. Soit $W(p, p, r)$ un groupe de Coxeter de rang 3 avec r impair. Alors il existe un quotient de ce groupe isomorphe au groupe de Coxeter de rang 3, $W(p, r, 2)$. Réciproquement, tout groupe de Coxeter de rang 3, $W(p, r, 2)$ avec r impair est isomorphe à un quotient de $W(p, p, r)$.

Nous commençons par quelques résultats techniques.

On suppose r impair : $r = 2r_1 + 1$. D'après la proposition 11 $\exists \epsilon \in \{+1, -1\}$ tel que si γ est une racine de $v_r(X)$ (avec $\epsilon \in \{-1, +1\}$) :

- si r_1 est pair, on ait $u_{r_1+1}(\gamma) + \epsilon\sqrt{\gamma}u_{r_1}(\gamma) = 0$
- si r_1 est impair, on ait $\epsilon\sqrt{\gamma}u_{r_1+1}(\gamma) + u_{r_1}(\gamma) = 0$.

On a alors :

Proposition 22. *Soient $W(p, q, r)$ un groupe de Coxeter de rang 3 et $R(\alpha, \beta, \gamma; l)$ une de ses représentations de réflexion. On suppose r impair : $r = 2r_1 + 1$. Les deux conditions suivantes sont équivalentes :*

1. $s_1(s_2s_3)^{r_1}s_2$ est d'ordre 2 ;
2. $q = p$, $\beta = \alpha$ et $l = m = \epsilon\sqrt{\gamma}$ (donc $\alpha l = \beta m$).

Démonstration. 1) On montre que (1) implique (2).

On a $(s_2s_3)^{r_1}s_2 = s_2(s_2s_3)^{r_1+1}$. On applique les résultats de la proposition 17.

Si r_1 est pair, $C(s_1, s_2(s_2s_3)^{r_1+1}) = (\alpha u_{r_1}(\gamma) + \beta u_{r_1+1}(\gamma))(u_{r_1+1}(\gamma) + m u_{r_1}(\gamma))$ donc $s_1s_2(s_2s_3)^{r_1+1}$ d'ordre 2 équivaut au système :

$$\begin{aligned}\alpha u_{r_1}(\gamma) + \beta u_{r_1+1}(\gamma) &= 0 \\ m u_{r_1}(\gamma) + u_{r_1+1}(\gamma) &= 0.\end{aligned}$$

On obtient d'abord $\alpha l = \beta m$. On a aussi l'équation $u_{r_1+1}(\gamma) + \epsilon\sqrt{\gamma}u_{r_1}(\gamma) = 0$ donc $m = \epsilon\sqrt{\gamma}$. Comme $lm = \gamma$ on voit que $l = m$, $\beta = \alpha$ et $q = p$.

Si r_1 est impair $C(s_1, s_2(s_2s_3)^{r_1+1}) = (\alpha u_{r_1}(\gamma) + \beta m u_{r_1+1}(\gamma))(u_{r_1}(\gamma) + l u_{r_1+1}(\gamma))$ donc $s_1s_2(s_2s_3)^{r_1+1}$ d'ordre 2 équivaut au système :

$$\begin{aligned}\alpha u_{r_1}(\gamma) + \beta m u_{r_1+1}(\gamma) &= 0 \\ u_{r_1}(\gamma) + l u_{r_1+1}(\gamma) &= 0\end{aligned}$$

On obtient d'abord $\alpha l = \beta m$. On a aussi l'équation $\epsilon\sqrt{\gamma}u_{r_1+1}(\gamma) + u_{r_1}(\gamma) = 0$ donc $l = \epsilon\sqrt{\gamma}$. Comme ci-dessus, $l = m$, $\beta = \alpha$ et $q = p$.

2) On montre que (2) implique (1).

Si $\beta = \alpha$ et $l = m = \epsilon\sqrt{\gamma}$ alors si r_1 est pair, le système :

$$\begin{aligned}\alpha u_{r_1}(\gamma) + \beta u_{r_1+1}(\gamma) &= 0 \\ m u_{r_1}(\gamma) + u_{r_1+1}(\gamma) &= 0. \\ u_{r_1+1}(\gamma) + \epsilon\sqrt{\gamma}u_{r_1}(\gamma) &= 0\end{aligned}$$

se réduit à la dernière équation qui est satisfaite par hypothèse donc $s_1(s_2s_3)^{r_1}s_2$ est d'ordre 2.

La démonstration est identique si r_1 est impair. □

Nous avons deux corollaires à ce résultat.


Corollaire 8. On pose $\gamma_k := 4 \cos^2 \frac{k\pi}{r}$, $0 \leq k < \frac{r}{2}$, $(k, r) = 1$. Avec les hypothèses et notations de la proposition 15, on a :

$$G(\alpha, \alpha, \gamma_k; \epsilon\sqrt{\gamma_k}) \simeq G(\alpha, \gamma_{k'}, 0; 0)$$

où

- si $k = 2k_1$, on a $k' = k_1$;
- si $k = 2k_1 + 1$, on a $k' = r_1 - k_1$.

Démonstration. Posons $s'_3 = (s_2 s_3)^{r_1} s_2$. On a $\langle s_2, s'_3 \rangle = \langle s_2, s_3 \rangle$ d'où $G = \langle s_1, s_2, s'_3 \rangle$. En utilisant la proposition 16 nous voyons que $s'_3(a_1) = a_1$, $s'_3(a_2) = a_3$ et $s'_3(a_3) = a_2$. Nous avons le diagramme :



Nous posons $a'_1 = s_1(a_2) - a_2 = \alpha a_1$ et $a'_3 = s'_3(a_2) - a_2 = a_3 - a_2$ et nous avons la relation $s_2(a'_3) - a'_3 = (2 + \epsilon\sqrt{\gamma})a_2$ donc $C(s_2, s'_3) = 2 + \epsilon\sqrt{\gamma}$. Un calcul simple montre que si $\gamma = \gamma_k$ on a :

- si $k = 2k_1$ alors $\epsilon = +1$ et $2 + \epsilon\sqrt{\gamma} = 4 \cos^2 \frac{k_1\pi}{r}$;
- si $k = 2k_1 + 1$ alors $\epsilon = -1$ et $2 + \epsilon\sqrt{\gamma} = 4 \cos^2 \frac{(r_1 - k_1)\pi}{r}$

d'où le résultat en utilisant la proposition 11. □

Corollaire 9. On pose $\tau := \frac{3+\sqrt{5}}{2} = 4 \cos^2 \frac{\pi}{5}$. C'est la plus grande racine de $u_5(X)$, l'autre étant $3 - \tau = \frac{3-\sqrt{5}}{2} = 4 \cos^2 \frac{2\pi}{5}$. On a :

1. $G(1, 1, 1; -1) \simeq W(A_3)$;
2. $G(2, 2, 2; -1) \simeq W(B_3)$;
3. $G(3, 3, 3; -1) \simeq W(\tilde{G}_2)$;
4. $G(1, 1, \tau; 1 - \tau) \simeq W(H_3)$;
5. $G(\tau, \tau, 1; -1) \simeq W(H_3)$.

Démonstration. C'est clair d'après le corollaire 8. □

Démonstration. (Du théorème 6)

Par hypothèse r est impair et $r = 2r_1 + 1$.

1) Distinguons deux cas suivant que $p = r$ ou non.

Premier cas $p \neq r$. Nous partons de la représentation suivante de $W(p, p, r)$: on suppose que $\alpha = \beta = 4 \cos^2 \frac{\pi}{p}$, $\gamma = 4 \cos^2 \frac{\pi}{r}$ et $\alpha l = \beta m$. D'après le corollaire 4, comme $k = 1$ on a $k_1 = 0$ et le groupe obtenu en ajoutant la relation $(s_1(s_2s_3)^{r_1}s_2)^2 = 1$ est isomorphe à $G(\alpha, \gamma_r, 0; 0)$. maintenant le groupe de Galois $G(K_0/\mathbb{Q})$ est commutatif et il existe $\sigma \in G(K_0/\mathbb{Q})$ tel que $\sigma(\alpha) = \alpha$ et $\sigma(\gamma_{r_1}) = \gamma_1$ car les polynômes $v_p(X)$ et $v_q(X)$ sont premiers entre eux et ils sont irréductibles. Il en résulte que $R(\alpha, \gamma_r, 0; 0)$ est conjuguée de la représentation géométrique de $W(p, r, 2)$, d'où le résultat dans ce cas.

Deuxième cas $p = r$. Nous partons de la représentation suivante de $W(p, p, p)$: on suppose que $\alpha = \beta = 4 \cos^2 \frac{\pi}{p}$, $\gamma = 4 \cos^2 \frac{2\pi}{r}$ et $\alpha l = \beta m$. D'après le corollaire 4, comme $k = 2$, nous voyons que le groupe obtenu en ajoutant la relation $(s_1(s_2s_3)^{r_1}s_2)^2 = 1$ est isomorphe à $G(\alpha, \gamma_1, 0; 0)$ d'où le résultat dans ce cas.

2) Réciproquement nous partons de la représentation géométrique de $W(p, r, 2)$: $\alpha = 4 \cos^2 \frac{pi}{p}$, $\gamma_1 = 4 \cos^2 \frac{pi}{r}$ et $l = m = 0$. Si nous appliquons le corollaire 4 au groupe $W(p, p, r)$ et à sa représentation $R(\alpha, \alpha, \gamma_2; \sqrt{\gamma_2})$ nous avons le résultat. \square


3.3 Présentations du groupe de Coxeter $W(H_3)$.

Nous montrons comment obtenir le groupe de Coxeter $W(H_3)$ comme quotient d'un groupe de Coxeter de rang 3.

Notation 3. Soit $W(p, q, r)$ un groupe de Coxeter de rang 3. Si G est un quotient de $W(p, q, r)$, une présentation de G est notée :

$$(w(p, q, r), R_1, \dots, R_n)$$

où $w(p, q, r)$ est la présentation de $W(p, q, r)$ comme groupe de Coxeter :



et où les R_i sont des mots en s_1, s_2 et s_3 .

Si G est un groupe de réflexion, dans la mesure du possible, nous choisissons les R_i sous la forme $(st)^m$ où s et t sont des réflexions de $W(p, q, r)$ et aussi de telle sorte que l'on puisse calculer les éléments du système de paramètres $P(G) := P(\alpha, \beta, \gamma; \alpha l, \beta m)$, puisque celui-ci permet de construire la représentation R .

Nous connaissons la structure du groupe $W(H_3) : W(H_3) \simeq C_2 \times A_5$ où A_5 est le groupe alterné de degré 5. Nous connaissons aussi son corps de définition en tant que groupe de réflexion : on a $K = K_0 = \mathbb{Q}(\tau)$. Nous avons alors :

Théorème 2. *Les présentations de $W(H_3)$ comme quotient d'un groupe de Coxeter $W(p, q, r)$ sont les suivantes où l'on a posé $t = s_1 s_2 s_3$: ($t = t_1$ dans la notation 2)*

1. $(p, q, r) = (3, 5, 2)$ (présentation de Coxeter)

$$(w(3, 5, 2))$$

on a $t^5 = -id_M$ et $\Delta = 2(3 - \tau)$. On obtient la représentation $R(1, \tau, 0; 0)$ de $W(3, 5, 2)$.

2. $(p, q, r) = (5, 5, 2)$

$$(w(5, 5, 2), (s_2 s_3^{s_1})^3 = 1)$$

On a $t^3 = -id_M$ et $\Delta = 2$. On obtient la représentation $R(\tau, 3 - \tau, 0; 0)$ de $W(5, 5, 2)$.

3. $(p, q, r) = (3, 3, 5)$

$$(w(3, 3, 5), (s_1 s_2^{s_3 s_2})^2 = 1)$$

On a $t^3 = -id_M$ et $\Delta = 2$. On obtient la représentation $R(1, 1, \tau; 1 - \tau)$ de $W(3, 3, 5)$.

4. $(p, q, r) = (5, 5, 3)$

$$(w(5, 5, 3), (s_1 s_2^{s_3})^2 = 1)$$

On a $t^5 = -id_M$ et $\Delta = 2(3 - \tau)$. On obtient la représentation $R(\tau, \tau, 1; -1)$ de $W(5, 5, 3)$.

5. $(p, q, r) = (5, 5, 3)$

$$(w(5, 5, 3), (s_3 s_2^{s_1})^2 = 1)$$

On a $t^3 = -id_M$ et $\Delta = 2$. On obtient la représentation $R(\tau, 3 - \tau, 1; \tau - 3)$ de $W(5, 5, 3)$.

6. $(p, q, r) = (5, 5, 5)$

$$(w(5, 5, 5), (s_1 s_2^{s_3})^3 = 1, (s_1 s_2^{s_3 s_2})^2 = 1)$$

On a $t^5 = -id_M$ et $\Delta = 2(3 - \tau)$. On obtient la représentation $R(\tau, \tau, \tau; 1 - \tau)$ de $W(5, 5, 5)$.


Démonstration. Elle est divisée en deux parties. D'abord nous montrons que les présentations données sont bien des présentations du groupe de Coxeter $W(H_3)$, ensuite nous montrons que ce sont les seules possibilités pour obtenir $W(H_3)$ comme quotient d'un groupe de Coxeter de rang 3. Le calcul de t^n ne présente

pas de difficultés.

Première partie.


1) C'est la définition de $W(H_3)$. On a la représentation $R(1, \tau, 0; 0)$ de $W(3, 5, 2)$.

2) On a $\langle s_3, s_3^{s_1} \rangle = \langle s_1, s_3 \rangle$, donc $G = \langle s_3^{s_1}, s_2, s_3 \rangle$ avec le diagramme :




et G est isomorphe à $W(H_3)$. En effet nous avons $\{\alpha, \beta\} \subset \{\tau, 3 - \tau\}$, $l = m = \gamma = 0$, puis $C(s_2, s_3^{s_1}) = \gamma + \alpha\beta + (\alpha l + \beta m) = \alpha\beta = 1$, d'où par exemple $\alpha = \tau$ et $\beta = 3 - \tau$. Nous obtenons la représentation $R(\tau, 3 - \tau, 0; 0)$ de $W(5, 5, 2)$.

3) On a $\langle s_2, s_3 \rangle = \langle s_2, s_2^{s_3 s_2} \rangle$, donc $G = \langle s_1, s_2, s_2^{s_3 s_2} \rangle$ avec le diagramme :



et G est isomorphe à $W(H_3)$. En effet nous avons $\alpha = \beta = 1$, $\gamma = \tau$ et $C(s_1, s_2^{s_3 s_2}) = (l + \gamma - 1)(m + \gamma - 1)$ d'où $l = m = 1 - \gamma = 1 - \tau$. Nous obtenons la représentation $R(1, 1, \tau; 1 - \tau)$ de $W(3, 3, 5)$.


4) On a $\langle s_2, s_3 \rangle = \langle s_2, s_2^{s_3} \rangle$ donc $G = \langle s_1, s_2, s_2^{s_3} \rangle$ avec le diagramme :



et G est isomorphe à $W(H_3)$. En effet nous avons $C(s_1, s_2^{s_3}) = (\beta m + \alpha)(l + 1)$ d'où $\beta m + \alpha = 0$ et $l + 1 = 0$ donc $l = -1$; comme $lm = \gamma = 1$, $m = -1$ et $\beta = \alpha$.


Nous obtenons la représentation $R(\tau, \tau, 1; -1)$ de $W(5, 5, 3)$.

5) On a $\langle s_2, s_2^{s_1} \rangle = \langle s_2, s_1 \rangle$ donc $G = \langle s_3, s_2, s_2^{s_1} \rangle$ avec le diagramme :



et G est isomorphe à $W(H_3)$. En effet nous avons $C(s_3, s_2^{s_1}) = (\alpha + m)(\beta + l)$ d'où $\alpha + m = \beta + l = 0$ donc $m = -\alpha$, $l = -\beta$ et $lm = \gamma = 1 = \alpha\beta$. Nous obtenons la représentation $R(\tau, 3 - \tau, 1; \tau - 3)$ de $W(5, 5, 3)$.

6) On a $\langle s_2, s_2^{s_3 s_2} \rangle = \langle s_2, s_3 \rangle$, donc $G = \langle s_1, s_2, s_2^{s_3 s_2} \rangle$ avec le diagramme :



Posons $t_2 := s_1$, $t_1 = s_2$, $t_3 = s_2^{s_3 s_2}$, alors $t_2 t_3^{t_1} = s_1 s_2^{s_3}$ qui est d'ordre 3 par hypothèse, donc d'après le 2), $G \simeq W(H_3)$. En effet nous avons $C(s_1, s_2^{s_3 s_2}) = (\alpha l + \beta(\gamma - 1))(m + \gamma - 1)$ d'où $\alpha l + \beta(\gamma - 1) = 0 = m + (\gamma - 1)$, donc $m = -(\gamma - 1)$ puis, comme $lm = \gamma$, $l = -(\gamma - 1)$ et la première relation donne $\beta = \alpha$. Nous avons $C(s_1, s_2^{s_3}) = 1 = \beta\gamma + \alpha + \alpha l + \beta m = \alpha(3 - \gamma)$. Il en résulte que $\gamma = \alpha$. Nous obtenons la représentation $R(\tau, \tau, \tau; 1 - \tau)$ de $W(5, 5, 5)$.

Deuxième partie.

Nous pouvons remarquer que le sous-groupe $G^+ (= D(G))$ où $G \simeq W(H_3)$ est isomorphe au groupe alterné de degré 5 donc il ne contient pas d'éléments d'ordre 4, 6 ou 10. Si l'on veut obtenir $W(H_3)$ comme quotient d'un groupe de Coxeter $W(p, q, r)$, on doit avoir $\{p, q, r\} \subset \{2, 3, 5\}$ avec $5 \in \{p, q, r\}$ et aussi 2 ne peut apparaître qu'une fois au plus parmi $\{p, q, r\}$. Les triples à examiner sont donc l'un des suivants (à l'ordre près de p, q, r) : $(3, 5, 2)$, $(5, 5, 2)$, $(3, 3, 5)$, $(5, 5, 3)$, $(5, 5, 5)$. on doit aussi avoir $\alpha l = \beta m$ puisqu'il existe une forme bilinéaire G -invariante non nulle. Dans toute la suite $\epsilon \in \{-1, +1\}$.

Nous examinons successivement les différents cas.

1) Pour $(p, q, r) = (3, 5, 2)$ il n'y a rien à dire.

2) Pour $(p, q, r) = (5, 5, 2)$ on a $\{\alpha, \beta\} \subset \{\tau, 3 - \tau\}$ et $\gamma = l = m = 0$. Nous avons $C(s_2, s_3^{s_1}) = \gamma + \alpha\beta + \alpha l + \beta m = \alpha\beta$ donc si le groupe G est fini, nécessairement $\alpha\beta = 1$, donc $\beta \neq \alpha$ et $s_2 s_3^{s_1}$ est d'ordre 3.

3) Pour $(p, q, r) = (3, 3, 5)$, on a $\alpha = \beta = 1$ et $\gamma = \tau$. Nous avons $\alpha l = \beta m = l = m$, $lm = \tau$ donc $l = m = \epsilon(\tau - 1)$. Nous obtenons

$$C(s_2, s_3^{s_1}) = \tau + 1 + 2\epsilon(\tau - 1) = \begin{cases} 3\tau - 1, & \text{si } \epsilon = +1 \\ 3 - \tau, & \text{si } \epsilon = -1. \end{cases}$$

Il en résulte que $\epsilon = -1$ car sinon $s_2 s_3^{s_1}$ est d'ordre infini.

4) Pour $(p, q, r) = (5, 5, 3)$, on a $\{\alpha, \beta\} \subset \{\tau, 3 - \tau\}$, $\gamma = 1$ et aussi $lm = 1$ et $\alpha l = \beta m$. Distinguons deux cas suivant que $\alpha = \beta$ ou non.

Premier cas. Si $\alpha = \beta$, alors $l = m = \epsilon$ et nous obtenons :

$$C(s_1, s_2^{s_3}) = \alpha + \beta\gamma + \alpha l + \beta m = (\alpha + \beta m)(l + 1) = \begin{cases} 4\alpha & \text{si } \epsilon = +1, \\ 0 & \text{si } \epsilon = -1. \end{cases}$$

Si $\epsilon = +1$, $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre infini ;

si $\epsilon = -1$, $\alpha + \beta m = l + 1 = 0$ donc $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 2.

Deuxième cas. Si $\beta \neq \alpha$, alors $\alpha = \tau$, $\beta = 3 - \tau$, $\gamma = 1$, $\alpha\beta m = 1$ et $\alpha l = \beta m = \epsilon$. Nous obtenons :

$$C(s_1, s_2^{s_3}) = \alpha + \beta\gamma + \alpha l + \beta m = 3 + 2\epsilon = \begin{cases} 5 & \text{si } \epsilon = +1, \\ 1 & \text{si } \epsilon = -1. \end{cases}$$

Si $\epsilon = +1$, $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre infini ;

si $\epsilon = -1$, $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 3.

5) Pour $(p, q, r) = (5, 5, 5)$, on a $\{\alpha, \beta, \gamma\} \subset \{\tau, 3 - \tau\}$ et nous pouvons supposer que $\alpha = \beta = \tau$ et $\gamma \in \{\tau, 3 - \tau\}$. Comme $\alpha l = \beta m$, nous avons $l = m$ et $l^2 = m^2 = \gamma$. On a $(\tau - 1)^2 = \tau$ et $(\tau - 2)^2 = 3 - \tau$ et nous obtenons :

$$l = m = \begin{cases} \epsilon(\tau - 1) & \text{si } \gamma = \tau, \\ \epsilon(\tau - 2) & \text{si } \gamma = 3 - \tau. \end{cases}$$

Nous avons $C(s_2, s_3^{s_1}) = \alpha\beta + \gamma + \alpha l + \beta m$. Distinguons deux cas suivant que $\gamma = \tau$ ou $\gamma = 3 - \tau$.

Premier cas. Si $\gamma = \tau$, alors $l = m = \epsilon(\tau - 1)$ et $C(s_2, s_3^{s_1}) = \tau(\tau + 1 + 2\epsilon\tau - 2\epsilon)$, si $\epsilon = +1$, $C(s_2, s_3^{s_1}) = \tau(3\tau - 1) = \tau^3$ et $s_2 s_3^{s_1}$ est d'ordre infini ; si $\epsilon = -1$, $C(s_2, s_3^{s_1}) = \tau(3 - \tau) = 1$ et $s_2 s_3^{s_1}$ est d'ordre 3.


Deuxième cas. Si $\gamma = 3 - \tau$, alors $l = m = \epsilon(\tau - 2)$ et $C(s_2, s_3^{s_1}) = \tau^2 + 3 - \tau + 2\epsilon(\tau^2 - \tau)$; si $\epsilon = +1$, $C(s_2, s_3^{s_1}) = 3(\tau^2 - \tau + 1) = 6\tau = 3(3 + \sqrt{5}) > 4$ et $s_2 s_3^{s_1}$ est d'ordre infini ; si $\epsilon = -1$, $C(s_2, s_3^{s_1}) = -\tau^2 + \tau + 3 = -2\tau + 4 = 1 - \sqrt{5} < 0$ et $s_2 s_3^{s_1}$ est d'ordre infini. \square

3.4 Présentations du groupe de Coxeter $W(H_4)$.

Nous donnons maintenant quelques résultats pour le groupe de Coxeter $W(H_4)$ sans prétendre être exhaustif.


Proposition 23. *Des présentations de $W(H_4)$ comme quotient d'un groupe de Coxeter de rang 4 sont les suivantes :*

1)




C'est la présentation de $W(H_4)$ comme groupe de Coxeter.

2)




On obtient la représentation $R(1, \tau, 3 - \tau; 0)$ de $W(H_4)$.

3)




On obtient la représentation $R(1, 1, \tau, \tau; -\tau)$ de $W(H_4)$.

4)



On obtient la représentation $R(1, 1, \tau, 3 - \tau; -1)$ de $W(H_4)$.

5)




On obtient la représentation $R(1, 1, 1, \tau; 1 - \tau)$ de $W(\tilde{H}_4)$.

Démonstration. Dans tous les cas, la racine de l'arbre couvrant est s_1 . Dans les cas 3), 4) et 5), on enlève l'arête (s_3, s_4) pour obtenir l'arbre couvrant.

Nous n'avons rien à dire sur le 1).

2) On a $\langle s_3, s_4 \rangle = \langle s_4^{s_3}, s_4 \rangle$ donc $G = \langle s_1, s_2, s_4^{s_3}, s_4 \rangle$ avec le diagramme :



d'où le résultat : $G \simeq W(H_4)$.

Soit $\tau' \in \{\tau, 3 - \tau\}$. Un calcul simple montre que $s_4^{s_3}(a_2) = a_2 + (\tau'a_3 + a_4)$ et $s_2(\tau'a_3 + a_4) = \tau\tau'a_2 + (\tau'a_3 + a_4)$, d'où $C(s_2, s_4^{s_3}) = \tau'\tau$. Ensuite $(s_2 s_4^{s_3})^3 = 1 \leftrightarrow C(s_2, s_4^{s_3})^3 = 1 = \tau'\tau$ donc $\tau' = 3 - \tau$. On obtient la représentation $R(1, \tau, 3 - \tau; 0)$.

3) On a $\langle s_3, s_4 \rangle = \langle s_4^{s_3}, s_3 \rangle$ donc $G = \langle s_1, s_2, s_3, s_4^{s_3} \rangle$ et nous terminons la démonstration comme dans le cas précédent.

4) On a $\langle s_3, s_4 \rangle = \langle s_3^{s_4}, s_3 \rangle$ donc $G = \langle s_1, s_2, s_3, s_3^{s_4} \rangle$ et nous terminons la démonstration comme dans le cas précédent.

5) On a $\langle s_3, s_4 \rangle = \langle s_3^{s_4 s_3}, s_3 \rangle$ donc $G = \langle s_1, s_2, s_3, s_3^{s_4 s_3} \rangle$ et nous terminons la démonstration comme dans le cas précédent. \square

4 Exemples lorsque le corps K est complexe.

4.1 Les groupes de réflexion complexes $G(p, p, n)$ comme quotients du groupe de Weyl affine $W(\tilde{A}_{n-1})$.

Nous montrons maintenant comment la théorie précédente permet de trouver la famille des groupes de réflexion complexe $G(p, p, n)$ comme quotients du groupe de Weyl affine $W(\tilde{A}_{n-1})$.

1) On pose $G := W(\tilde{A}_{n-1})$, $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ et le graphe $\Gamma = \Gamma(G)$ est un circuit sans corde. On prend s_1 comme racine et comme arbre couvrant $\{s_1, \dots, s_n\}$. On cherche toutes les représentations de réflexion de G satisfaisant aux conditions (R). On a $m_{s_i s_{i+1}} = 3$ pour $(1 \leq i \leq n, \text{ les indices étant pris mod } n)$. Si e est une arête de Γ alors α_e est égal à 1. On a $K_0 = \mathbb{Q}$. On a $(s_1, s_n) \in E'(\Gamma)$. Soient l et m dans une extension K de \mathbb{Q} avec $lm = 1$ et on suppose que $K = \mathbb{Q}(l)$. On pose $l_{1,n} = l$ et $l_{n,1} = m$.


Dans la base \mathcal{A} de M , on a les relations : toutes celles obtenues grâce à la construction fondamentale et $s_1(a_n) = la_1 + a_n$, et $s_n(a_1) = a_1 + ma_n$. On pose $s_0 := s_1^{s_2 s_3 \dots s_{n-1}}$ et $a_0 := \sum_{i=1}^{n-1} a_i$ (a_0 est l'opposée de la plus grande racine du système de racines associé au groupe de Weyl $W(A_{n-1})$ engendré par les $s_i (1 \leq i \leq n-1)$). On a alors $s_0(a_0) = -a_0$, $s_0(a_1) = a_1 + a_0$, $s_0(a_i) = a_i (2 \leq i \leq n-2)$, $s_0(a_{n-1}) = a_{n-1} + a_0$, $s_0(a_n) = a_n - (l+1)a_0$. De plus $s_n(a_0) = a_0 - (m+1)a_n$, donc $C(s_0, s_n) = (l+1)(m+1) = l+m+2$.

Dans la représentation géométrique de $W(\tilde{A}_{n-1})$, on a $l = m = 1$ donc $C(s_0, s_n) = 4$, $s_0 s_n$ est une application unipotente et $s_0 s_n$ et ses conjugués engendrent le sous-groupe des translations de $W(\tilde{A}_{n-1})$.

Grâce à s_0 nous obtenons une autre présentation du groupe G . On a :

$$\langle s_1, s_2, \dots, s_{n-1} \rangle = \langle s_2, \dots, s_{n-1}, s_0 \rangle$$

car $s_0 \in \langle s_1, s_2, \dots, s_{n-1} \rangle$ et $s_1 \in \langle s_2, \dots, s_{n-1}, s_0 \rangle$ car $s_1 = s_0^{s_{n-1} s_{n-2} \dots s_2}$. Il en résulte que $G = \langle s_2, \dots, s_{n-1}, s_0, s_n \rangle$ avec le diagramme $\Gamma(s_2, s_3, \dots, s_{n-2}, s_{n-1}, s_n, s_0)$:



On a la relation supplémentaire $(s_0^{s_{n-1}} s_n)^3 = 1$. En effet $(s_0^{s_{n-1}} s_n)^3 = (s_1^{s_2 \dots s_{n-2}} s_n)^3 = (s_1 s_n)^3 = 1$. Il résulte de ceci qu'il y a une **inclusion canonique de $W(\tilde{A}_i)$ dans $W(\tilde{A}_{n-1})$ pour $3 \leq i \leq n-1$** .

Le diagramme précédent avec la relation supplémentaire $(s_0^{s_{n-1}} s_n)^3 = 1$ donne une autre présentation du groupe G .

Soit $\Gamma = \Gamma(t_1, t_2, \dots, t_{n-3}, t_{n-2}, t_n, t_{n-1})$


$$H := \langle t_1, \dots, t_n | \Gamma, (t_{n-1}^{t_{n-2}} t_n)^3 = 1 \rangle$$

Nous montrons que $H \simeq G$. Il est clair que G est isomorphe à un quotient de H , donc H est infini.

Posons $t_0 := t_{n-1}^{t_{n-2} \cdots t_2 t_1}$. Alors $H = \langle t_0, t_1, \dots, t_{n-2}, t_n \rangle$, de plus

$$(t_0 t_n)^3 = (t_{n-1}^{t_{n-2} \cdots t_2 t_1} t_n)^3 = (t_{n-1}^{t_{n-2}} t_n)^3$$

et l'on a le diagramme :



donc H est isomorphe à un quotient du groupe G . Comme tous les quotients propres de G sont des groupes finis, d'après la remarque précédente, on voit que $H \simeq G$.

2) Soit maintenant un quotient propre de G . On sait que ce quotient est fini, donc l'ordre de $s_0 s_n$ est fini, p par exemple. On appelle G_p un tel quotient. On sait aussi que cela est possible si et seulement si $C(s_0, s_n)$ est racine du polynôme $v_p(X)$: il existe $k \in \mathbb{N}$, k premier à p tel que $l + m + 2 = 4 \cos^2 \frac{k\pi}{p}$. Il en résulte que l et m sont les racines du polynôme :



$$Q(X) = X^2 - 2 \cos \frac{2k\pi}{p} X + 1$$

et l'on a $\{l, m\} = \{\zeta_p, \zeta_p^{-1}\}$ où $\zeta_p = \exp(\frac{2ik\pi}{p})$.

Dans ces conditions, on obtient un groupe de réflexion complexe isomorphe à $G(p, p, n)$ et $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$.

Si $p = 2$, on obtient le groupe $W(D_n)$ (on a $l = m = -1$).

On a ainsi les deux présentations suivantes de $G(p, p, n)$:



La présentation (2) de $G(p, p, n)$ montre que si $2 \leq n' \leq n$ alors $G(p, p, n') \subset G(p, p, n)$.

Si $C(s_0, s_n)$ n'est racine d'aucun polynôme $v_p(X)$, alors $s_0 s_n$ est d'ordre infini et l'on obtient une représentation fidèle de réflexion de G qui n'est pas équivalente à la représentation géométrique.

4.2 Compléments sur les groupes $W(\tilde{A}_2)$.

En préparation de ce qui suit, nous complétons les résultats précédents sur le groupe $W(\tilde{A}_2)$.

Proposition 24. *On a les présentations suivantes pour le groupe de réflexion complexe $G(n, n, 3)$:*

1. $(w(3, 3, 3), (s_1 s_2^{s_3})^n = 1)$
2. $(w(3, 3, n), (s_1 s_2 s_3)^2 = (s_2 s_3 s_1)^2)$

Démonstration. Le 1) est clair d'après l'étude de $W(\tilde{A}_{n-1})$ faite dans la section précédente.

Pour le 2), appelons, pour cette démonstration uniquement, G_n le groupe $G(n, n, 3)$ et H_n un groupe ayant la présentation de l'énoncé :

$$G_n = \langle t_1, t_2, t_3 | w(3, 3, 3), (t_1 t_3^{t_2})^n = 1 \rangle$$

Comme $\langle t_1, t_2 \rangle = \langle t_1, t_2^{t_1} \rangle$, nous avons $G_n = \langle t_1, t_2^{t_1}, t_3 \rangle$. Posons $t'_2 := t_2^{t_1}$. Alors $t'_2 t_3 = t_2^{t_1} t_3 = t_1^{t_2} t_3 = (t_1 t_3^{t_2})^{t_2}$, donc $t'_2 t_3$ est d'ordre n .

Ensuite $(t_1 t'_2 t_3)^2 = (t_2 t_1 t_3)^2$ et $(t'_2 t_3 t_1)^2 = (t_2^{t_1} t_3 t_1)^2$ d'où

$$\begin{aligned} (t_1 t'_2 t_3)^2 &= t_2^{t_1} t_3 t_1 t_2^{t_1} t_3 t_1 = t_1 t_2 t_1 t_3 t_2 t_1 t_3 t_1 \\ &= t_2 t_1 (t_2 t_3 t_2 t_3) t_1 t_3 = t_2 t_1 (t_3 t_2) t_1 t_3 = (t_2 t_1 t_3)^2 \end{aligned}$$

et nous obtenons $(t_1 t'_2 t_3)^2 = (t'_2 t_3 t_1)^2$. Il en résulte que le groupe G_n est isomorphe à un quotient du groupe H_n .

Partant du groupe H_n de l'énoncé, posons $s'_2 := s_2^{s_1}$ et $u := (s_1 s_2 s_3)^2$. Nous pouvons remarquer que u commute avec s_1 . Posons $a := s'_2 s_3 s'_2$, $b := s_3 s'_2 s_3$. Alors $a = s_3^{s_1 s_2 s_1} = s_1^{s_3 s_2 s_1}$ et $b = s_2^{s_1 s_3} = s_1^{s_2 s_3}$, d'où $a^{s_1 s_2 s_1} = s_1$ et $b^{s_1 s_2 s_3} = s_1^{s_2 s_3 s_1 s_2 s_3} = s_1^u = s_1$ d'après la remarque précédente. Il en résulte que $a = b$ et que $s'_2 s_3$ est d'ordre 3.

Enfin $s_1 s'_2 s_3 s'_2 = s_2 s_1 (s_3 s_2) s_1 s_2$, donc $s_1 s'_2 s_3 s'_2$ a le même ordre que $s_3 s_2$ c'est à dire n . Comme $H_n = \langle s_1, s'_2, s_3 \rangle$, nous voyons que H_n est isomorphe à un quotient de G_n . En combinant les deux morphismes ainsi construits entre G_n et H_n , nous voyons que ce sont des isomorphismes et nous avons le résultat. \square

Proposition 25. Soit $R(1, 1, \gamma; l)$ une représentation de réflexion de $W(3, 3, n)$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

1. $(s_1 s_2 s_3)^2 = (s_2 s_3 s_1)^2$;
2. $l + m = -\gamma$;
3. $\Delta = 4 - \gamma$.

Si ces conditions sont satisfaites, on a $(s_1 s_2 s_3)^{2n} = id_M$ et $\{l, m\} = \{-1 - \exp(\frac{2ki\pi}{n}), -1 - \exp(\frac{-2ki\pi}{n})\}$ pour un certain k premier à n .

Démonstration. On a :

$$s_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, s_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & l \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, s_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & m & -1 \end{pmatrix}$$

et un calcul simple montre que :

$$(s_1 s_2 s_3)^2 = \begin{pmatrix} l^2 + l\gamma + 2\gamma + m - 1 & \gamma^2 + \gamma(l + m - 1) - (l + m) & -l^2 - l\gamma - \gamma \\ l^2 + l\gamma + \gamma & \gamma^2 + l\gamma - \gamma - l + m & -l^2 - l\gamma - 1 \\ \gamma + l + m & m\gamma + \gamma - m - 1 & -\gamma - l \end{pmatrix}$$

et

$$(s_2 s_3 s_1)^2 = \begin{pmatrix} -l - 1 & \gamma + l + m & 0 \\ -l^2 - l\gamma - \gamma & \gamma^2 + 2l\gamma + l^2 + m - l & -l - 1 \\ -\gamma - l - m & m\gamma + 2\gamma + l - 1 & m \end{pmatrix}$$

Si $(s_1 s_2 s_3)^2 = (s_2 s_3 s_1)^2$, nous devons avoir $\gamma + l + m = 0$ et nous vérifions immédiatement que cette condition est suffisante, donc les conditions 1. et 2. sont équivalentes. Comme $\Delta = 4 - 2\gamma - (l + m)$, nous voyons tout de suite que 2. et 3. sont équivalentes. \square

4.3 Le groupe de réflexion complexe G_{24} .

Dans cette partie nous montrons comment obtenir le groupe de réflexion complexe G_{24} comme quotient d'un groupe de Coxeter de rang 3. Plus précisément, nous obtenons tous les triples (p, q, r) (à l'ordre près) tels que G_{24} soit un quotient de $W(p, q, r)$. Nous donnons des présentations de G_{24} en utilisant les résultats précédents.

Nous connaissons la structure de G_{24} : $G_{24} \simeq C_2 \times PSL_2(7)$. Nous connaissons aussi son corps de définition en tant que groupe de réflexion complexe : si $\zeta := \frac{1+i\sqrt{7}}{2}$, ζ racine du polynôme $X^2 - X + 2$ l'autre étant $\zeta' := \frac{1-i\sqrt{7}}{2}$, alors $K_0 = \mathbb{Q}$ et $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ puisque ζ n'est racine d'aucun polynôme $u_n(X)$. De plus l'anneau des entiers de K est $\mathbb{Z}[\zeta]$ qui est un anneau principal..

Le reste de cette partie va être consacrée à la démonstration du théorème suivant :

Théorème 3.

1. Les triples (p, q, r) tels que G_{24} soit un quotient de $W(p, q, r)$ sont les suivants (à permutation près de p, q, r) :

$$(p, q, r) \in \{(3, 3, 4), (4, 4, 3), (4, 4, 4)\}.$$

On pose dans les trois cas $t := s_1 s_2 s_3$.

2. Des présentations de G_{24} sont :

- (a) $(w(3, 3, 4), (s_2^{s_1} s_3)^4 = 1)$. On a $t^7 = -id_M$ et $\Delta = 1$. On obtient la représentation $R(1, 1, 2; -\zeta)$ de $W(3, 3, 4)$.
- (b) $(w(4, 4, 3), (s_2 s_1^{s_3})^3 = 1)$. On a $t^7 = -id_M$ et $\Delta = 1$. On obtient la représentation $R(2, 2, 1; -1 + \frac{\zeta}{2} (= \frac{\zeta}{7}))$ de $W(4, 4, 3)$.
- (c) $(w(4, 4, 4), (s_1 s_2^{s_3})^3 = 1)$. On a $t^7 = -id_M$ et $\Delta = 1$. On obtient la représentation $R(2, 2, 2; -1 - \frac{\zeta}{2})$ de $W(4, 4, 4)$.

Démonstration. Elle divisée en deux parties.

D'abord nous montrons que les groupes obtenus dans le 2) sont isomorphes au groupe G_{24} , puis nous montrons que ce sont les seules possibilités.

A. 1) Considérons la représentation $R(1, 1, 2; l)$ de $W(3, 3, 4)$ et exprimons que $(s_2^{s_1} s_3)$ est d'ordre 4. Nous avons $(s_2^{s_1} s_3)$ d'ordre 4 si et seulement si $(1+l)(1+m) = 2$ donc, tenant compte de $lm = 2$, nous voyons que l et m sont les racines du polynôme :

$$Q(X) = X^2 + X + 2.$$


Nous obtenons $l = -\zeta$ et $m = -1 + \zeta$ (l'autre choix correspondant à la représentation conjuguée).

Posons $c := s_1 s_2$ et $d := s_1 s_3$. Alors le sous-groupe G^+ de G est engendré par c et d et nous avons $c^3 = d^3 = 1, c^2 d = s_2 s_3$ donc $(c^2 d)^3 = 1$ et nous venons de voir que $(cd)^4 = 1$. Il en résulte que $\langle c, d \rangle$ est isomorphe au groupe $PSL_2(7)$ (voir [5]). D'après la proposition 18 1), nous avons $\theta = l = -\zeta, \theta' = -m = \bar{\theta}$, d'où $P_t(X) = x^3 - \bar{\zeta} X^2 - \zeta X + 1$ et un calcul simple montre que $t^7 = -id_M$. Comme $t \notin G^+$, nous avons $t^7 \notin G^+$ et comme G^+ est d'indice 2 dans G , nous obtenons $G \simeq C_2 \times PSL_2(7) \simeq G_{24}$.

2) Considérons la représentation $R(2, 2, 1; l)$ de $W(4, 4, 3)$. Nous avons $s_2 s_1^{s_3}$ d'ordre 3 si et seulement si $\beta\gamma + \alpha + l\alpha + m\beta = 1$, si et seulement si $2l + 2m = -3$. Comme $2l2m = 4$, $2l$ et $2m$ sont les racines du polynôme :

$$Q(X) = x^2 + 3X + 4$$

et nous obtenons $\{l, m\} = \{-1 + \frac{\zeta}{2}, -1 + \frac{\bar{\zeta}}{2}\}$ ce qui détermine l à conjugaison près. Nous avons $\langle s_1, s_3 \rangle = \langle s_3, s_1^{s_3} \rangle$, donc $G = \langle s_2, s_3, s_1^{s_3} \rangle$ avec le diagramme :




Enfin $s'_1 s'_2 s'_1 s'_3 = s_3^{s_2} s_1^{s_3} = s_2^{s_3} s_1^{s_3} = (s_2 s_1)^{s_3}$ donc $s'_1 s'_2 s'_1 s'_3$ est d'ordre 4. Nous appliquons le 1) pour avoir le résultat : $G \simeq G_{24}$.

3) Considérons la représentation $R(2, 2, 2; l)$ de $W(4, 4, 4)$. Nous avons $s_1 s_2^{s_3}$ d'ordre 3 si et seulement si $\alpha + \beta\gamma + l\alpha + m\beta = 1$ si et seulement si $2l + 2m = -5$. Comme $2l2m = 8$, $2l$ et $2m$ sont les racines du polynôme :

$$Q(X) = X^2 + 5X + 8$$

et nous obtenons $\{l, m\} = \{-1 - \frac{\zeta}{2}, -1 - \frac{\bar{\zeta}}{2}\}$ ce qui détermine l à conjugaison près. Nous avons $\langle s_2, s_3 \rangle = \langle s_3, s_2^{s_3} \rangle$ donc $G = \langle s_1, s_3, s_2^{s_3} \rangle$ avec le diagramme :



Enfin $s'_2 s'_3 s'_1 s'_3 = s_1 (s_2^{s_3}) s_3 (s_2^{s_3}) = s_1 s_3^{s_2}$. Un calcul simple montre que $s_1 s_3^{s_2}$ est d'ordre 3, donc $s'_2 s'_3 s'_1 s'_3$ est d'ordre 3 et $G \simeq G_{24}$ d'après le 2).

B. Comme $K_0 = \mathbb{Q}$, nous avons $\{p, q, r\} \subset \{3, 4, 6\}$ et G est un quotient d'un $W(p, q, r)$, donc $\{\alpha, \beta, \gamma\} \subset \{1, 2, 3\}$. Nous savons que l'ordre des éléments réels de $PSL_2(7)$ est 3 ou 4. Un produit de deux réflexions de G_{24} ne peut donc être d'ordre que 2, 3 ou 4; en particulier $6 \notin \{p, q, r\}$. Nous avons donc les possibilités (à permutation près) (2 est aussi exclu car sinon nous obtenons des groupes de Coxeter : $W(A_3), W(B_3), W(\tilde{B}_2)$) :

$$(p, q, r) \in \{(3, 3, 4), (4, 4, 3), (4, 4, 4)\}.$$


Examinons ces trois cas successivement.

1) Si $(p, q, r) = (3, 3, 4)$, d'après la remarque précédente $s_2^{s_1} s_3$ est d'ordre 2, 3 ou 4.

- Si $s_2^{s_1} s_3$ est d'ordre 2, comme $C(s_3, s_2^{s_1}) = (l+1)(m+1)$, nous avons $l = m = -1$,

$\gamma = lm = 1 \neq 2$ ce cas ne peut pas se produire.


- Si $s_2^{s_1}s_3$ est d'ordre 3, comme $\langle s_1, s_2^{s_1} \rangle = \langle s_1, s_2 \rangle$ nous obtenons $G = \langle s_1, s_2^{s_1}, s_3 \rangle$ avec le diagramme :



et G est isomorphe à $W(\tilde{A}_2)$. Ce cas ne peut pas se produire. Il en résulte que $s_2^{s_1}s_3$ est d'ordre 4.

2) Si $(p, q, r) = (4, 4, 3)$, comme ci-dessus $s_2^{s_1}s_3$ est d'ordre 2, 3 ou 4.

- Si $s_2^{s_1}s_3$ est d'ordre 2, $l = m = -1$, donc $G = \langle s_1, s_2, s_3^{s_2} \rangle$ avec le diagramme :



et $G \simeq W(B_3)$. Ce cas ne peut pas se produire.

- Si $s_2^{s_1}s_3$ est d'ordre 4, on a $C(s_2, s_1^{s_3}) = 2 = 4 + 2(l - m)$, donc $l + m = -1$ et $\Delta = 8 - 4 - 4 - 2 + 2 = 0$. Ce cas ne peut pas se produire. Il en résulte que $s_2^{s_1}s_3$ est d'ordre 3.

3) Si $(p, q, r) = (4, 4, 4)$, comme ci-dessus, $s_1s_2^{s_3}$ est d'ordre 2, 3 ou 4.

- Si $s_1s_2^{s_3}$ est d'ordre 2, on a $l + 1 = 0 = 2(m + 1)$, donc $l = m = -1$ et $\gamma = 1 \neq 2$. Ce cas ne peut pas se produire.

- Si $s_1s_2^{s_3}$ est d'ordre 4, on a $2 = \beta\gamma + \alpha + l\alpha + m\beta = 6 + 2(l + m)$ donc $2(l + m) = -4$ et $\Delta = 8 - 4 - 4 - 4 + 4 = 0$. Ce cas ne peut pas se produire.

Il en résulte que $s_1s_2^{s_3}$ est d'ordre 3 et ceci achève la démonstration. \square

4.4 Le groupe de réflexion complexe G_{27} .

Dans cette partie nous montrons comment obtenir le groupe de réflexion complexe G_{27} comme quotient d'un groupe de Coxeter de rang 3. Plus précisément, nous obtenons tous les triples (p, q, r) (à l'ordre près) tels que G_{27} soit un quotient de $W(p, q, r)$. Nous donnons aussi des présentations de G_{27} .

Nous connaissons la structure de $G_{27} : G_{27} \simeq C_2 \times (C_3 * A_6)$ où A_6 désigne le groupe alterné de degré 6 et $C_3 * A_6$ est une extension centrale non scindée de A_6 par C_3 .

Nous connaissons aussi son corps de définition en tant que groupe de réflexion complexe : si $\omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ est une racine primitive troisième de l'unité, on a $K = \mathbb{Q}(\tau, \omega)$.

Le reste de cette partie va être consacrée à la démonstration du résultat suivant :

Théorème 4.

1. Les triples (p, q, r) tels que G_{27} soit isomorphe à un quotient de $W(p, q, r)$ sont les suivants (à permutation près) :

$$(p, q, r) \in \{(3, 3, 5), (3, 4, 5), (5, 5, 3), (5, 5, 4), (4, 4, 5), (3, 3, 4)\}.$$

2. Des présentations de G_{27} sont :

- (a) $(w(3, 3, 5), (s_1 s_2^{s_3})^4 = 1)$. On a $t^5 = -\omega id_M$, $t^{15} = -id_M$ et $\Delta = 3 - \tau$. On obtient la représentation $R(1, 1, \tau; \omega(1 - \tau))$ de $W(3, 3, 5)$ et $K_0 = \mathbb{Q}(\tau)$.
- (b) $(w(3, 4, 5), (s_1 s_2^{s_3})^4 = 1)$. On a $t^4 = \omega id_M$, $t^{12} = id_M$ et $\Delta = 3$. On obtient la représentation $R(1, 2, \tau; -\omega - \tau)$ de $W(3, 4, 5)$ et $K_0 = \mathbb{Q}(\tau)$.
- (c) $(w(3, 4, 5), (s_1 s_2^{s_3})^5 = 1)$. On a $t^5 = -\omega id_M$, $t^{15} = -id_M$ et $\Delta = 3 - \tau$. On obtient la représentation $R(1, 2, \tau; \omega^2 + \omega\tau)$ de $W(3, 4, 5)$ et $K_0 = \mathbb{Q}(\tau)$.
- (d) $(w(5, 5, 3), (s_3 s_2^{s_1})^3 = 1, (s_1 s_2^{s_3})^4 = 1)$. On a $t^5 = -\omega id_M$, $t^{15} = -id_M$ et $\Delta = 3 - \tau$. On obtient la représentation $R(\tau, 3 - \tau, 1; \omega(3 - \tau))$ de $W(5, 5, 3)$ et $K_0 = \mathbb{Q}(\tau)$.
- (e) $(w(5, 5, 4), (s_1 s_2^{s_3})^3 = 1, (s_1 s_3^{s_2})^3 = 1)$. On a $t^5 = -\omega id_M$, $t^{15} = -id_M$ et $\Delta = 3 - \tau$. On obtient la représentation $R(\tau, \tau, 2; \omega(\tau - 1) + \omega^2)$ de $W(5, 5, 4)$ et $K_0 = \mathbb{Q}(\tau)$.
- (f) $(w(4, 4, 5), (s_1 s_2^{s_3})^3 = 1)$. On a $t^4 = \omega^2 id_M$, $t^{12} = id_M$ et $\Delta = 1$. On obtient la représentation $R(2, 2, \tau; \frac{1}{2}(\omega - \tau))$ de $W(4, 4, 5)$ et $K_0 = \mathbb{Q}(\tau)$.
- (g) $(w(3, 3, 4), (s_1 s_2^{s_3})^5 = 1)$. On a $t^5 = -\omega^2 id_M$, $t^{15} = -id_M$ et $\Delta = \tau$. On obtient la représentation $R(1, 1, 2; \omega(\tau - 1) + \omega^2)$ de $W(3, 3, 4)$ et $K_0 = \mathbb{Q}$.

Démonstration. Elle divisée en deux parties.

D'abord nous montrons que les groupes obtenus dans le 2) sont isomorphes au groupe G_{27} , puis nous montrons que ce sont les seules possibilités.

A. 1) Considérons la représentation $R(1, 1, \tau; l)$ de $W(3, 3, 5)$ et exprimons que l'élément $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 4. Nous avons $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 4 si et seulement si

$C(s_1, s_2^{s_3}) = 2$ donc $2 = 1 + \tau + l + m$ et comme $lm = \gamma = \tau$, nous voyons que l, m sont les racines du polynôme :

$$Q(X) = X^2 - (1 - \tau)X + \tau$$

dont le discriminant est $-3\tau = -3(\tau - 1)^2$, d'où $l = \omega(1 - \tau)$ et $m = \omega^2(1 - \tau)$ et $K = \mathbb{Q}(\tau, \omega)$.

Nous devons montrer que G possède la bonne structure. Posons $c := s_1s_2$ et $d := s_2s_3$. Alors $D(G) = G^+ = \langle c, d \rangle$ et nous avons $c^3 = d^5 = 1$, $cd = s_1s_3$, donc $(cd)^3 = 1$. De plus $c^2d = s_2s_1s_2s_3 = s_1^{s_2}s_3 = (s_1s_3^{s_2})^{s_2}$. Comme $\alpha = \beta = 1$, nous avons $C(s_1, s_3^{s_2}) = C(s_1, s_2^{s_3}) = 2$, donc c^2d est d'ordre 4.

Nous montrons maintenant que $G^+/Z(G^+)$ est isomorphe au groupe alterné de degré 6 en utilisant la présentation de ce groupe donnée dans [3] :

$$A_6 = \langle c, d \mid c^3 = d^5 = (cd)^3 = (c^2d)^4 = [c, d^3]^2 = 1 \rangle.$$

(Par exemple on prend $c = (2, 4, 6)$ et $d = (1, 2, 3, 4, 5)$.)

Il nous reste à calculer l'ordre de $[c, d^3]$. Nous avons :

$$[c, d^3] = (s_1s_2)(s_2s_3)^3(s_2s_1)(s_3s_2)^3 = (s_1(s_2s_3)^2)^2 = t_2^2$$

où $t_2 = s_1(s_2s_3)^2$ (notation de la section 2). Nous utilisons les formules de la proposition 18. Nous avons :

$$\begin{aligned} \theta &= -4 + 1 + 1 + \tau + l & &= l + \tau - 2 = -1 - m \\ \theta' &= 4 - 1 - 1 - \tau - m & &= 2 - m - \tau = l + 1 \end{aligned}$$

Nous obtenons $\theta\theta' = -(1 + l)(1 + m) = -2$ et $\theta + \theta' = l - m$. Il en résulte que $P_{t_2}(X) = X^3 - uX^2 + u'X + 1$ avec $u = 1 + \theta\tau - (\theta + \theta')$ et $u' = -1 + \theta'\tau - (\theta + \theta')$, puis

$$\begin{aligned} u &= 1 - \tau - \omega^2\tau(\tau - 1) - \omega(\tau - 1) + \omega^2(\tau - 1) \\ &= (\tau - 1)(-1 - \omega^2\tau - \omega + \omega^2) \\ &= (\tau - 1)\omega^2(\tau - 2) = -\omega^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u' &= -1 + \omega\tau(\tau - 1) + \tau - \omega(\tau - 1) + \omega^2(\tau - 1) \\ &= (\tau - 1)(1 + \omega\tau - \omega + \omega^2) \\ &= (\tau - 1)\omega(\tau - 2) = \omega \end{aligned}$$

car $\tau^2 - 3\tau + 1 = 0$.

Nous avons alors :

$$\begin{aligned} t_2^3 &= ut_2^2 - u't_2 - id_M, \\ t_2^4 &= (u^2 - u')t_2^2 - (uu' + 1)t_2 - uid_M = \omega^2id_M \end{aligned}$$

d'où $t_2^4 \in Z(G^+)$, t_2^4 est d'ordre 3 et t_2 est d'ordre 12.

Maintenant $[c, d^3] = t_2^2$, donc $[c, d^3]$ est d'ordre 6 et $[c, d^3]^2 \in Z(G^+)$. D'après le résultat de Burnside, nous voyons que $D(G^+)/Z(G^+)$ est isomorphe au groupe alterné A_6 et que $Z(G^+) = \langle [c, d^3]^2 \rangle$.

Comme $D(G)$ est son propre groupe dérivé, il en résulte que $D(G) \simeq C_3 * A_6$ extension centrale non scindée de A_6 .

Nous avons $P_t(X) = X^3 - (1 + \theta)X^2 + (-1 + \theta')X + 1 = X^3 + mX^2 + lX + 1$ et nous obtenons :

$$\begin{aligned} t^3 &= -mt^2 - lt - id_M \\ t^4 &= (m^2 - l)t^2 + (\tau - 1)t + mid_M \\ t^5 &= (-m^3 + 2\tau - 1)t^2 + (-lm^2 + l^2 + m)t - (m^2 - l)id_M. \end{aligned}$$


Comme $l = \omega(\tau - 1)$ et $m = \omega^2(\tau - 1)$, nous avons $m^2 - l = \omega(\tau - 1)^2 - \omega(\tau - 1) = \omega$, $m^3 = 2\tau - 1$, donc $-m^3 + 2\tau - 1 = 0$ et de même on voit que $-lm^2 + l^2 + m = 0$. Finalement, $t^5 = -\omega id_M \in Z(G)$ et $t^{15} = -id_M$. Comme $-id_M \notin D(G)$ nous avons le résultat : $G \simeq C_2 \times (C_3 * A_6) \simeq G_{27}$.

2) Considérons la représentation $R(1, 2, \tau; l)$ de $W(3, 4, 5)$. Exprimons que l'élément $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 4.

(i) Nous avons $s_1 s_2^{s_3}$ d'ordre 4 si et seulement si $C(s_1, s_2^{s_3}) = 2$ donc $2 = 1 + 2\tau + l + 2m$ et comme $lm = \gamma = \tau$, nous voyons que l et $2m$ sont les racines du polynôme :

$$Q(X) = x^2 - (1 - 2\tau)X + 2\tau$$

dont le discriminant est -3 , d'où $K = \mathbb{Q}(\tau, \omega)$ et $\{l, 2m\} = \{-\omega - \tau, -\omega^2 - \tau\}$. Nous avons $C(s_1, s_2^{s_3 s_2}) = \beta\gamma + \alpha(\gamma - 1)^2 + (\gamma - 1)(l\alpha + m\beta) = 3\tau + (\tau - 1)(1 - 2\tau)$ donc $C(s_1, s_2^{s_3 s_2}) = -2\tau^2 + 6\tau - 1 = 1$. Nous obtenons $G = \langle s_1, s_2, s_2^{s_3 s_2} \rangle$ avec le diagramme :



et comme $s_2^{s_3 s_2} s_2 s_2^{s_3 s_2} = s_3$, nous avons $(s_1 s'_3 s_2 s'_3)^4 = (s_1 s_3)^4 = 1$ donc, d'après le 1), G est isomorphe à G_{27} . Les autres calculs ne présentent pas de difficultés.


(ii) Exprimons maintenant que l'élément $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 5.

Nous avons $C(s_1, s_2^{s_3}) = 1 + 2\tau + (l + 2m) \in \{\tau, 3 - \tau\}$ d'où deux possibilités. - $1 + 2\tau + (l + 2m) = \tau$, alors l et $2m$ sont les racines du polynôme :

$$Q(X) = X^2 + (\tau + 1)X + 2\tau$$

et nous voyons que $\{l, 2m\} = \{\omega^2 + \tau\omega, \omega + \tau\omega^2\}$ d'où $K = \mathbb{Q}(\tau, \omega)$.

Nous avons $C(s_1, s_3^{s_2}) = 2 + \tau - 1 - \tau = 1$, donc $s_1 s_3^{s_2}$ est d'ordre 3 et $G = \langle s_1, s_2, s_3^{s_2} \rangle$ avec le diagramme :



et $s_1(s_3^{s_2})^{s_2} = s_1 s_3$ avec $(s_1 s_3)^4 = 1$. D'après le 1) G est isomorphe à G_{27} . Les autres calculs ne présentent pas de difficultés.

- $1 + 2\tau + l + 2m = 3 - \tau$, donc $l + 2m = 2 - 3\tau$, $l2m = 2\tau$ et l et $2m$ sont les racines du polynôme

$$Q(X) = X^2 + (3\tau - 2)X + 2\tau$$

dont le discriminant est $(3\tau - 2)^2 - 8\tau = 7\tau - 5$, mais $\sqrt{7\tau - 5}$ n'est pas dans K . Ce cas ne peut pas se produire.

3) Considérons la représentation $R(\alpha, \beta, 1; l)$ de $W(5, 5, 3)$ où α et β sont des racines de $u_5(X) = X^2 - 3X + 1$ et $\gamma = 1$. Nous avons :

$$(s_3 s_2^{s_1})^3 = 1 \iff C(s_3, s_2^{s_1}) = \gamma + \alpha\beta + l\alpha + m\beta = 1,$$


$$(s_1 s_2^{s_3})^4 = 1 \iff C(s_1, s_2^{s_3}) = \alpha + \beta\gamma + l\alpha + m\beta = 2.$$

Comme $\gamma = 1$ nous obtenons : $\alpha\beta = -(l\alpha + m\beta)$ et $\alpha + \beta = 2 - (l\alpha + m\beta)$ donc $\alpha + \beta - \alpha\beta = 2$. Si $\beta = \alpha$, nous obtenons $\alpha^2 - 2\alpha + 2 = 0$ ce qui n'est pas ; donc $\beta \neq \alpha$ et nous pouvons choisir $\alpha = \tau$ et $\beta = 3 - \tau$. Dans ces conditions $l\tau + m(3 - \tau) = -1$ et $l\tau.m(3 - \tau) = 1$: $l\tau$ et $m(3 - \tau)$ sont les racines du polynôme

$$Q(X) = X^2 + X + 1$$

donc $K = \mathbb{Q}(\tau, \omega)$ et $\{l\tau, m(3 - \tau)\} = \{\omega, \omega^2\}$.

Nous avons $G = \langle s_2^{s_3}, s_3, s_1 \rangle$ avec le diagramme :



et $(s_1' s_3' s_2' s_3')^4 = (s_2^{s_3} s_3^{s_1})^4$. Des calculs simples montrent que :

$$s_2^{s_3}(a_1) = a_1 + (l + 1)(a_2 + ma_3), \quad s_2^{s_3}(a_3) = a_3 - l(a_2 + ma_3)$$


$s_3^{s_1}(a_2) = a_2 + (\tau + m)((3 - \tau)a_1 + a_3)$, $s_3^{s_1}(a_3) = a_3 + (1 - \tau)((3 - \tau)a_1 + a_3)$
donc $C(s_2^{s_3}, s_3^{s_1}) = [(3 - \tau)(l + 1) - l][(\tau + m) + m(1 - \tau)]$ et, tenant compte des égalités
 $l\tau = \omega$ et $2m(3 - \tau) = 2\omega^2$ nous voyons que $C(s_2^{s_3}, s_3^{s_1}) = 2$ et $(s'_1 s'_3 s'_2 s'_3)^4 = 1$.
d'après le 2), G est isomorphe à G_{27} . Les autres calculs ne présentent pas de
difficultés.

4) Considérons la représentation $R(\alpha, \beta, 2; l)$ de $W(5, 5, 4)$ où α et β sont racines
de $u_5(X)$ et $\gamma = 2$. Nous avons $C(s_1, s_2^{s_3}) = 1 = \alpha + 2\beta + (\alpha l + \beta m) = 1$, $C(s_1, s_3^{s_2}) =$
 $\beta + 2\alpha + (\alpha l + \beta m) = 1$ et nous obtenons $\beta = \alpha = \tau$. Alors $l\tau + m\tau = 1 - 3\tau$, d'où
 $l + m = -\tau$ et $lm = 2$, donc l, m sont racines du polynôme :

$$Q(X) = X^2 + \tau X + 2$$

dont le discriminant est $\tau^2 - 8 = -3(3 - \tau) = -3(\tau - 2)^2$. Il en résulte que
 $K = \mathbb{Q}(\tau, \omega)$ et $\{l, m\} = \{\omega(\tau - 1) + \omega^2, \omega^2(\tau - 1) + \omega\}$.

Comme $\langle s_2, s_3 \rangle = \langle s_2^{s_3}, s_3 \rangle$, on a $G = \langle s_2^{s_3}, s_1, s_3 \rangle$ avec le diagramme :




et $s'_1 s'_3 s'_2 s'_3 = s_2^{s_3} s_1^{s_3} = (s_2 s_1)^{s_3}$, donc $s'_1 s'_3 s'_2 s'_3$ est d'ordre 5 et d'après le 2) G est
isomorphe à G_{27} . Les autres calculs ne présentent pas de difficultés.

5) Considérons la représentation $R(2, 2, \tau; l)$ de $W(4, 4, 5)$.
Nous avons $C(s_1, s_2^{s_3}) = 1 = 2\tau + 2 + 2(l + m)$ donc $2l + 2m = -(2\tau + 1)$, $2l2m = 4\tau$
et $2l, 2m$ sont les racines du polynôme

$$Q(X) = X^2 + (2\tau + 1)X + 4\tau$$

dont le discriminant est $(2\tau + 1)^2 - 16\tau = -3$, donc $K = \mathbb{Q}(\tau, \omega)$ et nous obte-
nons : $\{2l, 2m\} = \{\omega - \tau, \omega^2 - \tau\}$.

On a $\langle s_2, s_3 \rangle = \langle s_2^{s_3}, s_3 \rangle$, donc $G = \langle s_1, s_2^{s_3}, s_3 \rangle$ avec le diagramme :



et $s'_1 s'_3 s'_2 s'_3 = s_1 s_2$ est d'ordre 4. D'après le 2), G est isomorphe à G_{27} . Les autres
calculs ne présentent pas de difficultés.


6) Considérons la représentation $R(1, 1, 2; l)$ de $W(3, 3, 4)$

. Nous avons $C(s_1, s_2^{s_3}) = 3 - \tau = 3 + l + m$, $lm = 2$ donc l et m sont les racines du polynôme

$$Q(X) = X^2 + \tau X + 2$$

dont le discriminant est $\tau^2 - 8 = 3\tau - 9 = -3(3 - \tau) = -3(\tau - 2)^2$ donc $K = \mathbb{Q}(\tau, \omega)$ et nous obtenons $\{l, m\} = \{\omega^2(\tau - 2) - 1, \omega(\tau - 2) - 1\}$.

On a $\langle s_2, s_3 \rangle = \langle s_2, s_3^{s_2} \rangle$, donc $G = \langle s_3, s_1, s_2^{s_3} \rangle$ avec le diagramme :



On a $s'_1 s'_3 s'_2 s'_3 = s_3 (s_2^{s_3}) s_1 (s_2^{s_3}) = (s_2^{s_3}) (s_3^{s_2} s_1) (s_2^{s_3})$. Comme $C(s_1, s_3^{s_2}) = 3 - \tau$, $s_1 s_3^{s_2}$ est d'ordre 5, donc aussi $s'_1 s'_3 s'_2 s'_3$: G est isomorphe à G_{27} d'après le 2). Les autres calculs ne présentent pas de difficultés.

B. Nous montrons maintenant que les seules possibilités sont celles du théorème.


Nous commençons par deux remarques :

- Le groupe $G^+ \simeq C * A_6$ ne contient aucun élément d'ordre 10.
- Le groupe G^+ ne contient aucun élément réel d'ordre 6, car dans A_6 il n'y a aucun élément d'ordre 6.

Il résulte de ces deux remarques que si l'on veut obtenir G_{27} comme quotient d'un groupe de Coxeter $W(p, q, r)$ on doit avoir $\{p, q, r\} \subset \{3, 4, 5\}$. Les triples (p, q, r) à examiner sont donc les triples suivants :

$$(3, 3, 4), (3, 3, 5), (3, 4, 4), (3, 4, 5), (4, 4, 4), (4, 4, 5), (5, 5, 3), (5, 5, 4), (5, 5, 5).$$

Pour éliminer certains de ces triples, nous montrons soit que le corps obtenu n'est pas le bon, soit que certains éléments sont d'ordre infini. Pour cela nous exprimons que l'ordre de $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 3, 4 ou 5 (cet ordre ne peut pas être 2, car alors le groupe G est un groupe de réflexion réel : en effet, on a $\langle s_2, s_3 \rangle = \langle s_3, s_2^{s_3} \rangle$, donc $G = \langle s_1, s_3, s_2^{s_3} \rangle$ avec le diagramme :



d'où le résultat.)

Nous éliminons les triples $(3, 4, 4)$, $(4, 4, 4)$, $(5, 5, 5)$, les autres triples se traitant de la même manière.

- Si $(p, q, r) = (4, 4, 3)$, alors $\alpha = \beta = 2, \gamma = 1$ et nécessairement $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 5, donc $C(s_1, s_2^{s_3}) = 4 + 2(l + m) = \tau$ et $2l$ et $2m$ sont les racines du polynôme :

$$Q(X) = X^2 - (4 - \tau)X + 4$$

dont le discriminant est $\tau^2 - 8 = 1 - 5\tau$, mais $\sqrt{1 - 5\tau} \notin \mathbb{Q}(\tau, \omega)$. Ce cas ne peut pas se produire.

- Si $(p, q, r) = (4, 4, 4)$, alors $\alpha = \beta = 2 = \gamma$ et comme ci-dessus $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 5, donc $C(s_1, s_2^{s_3}) = 6 + 2(l + m) = \tau$ et $2l$ et $2m$ sont les racines du polynôme

$$Q(X) = X^2 - (\tau - 6)X + 8$$

dont le discriminant est $\tau^2 - 12\tau + 4 = 3 - 9\tau$, mais $\sqrt{3 - 9\tau} \notin \mathbb{Q}(\tau, \omega)$. Ce cas ne peut pas se produire.

- Si $(p, q, r) = (5, 5, 5)$, alors nous pouvons sans perte de généralité supposer que $\alpha = \beta = \tau$ et $\gamma = lm \in \{\tau, 3 - \tau\}$.

Nous avons $C(s_1, s_2^{s_3}) = \alpha + \beta\gamma + \tau(l + m) = \tau + \tau\gamma + \tau(l + m)$.

Considérons deux cas suivant la valeur de γ .

Premier Cas. $\gamma = \tau$, alors $C(s_1, s_2^{s_3}) = \tau^2 + \tau + \tau(l + m) = 4\tau - 1 + \tau(l + m)$.

- Si $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 3, on a $\tau(l + m) = 2 - 4\tau$, d'où $l + m = 2(5 - 2\tau)$, $lm = \tau$, donc l et m sont les racines du polynôme

$$Q(X) = x^2 - 2(5 - 2\tau)X + \tau$$

dont le discriminant est $21 - 9\tau$, mais $\sqrt{21 - 9\tau} \notin \mathbb{Q}(\tau, \omega)$. Ce cas ne peut pas se produire.

- Si $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 4, on a $\tau(l + m) = 3 - 4\tau$, d'où $l + m = 3 - 4\tau$, $lm = \tau$ et l et m sont les racines du polynôme

$$Q(X) = x^2 + (3\tau - 5)X + \tau$$

dont le discriminant est $16 - 17\tau$, mais $\sqrt{16 - 17\tau} \notin \mathbb{Q}(\tau, \omega)$. Ce cas ne peut pas se produire.

- Si $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 5, alors $4\tau - 1 + \tau(l + m) \in \{\tau, 3 - \tau\}$ d'où deux possibilités :
— si $4\tau - 1 + \tau(l + m) = \tau$, on a $l + m = -\tau$, $lm = \tau$, donc l et m sont les racines du polynôme

$$Q(X) = x^2 + \tau X + \tau$$

dont le discriminant est $\tau^2 - 4\tau$, mais $\sqrt{\tau^2 - 4\tau} \notin \mathbb{Q}(\tau, \omega)$. Ce cas ne peut pas se produire.

— si $4\tau - 1 + \tau(l + m) = 3 - \tau$, on a $l + m = 7 - 4\tau$, $lm = \tau$, donc l et m sont les racines du polynôme

$$Q(X) = x^2 + (4\tau - 7)X + \tau$$

dont le discriminant est $33 - 12\tau$, mais $\sqrt{33 - 12\tau} \notin \mathbb{Q}(\tau, \omega)$.

On ne peut donc pas avoir $\gamma = \tau$.

Deuxième cas. $\gamma = 3 - \tau$, alors $C(s_1, s_2^{s_3}) = \tau + 1 + \tau(l + m)$.

- Si $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 3, on a $\tau + 1 + \tau(l + m) = 1$ d'où $l + m = -1$, $lm = 3 - \tau$ donc l et m sont les racines du polynôme

$$Q(X) = x^2 + X + 3 - \tau$$

dont le discriminant est $4\tau - 11$, mais $\sqrt{4\tau - 11} \notin \mathbb{Q}(\tau, \omega)$.

- Si $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 4, on a $\tau + 1 + \tau(l + m) = 2$ d'où $l + m = 2$, $\tau, lm = 3 - \tau$ donc l et m sont les racines du polynôme

$$Q(X) = x^2 - (2 - \tau)X + 3 - \tau$$

dont le discriminant est $\tau^2 - 8 = -3(3 - \tau) = -3(\tau - 2)^2$, donc on a le bon corps dans ce cas, mais $(s_2, s_3^{s_1}) = 3 + \tau$, ce qui implique que $s_2 s_3^{s_1}$ est d'ordre infini, ce qui ne convient pas.

- Si $s_1 s_2^{s_3}$ est d'ordre 5, on a $\tau + 1 + \tau(l + m) \in \{\tau, 3 - \tau\}$ d'où deux possibilités :

- Si $\tau + 1 + \tau(l + m) = \tau$, on a $l + m = \tau - 3$, $lm = \tau - 3$ donc l et m sont les racines du polynôme

$$Q(X) = x^2 + (3 - \tau)X + 3 - \tau$$

dont le discriminant est : $2 - \tau$, mais $\sqrt{2 - \tau} \notin \mathbb{Q}(\tau, \omega)$.

- Si $\tau + 1 + \tau(l + m) = 3 - \tau$, on a $l + m = 2(2 - \tau)$, $lm = 3 - \tau$ donc l et m sont les racines du polynôme

$$Q(X) = x^2 - 2(2 - \tau)X + 3 - \tau = (X - (2 - \tau))^2$$

On obtient $\Delta = 0$, avec comme corps $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ce qui n'est pas le bon corps. On ne peut pas avoir ce cas.

Nous verrons dans la dernière partie de ce travail à quoi correspond cette possibilité. La fin de cette démonstration ne présente pas de difficultés et se fait comme dans le théorème précédent. \square

Références

- [1] N. Bourbaki *Groupes et algèbres de Lie. Chapitres 4, 5, 6* Hermann (1968)
- [2] M. Broué, G. Malle, R. Rouquier *Complex reflection groups, braids groups, Hecke algebra* J. Reine Angew. Math. 500 (1988) 127–190

- [3] W. Burnside *Note on the symmetric group* Proceeding of the London Math. Soc. 28 (1897) 119-129
- [4] A. M. Cohen *Finite Complex Reflection Groups* Ann. scient. Ec. Norm. Sup. t. 9 (1976) 379–436
- [5] H.S.M. Coxeter, W.O.J. Moser *Generators and Relations for Discrete Groups* Springer Verlag Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete 14 (1980)
- [6] Jian-yi Shi *Simple root systems and presentations for certain complex reflection groups* Comm. in Algebra 284 (1) (2005) 392-414
- [7] Jian-yi Shi *Presentations for finite complex reflection groups* Proceedings of the Conference on Complex geometry, Algebra, and Combinatorics, AMS/IP Studies in Advanced Mathematics, 39 (2007), 263–275.
- [8] Gabor SZEGÖ *Orthogonal Polynomials* AMS Colloquium publications 23 (1975)
- [9] F. Zara *Generalized reflection groups* Journal of Algebra 255 (2002) 221–246
- [10] F. Zara *Représentations de réflexion de groupes de Coxeter. Première partie : le cas irréductible* arXiv:2001.09278 (2020)

Université de Picardie Jules Verne
Pôle Scientifique
Laboratoire LAMFA, UMR CNRS 7352
33, rue Saint Leu
80039 Amiens Cedex
francois.zara@u-picardie.fr