

О критерии Лежандра подходящей дроби

Н.Г. Мощевитин, А.Ю. Яшникова

(Астраханский государственный университет)

Как известно, вещественные числа представимы в виде обыкновенных цепных дробей

$$[a_0; a_1, a_2, \dots, a_n, \dots] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots + \frac{1}{a_n + \dots}}}, \quad a_0 \in \mathbb{Z}, \quad a_n \in \mathbb{Z}_+, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (1)$$

конечных для рациональных чисел и бесконечных для иррациональных, а выражения

$$\frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n], \quad (p_n, q_n) = 1, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

называются подходящими дробями для дроби (1).

В этой короткой заметке мы изложим любопытную на наш взгляд историю, связанную с известным критерием того, что заданное рациональное число $\frac{p}{q}$, $(p, q) = 1$ является подходящей дробью для некоторого вещественного числа α . В особенности примечательным кажется нам вопрос, почему Люка [Lucas1891] в процессе изложения этого критерия никоим образом не цитирует книгу Лежандра [Legendre1798]. Ответа на него мы не знаем. В своей книге Люка упоминает имя Лежандра всего только около десяти раз, причем в главе XXIV, посвященной цепным дробям, при обсуждении критерия подходящей дроби (параграф 245) Люка на Лежандра нигде не ссылается. Мы надеемся, что наш рассказ пробудит интерес к первоисточникам и поспособствует тому, чтобы читатель сам посмотрел и разобрался, что именно написано в книгах [Legendre1798] и [Lucas1891], а также и в других упомянутых нами первоисточниках, которые сейчас общедоступны и легко могут быть найдены в интернете.

Обсуждаемая здесь история в какой-то мере затронута в недавней статье первого автора [Moshchevitin2017], однако сейчас все будет описано более подробно и обстоятельно.

1. Наиболее известная формулировка.

Во многих учебниках и книгах, где обсуждаются простейшие свойства цепных дробей, следующее утверждение, которое мы здесь назовем теоремой А, формулируется как теорема Лежандра.

В качестве примера, когда теорема А формулируется как принадлежащая Лежандру, мы хотим привести следующие ссылки: теорема 5С главы I из [Шмидт1983], теорема 1.8 из книги [Bugeaud2004]. Конечно, утверждение теоремы А очень хорошо известно, и оно имеется в большинстве учебников (см., например, [Хинчин1960, Бухштаб1966, Нестеренко2008]).

Работа поддержана грантом РФФИ номер 18-01-00886.

Теорема А. Рассмотрим вещественное число α . Если несократимая дробь $\frac{p}{q}$ удовлетворяет неравенству

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2} \quad (2)$$

то она является одной из подходящих дробей к числу α .

Итак, теорема А дает достаточное условие того, что некоторая несократимая дробь $\frac{p}{q}$ является подходящей дробью для α . Доказательство теоремы А зачастую излагается довольно причудливо (см., например [Шмидт1983]), часто теорему А доказывают с помощью теоремы Лагранжа, утверждающей, что подходящие дроби и наилучшие приближения *второго рода* суть одно и то же (например, так делается в [Хинчин1960]). На самом деле, теорема А является следствием более сильного утверждения, доказанного Лежандром, а именно необходимого и достаточного условия (то есть критерия) того, что дробь $\frac{p}{q}$ является подходящей дробью. Несколько странно то, что, несмотря на то, что точный критерий и его простое и естественное доказательство имеются уже в первом издании книги Лежандра [Legendre1798] и, естественно, содержатся в последующих изданиях (например, [Legendre1830]), критерий этот несколько менее известен, чем утверждение теоремы А.

2. Критерий Лежандра.

Мы не будем здесь приводить дословную формулировку критерия из самой книги Лежандра (см. [Legendre1798], р.27 - 29, или [Legendre1830], р.23 - 26, параграф (9)). В те времена не было принято всегда выделять теоремы отдельными утверждениями, и Лежандр описывает содержание критерия в процессе его доказательства. В параграфе (9) результат теоремы А, которую мы сформулировали выше, он приводит в самом конце в последнем предложении.

В книге Перрона (мы ссылаемся на параграф 13 главы II из третьего издания [Peron1954]) критерий Лежандра сформулирован в виде замысловатого утверждения, из которого он выводит Теорему А (Satz 2.11). Мы решили не приводить дословно формулировку из книги Перрона тоже. Книга Лежандра написана по-французски, книга Перрона — по-немецки, и нам не хочется приводить здесь перевод утверждения. Но мы почти дословно приведем формулировку из книги Венкова (глава II, параграф 5 из [Венков1937], которая почти тождественна и оригинальной формулировке Лежандра, и утверждению из книги Перрона, хотя в ней есть некоторый любопытный нюанс.

Теорема Б (Критерий Лежандра). Рассмотрим вещественное число α . Считая $\frac{p}{q} \neq \alpha$, положим

$$\alpha - \frac{p}{q} = \frac{\theta}{q^2} \quad (3)$$

и разложим $\frac{p}{q}$ в непрерывную дробь с нечетным или четным¹ числом неполных частных, смотря по тому, будет ли $\theta < 0$ или $\theta > 0$; пусть $\frac{p'}{q'}$ будет предпоследняя подходящая дробь к этой непрерывной дроби. Для того, чтобы $\frac{p}{q}$ была подходящей дробью к α , необходимо и достаточно, чтобы

$$|\theta| \leq \frac{q}{q + q'}. \quad (4)$$

¹Обычно нумерация неполных частных в цепной дроби именно такая, как в формуле (1), в частности, так обстоит дело в книге Перрона. Но в книге Венкова нумерация неполных частных начинается с единицы, то есть там считается, что $[\alpha] = a_1$. Поэтому мы позволили себе изменить оригинальный текст формулировки теоремы Б и поменять местами слова "нечетным" и "четным". У Лежандра неполные частные вообще не нумеруются индексами и обозначаются $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$

Различие между оригинальной формулировкой Лежандра (которая повторена у Перрона) и формулировкой теоремы Б из книги Венкова состоит в том, что у Лежандра и Перрона в качестве условия эквивалентного тому, что $\frac{p}{q}$ есть подходящая дробь к α вместо *нестрогого* неравенства (4) фигурирует *строгое* неравенство

$$|\theta| < \frac{q}{q + q'}. \quad (5)$$

По-видимому, и сама формулировка теоремы Б, и ее различие с тем, что имеется у Лежандра и Перрона, нуждаются в небольшом комментарии.

Во-первых, всякое рациональное число $\frac{p}{q}$ может быть записано в виде обыкновенной цепной дроби ровно двумя способами

$$\frac{p}{q} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n] = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n - 1, 1], \quad a_n \geq 2, \quad (6)$$

и ясно, что здесь одно из разложений четной длины, а другое - нечетной. Таким образом, мы пояснили, что имеется в виду в формулировке теоремы Б, и предпоследняя дробь $\frac{p'}{q'}$ будет, соответственно, определяться равенствами

$$\frac{p'}{q'} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1}] \quad \frac{p'}{q'} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n - 1]. \quad (7)$$

Во-вторых, если для θ , определенного в (3), выполнено равенство

$$|\theta| = \frac{q}{q + q'},$$

то это значит, что

$$\alpha = \frac{p + p'}{q + q'}$$

является медиантой дробей

$$\frac{p}{q} = [b_0; b_1, b_2, \dots, b_{k-1}, b_k] \quad \text{и} \quad \frac{p'}{q'} = [b_0; b_1, b_2, \dots, b_{k-1}], \quad k = n \text{ или } n + 1.$$

В этом случае α рационально, и для него имеется два разложения в цепную дробь:

$$\alpha = [b_0; b_1, b_2, \dots, b_{k-1}, b_k, 1] \quad (8)$$

и

$$\alpha = [b_0; b_1, b_2, \dots, b_{k-1}, b_k + 1]. \quad (9)$$

Для разложения (8) дробь $\frac{p}{q}$ будет (предпоследней) подходящей дробью, но для разложения (9) дробь $\frac{p}{q}$ подходящей дробью не будет. Таким образом, свойство дроби $\frac{p}{q}$ быть подходящей дробью для α зависит от того, какое разложение мы взяли, и чтобы пояснить различие, снова надо апеллировать к неединственности разложения рационального числа в цепную дробь.

3. Формулировка Люка.

Утверждение, похожее на критерий Лежандра, приведено в книге Люка [Lucas1891]. Мы уже отмечали в начале нашей заметки, что Люка почему-то не ссылается на Лежандра. Более того, формулировка Люка не совсем четкая. Постаравшись быть близкими к французскому оригиналу, мы приводим ее в виде нижеследующей теоремы В.

Теорема В. Для того, чтобы данная дробь $f : g$ была бы подходящей дробью к числу x , необходимо и достаточно выполнение неравенства

$$\left| x - \frac{f_p}{g_p} \right| < \frac{1}{g_p(g_p + g_{p-1})}, \quad (10)$$

где через g_p и g_{p-1} обозначены знаменатели двух последних подходящих дробей разложения величины $f : g$ в цепную дробь.

Заметим, что Люка упоминает, что в предположении (2) неравенство (10) для $x = \alpha$ выполняется.

Теперь мы обратим наше внимание на следующее утверждение, которое использовалось в статье Лемера [Lehmer1938]. Мы приводим дословный перевод формулировки отсюда:

Теорема Г. Пусть $A_k/B_k, A_{k-1}/B_{k-1}$ суть две последовательные подходящие дроби к числу η . Тогда эти две дроби будут двумя последовательными подходящими дробями для числа ξ тогда и только тогда, когда

$$\left| \xi - \frac{A_k}{B_k} \right| < \frac{1}{B_k(B_k + B_{k-1})}. \quad (11)$$

Это утверждение Лемер называет хорошо известным и дает ссылку как раз на книгу Люка [Lucas1891]. Формулировка Лемера несколько отличается от формулировки Люка, но она тоже не совсем четкая. Ниже мы прокомментируем утверждения теорем В и Г.

Начнем с утверждение Люка - теоремы В. На первый взгляд, неравенство (10) задает интервал с серединой $\frac{f_p}{g_p}$. Но на самом деле, это неравенство надо интерпретировать по-другому. Как мы уже писали выше, рациональное число раскладывается в цепную дробь ровно двумя способами (6). В утверждении теоремы В надо брать два последних знаменателя разложения величины $f : g$ в цепную дробь. Но имеется два различных разложения. И в зависимости от знака разности $x - \frac{f}{g}$ надо выбирать разложение четной или нечетной длины. Точнее, если $x > \frac{f}{g}$, надо брать разложение $\frac{f}{g} = \frac{f_p}{g_p}$ с четным p , а если $x < \frac{f}{g}$, то надо брать разложение с нечетным p .

Теперь прокомментируем утверждение теоремы Г.

Во-первых, число ξ обязано лежать именно между соседними подходящими дробями A_k/B_k и A_{k-1}/B_{k-1} , поэтому теорему Г следует уточнить: необходимым и достаточным условием является принадлежность ξ интервалу (11), пересеченному с отрезком с концами $A_k/B_k, A_{k-1}/B_{k-1}$.

Во-вторых, две несократимые дроби $\frac{p}{q}, \frac{p'}{q'}$ будут последовательными подходящими дробями к некоторому η тогда и только тогда, когда

$$\left| \frac{p}{q} - \frac{p'}{q'} \right| = \frac{1}{qq'}. \quad (12)$$

Следовательно, мы можем переформулировать теорему Г так:

Теорема Г'. Две дроби $\frac{p}{q}, \frac{p'}{q'}$ с условием $q \geq q'$ и удовлетворяющие (12) будут двумя последовательными подходящими дробями для числа ξ тогда и только тогда, когда ξ принадлежит полуоткрытому интервалу с концами $\frac{p}{q}$ и $\frac{p+p'}{q+q'} = \frac{p}{q} \pm \frac{1}{qq'}$, причем конец $\frac{p}{q}$ входит в полуинтервал, а конец $\frac{p+p'}{q+q'}$ не входит.

4. Более естественная формулировка.

Очень уместным нам кажется сформулировать теорему Лежандра с помощью рядов Фарея. Мы ограничимся случаем $\frac{p}{q} \in (0, 1)$. Для заданной несократимой рациональной дроби $\frac{p}{q}$ рассмотрим ряд Фарея \mathfrak{F}_q порядка q , то есть совокупность всех рациональных дробей со знаменателем $\leq q$:

$$\mathfrak{F}_q: 0 = r_0 < r_1 < r_2 < \dots < r_j < r_{j+1} < \dots < r_\Phi, \quad \Phi = \sum_{k=1}^q \varphi(k), \quad \varphi(\cdot) - \text{функция Эйлера.}$$

Где-то в этой последовательности находится число $\frac{p}{q} = r_j$. Мы рассмотрим его двух соседей по ряду Фарея \mathfrak{F}_q :

$$r_{j-1} < \frac{p}{q} = r_j < r_{j+1}.$$

Если рассмотреть единственное разложение дроби $\frac{p}{q}$ в цепную дробь вида

$$r_j = \frac{p}{q} = [a_0; a_1, \dots, a_t], \quad a_t \geq 2,$$

то для соседних дробей будет выполнено

$$r_{j-1} = \frac{p_-}{q_-} = [a_0; a_1, \dots, a_{t-1}], \quad r_{j+1} = \frac{p_+}{q_+} = [a_0; a_1, \dots, a_t - 1],$$

или

$$r_{j-1} = \frac{p_-}{q_-} = [a_0; a_1, \dots, a_t - 1], \quad r_{j+1} = \frac{p_+}{q_+} = [a_0; a_1, \dots, a_{t-1}],$$

в зависимости от четности t . Ясно, что теоремы Б (со строгим неравенством (5) вместо (4)) и теорема В (уточненная нашим комментарием о том, как выбирать разложение в цепную дробь) эквивалентны следующему утверждению.

Теорема Д. *Несократимая дробь $\frac{p}{q}$ будет подходящей дробью для числа α тогда и только тогда, когда*

$$\alpha \in \left(\frac{p + p_-}{q + q_-}, \frac{p + p_+}{q + q_+} \right).$$

Кроме того, нам кажется естественным упомянуть здесь рассуждения (в духе параграфа 12 главы III книги Хинчина [Хинчин1960]), связанные с "цилиндрами"

$$E \left(\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & \dots & n-1 & n & \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_n & \end{array} \right) = \tag{13}$$

$= \{ \alpha \in [0, 1] : \alpha \text{ представляется в виде конечной или бесконечной дроби } \alpha = [0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n, \dots] \}.$

Легко видеть что цилиндр (13) представляет из себя полуинтервал с концами $\frac{p_n}{q_n}, \frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}}$, точнее

$$E \left(\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & \dots & n-1 & n & \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_n & \end{array} \right) = \begin{cases} \left[\frac{p_n}{q_n}, \frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}} \right), & \text{если } n \text{ четно,} \\ \left(\frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}}, \frac{p_n}{q_n} \right], & \text{если } n \text{ нечетно.} \end{cases}$$

Именно этот полуинтервал фигурирует в формулировке теоремы Γ' . Как мы отмечали ранее, рациональное число $\frac{p}{q}$ представляется в виде цепной дроби ровно двумя способами (6). Таким образом,

$$\left(\frac{p+p_-, p+p_+}{q+q_-, q+q_+}\right) = E\left(\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & \dots & n-1 & n & \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_n & \end{array}\right) \cup E\left(\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & \dots & n-1 & n & n+1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_n-1 & 1 \end{array}\right),$$

причем, естественно,

$$E\left(\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & \dots & n-1 & n & \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_n & \end{array}\right) \cap E\left(\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & \dots & n-1 & n & n+1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_n-1 & 1 \end{array}\right) = \left\{\frac{p}{q}\right\}.$$

В силу определения множеств $E(\cdot)$, последние равенства доказывают теорему Д.

5. Об обобщениях.

Следующее обобщение теоремы А со ссылками на Фату [Fatou1904] и Грейса [Grace1918] приводится в книге Бюжо [Bugeaud2004]. В этой книге следующий результат назван "малоизвестным" ([Bugeaud2004], стр. 9), см., однако, теорему 10 главы I из книги Ленга [Ленг1970].

Теорема Е. Если несократимая дробь $\frac{p}{q}$ удовлетворяет неравенству

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^2}$$

то она является одной из подходящих или промежуточных дробей для α , из набора

$$\frac{p_n}{q_n}, \quad \frac{p_{n+1} + p_n}{q_{n+1} + q_n}, \quad \frac{p_{n+1} - p_n}{q_{n+1} - q_n}$$

при некотором n .

Примечательно, что относительно недавно были опубликованы утверждения, содержащие еще более широкие простые обобщения. Например, Дуелла [Dujella2004] пишет, что он обобщает классический результат Лежандра - теорему А и доказывает следующее утверждение.

Теорема Ж. Пусть α - иррациональное число и несократимая дробь $\frac{p}{q}$ удовлетворяет неравенству

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{c}{q^2}$$

с некоторым положительным c . Тогда пара (p, q) имеет вид

$$(p, q) = (rp_{n+1} \pm sp_n, rq_{n+1} \pm sq_n)$$

с некоторыми неотрицательными целыми r, s , удовлетворяющими неравенству $rs < 2c$.

Несколько более громоздкая формулировка имеется более ранней работе Ворли [Worley1981].

Список литературы

- [Bugeaud2004] Y. Bugeaud, *Approximation by algebraic numbers*, Cambridge University Press, 2004.
- [Dujella2004] A. Dujella, *Continued fractions and RSA with small secret exponent*, Tatra Mt . Math. Publ . **29** (2004), 101-112.
- [Fatou1904] P. Fatou, *Sur l'approximation des incommensurables et les séries trigonométriques*, C.R. Acad. Sci. Paris, **139** (1904), 1019 - 1021.
- [Grace1918] J. H. Grace, *The classification of rational approximations*, Proc. London Math. Soc. **17** (1918), 27 - 258.
- [Legendre1798] A. M. Legendre, *Essai sur la Théorie des Nombres.*, Paris, 1798.
- [Legendre1830] A.-M. Legendre, *Théorie des Nombres* T.1, 3 édition, Paris, 1830.
- [Lehmer1938] D.H. Lehmer, *Euclid's Algorithm for Large Numbers*, American Mathematical Monthly, 45:4 (1938), 227-233.
- [Lucas1891] E. Lucas, *Théorie des Nombres*, T.1², Paris, 1891.
- [Moshchevitin2017] N.G. Moshchevitin, *Über die Funktionen des Irrationalitätsmaßes für zwei irrationalen Zahlen*, in *Anal. Probab. Methods Number Theory*, Proceedings of 6th International Conference, Palanga, Lithuania, 11-16 September 2016, A. Dubickas et al. (Eds), Vilnius University, 2017, 123-148.
- [Perron1954] O. Perron, *Die Lehre von den Kettenbrüchen*, Band I, Stuttgart, B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1954.
- [Worley1981] R.T. Worley, *Estimating $|\alpha - p/q|$* , Austral. Math. Soc. (Series A) **31** (1981), 202-206.
- [Бухштаб1966] А.А. Бухштаб, *Теория чисел*, М., Просвещение, 1966.
- [Венков1937] Б.А. Венков, *Элементарная теория чисел*, М.-Л., ОНТИ, 1937.
- [Ленг1970] С. Ленг, *Введение в теорию диофантовых приближений*, М. Мир, 1970.
- [Нестеренко2008] Ю.В. Нестеренко, *Теория чисел*, М., Академия, 2008.
- [Хинчин1960] А. Я. Хинчин, *Ценные дроби*, М., Физматлит, 1960
- [Шмидт1983] В. Шмидт, *Диофантовы приближения*, М., Мир, 1983 (русский перевод).

²Вероятно, был опубликован только первый том.