

Эргодичность границы Мартина графа Юнга–Фибоначчи. I

И. А. Бочков, В. Ю. Евтушевский

31 октября 2021 г.

Содержание


1	Введение	2
2	Подготовка к доказательству основной Теоремы	5
3	Доказательство основной Теоремы	16
4	Доказательство Следствия 3	35
5	Доказательство Следствия 4	37
6	Благодарности	49
	Список литературы	50

1 Введение

Рассмотрим слова над алфавитом $\{1, 2\}$ с данной суммой цифр n . Как известно, их количество есть число Фибоначчи F_{n+1} ($F_0 = 0, F_1 = 1, F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$), и это самая распространённая комбинаторная интерпретация чисел Фибоначчи. Также можно думать о разбиениях полосы $2 \times n$ на домино 1×2 и 2×1 , сопоставляя двойки парам горизонтальных домино, а единицы вертикальным домино.

Введём на этом множестве слов частичный порядок: будем говорить, что слово x предшествует слову y , если после удаления общего суффикса в слове y остаётся не меньше двоек, чем в слове x остаётся цифр.

Это действительно частичный порядок, более того, соответствующее частично упорядоченное множество является модулярной решёткой, известной как решётка Юнга – Фибоначчи.



Графом Юнга – Фибоначчи (он изображён на рисунке выше) называют диаграмму Хассе этой решётки. Это градуированный граф, который мы представляем растущим снизу вверх начиная с пустого слова. Градуировкой служит функция суммы цифр. Опишем явно, как устроены ориентированные рёбра. Рёбра “вверх” из данного слова x ведут в слова, получаемые из x одной из двух операций:

- 1) заменить самую левую единицу на двойку;
- 2) вставить единицу левее чем самая левая единица.

Этот граф помимо модулярности является 1-дифференциальным, то есть для каждой вершины исходящая степень на 1 превосходит входящую степень.

Изучение градуированного графа Юнга – Фибоначчи было инициировано в 1988 году одновременно и независимо такими математиками, как Ричард Стенли [9] и Сергей Владимирович Фомин [7].

Причина интереса к нему в том, что существует всего две 1-дифференциальных модулярных решётки, вторая — это решётка диаграмм Юнга, имеющая ключевое значение в теории представлений симметрической группы.

Центральные вопросы о градуированных графах касаются центральных мер на пространстве (бесконечных) путей в графе. Эта точка зрения последовательно развивалась в работах Анатолия Моисеевича Вершика, к недавнему обзору которого [4] и приводимой там литературе мы отсылаем читателя.

Среди центральных мер выделяют те, которые являются пределами мер, индуцированных путями в далёкие вершины — так называемую границу Мартина графа.

Граница пространства путей графа Юнга – Фибоначчи изучалась в работе Фредерика Гудмана и Сергея Васильевича Керова (2000) [5].

Они использовали алгебраический формализм Окады [6].

Как следует из самого определения, асимптотический вопрос о границе напрямую связан с пересчётным вопросом о числе путей между двумя вершинами графа. Отметим важную общую работу С. В. Фомина [8] о пересчёте путей в градуированных графах, в которой приводится ряд общих тождеств и указывается связь помимо прочего с обобщением алгоритма Робинсона – Шенстеда – Кнута .

Гудман и Керов обходятся без явных формул для числа путей, хотя, как указал автору Павел Павлович Никитин, из их рассуждений и можно их извлечь — но количество слагаемых оказывается экспоненциальным по длине меньшего из слов. Формула с полиномиальным числом слагаемых была получена в работе [1], (сокращённая версия которой опубликована как [2]). Ниже используются ссылки на оба текста.

Среди центральных мер на пространстве путей в графе Юнга – Фибоначчи выделяется так называемая мера Планшереля. Её эргодичность была установлена в работе Керова и Гнедина [3].

Целью настоящего цикла из двух работ является доказательство эргодичности остальных мер границы Мартина данного графа, описанных в статье [5]. Эти меры параметризуются бесконечным словом из единиц и двоек и параметром $\beta \in (0, 1]$ (случай $\beta = 0$ соответствует мере Планшереля). В данной статье мы сосредотачиваемся на утверждениях, соответствующих случаю $\beta = 1$. Основной результат данной работы — Теорема 2 и ей Следствия 3 и 4. В следующей работе Следствия 3 и 4 используются

“как чёрный ящик” для завершения доказательства гипотезы эргодичности Керова – Гудмана.

2 Подготовка к доказательству основной Теоремы

Обозначение 1. Пусть \mathbb{YF} – это граф Юнга – Фибоначчи.

Определение 1. Пусть $x \in \mathbb{YF}$. Тогда номером x будем называть слово из единиц и двоек, соответствующее вершине x .

Определение 2. Пусть $\{\alpha_i\}_{i=1}^\infty \in \{1, 2\}^\infty$ – бесконечная последовательность из единиц и двоек. Этой последовательности сопоставим “бесконечно удалённую вершину” графа Юнга – Фибоначчи с номером $x = \dots \alpha_2 \alpha_1$.

Обозначение 2. Пусть \mathbb{YF}_∞ – это множество “бесконечно удалённых вершин” графа Юнга–Фибоначчи.

Обозначение 3.

- Пусть $x \in \mathbb{YF}$, $n \in \mathbb{N}_0$, $\{\alpha_i\}_{i=1}^n \in \{1, 2\}^n$: номер x – это $\alpha_n \dots \alpha_2 \alpha_1$. Тогда будем писать, что $x = \alpha_n \dots \alpha_2 \alpha_1$.
- Пусть $x \in \mathbb{YF}_\infty$, $\{\alpha_i\}_{i=1}^\infty \in \{1, 2\}^\infty$: номер x – это $\dots \alpha_2 \alpha_1$. Тогда будем писать, что $x = \dots \alpha_2 \alpha_1$.

Обозначение 4.

- Пусть $x \in \mathbb{YF}$. Тогда сумму цифр в номере x обозначим за $|x|$.
- Пусть $x \in \mathbb{YF}_\infty$. Тогда скажем, что $|x| = \infty$.

Обозначение 5. Пусть $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда

$$\mathbb{YF}_n := \{v \in \mathbb{YF} : |v| = n\}.$$

Замечание 1.

- Пусть $x \in \mathbb{YF}$. Тогда $|x|$ – это ранг вершины x в графе Юнга – Фибоначчи.
- Пусть $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда \mathbb{YF}_n – это множество вершин графа Юнга – Фибоначчи ранга n .

Обозначение 6. Пусть $n, m \in \mathbb{N}_0 : m \leq n$. Тогда

- $$\bar{n} := \{0, 1, \dots, n\};$$
- $$\overline{m, n} := \{m, m + 1, \dots, n\}.$$

Определение 3. Пусть $x, y, \{y_i\}_{i=0}^n \in \mathbb{YF} : n \in \mathbb{N}_0$,

$$y = y_0 y_1 y_2 \dots y_n = x$$

– это такой путь в графе Юнга-Фибоначчи, что $\forall i \in \bar{n}$

$$|y_i| = |y| - i.$$

Тогда путь

$$y = y_0 y_1 y_2 \dots y_n = x$$

назовём yx -путём “вниз” в \mathbb{YF} .

Замечание 2. В Определении 3 $n = |y| - |x|$.

Обозначение 7. Пусть $x, y \in \mathbb{YF}$. Тогда количество yx -путей “вниз” в \mathbb{YF} будем обозначать как $d(x, y)$.

Замечание 3. Пусть $x, y \in \mathbb{YF} : |y| < |x|$. Тогда

$$d(x, y) = 0.$$

Обозначение 8. Пусть $x, y \in \mathbb{YF}$. Тогда множество всех yx -путей “вниз” обозначим за $T(x, y)$.

Обозначение 9.

$$T(\mathbb{YF}) := \bigcup_{\{(x,y) \in \mathbb{YF}^2\}} T(x, y).$$

Обозначение 10. Пусть $x, y \in \mathbb{YF}$, $t \in T(\mathbb{YF}) : t \in T(x, y)$. Тогда будем обозначать вершины этого пути как

$$y = t(|y|), t(|y| - 1), \dots, t(|x| + 1), t(|x|) = x,$$

а также считать, что если $z \in (\mathbb{N}_0 \setminus \overline{|x|, |y|})$, то $t(z)$ не определено.

Замечание 4. Ясно, что $t(z)$ – это вершина, через которую путь t проходит на уровне $z \in (\mathbb{N}_0 \setminus \overline{|x|, |y|})$.

Обозначение 11.

- Пусть $x \in \mathbb{YF}$. Тогда количество цифр в номере x обозначим за $\#x$.
- Пусть $x \in \mathbb{YF}_\infty$. Тогда скажем, что $\#x = \infty$.

Обозначение 12. Пусть $x \in (\mathbb{YF} \cup \mathbb{YF}_\infty)$. Тогда:

- Количество единиц в номере x обозначим за $e(x)$;
- Количество двоек в номере x обозначим за $d(x)$.

Замечание 5. Пусть $x \in \mathbb{YF}_\infty$. Тогда:

- $d(x)$ может быть равно бесконечности;
- $e(x)$ может быть равно бесконечности.

Замечание 6. Пусть $x \in (\mathbb{YF} \cup \mathbb{YF}_\infty)$. Тогда:

- $e(x) + d(x) = \#x$;
- $e(x) + 2d(x) = |x|$;
- $\#x + d(x) = |x|$.

Обозначение 13.

$$f(x, y, z) : \left\{ (x, y, z) \subseteq \mathbb{YF} \times \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 : y \in \overline{|x|}, z \in \overline{\#x} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$$

– это функция, определённая следующим образом:

При $z = 0$:

- Если $x \in \mathbb{YF}$ представляется в виде $x = \alpha_1 \dots \alpha_m \alpha_{m+1} \dots \alpha_n$, где $|\alpha_{m+1} \dots \alpha_n| = y$, $\alpha_i \in \{1, 2\}$, то

$$\begin{aligned} f(x, y, 0) &:= \frac{1}{(\alpha_{m+1})(\alpha_{m+1} + \alpha_{m+2}) \dots (\alpha_{m+1} + \dots + \alpha_n)} \cdot (-1)^{n-m} \\ &\cdot \frac{1}{(\alpha_m)(\alpha_m + \alpha_{m-1})(\alpha_m + \alpha_{m-1} + \alpha_{m-2}) \dots (\alpha_m + \dots + \alpha_1)} = \\ &= \frac{1}{(-\alpha_{m+1})(-\alpha_{m+1} - \alpha_{m+2}) \dots (-\alpha_{m+1} - \dots - \alpha_n)} \cdot \\ &\cdot \frac{1}{(\alpha_m)(\alpha_m + \alpha_{m-1})(\alpha_m + \alpha_{m-1} + \alpha_{m-2}) \dots (\alpha_m + \dots + \alpha_1)}; \end{aligned}$$

- Если $x \in \mathbb{YF}$ не представляется в виде $x = \alpha_1 \dots \alpha_m \alpha_{m+1} \dots \alpha_n$, где $|\alpha_{m+1} \dots \alpha_n| = y$, $\alpha_i \in \{1, 2\}$, то

$$f(x, y, 0) = 0.$$

При $z > 0$ (рекурсивное определение):

- Если $y = 0$, то

$$f(x1, 0, z) = f(x1, 0, 0);$$

- Если $y > 0$, то

$$f(x1, y, z) = f(x1, y, 0) + f(x, y - 1, z - 1);$$

-

$$f(x2, y, z) = \begin{cases} \frac{f(x11, y, z+1)}{1-y} & \text{если } y \neq 1 \\ 0 & \text{если } y = 1. \end{cases}$$

Пример 1. Значения $f(x, y, z)$ при всех возможных тройках $(x, y, z) \subseteq \mathbb{YF} \times \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 : x = 21221, y \in \overline{|x|}, z = 0 :$

•

$$f(21221, 0, 0) = \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 8} = \frac{1}{720};$$

•

$$f(21221, 1, 0) = \frac{1}{(-1) \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 7} = -\frac{1}{280};$$

•

$$f(21221, 2, 0) = 0;$$

•

$$f(21221, 3, 0) = \frac{1}{(-2) \cdot (-3) \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5} = \frac{1}{180};$$

•

$$f(21221, 4, 0) = 0;$$

•

$$f(21221, 5, 0) = \frac{1}{(-2) \cdot (-4) \cdot (-5) \cdot 1 \cdot 3} = -\frac{1}{120};$$

•

$$f(21221, 6, 0) = \frac{1}{(-1) \cdot (-3) \cdot (-5) \cdot (-6) \cdot 2} = \frac{1}{180};$$

•

$$f(21221, 7, 0) = 0;$$

•

$$f(21221, 8, 0) = \frac{1}{(-2) \cdot (-3) \cdot (-5) \cdot (-7) \cdot (-8)} = -\frac{1}{1680}.$$

Пример 2. Значения $f(x, y, z)$ при всех возможных тройках $(x, y, z) \subseteq \mathbb{YF} \times \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 : |x| \in \overline{4}, y \in \overline{|x|}, z \in \#x :$

• $x = \varepsilon$

	$y =$
	0
$z =$	1
0	

• $x = 1$

	$y =$	$y =$
	0	1
$z =$	1	-1
0		
$z =$	1	0
1		

- $x = 2$

	$y =$ 0	$y =$ 1	$y =$ 2
$z =$ 0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$
$z =$ 1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$

- $x = 11$

	$y =$ 0	$y =$ 1	$y =$ 2
$z =$ 0	$\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$
$z =$ 1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$
$z =$ 2	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$

- $x = 12$

	$y =$ 0	$y =$ 1	$y =$ 2	$y =$ 3
$z =$ 0	$\frac{1}{6}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$
$z =$ 1	$\frac{1}{6}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$
$z =$ 2	$\frac{1}{6}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{6}$

- $x = 21$

	$y =$ 0	$y =$ 1	$y =$ 2	$y =$ 3
$z =$ 0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{6}$
$z =$ 1	$\frac{1}{3}$	0	0	$-\frac{1}{3}$
$z =$ 2	$\frac{1}{3}$	0	0	$-\frac{1}{3}$

- $x = 111$

	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$	$y = 3$
$z = 0$	$\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{6}$
$z = 1$	$\frac{1}{6}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$
$z = 2$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{2}{3}$
$z = 3$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

- $x = 112$

	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$	$y = 3$	$y = 4$
$z = 0$	$\frac{1}{24}$	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{8}$
$z = 1$	$\frac{1}{24}$	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{8}$
$z = 2$	$\frac{1}{24}$	0	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{6}$	$\frac{5}{24}$
$z = 3$	$\frac{1}{24}$	0	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{8}$

- $x = 22$

	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$	$y = 3$	$y = 4$
$z = 0$	$\frac{1}{8}$	0	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{8}$
$z = 1$	$\frac{1}{8}$	0	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{8}$
$z = 2$	$\frac{1}{8}$	0	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{8}$

- $x = 121$

	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$	$y = 3$	$y = 4$
$z = 0$	$\frac{1}{12}$	$-\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{12}$
$z = 1$	$\frac{1}{12}$	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$
$z = 2$	$\frac{1}{12}$	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$
$z = 3$	$\frac{1}{12}$	0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{4}$

- $x = 211$

	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$	$y = 3$	$y = 4$
$z = 0$	$\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	0	$-\frac{1}{24}$
$z = 1$	$\frac{1}{8}$	0	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{8}$
$z = 2$	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{4}$	0	$-\frac{3}{8}$
$z = 3$	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{4}$	0	$-\frac{3}{8}$

- $x = 1111$

	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$	$y = 3$	$y = 4$
$z = 0$	$\frac{1}{24}$	$-\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{6}$	$\frac{1}{24}$
$z = 1$	$\frac{1}{24}$	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{8}$
$z = 2$	$\frac{1}{24}$	0	$\frac{1}{4}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{3}{8}$
$z = 3$	$\frac{1}{24}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{8}$
$z = 4$	$\frac{1}{24}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{8}$

Обозначение 14.

$$g(x, y) : \{(x, y) \in (\mathbb{YF} \cup \mathbb{YF}_\infty) \times \mathbb{N} : y \leq d(x)\} \rightarrow \mathbb{N}$$

– это функция, определённая следующим образом:

Рассмотрим представление $x \in \mathbb{YF}$ в виде

$$x = \dots \underbrace{21 \dots 1}_m \dots \underbrace{21 \dots 1}_1 \dots \underbrace{21 \dots 1}_0$$

и определим:

- $g(x, 1) = \beta_0 + 1$;
- $g(x, 2) = \beta_0 + \beta_1 + 3$;
- ...
- $g(x, m) = \beta_0 + \dots + \beta_{m-1} + 2m - 1$;
-

Обозначение 15. Пусть $x \in (\mathbb{YF} \cup \mathbb{YF}_\infty)$, $y \in \mathbb{YF}$. Тогда вершину графа Юнга – Фибоначчи, номер которой – это конкатенация номеров x и y , обозначим за xy .

Обозначение 16.

- Пусть $x, y \in (\mathbb{YF} \cup \mathbb{YF}_\infty)$, и при этом не выполняется то, что $x = y \in \mathbb{YF}_\infty$. Тогда максимальное $z \in \mathbb{N}_0 : \exists x', y' \in (\mathbb{YF} \cup \mathbb{YF}_\infty), z' \in \mathbb{YF} : x = x'z', y = y'z', |z'| = z$, обозначим за $h'(x, y)$.
- Пусть $x = y \in \mathbb{YF}_\infty$. Тогда будем считать, что $h'(x, y) = \infty$.

Обозначение 17.

- Пусть $x, y \in (\mathbb{YF} \cup \mathbb{YF}_\infty)$, и при этом не выполняется то, что $x = y \in \mathbb{YF}_\infty$. Тогда максимальное $z \in \mathbb{N}_0 : \exists x', y' \in (\mathbb{YF} \cup \mathbb{YF}_\infty), z' \in \mathbb{YF} : x = x'z', y = y'z', \#z' = z$, обозначим за $h(x, y)$.
- Пусть $x = y \in \mathbb{YF}_\infty$. Тогда будем считать, что $h(x, y) = \infty$.

Замечание 7. Пусть $x, y \in (\mathbb{YF} \cup \mathbb{YF}_\infty)$. Тогда

- $h'(x, y)$ – это сумма цифр в самом длинном общем суффиксе номеров x и y ;
- $h(x, y)$ – это количество цифр в самом длинном общем суффиксе номеров x и y ;
- $h'(x, y) = h'(y, x)$;
- $h(x, y) = h(y, x)$.

Теорема 1 (Теорема 1[1], Теорема 1[2]). Пусть $x, y \in \mathbb{YF} : |y| \geq |x|$. Тогда

$$d(x, y) = \sum_{i=0}^{|x|} \left(f(x, i, h(x, y)) \prod_{j=1}^{d(y)} (g(y, j) - i) \right).$$

Следствие 1. Пусть $y \in \mathbb{YF}$. Тогда

$$d(\varepsilon, y) = \prod_{j=1}^{d(y)} g(y, j).$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} d(\varepsilon, y) &= (\text{По Теореме 1}) = \sum_{i=0}^{|\varepsilon|} \left(f(\varepsilon, i, h(\varepsilon, y)) \prod_{j=1}^{d(y)} (g(y, j) - i) \right) = \\ &= \sum_{i=0}^0 \left(f(\varepsilon, i, 0) \prod_{j=1}^{d(y)} (g(y, j) - i) \right) = f(\varepsilon, 0, 0) \prod_{j=1}^{d(y)} (g(y, j) - 0) = \prod_{j=1}^{d(y)} g(y, j). \end{aligned}$$

□

Обозначение 18. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty$, $m \in \mathbb{N}_0$. Тогда за $w_m \in \mathbb{YF}$ обозначим такую вершину графа Юнга–Фибоначчи, что $\#w_m = m$ и $\exists w' \in \mathbb{YF}_\infty : w = w'w_m$.

Замечание 8.

- Очевидно, что для любых $w \in \mathbb{YF}_\infty$ и $m \in \mathbb{N}_0$ такая вершина существует и однозначно определена.
- Ясно, что это просто вершина, номер которой – это последние (то есть самые правые) m символов номера w .

Обозначение 19. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty$, $v \in \mathbb{YF}$, $m \in \mathbb{N}_0$. Тогда

$$\mu_w(v, m) := \frac{d(\varepsilon, v)d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)}.$$

Утверждение 1. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty$, $v \in \mathbb{YF}$. Тогда существует предел

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \mu_w(v, m) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{d(\varepsilon, v)d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)}.$$

Доказательство. Ясно, что если $m \geq |v|$, то $|w_m| \geq m \geq |v|$, а значит, по Теореме 1 при $v, w_m \in \mathbb{YF}$

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} \mu_w(v, m) &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{d(\varepsilon, v)d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)} = \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{d(\varepsilon, v) \sum_{i=0}^{|v|} \left(f(v, i, h(v, w_m)) \prod_{j=1}^{d(w_m)} (g(w_m, j) - i) \right)}{\prod_{j=1}^{d(w_m)} g(w_m, j)} = \\ &= d(\varepsilon, v) \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=0}^{|v|} \left(f(v, i, h(v, w_m)) \prod_{j=1}^{d(w_m)} \frac{(g(w_m, j) - i)}{g(w_m, j)} \right) \right). \end{aligned}$$

Ясно, что если $m \geq |v|$, то $|w_m| \geq m \geq |v|$, а значит $h(v, w_m) = h(v, w)$, из чего следует, что наше выражение равняется следующему:

$$\begin{aligned} &d(\varepsilon, v) \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=0}^{|v|} \left(f(v, i, h(v, w)) \prod_{j=1}^{d(w_m)} \frac{(g(w_m, j) - i)}{g(w_m, j)} \right) \right) = \\ &= d(\varepsilon, v) \sum_{i=0}^{|v|} \left(f(v, i, h(v, w)) \cdot \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^{d(w_m)} \frac{(g(w_m, j) - i)}{g(w_m, j)} \right) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (\text{По определению функции } g) = \\
&= d(\varepsilon, v) \sum_{i=0}^{|v|} \left(f(v, i, h(v, w)) \prod_{j=1}^{d(w)} \frac{(g(w, j) - i)}{g(w, j)} \right).
\end{aligned}$$

Из определения функции g очевидно, что данное выражение определено. \square

Обозначение 20. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty$, $v \in \mathbb{YF}$. Тогда

$$\mu_w(v) := \lim_{m \rightarrow \infty} \mu_w(v, m) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{d(\varepsilon, v)d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)}.$$

Замечание 9. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty$, $v \in \mathbb{YF}$, $m, n \in \mathbb{N}_0$: $|w_m| \geq |v| = n$. Тогда

- $$d(\varepsilon, v)d(v, w_m) = |\{t \in T(\varepsilon, w_m) : t(n) = v\}|;$$
- $$\mu_w(v, m) = \frac{d(\varepsilon, v)d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)} = \frac{|\{t \in T(\varepsilon, w_m) : t(n) = v\}|}{|\{T(\varepsilon, w_m)\}|}.$$

Утверждение 2. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty$, $m, n \in \mathbb{N}_0$: $|w_m| \geq n$. Тогда

$$\sum_{v \in \mathbb{YF}_n} \mu_w(v, m) = \sum_{v \in \mathbb{YF}_n} \frac{d(\varepsilon, v)d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)} = 1.$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}
\sum_{v \in \mathbb{YF}_n} \mu_w(v, m) &= \sum_{v \in \mathbb{YF}_n} \frac{d(\varepsilon, v)d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)} = (\text{так как } |w_m| \geq n) = \sum_{v \in \mathbb{YF}_n} \frac{|\{t \in T(\varepsilon, w_m) : t(n) = v\}|}{|\{T(\varepsilon, w_m)\}|} = \\
&= \frac{\sum_{v \in \mathbb{YF}_n} |\{t \in T(\varepsilon, w_m) : t(n) = v\}|}{|\{T(\varepsilon, w_m)\}|} = \frac{|\{T(\varepsilon, w_m)\}|}{|\{T(\varepsilon, w_m)\}|} = 1.
\end{aligned}$$

\square

Следствие 2. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty$, $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда

$$\sum_{v \in \mathbb{YF}_n} \mu_w(v) = 1.$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}
\sum_{v \in \mathbb{YF}_n} \mu_w(v) &= \sum_{v \in \mathbb{YF}_n} \left(\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{d(\varepsilon, v)d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)} \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{v \in \mathbb{YF}_n} \left(\frac{d(\varepsilon, v)d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)} \right) \right) = \\
&= (\text{Так как если } m \geq n, \text{ то } |w_m| \geq m \geq n) = 1.
\end{aligned}$$

\square

Обозначение 21. Пусть $w \in (\mathbb{YF} \cup \mathbb{YF}_\infty)$. Тогда

$$\pi(w) := \prod_{i: g(w,i) > 1} \frac{g(w,i) - 1}{g(w,i)}.$$

Замечание 10. Ясно, что

- Если $w \in \mathbb{YF}$, то $\pi(w) \in (0, 1]$;
- Если $w \in \mathbb{YF}_\infty$, то $\pi(w) \in [0, 1]$.

Обозначение 22.

$$\mathbb{YF}_\infty^+ := \{w \in \mathbb{YF}_\infty : \pi(w) > 0\}.$$

Замечание 11. Ясно, что

$$\mathbb{YF}_\infty^+ = \{w \in \mathbb{YF}_\infty : \pi(w) \in (0, 1)\}.$$

3 Доказательство основной Теоремы

Обозначение 23. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty$, $n \in \mathbb{N}_0$, $\delta \in (0, 1)$. Тогда

- $P(w, n, \delta) := \{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) \geq (1 - \delta)n\};$
- $\bar{P}(w, n, \delta) := \{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) < (1 - \delta)n\}.$

Теорема 2. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$, $\delta \in (0, 1)$. Тогда

- 1)
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in \bar{P}(w, n, \delta)} \mu_w(v) = 0;$$
- 2)
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in P(w, n, \delta)} \mu_w(v) = 1.$$

Доказательство.

Обозначение 24. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty$, $\delta \in (0, 1)$, $n, m \in \mathbb{N}_0 : m \geq n$. Тогда

$$\bar{P}(w, n, \delta, m) := \left\{ (a, b, k) \in \mathbb{YF} \times \mathbb{YF} \times \mathbb{N} : ab = w_m, |b| < (1 - \delta)n, k > \frac{\delta n}{2} \right\}.$$

Обозначение 25. Пусть $v \in \mathbb{YF}$, $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда

$$v^n := \underbrace{v \dots v}_n.$$

Лемма 1. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty$, $\delta \in (0, 1)$, $n, m \in \mathbb{N}_0 : m \geq n$. Тогда

$$\sum_{v \in \bar{P}(w, n, \delta)} \frac{d(\varepsilon, v)d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)} \leq \sum_{(a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m)} \frac{d(\varepsilon, 2^k b)d(2^k, a)}{d(\varepsilon, w_m)}.$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} & \sum_{v \in \bar{P}(w, n, \delta)} \frac{d(\varepsilon, v)d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)} \leq \sum_{(a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m)} \frac{d(\varepsilon, 2^k b)d(2^k, a)}{d(\varepsilon, w_m)} \iff \\ & \iff \sum_{v \in \bar{P}(w, n, \delta)} (d(\varepsilon, v)d(v, w_m)) \leq \sum_{(a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m)} (d(\varepsilon, 2^k b)d(2^k, a)) \iff \\ & \iff (\text{Так как если } m \geq n, \text{ то } |w_m| \geq m \geq n) \iff \\ & \iff \sum_{v \in \bar{P}(w, n, \delta)} |\{t \in T(\varepsilon, w_m) : t(n) = v\}| \leq \sum_{(a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m)} (d(\varepsilon, 2^k b)d(2^k, a)). \end{aligned}$$

Обозначение 26.

Пусть $x, y \in \mathbb{YF}$, $t \in T(\mathbb{YF}) : t \in T(x, y)$. Тогда обозначим за $c(t)$ самую верхнюю вершину пути t из тех вершин пути t , у которых самый короткий общий суффикс с y .

Формально:

Пусть $x, y \in \mathbb{YF}$, $t \in T(\mathbb{YF}) : t \in T(x, y)$. Тогда обозначим за $c(t)$ такую вершину $t(z)$ пути t ($z \in |x|, |y|$), что $\nexists z' \in |x|, |y| : h'(t(z'), y) < h'(t(z), y)$ и $\nexists z' \in z + 1, |y| : h'(t(z'), y) = h'(t(z), y)$.

Замечание 12. Очевидно, что если $x, y \in \mathbb{YF}$, $t \in T(\mathbb{YF}) : t \in T(x, y)$, то вершина $c(t)$ существует и однозначно определена.

Давайте рассмотрим теперь путь $t \in T(\varepsilon, w_m)$ такой, что $t(n) \in \bar{P}(w, n, \delta)$.

Пусть t' – это часть данного пути, которая проходит от вершины w_m до вершины $t(n)$.

Формально:

$t' \in T(t(n), w_m)$, $t'(|w_m|) = t(|w_m|) = w_m$, $t'(|w_m| - 1) = t(|w_m| - 1)$, ..., $t'(n + 1) = t(n + 1)$, $t'(n) = t(n)$.

Рассмотрим вершину $c(t')$. Рассмотрим три случая:


1° $\exists x, y, z \in \mathbb{YF} : w_m = x2y$, $c(t') = z1y$.

Как в данном случае проходит путь t' ?


- По Обозначению 26 $h'(t'(|c(t')| + 1), w_m) > h'(t'(|c(t')|), w_m) = h'(c(t'), w_m) = |y|$. А значит $\exists q \in \mathbb{YF} : t'(|c(t')| + 1) = q2y$. Таким образом, между $t'(|c(t')| + 1)$ и $t'(|c(t')|) = c(t')$ шаг “вниз” выглядит следующим образом:

$$q2y \rightarrow z1y.$$

Вспомним, как выглядят родители вершины графа Юнга – Фибоначчи:



или



Становится ясно, что если q содержит хотя бы одну единицу, то любой родитель $q2y$ также заканчивается на $2y$. А значит, q не содержит ни одной единицы, то есть $\exists e \in \mathbb{N}_0 : q = 2^e$. Таким образом, между $t'(|c(t')| + 1)$ и $t'(|c(t')|) = c(t')$ шаг “вниз” выглядит следующим образом:

$$2^e 2y \rightarrow 2^e 1y.$$

- $u := e + 1$. Ясно, что $|t'(|c(t')| + 1)| = |c(t')| + 1 \geq n + 1 > n$, то есть $|2^e 2y| > n \iff |2^u y| > n \iff |2^u| > n - |y|$;

Также по Обозначению 26 $|y| = h'(c(t'), w_m) = h'(t'(|c(t')|), w_m) \leq h'(t'(n), w_m) = h'(t(n), w_m) =$ (так как $|w_m| \geq m \geq n = |t(n)| = h'(t(n), w) <$ (так как $t(n) \in \overline{P}(w, n, \delta) < (1 - \delta)n$.

Таким образом, можно сделать вывод, что $2u = |2^u| > n - |y| > n - (1 - \delta)n \geq \delta n \implies 2u > \delta n$.

То есть $u > \frac{\delta n}{2}$.

- И снова по Обозначению 26 если $r \in \overline{|c(t')| + 1, |w_m|}$, то $h'(t'(r), w_m) > h'(t'(|c(t')|), w_m) = h'(c(t'), w_m) = |y|$. А значит, номера вершин из множества $\{t'(r) : r \in \overline{|c(t')| + 1, |w_m|}\}$ заканчиваются на $2y$.
- Путь t' выглядит следующим образом:

$$\begin{aligned}
 t'(|w_m|) = w_m = x2y &\rightarrow t'(|w_m| - 1) \rightarrow \dots \rightarrow \\
 \rightarrow t'(|c(t')| + 1) = 2^e 2y = 2^u y &\rightarrow t'(|c(t')|) = c(t') = 2^e 1y \rightarrow \\
 \rightarrow \dots \rightarrow t'(n) = t(n). &
 \end{aligned}$$


2° $\exists x, y, z \in \mathbb{YF} : w_m = x1y, c(t') = z2y$.

Как в данном случае проходит путь t' ?


- По Обозначению 26 $h'(t'(|c(t')| + 1), w_m) > h'(t'(|c(t')|), w_m) = h'(c(t'), w_m) = |y|$. А значит $\exists q \in \mathbb{YF} : t'(|c(t')| + 1) = q1y$. Таким образом, между $t'(|c(t')| + 1)$ и $t'(|c(t')|) = c(t')$ шаг “вниз” выглядит следующим образом:

$$q1y \rightarrow z2y.$$

Вспомним, как выглядят родители вершины графа Юнга–Фибоначчи:



или



Становится ясно, что если q содержит хотя бы одну единицу, то любой родитель $q1y$ также заканчивается на $1y$. А значит, q не содержит ни одной единицы, то есть $\exists e \in \mathbb{N}_0 : q = 2^e$. Таким образом, между $t'(|c(t')|+1)$ и $t'(|c(t')|) = c(t')$ шаг “вниз” выглядит следующим образом:

$$2^e 1y \rightarrow 2^e y.$$

- $u := e$. Ясно, что $|c(t')| \geq n$, то есть $|2^e y| \geq n \iff |2^u y| \geq n \iff |2^u| \geq n - |y|$;

Также по Обозначению 26 $|y| = h'(c(t'), w_m) = h'(t'(|c(t')|), w_m) \leq h'(t'(n), w_m) = h'(t(n), w_m) =$ (так как $|w_m| \geq m \geq n = |t(n)| = h'(t(n), w) <$ (так как $t(n) \in \overline{P}(w, n, \delta) < (1 - \delta)n$.

Таким образом, можно сделать вывод, что $2u = |2^u| \geq n - |y| > n - (1 - \delta)n \geq \delta n \implies 2u > \delta n$.

То есть $u > \frac{\delta n}{2}$.

- И снова по Обозначению 26 если $r \in \overline{|c(t')| + 1, |w_m|}$, то $h'(t'(r), w_m) > h'(t'(|c(t')|), w_m) = h'(c(t'), w_m) = |y|$. А значит, номера вершин из множества $\{t'(r) : r \in \overline{|c(t')| + 1, |w_m|}\}$ заканчиваются на $1y$.
- Путь t' выглядит следующим образом:

$$t'(|w_m|) = w_m = x1y \rightarrow t'(|w_m| - 1) \rightarrow \dots \rightarrow$$

$$\begin{aligned} \rightarrow t'(|c(t')| + 1) &= 2^e 1y \rightarrow t'(|c(t')|) = c(t') = 2^e y = 2^u y \rightarrow \\ &\rightarrow \dots \rightarrow t'(n) = t(n). \end{aligned}$$

3° $\exists x, y \in \mathbb{YF} : w_m = xy, c(t') = y.$

По Обозначению 26 $n \leq |c(t')| = h'(c(t'), w_m) = h'(t'(|c(t')|), w_m) \leq h'(t'(n), w_m) = h'(t(n), w_m) =$ (так как $|w_m| \geq m \geq n = |t(n)| = h'(t(n), w) <$ (так как $t(n) \in \overline{P}(w, n, \delta) < (1 - \delta)n \implies n < (1 - \delta)n$. Противоречие.
Данный случай невозможен.

Ясно, что все случаи разобраны.

Итак, в обоих возможных случаях можно сделать следующие выводы:

$\exists x, y \in \mathbb{YF}, u \in \mathbb{N}_0 :$

- Путь t' выглядит следующим образом:

$$w_m = xy \rightarrow \dots \rightarrow 2^u y \rightarrow \dots \rightarrow t'(n) = t(n);$$

- Номера всех вершин данного пути от $w_m = xy$ до $2^u y$ заканчиваются на y ;
- $|y| < (1 - \delta)n$;
- $u > \frac{\delta n}{2}$.

Обозначение 27. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty, \delta \in (0, 1), n, m \in \mathbb{N}_0 : m \geq n$. Тогда обозначим за

$$T(w, n, \delta, m)$$

множество таких путей $t \in T(\varepsilon, w_m)$, что $\exists x, y \in \mathbb{YF}, u \in \mathbb{N}$, такие что

- Путь t выглядит следующим образом:

$$w_m = xy \rightarrow \dots \rightarrow 2^u y \rightarrow \dots \rightarrow \varepsilon;$$

- Номера всех вершин данного пути от $w_m = xy$ до $2^u y$ заканчиваются на y ;
- $|y| < (1 - \delta)n$;
- $u > \frac{\delta n}{2}$.

Мы рассмотрели путь $t \in T(\varepsilon, w_m)$ такой, что $t(n) \in \overline{P}(w, n, \delta)$, после чего поняли, что $t \in T(w, n, \delta, m)$.

Таким образом, ясно, что

$$\begin{aligned} |\{t \in T(\varepsilon, w_m) : t(n) \in \overline{P}(w, n, \delta)\}| &\leq |T(w, n, \delta, m)| \iff \\ \iff \sum_{v \in \overline{P}(w, n, \delta)} |\{t \in T(\varepsilon, w_m) : t(n) = v\}| &\leq |T(w, n, \delta, m)|. \end{aligned}$$

Теперь ясно, что если мы просуммируем по всем тройкам $(x, y, u) \in \mathbb{YF} \times \mathbb{YF} \times \mathbb{N}$, таким что

- $w_m = xy$,
- $|y| < (1 - \delta)n$,
- $u > \frac{\delta n}{2}$,

количество путей вида

$$w_m = xy \rightarrow \dots \rightarrow 2^u y \rightarrow \dots \rightarrow \varepsilon,$$

таких что номера всех вершин данного пути от w_m до $2^u y$ заканчиваются на y , то мы посчитаем все пути из $T(w, n, \delta, m)$ хотя бы один раз.

А теперь вспомним определение $\overline{P}(w, n, \delta, m)$, поймём, что при фиксированных x, y и u количество путей вида

$$w_m = xy \rightarrow \dots \rightarrow 2^u y \rightarrow \dots \rightarrow \varepsilon,$$

таких что номера всех вершин данного пути от w_m до $2^u y$ заканчиваются на y , равно

$$d(\varepsilon, 2^u y)d(2^u, x)$$

и сделаем вывод, что

$$|T(w, n, \delta, m)| \leq \sum_{(x,y,u) \in \overline{P}(w,n,\delta,m)} (d(\varepsilon, 2^u y)d(2^u, x)).$$

Таким образом, мы доказали, что

$$\begin{aligned} \sum_{v \in \overline{P}(w,n,\delta)} |\{t \in T(\varepsilon, w_m) : t(n) = v\}| &\leq |T(w, n, \delta, m)| \leq \sum_{(x,y,u) \in \overline{P}(w,n,\delta,m)} (d(\varepsilon, 2^u y)d(2^u, x)) \implies \\ \implies \sum_{v \in \overline{P}(w,n,\delta)} |\{t \in T(\varepsilon, w_m) : t(n) = v\}| &\leq \sum_{(a,b,k) \in \overline{P}(w,n,\delta,m)} (d(\varepsilon, 2^k b)d(2^k, a)) \iff \\ \iff \sum_{v \in \overline{P}(w,n,\delta)} \frac{d(\varepsilon, v)d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)} &\leq \sum_{(a,b,k) \in \overline{P}(w,n,\delta,m)} \frac{d(\varepsilon, 2^k b)d(2^k, a)}{d(\varepsilon, w_m)}, \end{aligned}$$

что и требовалось.

Лемма доказана. \square

Обозначение 28. Пусть $x \in \mathbb{YF}$, $i \in \mathbb{N}_0 : i \in \overline{1, d(x)}$. Тогда

$$g'(x, i) := g(x, i) - 2i + 2.$$

Обозначение 29. Пусть $a \in \mathbb{YF}$, $k \in \mathbb{N}_0$, $i = (i_1, \dots, i_{d(a)-k}) \in \mathbb{N}^{d(a)-k} : d(a) \geq k, 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d(a)-k} \leq d(a)$.

Тогда:

- за $d(2^k, a, i)$ обозначим число таких путей “вниз” из a в 2^k , при проходе которых удаляются те и только те двойки, которые изначально были i_1 -ой, i_2 -ой, \dots и $i_{d(a)-k}$ -ой в номере a , если считать справа;

- за $a(i)$ обозначим вершину графа Юнга–Фибоначчи, $(a(i) \in \mathbb{YF})$, номер которой получается из номера вершины a удалением i_1 -ой, i_2 -ой, ... и $i_{d(a)-k}$ -ой двоек, если считать справа.

Утверждение 3. Пусть $a \in \mathbb{YF}$, $k \in \mathbb{N}_0$, $i = (i_1, \dots, i_{d(a)-k}) \in \mathbb{N}^{d(a)-k}$: $d(a) \geq k$, $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d(a)-k} \leq d(a)$. Тогда

$$d(2^k, a, i) = \prod_{j=1}^{d(a)-k} (g'(a, i_j) + 2j - 2).$$


Доказательство. Хотим доказать, что

$$d(2^k, a, i) = d(\varepsilon, a(i)) = \prod_{j=1}^{d(a)-k} (g'(a, i_j) + 2j - 2).$$

Для начала поймём, что

$$d(2^k, a, i) = d(\varepsilon, a(i)) :$$

Это несложно понять по следующим двум картинкам. Вверху нарисовано, как устроен шаг пути “вниз” из вершины a в 2^k . Перечёркнуты тут двойки, которые в процессе прохождения пути не должны быть удалены. Внизу нарисовано, как устроен соответствующий шаг пути “вниз” из вершины $a(i)$ в ε . Ясно, как из этого следует биекция между этими множествами путей.



Иными словами, ясно, что двойки, которые нельзя удалить, ни на что не влияют, так как их нельзя удалить, а также, так как их расположение относительно других символов никак не влияет на то, какие операции можно сделать с остальными символами.

Теперь хотим понять, что

$$d(\varepsilon, a(i)) = \prod_{j=1}^{d(a)-k} (g'(a, i_j) + 2j - 2).$$

По определению функции g' и формуле для числа путей “вниз” в ε можно понять, что

$$\prod_{j=1}^{d(a)-k} (g'(a, i_j) + 2j - 2) = \prod_{j=1}^{d(a)-k} (g(a, i_j) - 2i_j + 2 + 2j - 2) = \prod_{j=1}^{d(a)-k} (g(a, i_j) - 2i_j + 2j) =$$

= (Так как ясно, что $2i_j - 2j$ — это удвоенное количество таких двоек в номере a , которые нельзя удалить, и которые при этом стоят справа от j -ой “разрешённой” двойки) =

$$= \prod_{j=1}^{d(a)-k} g(a(i), j) = \prod_{j=1}^{d(a(i))} g(a(i), j) = d(\varepsilon, a(i)).$$

Таким образом, мы доказали, что

$$d(2^k, a, i) = d(\varepsilon, a(i)) = \prod_{j=1}^{d(a)-k} (g'(a, i_j) + 2j - 2),$$

что и требовалось.

Утверждение доказано. □


Утверждение 4. Пусть $a \in \mathbb{YF}$, $k \in \mathbb{N}_0$. Тогда

$$d(2^k, a) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d(a)-k} \leq d(a)} \left(\prod_{j=1}^{d(a)-k} (g'(a, i_j) + 2j - 2) \right).$$


Доказательство. Рассмотрим два случая:

1° $d(a) < k$.

Ясно, что при каждом шаге “вниз” количество двоек не увеличивается, так как мы можем только заменить двойку на единицу или удалить единицу



или



А значит, так как справа сумма пустая,

$$d(2^k, a) = 0 = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d(a)-k} \leq d(a)} \left(\prod_{j=1}^{d(a)-k} (g'(a, i_j) + 2j - 2) \right).$$

2° $d(a) \geq k$.

Ясно, что при любом пути “вниз” из вершины a в вершину 2^k при $d(a) \geq k$ какие-либо k из изначально находящихся $d(a)$ двоек в номере a остаются нетронутыми, а $d(a) - k$ — удаляются. Таким образом, для завершения доказательства Утверждения осталось только просуммировать Утверждение 3 по всем $i = (i_1, \dots, i_{d(a)-k}) \in \mathbb{N}^{d(a)-k}$: $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d(a)-k} \leq d(a)$.

$$d(2^k, a) = \sum_{\substack{i=(i_1, \dots, i_{d(a)-k}): \\ 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d(a)-k} \leq d(a)}} d(2^k, a, i) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d(a)-k} \leq d(a)} \left(\prod_{j=1}^{d(a)-k} (g'(a, i_j) + 2j - 2) \right),$$

что и требовалось.

Утверждение доказано.

□

Утверждение 5. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$. Тогда

$$\sum_{i=1}^{d(w)} \frac{1}{g(w, i)} < \infty.$$

Доказательство.

$$w \in \mathbb{YF}_\infty^+ \implies \pi(w) > 0 \iff \prod_{i: g(w, i) > 1} \frac{g(w, i) - 1}{g(w, i)} > 0 \iff$$

$$\begin{aligned} &\iff \prod_{i:g(w,i)>1} \frac{g(w,i)}{g(w,i)-1} < \infty \iff \prod_{i:g(w,i)>1} \left(1 + \frac{1}{g(w,i)-1}\right) < \infty. \\ \infty &> \prod_{i:g(w,i)>1} \left(1 + \frac{1}{g(w,i)-1}\right) \geq \prod_{i:g(w,i)>1} \left(1 + \frac{1}{g(w,i)}\right) \geq 1 + \sum_{i:g(w,i)>1} \frac{1}{g(w,i)} \geq \sum_{i=1}^{d(w)} \frac{1}{g(w,i)}. \end{aligned}$$

□

Лемма 2. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$, $s \in (0, 1)$. Тогда $\exists c_1, c_2 \in \mathbb{N}_0 : \forall a, b \in \mathbb{YF}$, $m, k \in \mathbb{N}_0 : w_m = ab, k \geq c_2$

$$\frac{d(2^k, a)}{d(\varepsilon, a1^{|b|})} \leq c_1 \frac{s^{k-c_2}}{(k-c_2)!}.$$

Доказательство. Давайте рассмотрим $a, b \in \mathbb{YF}$, $m, k \in \mathbb{N}_0 : w_m = ab$, $d(a) \geq k$.

Очевидно, что в данном случае $|a| \geq 2k$.

Ясно, что $d(2^k, a) \leq d(2^k, a1^{|b|})$, так как каждому пути $t \in T(2^k, a)$ “вниз”

$$a = t(|a|) \rightarrow t(|a|-1) \rightarrow t(|a|-2) \rightarrow \dots \rightarrow t(|2k|) = 2^k$$

можно однозначно сопоставить путь $t' \in T(2^k, a1^{|b|})$ “вниз”

$$\begin{aligned} a1^{|b|} &= t(|a|)1^{|b|} \rightarrow t(|a|-1)1^{|b|} \rightarrow t(|a|-2)1^{|b|} \rightarrow \dots \rightarrow \\ &\rightarrow \dots \rightarrow t(|2k|)1^{|b|} = 2^k 1^{|b|} \rightarrow 2^k 1^{|b|-1} \rightarrow 2^k 1^{|b|-2} \rightarrow \dots \rightarrow 2^k, \end{aligned}$$

причём любой паре таких путей соответствуют разные пути.

Давайте посчитаем:

$$\frac{d(2^k, a)}{d(\varepsilon, a1^{|b|})} \leq \frac{d(2^k, a1^{|b|})}{d(\varepsilon, a1^{|b|})} = \left(\text{По Утверждению 4 при } (a1^{|b|}) \in \mathbb{YF}, k \in \mathbb{N}_0 \right) =$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d(a)-k} \leq d(a)} \left(\prod_{j=1}^{d(a)-k} (g'(a1^{|b|}, i_j) + 2j - 2) \right)}{d(\varepsilon, a1^{|b|})} = \\ &= \left(\text{По формуле для количества путей “вниз” в } \varepsilon \right) = \\ &= \frac{\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d(a)-k} \leq d(a)} \left(\prod_{j=1}^{d(a)-k} (g'(a1^{|b|}, i_j) + 2j - 2) \right)}{d(a1^{|b|}) \prod_{j=1}^{d(a)-k} g(a1^{|b|}, j)} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d(a)-k} \leq d(a)} \left(\prod_{j=1}^{d(a)-k} (g'(a1^{|b|}, i_j) + 2j - 2) \right)}{\prod_{j=1}^{d(a)} g(a1^{|b|}, j)} = \\
&= (\text{По определению } g') = \\
&= \frac{\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d(a)-k} \leq d(a)} \left(\prod_{j=1}^{d(a)-k} (g(a1^{|b|}, i_j) - 2i_j + 2 + 2j - 2) \right)}{\prod_{j=1}^{d(a)} g(a1^{|b|}, j)} = \\
&= \frac{\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d(a)-k} \leq d(a)} \left(\prod_{j=1}^{d(a)-k} (g(a1^{|b|}, i_j) - 2i_j + 2j) \right)}{\prod_{j=1}^{d(a)} g(a1^{|b|}, j)} \leq \\
&\leq \frac{\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d(a)-k} \leq d(a)} \left(\prod_{j=1}^{d(a)-k} g(a1^{|b|}, i_j) \right)}{\prod_{j=1}^{d(a)} g(a1^{|b|}, j)} = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq d(a)} \left(\frac{1}{\prod_{j=1}^k g(a1^{|b|}, i_j)} \right) \leq \\
&\leq \left(\text{Из определения функции } g \text{ ясно, что } \{g(a1^{|b|}, j)\}_{j=1}^{d(a1^{|b|})} = \{g(a1^{|b|}, j)\}_{j=1}^{d(a)} \subseteq \{g(ab, j)\}_{j=1}^{d(ab)} \right) \leq \\
&\leq \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq d(ab)} \left(\frac{1}{\prod_{j=1}^k g(ab, i_j)} \right) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq d(w_m)} \left(\frac{1}{\prod_{j=1}^k g(w_m, i_j)} \right) \leq \\
&\leq \left(\text{Из определения функции } g \text{ ясно, что } \{g(w_m, j)\}_{j=1}^{d(w_m)} \subseteq \{g(w, j)\}_{j=1}^{d(w)} \right) \leq \\
&\leq \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq d(w)} \left(\frac{1}{\prod_{j=1}^k g(w, i_j)} \right).
\end{aligned}$$

Иными словами, последние два неравенства верны, так как w содержит все двойки из $a1^{|b|}$, причём именно на тех же местах.

Заметим, что данное выражение не зависит от a, b и m .

По Утверждению 5 при нашем $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$

$$\sum_{i=1}^{d(w)} \frac{1}{g(w, i)} < \infty \implies \exists S \in \mathbb{N}_0 : \sum_{i=S+1}^{d(w)} \frac{1}{g(w, i)} < s.$$

Выберем такое $S \in \mathbb{N}_0$. Пусть $c_2 = S$.

Несложно заметить (из раскрытия скобок при возведении в степень), что при $k \geq c_2 = S$

$$\begin{aligned} \sum_{S+1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq d(w)} \left(\frac{1}{\prod_{j=1}^k g(w, i_j)} \right) &\leq \frac{\left(\sum_{i=S+1}^{d(w)} \frac{1}{g(w, i)} \right)^k}{k!} \leq \frac{s^k}{k!}; \\ \sum_{1 \leq i_1 < S+1 \leq i_2 < \dots < i_k \leq d(w)} \left(\frac{1}{\prod_{j=1}^k g(w, i_j)} \right) &\leq \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right) \frac{\left(\sum_{i=S+1}^{d(w)} \frac{1}{g(w, i)} \right)^{k-1}}{(k-1)!} \leq \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right) \frac{s^{k-1}}{(k-1)!}; \\ \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < S+1 \leq i_3 < \dots < i_k \leq d(w)} \left(\frac{1}{\prod_{j=1}^k g(w, i_j)} \right) &\leq \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^2 \frac{\left(\sum_{i=S+1}^{d(w)} \frac{1}{g(w, i)} \right)^{k-2}}{(k-2)!} \leq \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^2 \frac{s^{k-2}}{(k-2)!}; \\ &\dots \\ \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_l < S+1 \leq i_{l+1} < \dots < i_k \leq d(w)} \left(\frac{1}{\prod_{j=1}^k g(w, i_j)} \right) &\leq \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^l \frac{\left(\sum_{i=S+1}^{d(w)} \frac{1}{g(w, i)} \right)^{k-l}}{(k-l)!} \leq \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^l \frac{s^{k-l}}{(k-l)!}; \\
&\quad \dots \\
&\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_S < S+1 \leq i_{S+1} < \dots < i_k \leq d(w)} \left(\frac{1}{\prod_{j=1}^k g(w, i_j)} \right) \leq \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^S \frac{\left(\sum_{i=S+1}^{d(w)} \frac{1}{g(w, i)} \right)^{k-S}}{(k-S)!} \leq \\
&\leq \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^S \frac{s^{k-S}}{(k-S)!}.
\end{aligned}$$

Выше написано $S+1$ неравенство, в l -ом неравенстве (при нумерации с нуля) слева написана сумма по таким k i -шкам, что ровно l из них строго меньше, чем $S+1$, а остальные $k-l$ — не меньше. И данную сумму мы оцениваем сверху. Ясно, что других вариантов расположения k i -шек нет, а значит, просуммировав данные неравенства, получим верхнюю оценку для всех таких наборов из k i -шек:

$$\begin{aligned}
&\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq d(w)} \frac{1}{\prod_{j=1}^k g(w, i_j)} \leq \\
&\leq \frac{s^k}{k!} + \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right) \frac{s^{k-1}}{(k-1)!} + \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^2 \frac{s^{k-2}}{(k-2)!} + \dots + \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^S \frac{s^{k-S}}{(k-S)!} \leq \\
&\leq \frac{s^k}{(k-S)!} + \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right) \frac{s^{k-1}}{(k-S)!} + \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^2 \frac{s^{k-2}}{(k-S)!} + \dots + \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^S \frac{s^{k-S}}{(k-S)!} \leq \\
&\leq (\text{Так как } s \in (0, 1)) \leq \\
&\leq \frac{s^{k-S}}{(k-S)!} + \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right) \frac{s^{k-S}}{(k-S)!} + \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^2 \frac{s^{k-S}}{(k-S)!} + \dots + \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^S \frac{s^{k-S}}{(k-S)!} = \\
&= \frac{s^{k-S}}{(k-S)!} \left(1 + \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right) + \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^2 + \dots + \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^S \right) = \\
&= \frac{s^{k-S}}{(k-S)!} \left(\sum_{j=0}^S \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^j \right) \leq \frac{s^{k-S}}{(k-S)!} \left[\sum_{j=0}^S \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^j \right].
\end{aligned}$$

Пусть

$$c_1 = \left[\sum_{j=0}^S \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^j \right] < \infty.$$

При выбранных нами $c_1, c_2 \in \mathbb{N}_0$ и произвольных $a, b \in \mathbb{YF}$, $m, k \in \mathbb{N}_0$: $w_m = ab$, $k \geq c_2$ есть два случая:

1° $d(a) \geq k$.

В данном случае мы поняли, что

$$\frac{d(2^k, a)}{d(\varepsilon, a1^{|b|})} \leq \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq d(w)} \left(\frac{1}{\prod_{j=1}^k g(w, i_j)} \right) \leq \frac{s^{k-S}}{(k-S)!} \left[\sum_{j=0}^S \left(\sum_{i=1}^S \frac{1}{g(w, i)} \right)^j \right] = c_1 \frac{s^{k-c_2}}{(k-c_2)!}.$$

2° $d(a) < k$.

Заметим, что при каждом шаге “вниз” количество двоек не увеличивается, так как мы можем только заменить двойку на единицу или удалить единицу, а значит, если $d(a) < k$, то $d(2^k, a) = 0$. Таким образом, в данном случае

$$\frac{d(2^k, a)}{d(\varepsilon, a1^{|b|})} = 0 \leq c_1 \frac{s^{k-c_2}}{(k-c_2)!}.$$

Мы поняли, что при выбранных нами $c_1, c_2 \in \mathbb{N}_0$ и произвольных $a, b \in \mathbb{YF}$, $m, k \in \mathbb{N}_0$: $w_m = ab$, $k \geq c_2$ в любом случае

$$\frac{d(2^k, a)}{d(\varepsilon, a1^{|b|})} \leq c_1 \frac{s^{k-c_2}}{(k-c_2)!},$$

что и требовалось.

Лемма доказана. □

Утверждение 6. Пусть $x, x', x'' \in \mathbb{YF}$: $x = x'x''$. Тогда

$$d(\varepsilon, x) = d(\varepsilon, x'')d(\varepsilon, x'1^{|x''|}).$$

Доказательство. Воспользуемся формулой для числа путей “вниз” в ε и определением функции g :

$$d(\varepsilon, x) = \prod_{i=1}^{d(x)} g(x, i) = \left(\prod_{i=1}^{d(x'')} g(x, i) \right) \left(\prod_{i=d(x'')+1}^{d(x)} g(x, i) \right) = d(\varepsilon, x'') d(\varepsilon, x'1^{|x''|}).$$

□

Теперь давайте докажем Теорему. Самое время вспомнить формулировку:

Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$, $\delta \in (0, 1)$. Тогда

1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in \bar{P}(w, n, \delta)} \mu_w(v) = 0;$$

2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in P(w, n, \delta)} \mu_w(v) = 1.$$

Давайте при наших $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$ и $\delta \in (0, 1)$ зафиксируем произвольные $m, n \in \mathbb{N}_0 : m \geq n \geq 1$.

Ясно, что если $(a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m)$ (то есть при $a, b \in \mathbb{YF}$, $k \in \mathbb{N}$: $ab = w_m$, $|b| < (1 - \delta)n$, $k > \frac{\delta n}{2}$), то

$$\frac{|b|}{k} < \frac{(1 - \delta)n}{\frac{\delta n}{2}} = \frac{2(1 - \delta)n}{\delta n} = \frac{2(1 - \delta)}{\delta} < \frac{2}{\delta} \implies |b| < \frac{2}{\delta}k.$$

А значит, если $(a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m)$, то

$$\begin{aligned} \frac{d(\varepsilon, 2^k b)}{d(\varepsilon, b)} &= (\text{По Утверждению 6 при } (2^k b), 2^k, b \in \mathbb{YF}) = \frac{d(\varepsilon, b) d(\varepsilon, 2^k 1^{|b|})}{d(\varepsilon, b)} = \\ &= d(\varepsilon, 2^k 1^{|b|}) = (\text{По формуле для числа путей "вниз" в } \varepsilon) = \\ &= \prod_{i=1}^{d(2^k 1^{|b|})} g(2^k 1^{|b|}, i) = \prod_{i=1}^k g(2^k 1^{|b|}, i) = (\text{По определению функции } g) = \\ &= \prod_{i=1}^k (|b| + 2i - 1) \leq \prod_{i=1}^k (|b| + 2k - 1) = (|b| + 2k - 1)^k < \left(\frac{2}{\delta}k + 2k - 1\right)^k. \end{aligned}$$

Таким образом, мы поняли, что при $(a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m)$

$$\frac{d(\varepsilon, 2^k b)}{d(\varepsilon, b)} < \left(\frac{2}{\delta}k + 2k - 1\right)^k.$$

Применим Лемму 2 при нашем $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$ и $s = \frac{1}{2e(\frac{2}{\delta} + 2)}$ (ясно, что $s \in (0, 1)$). По этой Лемме $\exists c_1, c_2 \in \mathbb{N}_0$: $\forall a, b \in \mathbb{YF}$, $m, k \in \mathbb{N}_0$: $w_m = ab$, $k \geq c_2$

$$\frac{d(2^k, a)}{d(\varepsilon, a 1^{|b|})} \leq c_1 \frac{\left(\frac{1}{2e(\frac{2}{\delta} + 2)}\right)^{k - c_2}}{(k - c_2)!}.$$

Рассматриваем данные c_1 и c_2 .

Перемножив два неравенства и вспомнив определение $\bar{P}(w, n, \delta, m)$, получаем, что $\forall a, b \in \mathbb{YF}, k \in \mathbb{N}: (a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m), k \geq c_2$

$$\begin{aligned}
\frac{d(\varepsilon, 2^k b) d(2^k, a)}{d(\varepsilon, b) d(\varepsilon, a1^{|b|})} &< \left(\frac{2}{\delta}k + 2k - 1\right)^k c_1 \frac{\left(\frac{1}{2e(\frac{2}{\delta} + 2)}\right)^{k-c_2}}{(k-c_2)!} \leq \left(\frac{2}{\delta}k + 2k\right)^k c_1 \frac{\left(\frac{1}{2e(\frac{2}{\delta} + 2)}\right)^{k-c_2}}{(k-c_2)!} \leq \\
&\leq \left(k \left(\frac{2}{\delta} + 2\right)\right)^k c_1 \frac{\left(\frac{1}{2e(\frac{2}{\delta} + 2)}\right)^{k-c_2}}{(k-c_2)!} = k^k \left(\frac{2}{\delta} + 2\right)^k c_1 \frac{\left(\frac{1}{2e}\right)^{k-c_2} \left(\frac{2}{\delta} + 2\right)^{c_2-k}}{(k-c_2)!} = \\
&= k^k \left(\frac{2}{\delta} + 2\right)^{c_2} c_1 \frac{\left(\frac{1}{2e}\right)^{k-c_2}}{(k-c_2)!} = c_1 \left(\frac{2}{\delta} + 2\right)^{c_2} k^k \frac{\left(\frac{1}{2e}\right)^{k-c_2}}{(k-c_2)!} = \left(\text{при } C_1 = c_1 \left(\frac{2}{\delta} + 2\right)^{c_2}\right) = C_1 k^k \frac{\left(\frac{1}{2e}\right)^{k-c_2}}{(k-c_2)!}.
\end{aligned}$$

Пусть $k > c_2$. Тогда ясно, что $(k-c_2) \in \mathbb{N}$. Применим формулу Стирлинга для $(k-c_2)$. Она гласит, что $\exists \theta_{k-c_2} \in (0, 1)$:

$$(k-c_2)! = \sqrt{2\pi(k-c_2)} \left(\frac{k-c_2}{e}\right)^{k-c_2} \exp \frac{\theta_{k-c_2}}{12(k-c_2)}.$$

Таким образом, мы получаем, что $\forall a, b \in \mathbb{YF}, k \in \mathbb{N}: (a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m), k > c_2$

$$\begin{aligned}
\frac{d(\varepsilon, 2^k b) d(2^k, a)}{d(\varepsilon, b) d(\varepsilon, a1^{|b|})} &< \left(\text{при } C_1 = c_1 \left(\frac{2}{\delta} + 2\right)^{c_2}\right) < C_1 k^k \frac{\left(\frac{1}{2e}\right)^{k-c_2}}{(k-c_2)!} = \\
&= C_1 k^k \frac{\left(\frac{1}{2e}\right)^{k-c_2}}{\sqrt{2\pi(k-c_2)} \left(\frac{k-c_2}{e}\right)^{k-c_2} \exp \frac{\theta_{k-c_2}}{12(k-c_2)}} \leq C_1 k^k \frac{\left(\frac{1}{2e}\right)^{k-c_2}}{\sqrt{2\pi(k-c_2)} \left(\frac{k-c_2}{e}\right)^{k-c_2}} \leq \\
&\leq C_1 k^k \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{k-c_2}}{\sqrt{2\pi(k-c_2)} (k-c_2)^{k-c_2}} \leq C_1 k^k \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{k-c_2}}{(k-c_2)^{k-c_2}} = C_1 k^k \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k}{(k-c_2)^k} \cdot \frac{(k-c_2)^{c_2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^{c_2}} \leq \\
&\leq C_1 k^k \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k}{(k-c_2)^k} k^{c_2} 2^{c_2} = 2^{c_2} C_1 k^{c_2} k^k \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k}{(k-c_2)^k} = (\text{при } C_2 = 2^{c_2} C_1) = \\
&= C_2 k^{c_2} k^k \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k}{(k-c_2)^k} = C_2 k^{c_2} \left(\frac{k}{k-c_2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^k.
\end{aligned}$$

Как известно,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{k-c_2}\right)^k = e^{c_2},$$

а значит, существует $K \in \mathbb{N}$: $K > c_2, \forall k \in \mathbb{N} : k \geq K$

$$\left(\frac{k}{k-c_2}\right)^k < 2e^{c_2}.$$

Зафиксируем данное K .

Мы получаем, что $\forall a, b \in \mathbb{YF}, k \in \mathbb{N}: (a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m), k \geq K$

$$\begin{aligned} \frac{d(\varepsilon, 2^k b) d(2^k, a)}{d(\varepsilon, b) d(\varepsilon, a1^{|b|})} &< \left(\text{при } C_2 = 2^{c_2} C_1, C_1 = c_1 \left(\frac{2}{\delta} + 2\right)^{c_2}\right) < C_2 k^{c_2} \left(\frac{k}{k-c_2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^k < \\ &< C_2 k^{c_2} 2e^{c_2} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2C_2 e^{c_2} k^{c_2} \left(\frac{1}{2}\right)^k = (\text{при } C = 2C_2 e^{c_2}) = C k^{c_2} \left(\frac{1}{2}\right)^k. \end{aligned}$$

Ясно, что экспонента растёт быстрее многочлена, а значит, $\exists K' \in \mathbb{N} : K' \geq K, \forall k \in \mathbb{N} : k \geq K'$

$$C k^{c_2} < \left(\frac{4}{3}\right)^k.$$

Зафиксируем данное K' .

Таким образом, мы получаем, что $\forall a, b \in \mathbb{YF}, k \in \mathbb{N}: (a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m), k \geq K'$

$$\begin{aligned} \frac{d(\varepsilon, 2^k b) d(2^k, a)}{d(\varepsilon, b) d(\varepsilon, a1^{|b|})} &< \left(\text{при } C = 2C_2 e^{c_2}, C_2 = 2^{c_2} C_1, C_1 = c_1 \left(\frac{2}{\delta} + 2\right)^{c_2}\right) < \\ &< C k^{c_2} \left(\frac{1}{2}\right)^k < \left(\frac{4}{3}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^k = \left(\frac{2}{3}\right)^k. \end{aligned}$$

Это в свою очередь значит, что $\forall a, b \in \mathbb{YF}, k \in \mathbb{N}: (a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m), k \geq K'$

$$\begin{aligned} \frac{d(\varepsilon, 2^k b) d(2^k, a)}{d(\varepsilon, a1^{|b|}) d(\varepsilon, b)} &< \left(\frac{2}{3}\right)^k \iff (\text{По Утверждению 6 при } (ab), a, b \in \mathbb{YF}) \iff \\ \iff \frac{d(\varepsilon, 2^k b) d(2^k, a)}{d(\varepsilon, ab)} &< \left(\frac{2}{3}\right)^k \iff \frac{d(\varepsilon, 2^k b) d(2^k, a)}{d(\varepsilon, w_m)} < \left(\frac{2}{3}\right)^k. \end{aligned}$$

Пусть $m, n \in \mathbb{N}_0 : m \geq n \geq \frac{2K'}{\delta}$. Вспомним определение $\bar{P}(w, n, \delta, m)$ и поймём, что $\forall a, b \in \mathbb{YF}, k \in \mathbb{N}: (a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m)$

$$k > \frac{\delta n}{2} \geq \frac{\delta \frac{2K'}{\delta}}{2} = \frac{2K'}{2} = K'.$$

Таким образом, мы получаем, что если $m, n \in \mathbb{N}_0 : m \geq n \geq \frac{2K'}{\delta}$, то $\forall a, b \in \mathbb{YF}, k \in \mathbb{N}: (a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m)$

$$\frac{d(\varepsilon, 2^k b) d(2^k, a)}{d(\varepsilon, w_m)} < \left(\frac{2}{3}\right)^k.$$

Давайте просуммируем данное выражение по $(a, b, k) \in \bar{P}(w, n, \delta, m)$.
Для начала зафиксируем a и b и просуммируем по $k \in \mathbb{N} : k > \frac{\delta n}{2}$:

$$\sum_{k \in \mathbb{N} : k > \frac{\delta n}{2}} \frac{d(\varepsilon, 2^k b) d(2^k, a)}{d(\varepsilon, w_m)} < \sum_{k \in \mathbb{N} : k > \frac{\delta n}{2}} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \sum_{k=\lfloor \frac{\delta n}{2} \rfloor + 1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \left(\frac{2}{3}\right)^{\lfloor \frac{\delta n}{2} \rfloor + 1} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = 3 \left(\frac{2}{3}\right)^{\lfloor \frac{\delta n}{2} \rfloor + 1}.$$

Осталось просуммировать данное выражение по всем парам $(a, b) \in \mathbb{YF}^2 : ab = w_m$ и $|b| < (1 - \delta)n$. Несложно заметить, что наше выражение не зависит от a и b , а количество данных разбиений w_m точно не больше, чем n , так как $|b| < (1 - \delta)n < n \implies |b| \in \overline{n-1}$.

А значит, если $m, n \in \mathbb{N}_0 : m \geq n \geq \frac{2K'}{\delta}$, то

$$\begin{aligned} \sum_{(a,b,k) \in \bar{P}(w,n,\delta,m)} \frac{d(\varepsilon, 2^k b) d(2^k, a)}{d(\varepsilon, w_m)} &\leq n \cdot \sum_{k \in \mathbb{N}_0 : k > \frac{\delta n}{2}} \frac{d(\varepsilon, 2^k b) d(2^k, a)}{d(\varepsilon, w_m)} < \\ &< n \cdot 3 \left(\frac{2}{3}\right)^{\lfloor \frac{\delta n}{2} \rfloor + 1} = 3n \left(\frac{2}{3}\right)^{\lfloor \frac{\delta n}{2} \rfloor + 1} \leq 3n \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{\delta n}{2}} = 3n \left(\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{\delta}{2}}\right)^n. \end{aligned}$$

Итак, таким образом, мы доказали, что $\exists N = K' \in \mathbb{N} : \forall m, n \in \mathbb{N}_0 : m \geq n \geq N$

$$\sum_{(a,b,k) \in \bar{P}(w,n,\delta,m)} \frac{d(\varepsilon, 2^k b) d(2^k, a)}{d(\varepsilon, w_m)} < 3n \left(\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{\delta}{2}}\right)^n.$$

А это значит, что $\forall n \in \mathbb{N}_0 : n \geq N$

$$\begin{aligned} \sum_{v \in \bar{P}(w,n,\delta)} \mu_w(v) &= \sum_{v \in \bar{P}(w,n,\delta)} \left(\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{d(\varepsilon, v) d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)} \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{v \in \bar{P}(w,n,\delta)} \frac{d(\varepsilon, v) d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)} \right) \leq \\ &\leq (\text{По Лемме 1 при } w \in \mathbb{YF}_\infty, \delta \in (0, 1), n, m \in \mathbb{N}_0) \leq \\ &\leq \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{(a,b,k) \in \bar{P}(w,n,\delta,m)} \frac{d(\varepsilon, 2^k b) d(2^k, a)}{d(\varepsilon, w_m)} \right) \leq 3n \left(\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{\delta}{2}}\right)^n. \end{aligned}$$

Ясно, что $\forall w \in \mathbb{YF}_\infty, v \in \mathbb{YF}$

$$\mu_w(v) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{d(\varepsilon, v) d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)} \geq 0,$$

а значит, при наших $w \in \mathbb{YF}_\infty^+, \delta \in (0, 1) \forall n \in \mathbb{N}_0 : n \geq N$

$$3n \left(\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{\delta}{2}}\right)^n \geq \sum_{v \in \bar{P}(w,n,\delta)} \mu_w(v) \geq 0.$$

Ясно, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3n \left(\left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{\delta}{2}} \right)^n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n}{\left(\left(\frac{3}{2} \right)^{\frac{\delta}{2}} \right)^n} \right) = 0,$$

так как экспонента растёт быстрее многочлена.

А значит, по Лемме о двух полицейских,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in \bar{P}(w, n, \delta)} \mu_w(v) = 0,$$

что доказывает первый пункт.

Также заметим, что

•

$$\bar{P}(w, n, \delta) \cup P(w, n, \delta) = \{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) < (1 - \delta)n\} \cup \{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) \geq (1 - \delta)n\} = \mathbb{YF}_n;$$

•

$$\bar{P}(w, n, \delta) \cap P(w, n, \delta) = \{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) < (1 - \delta)n\} \cap \{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) \geq (1 - \delta)n\} = \emptyset;$$

• (Следствие 2) $\forall w \in \mathbb{YF}_\infty$ и $n \in \mathbb{N}_0$

$$\sum_{v \in \mathbb{YF}_n} \mu_w(v) = 1.$$

Таким образом, можно сделать вывод, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in P(w, n, \delta)} \mu_w(v) = 1,$$

то есть второй пункт доказан.

Оба пункта доказаны.

Теорема доказана.

□

4 Доказательство Следствия 3

Обозначение 30. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty$, $n, l \in \mathbb{N}_0$. Тогда

- $Q(w, n, l) := \{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) \geq l\};$
- $\overline{Q}(w, n, l) := \{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) < l\}.$

Следствие 3 (Из Теоремы 2). Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$, $l \in \mathbb{N}_0$. Тогда

- 1)
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in \overline{Q}(w, n, l)} \mu_w(v) = 0;$$
- 2)
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in Q(w, n, l)} \mu_w(v) = 1.$$

Доказательство. Давайте применим Теорему 2 (первый пункт) при $\delta = \frac{1}{2}$ и том же $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in \overline{P}(w, n, \frac{1}{2})} \mu_w(v) = 0.$$

Несложно заметить, что при $n \in \mathbb{N}_0 : n \geq 2l$

$$\begin{aligned} \overline{P}\left(w, n, \frac{1}{2}\right) &= \left\{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) < \left(1 - \frac{1}{2}\right)n\right\} = \left\{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) < \frac{1}{2}n\right\} \supseteq \\ &\supseteq \{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) < l\} = \overline{Q}(w, n, l). \end{aligned}$$

Ясно, что $\forall w \in \mathbb{YF}_\infty, v \in \mathbb{YF}$

$$\mu_w(v) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{d(\varepsilon, v)d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)} \geq 0,$$

а значит, при наших $w \in \mathbb{YF}_\infty^+, l \in \mathbb{N}_0 \forall n \in \mathbb{N}_0 : n \geq 2l$

$$\sum_{v \in \overline{P}(w, n, \frac{1}{2})} \mu_w(v) \geq \sum_{v \in \overline{Q}(w, n, l)} \mu_w(v) \geq 0.$$

А значит, по Лемме о двух полицейских,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in \overline{Q}(w, n, l)} \mu_w(v) = 0,$$

что доказывает первый пункт.

Также заметим, что

•

$$\overline{Q}(w, n, l) \cup Q(w, n, l) = \{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) < l\} \cup \{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) \geq l\} = \mathbb{YF}_n;$$

•

$$\overline{Q}(w, n, l) \cap Q(w, n, l) = \{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) < l\} \cap \{v \in \mathbb{YF}_n : h'(v, w) \geq l\} = \emptyset;$$

• (Следствие 2) $\forall w \in \mathbb{YF}_\infty$ и $n \in \mathbb{N}_0$

$$\sum_{v \in \mathbb{YF}_n} \mu_w(v) = 1.$$

Таким образом, можно сделать вывод, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in Q(w, n, l)} \mu_w(v) = 1,$$

что доказывает второй пункт.

Таким образом, оба пункта доказаны.

Следствие доказано.

□

5 Доказательство Следствия 4

Обозначение 31. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty$, $n \in \mathbb{N}_0$, $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Тогда

- $R(w, n, \varepsilon) := \{v \in \mathbb{YF}_n : \pi(v) \in (\pi(w)(1 - \varepsilon), \pi(w)(1 + \varepsilon))\};$
- $\bar{R}(w, n, \varepsilon) := \{v \in \mathbb{YF}_n : \pi(v) \notin (\pi(w)(1 - \varepsilon), \pi(w)(1 + \varepsilon))\}.$

Следствие 4 (Из Теоремы 2). Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$, $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Тогда

1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in \bar{R}(w, n, \varepsilon)} \mu_w(v) = 0;$$

2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in R(w, n, \varepsilon)} \mu_w(v) = 1.$$

Доказательство. Давайте докажем, что при данных $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$ и $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ существуют $\delta \in (0, 1)$ и $N \in \mathbb{N}_0$: при любом $n \in \mathbb{N}_0 : n \geq N$

$$R(w, n, \varepsilon) \supseteq P(w, n, \delta).$$

Для этого докажем следующие утверждения:

Утверждение 7. Пусть $v, v', v'' \in \mathbb{YF} : v = v'v''$. Тогда

$$\pi(v) = \pi(v'')\pi(v'1^{|v''|}).$$

Доказательство. Рассмотрим три случая:

1° $v'' = \varepsilon$.

Ясно, что в данном случае $v = v'$. Посчитаем, воспользовавшись определением функций π и g :

$$\begin{aligned} \pi(v) &= \pi(v') = \left(\prod_{i: g(\varepsilon, i) > 1} \frac{g(\varepsilon, i) - 1}{g(\varepsilon, i)} \right) \pi(v') = \pi(\varepsilon)\pi(v') = \\ &= \pi(\varepsilon)\pi(v'1^0) = \pi(\varepsilon)\pi(v'1^{|\varepsilon|}) = \pi(v'')\pi(v'1^{|v''|}). \end{aligned}$$

В данном случае Утверждение доказано.

2° номер v'' заканчивается на 1.

Ясно, что в данном случае номер v тоже заканчивается на 1, а также то, что $|v''| \geq 1$. Посчитаем, воспользовавшись определением функций π и g :

$$\begin{aligned}
\pi(v) &= \prod_{i: g(v,i) > 1} \frac{g(v,i) - 1}{g(v,i)} = \prod_{i=1}^{d(v)} \frac{g(v,i) - 1}{g(v,i)} = \\
&= \left(\prod_{i=1}^{d(v'')} \frac{g(v,i) - 1}{g(v,i)} \right) \left(\prod_{i=d(v'')+1}^{d(v)} \frac{g(v,i) - 1}{g(v,i)} \right) = \\
&= \left(\prod_{i=1}^{d(v'')} \frac{g(v'',i) - 1}{g(v'',i)} \right) \left(\prod_{i=1}^{d(v'1|v'')} \frac{g(v'1|v'',i) - 1}{g(v'1|v'',i)} \right) = \\
&= \left(\prod_{i: g(v'',i) > 1} \frac{g(v'',i) - 1}{g(v'',i)} \right) \left(\prod_{i: g(v'1|v'',i) > 1} \frac{g(v'1|v'',i) - 1}{g(v'1|v'',i)} \right) = \\
&= \pi(v'') \pi(v'1|v'').
\end{aligned}$$

В данном случае Утверждение доказано.

3° номер v'' заканчивается на 2.

Ясно, что в данном случае номер v тоже заканчивается на 2, а также то, что $|v''| \geq 2$. Посчитаем, воспользовавшись определением функций π и g :

$$\begin{aligned}
\pi(v) &= \prod_{i: g(v,i) > 1} \frac{g(v,i) - 1}{g(v,i)} = \prod_{i=2}^{d(v)} \frac{g(v,i) - 1}{g(v,i)} = \\
&= \left(\prod_{i=2}^{d(v'')} \frac{g(v,i) - 1}{g(v,i)} \right) \left(\prod_{i=d(v'')+1}^{d(v)} \frac{g(v,i) - 1}{g(v,i)} \right) = \\
&= \left(\prod_{i=2}^{d(v'')} \frac{g(v'',i) - 1}{g(v'',i)} \right) \left(\prod_{i=1}^{d(v'1|v'')} \frac{g(v'1|v'',i) - 1}{g(v'1|v'',i)} \right) = \\
&= \left(\prod_{i: g(v'',i) > 1} \frac{g(v'',i) - 1}{g(v'',i)} \right) \left(\prod_{i: g(v'1|v'',i) > 1} \frac{g(v'1|v'',i) - 1}{g(v'1|v'',i)} \right) = \\
&= \pi(v'') \pi(v'1|v'').
\end{aligned}$$

В данном случае Утверждение доказано.

Все случаи разобраны.
Утверждение доказано. \square

Утверждение 8. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$, $\delta \in (0, 1)$, $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Тогда $\exists N'' \in \mathbb{N}_0$:
 $\forall n \in \mathbb{N}_0, v \in \mathbb{YF} : n \geq N'', v \in P(w, n, \delta)$

$$\frac{\pi(v)}{\pi(w)} < 1 + \varepsilon.$$

Доказательство. Ясно, что то, что $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$ означает, что выражение $\frac{\pi(v)}{\pi(w)}$ определено.

Давайте считать, что при нашем $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$ и произвольно выбранной вершине $v \in \mathbb{YF}$

$$w = w'w''; \quad v = v'w'',$$

где w'' – самый длинный общий суффикс v и w . Ясно, что тут $w' \in \mathbb{YF}_\infty$, $v', w'' \in \mathbb{YF}$. Кроме того, из определения функции h' ясно, что $|w''| = h'(v, w)$.

Значит,

$$\frac{\pi(v)}{\pi(w)} = (\text{По Утверждению 7 при } v, v', w'' \in \mathbb{YF}, \text{ а также при } w, w', w'' \in \mathbb{YF}) =$$

$$= \frac{\pi(w'') \pi(v'1^{|w''|})}{\pi(w'') \pi(w'1^{|w''|})} = \frac{\pi(v'1^{|w''|})}{\pi(w'1^{|w''|})} \leq (\text{По Замечанию 10 при } (v'1^{|w''|}) \in \mathbb{YF}) \leq$$

$$\leq \frac{1}{\pi(w'1^{|w''|})} = \frac{1}{\prod_{i: g(w'1^{|w''|}, i) > 1} \frac{g(w'1^{|w''|}, i) - 1}{g(w'1^{|w''|}, i)}} =$$

$$= (\text{Следует из определения функции } g) = \frac{1}{\prod_{i: g(w, i) > \max(1, |w''|)} \frac{g(w, i) - 1}{g(w, i)}}.$$

Мы знаем, что $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$, а это значит, что

$$\prod_{i: g(w, i) > 1} \frac{g(w, i) - 1}{g(w, i)} > 0,$$

а это значит, что $\forall \varepsilon' \in \mathbb{R}_{>0} \exists n' \in \mathbb{N}_0 : n' \geq 1$ и

$$\prod_{i: g(w, i) > n'} \frac{g(w, i) - 1}{g(w, i)} > 1 - \varepsilon',$$

а это, в свою очередь, значит, что при нашем $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ существует $n' \in \mathbb{N}_0$: $n' \geq 1$ и

$$\frac{1}{\prod_{i: g(w,i) > n'} \frac{g(w,i) - 1}{g(w,i)}} < 1 + \varepsilon.$$

Пусть $N'' = \left\lceil \frac{n'}{(1-\delta)} \right\rceil \in \mathbb{N}_0$. Тогда если $v \in P(w, n, \delta)$ при $n \in \mathbb{N}_0 : n \geq N''$, то, по определению $P(w, n, \delta)$,

$$|w''| = h'(v, w) \geq (1-\delta)n \geq (1-\delta)N'' = (1-\delta) \left\lceil \frac{n'}{(1-\delta)} \right\rceil \geq (1-\delta) \frac{n'}{(1-\delta)} = n',$$

то есть

$$\frac{1}{\prod_{i: g(w,i) > |w''|} \frac{g(w,i) - 1}{g(w,i)}} \leq \frac{1}{\prod_{i: g(w,i) > n'} \frac{g(w,i) - 1}{g(w,i)}} < 1 + \varepsilon,$$

а значит, если $v \in P(w, n, \delta)$ при $n \in \mathbb{N}_0 : n \geq N''$, то

$$\frac{\pi(v)}{\pi(w)} < 1 + \varepsilon,$$

что и требовалось.

Утверждение доказано. \square

Утверждение 9. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$, $\delta \in (0, 1)$, $n \in \mathbb{N}_0$, $v \in \mathbb{YF} : n \geq 1$, $v \in P(w, n, \delta)$. Тогда

$$\prod_{i=1}^{\lceil \frac{\delta n}{2} \rceil} \frac{g\left(2^{\lceil \frac{\delta n}{2} \rceil} 1^{2^{\lceil \frac{(1-\delta)n}{2} \rceil - 1}}, i\right) - 1}{g\left(2^{\lceil \frac{\delta n}{2} \rceil} 1^{2^{\lceil \frac{(1-\delta)n}{2} \rceil - 1}}, i\right)} \leq \frac{\pi(v)}{\pi(w)}.$$

Доказательство. Ясно, что то, что $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$ означает, что выражение $\frac{\pi(v)}{\pi(w)}$ определено.

Давайте считать, что при нашем $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$ и произвольно выбранной вершине $v \in \mathbb{YF}$

$$w = w'w''; \quad v = v'w'',$$

где w'' – самый длинный общий суффикс v и w . Ясно, что тут $w' \in \mathbb{YF}_\infty$, $v', w'' \in \mathbb{YF}$. Кроме того, из определения функции h' ясно, что $|w''| = h'(v, w)$.

Значит

$$\frac{\pi(v)}{\pi(w)} = (\text{По Утверждению 7 при } v, v', w'' \in \mathbb{YF}, \text{ а также при } w, w', w'' \in \mathbb{YF}) =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\pi(w'') \pi(v'1^{|w''|})}{\pi(w'') \pi(w'1^{|w''|})} = \frac{\pi(v'1^{|w''|})}{\pi(w'1^{|w''|})} \geq \left(\text{По Замечанию 10 при } (w'1^{|w''|}) \in \mathbb{YF} \right) \geq \\
&\geq \pi(v'1^{|w''|}) = \prod_{i: g(v'1^{|w''|}, i) > 1} \frac{g(v'1^{|w''|}, i) - 1}{g(v'1^{|w''|}, i)}.
\end{aligned}$$

Вспомним, что $v \in P(w, n, \delta)$ при $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$, $n \in \mathbb{N}_0 : n \geq 1$ и $\delta \in (0, 1)$. А это значит, что

$$|w''| = h'(v, w) \geq (1 - \delta)n > 0,$$

то есть (так как $|w''| \in \mathbb{N}_0$)

$$|w''| \geq 1.$$

Таким образом, из определения функции g ясно, что $\forall i \in \{1, \dots, d(v'1^{|w''|})\}$

$$g(v'1^{|w''|}, i) \geq 2.$$

Таким образом, наше выражение равняется следующему:

$$\prod_{i=1}^{d(v'1^{|w''|})} \frac{g(v'1^{|w''|}, i) - 1}{g(v'1^{|w''|}, i)} = \prod_{i=1}^{d(v')} \frac{g(v'1^{|w''|}, i) - 1}{g(v'1^{|w''|}, i)}.$$

Вспомним, что $v \in P(w, n, \delta)$ при $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$, $n \in \mathbb{N}_0 : n \geq 1$ и $\delta \in (0, 1)$. А это значит, что

$$|w''| = h'(v, w) \geq (1 - \delta)n > 0.$$

Также ясно, что

$$(1 - \delta)n + 1 = 2 \frac{(1 - \delta)n}{2} + 2 - 1 > 2 \left\lceil \frac{(1 - \delta)n}{2} \right\rceil - 1 \geq 2 - 1 = 1 \implies$$

$$\implies \left(\text{так как } \left(2 \left\lceil \frac{(1 - \delta)n}{2} \right\rceil - 1 \right) \in \mathbb{Z} \right) \implies (1 - \delta)n \geq 2 \left\lceil \frac{(1 - \delta)n}{2} \right\rceil - 1 \geq 1.$$

Делаем вывод, что

$$|w''| = h'(v, w) \geq (1 - \delta)n \geq 2 \left\lceil \frac{(1 - \delta)n}{2} \right\rceil - 1 \geq 1.$$

Таким образом, из определения функции g ясно, что $\forall i \in \{1, \dots, d(v'1^{|w''|})\} = \{1, \dots, d(v')\} = \{1, \dots, d(v'1^{2^{\lceil \frac{(1 - \delta)n}{2} \rceil - 1}})\}$

$$g(v'1^{|w''|}, i) \geq g(v'1^{2^{\lceil \frac{(1 - \delta)n}{2} \rceil - 1}}, i) \geq 2.$$

Таким образом, делаем вывод, что

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{d(v')} \frac{g(v'1^{|w''|}, i) - 1}{g(v'1^{|w''|}, i)} &\geq \prod_{i=1}^{d(v')} \frac{g(v'1^{2^{\lceil \frac{(1-\delta)n}{2} \rceil - 1}}, i) - 1}{g(v'1^{2^{\lceil \frac{(1-\delta)n}{2} \rceil - 1}}, i)} \geq \\ &\geq (\text{По определению функции } g) \geq \prod_{i=1}^{\lceil \frac{|v'|}{2} \rceil} \frac{g\left(2^{\lceil \frac{|v'|}{2} \rceil} 1^{2^{\lceil \frac{(1-\delta)n}{2} \rceil - 1}}, i\right) - 1}{g\left(2^{\lceil \frac{|v'|}{2} \rceil} 1^{2^{\lceil \frac{(1-\delta)n}{2} \rceil - 1}}, i\right)}. \end{aligned}$$

Вспомним, что $v \in P(w, n, \delta)$ при $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$, $n \in \mathbb{N}_0 : n \geq 1$ и $\delta \in (0, 1)$. А это значит, что

$$|v'| = n - |w''| = n - h'(v, w) \leq n - (1 - \delta)n = \delta n \implies \frac{|v'|}{2} \leq \frac{\delta n}{2} \implies \left\lceil \frac{|v'|}{2} \right\rceil \leq \left\lceil \frac{\delta n}{2} \right\rceil,$$

что, в свою очередь, значит, что

$$\prod_{i=1}^{\lceil \frac{|v'|}{2} \rceil} \frac{g\left(2^{\lceil \frac{|v'|}{2} \rceil} 1^{2^{\lceil \frac{(1-\delta)n}{2} \rceil - 1}}, i\right) - 1}{g\left(2^{\lceil \frac{|v'|}{2} \rceil} 1^{2^{\lceil \frac{(1-\delta)n}{2} \rceil - 1}}, i\right)} \geq \prod_{i=1}^{\lceil \frac{\delta n}{2} \rceil} \frac{g\left(2^{\lceil \frac{\delta n}{2} \rceil} 1^{2^{\lceil \frac{(1-\delta)n}{2} \rceil - 1}}, i\right) - 1}{g\left(2^{\lceil \frac{\delta n}{2} \rceil} 1^{2^{\lceil \frac{(1-\delta)n}{2} \rceil - 1}}, i\right)}.$$

Таким образом, мы доказали, что

$$\frac{\pi(v)}{\pi(w)} \geq \prod_{i=1}^{\lceil \frac{\delta n}{2} \rceil} \frac{g\left(2^{\lceil \frac{\delta n}{2} \rceil} 1^{2^{\lceil \frac{(1-\delta)n}{2} \rceil - 1}}, i\right) - 1}{g\left(2^{\lceil \frac{\delta n}{2} \rceil} 1^{2^{\lceil \frac{(1-\delta)n}{2} \rceil - 1}}, i\right)},$$

что и требовалось.

Утверждение доказано. \square

Лемма 3. Пусть $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$, $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Тогда $\exists N' \in \mathbb{N}_0$, $\delta \in (0, 1) : \forall n \in \mathbb{N}_0$, $v \in \mathbb{YF} : n \geq N'$, $v \in P(w, n, \delta)$

$$1 - \varepsilon < \frac{\pi(v)}{\pi(w)}.$$

Доказательство. По Утверждению 9 при нашем $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$ и произвольных $n \in \mathbb{N}_0$, $\delta \in (0, 1)$, $v \in \mathbb{YF} : n \geq 1$, $v \in P(w, n, \delta)$

$$\prod_{i=1}^{\lceil \frac{\delta n}{2} \rceil} \frac{g\left(2^{\lceil \frac{\delta n}{2} \rceil} 1^{2^{\lceil \frac{(1-\delta)n}{2} \rceil - 1}}, i\right) - 1}{g\left(2^{\lceil \frac{\delta n}{2} \rceil} 1^{2^{\lceil \frac{(1-\delta)n}{2} \rceil - 1}}, i\right)} \leq \frac{\pi(v)}{\pi(w)}.$$

Пусть $\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{2}, \frac{1}{2}\right)$. Ясно, что $\delta \in (0, 1)$.

Теперь введём следующие обозначения:

•

$$a = a(n) = \left\lfloor \frac{(1-\delta)n}{2} \right\rfloor;$$

•

$$b = b(n) = \left\lfloor \frac{\delta n}{2} \right\rfloor.$$

Ясно, что

•

$$a(n) = \left\lfloor \frac{(1-\delta)n}{2} \right\rfloor \geq \frac{(1-\delta)n}{2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \implies a(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty;$$

•

$$b(n) = \left\lfloor \frac{\delta n}{2} \right\rfloor \geq \frac{\delta n}{2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \implies b(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty.$$

Утверждение 9 при нашем $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$ и выбранном $\delta \in (0, 1)$ в новых обозначениях принимает следующий вид (помним про определение функции g):

При произвольных $n \in \mathbb{N}_0$, $v \in \mathbb{YF}$: $n \geq 1$, $v \in P(w, n, \delta)$

$$\prod_{i=a(n)}^{a(n)+b(n)-1} \frac{2i-1}{2i} \leq \frac{\pi(v)}{\pi(w)}.$$

Давайте найдём

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{i=a(n)}^{a(n)+b(n)-1} \frac{2i-1}{2i} \right).$$

Посчитаем, держа в голове, что $a(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ и $b(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$, что в частности значит, что мы можем рассматривать только такие n , что $a(n) \geq 2$ и $b(n) \geq 1$:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{i=a}^{a+b-1} \frac{2i-1}{2i} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{i=a}^{a+b-1} \frac{(2i-1)2i}{(2i)^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\prod_{i=2a-1}^{2a+2b-2} i}{\left(2^b \prod_{i=a}^{a+b-1} i \right)^2} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2a+2b-2)!}{(2a-2)!} \right)^2 \frac{(2a+2b-2)!}{2^{2b} \left(\frac{(a+b-1)!}{(a-1)!} \right)^2}. \end{aligned}$$

По формуле Стирлинга данное выражение равняется следующему выражению при некоторых $\theta_{a+b-1}, \theta_{a-1}, \theta_{2a-2}, \theta_{2a+2b-2} \in (0, 1)$ (тут важно, что

мы рассматривает только такие n , что $a(n) \geq 2$ и $b(n) \geq 1$, что, в свою очередь, значит, что $a + b - 1 \geq 1$; $a - 1 \geq 1$; $2a - 2 \geq 1$; $2a + 2b - 2 \geq 1$):

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2^{2b}} \frac{2\pi(a-1) \left(\frac{a-1}{e}\right)^{2a-2} \left(\exp \frac{\theta_{a-1}}{12(a-1)}\right)^2}{2\pi(a+b-1) \left(\frac{a+b-1}{e}\right)^{2a+2b-2} \left(\exp \frac{\theta_{a+b-1}}{12(a+b-1)}\right)^2} \cdot \right. \\ & \quad \left. \frac{\sqrt{2\pi(2a+2b-2)} \left(\frac{2a+2b-2}{e}\right)^{2a+2b-2} \exp \frac{\theta_{2a+2b-2}}{12(2a+2b-2)}}{\sqrt{2\pi(2a-2)} \left(\frac{2a-2}{e}\right)^{2a-2} \exp \frac{\theta_{2a-2}}{12(2a-2)}} \right) = \\ & = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2^{2b}} \frac{(a-1)(a-1)^{2a-2} \left(\exp \frac{\theta_{a-1}}{12(a-1)}\right)^2}{(a+b-1)(a+b-1)^{2a+2b-2} \left(\exp \frac{\theta_{a+b-1}}{12(a+b-1)}\right)^2} \cdot \right. \\ & \quad \left. \frac{\sqrt{(2a+2b-2)}(2a+2b-2)^{2a+2b-2} \exp \frac{\theta_{2a+2b-2}}{12(2a+2b-2)}}{\sqrt{(2a-2)}(2a-2)^{2a-2} \exp \frac{\theta_{2a-2}}{12(2a-2)}} \right). \end{aligned}$$

Для начала рассмотрим

$$\frac{\left(\exp \frac{\theta_{a-1}}{12(a-1)}\right)^2 \exp \frac{\theta_{2a+2b-2}}{12(2a+2b-2)}}{\left(\exp \frac{\theta_{a+b-1}}{12(a+b-1)}\right)^2 \exp \frac{\theta_{2a-2}}{12(2a-2)}}.$$

Мы уже поняли, что $a(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ и $b(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$, а это значит, что (помним, что если $i \in \mathbb{N}$, то $\theta_i \in (0, 1)$)

- $$\lim_{n \rightarrow \infty} (a(n) - 1) = \infty \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\theta_{a-1}}{12(a-1)} = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\exp \frac{\theta_{a-1}}{12(a-1)}\right) = 1;$$

- $$\lim_{n \rightarrow \infty} (a(n) + b(n) - 1) = \infty \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\theta_{a+b-1}}{12(a+b-1)} = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\exp \frac{\theta_{a+b-1}}{12(a+b-1)}\right) = 1;$$

- $$\lim_{n \rightarrow \infty} (2a(n) + 2b(n) - 2) = \infty \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\theta_{2a+2b-2}}{12(2a+2b-2)} = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\exp \frac{\theta_{2a+2b-2}}{12(2a+2b-2)}\right) = 1;$$

- $$\lim_{n \rightarrow \infty} (2a(n) - 2) = \infty \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\theta_{2a-2}}{12(2a-2)} = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\exp \frac{\theta_{2a-2}}{12(2a-2)}\right) = 1.$$

А из этого следует, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\exp \frac{\theta_{a-1}}{12(a-1)}\right)^2 \exp \frac{\theta_{2a+2b-2}}{12(2a+2b-2)}}{\left(\exp \frac{\theta_{a+b-1}}{12(a+b-1)}\right)^2 \exp \frac{\theta_{2a-2}}{12(2a-2)}} = 1.$$

Таким образом, мы поняли, что

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2^{2b}} \frac{(a-1)(a-1)^{2a-2} \left(\exp \frac{\theta_{a-1}}{12(a-1)}\right)^2}{(a+b-1)(a+b-1)^{2a+2b-2} \left(\exp \frac{\theta_{a+b-1}}{12(a+b-1)}\right)^2} \cdot \frac{\sqrt{(2a+2b-2)}(2a+2b-2)^{2a+2b-2} \exp \frac{\theta_{2a+2b-2}}{12(2a+2b-2)}}{\sqrt{(2a-2)}(2a-2)^{2a-2} \exp \frac{\theta_{2a-2}}{12(2a-2)}} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2^{2b}} \cdot \frac{(a-1)(a-1)^{2a-2}}{(a+b-1)(a+b-1)^{2a+2b-2}} \cdot \frac{\sqrt{(2a+2b-2)}(2a+2b-2)^{2a+2b-2}}{\sqrt{(2a-2)}(2a-2)^{2a-2}} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(a-1)(a-1)^{2a-2}}{(a+b-1)(a+b-1)^{2a+2b-2}} \cdot \frac{\sqrt{(a+b-1)}(a+b-1)^{2a+2b-2}}{\sqrt{(a-1)}(a-1)^{2a-2}} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(a-1)}{(a+b-1)} \cdot \frac{\sqrt{(a+b-1)}}{\sqrt{(a-1)}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{a-1}{a+b-1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{a(n)-1}{a(n)+b(n)-1}} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{\left\lfloor \frac{(1-\delta)n}{2} \right\rfloor - 1}{\left\lfloor \frac{(1-\delta)n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{\delta n}{2} \right\rfloor - 1}} \right). \end{aligned}$$

Заметим, что

- $$1 - \frac{2}{(1-\delta)n} = \frac{(1-\delta)n-2}{(1-\delta)n} = \frac{\frac{(1-\delta)n}{2} - 1}{\frac{(1-\delta)n}{2}} \leq \frac{\left\lfloor \frac{(1-\delta)n}{2} \right\rfloor - 1}{\frac{(1-\delta)n}{2}} \leq \frac{\frac{(1-\delta)n}{2}}{\frac{(1-\delta)n}{2}} = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{(1-\delta)n} \right) = 1 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left\lfloor \frac{(1-\delta)n}{2} \right\rfloor - 1}{\frac{(1-\delta)n}{2}} = 1;$$

- $$1 - \frac{2}{n+2} = \frac{n}{n+2} = \frac{\frac{n}{2}}{\frac{(1-\delta)n}{2} + \frac{\delta n}{2} + 1} \leq \frac{\frac{n}{2}}{\left\lfloor \frac{(1-\delta)n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{\delta n}{2} \right\rfloor - 1} \leq \frac{\frac{n}{2}}{\frac{(1-\delta)n}{2} + \frac{\delta n}{2} - 1} = \frac{n}{n-2} = 1 + \frac{2}{n-2},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n+2} \right) = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n-2} \right) = 1 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{n}{2}}{\left\lfloor \frac{(1-\delta)n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{\delta n}{2} \right\rfloor - 1} \right) = 1.$$

А значит,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{\left\lfloor \frac{(1-\delta)n}{2} \right\rfloor - 1}{\left\lfloor \frac{(1-\delta)n}{2} \right\rfloor + \left\lceil \frac{\delta n}{2} \right\rceil - 1}} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{\left\lfloor \frac{(1-\delta)n}{2} \right\rfloor - 1}{\frac{(1-\delta)n}{2}} \cdot \frac{(1-\delta)n}{2} \cdot \frac{\frac{n}{2}}{\left\lfloor \frac{(1-\delta)n}{2} \right\rfloor + \left\lceil \frac{\delta n}{2} \right\rceil - 1} \cdot \frac{2}{n}} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{(1-\delta)n}{2} \cdot \frac{2}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \delta) = 1 - \delta. \end{aligned}$$

Таким образом, мы доказали, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{i=a(n)}^{a(n)+b(n)-1} \frac{2i-1}{2i} \right) = 1 - \delta.$$

А это значит, что $\exists N' \in \mathbb{N}_0 : N' \geq 1, \forall n \in \mathbb{N}_0 : n \geq N'$

$$\prod_{i=a(n)}^{a(n)+b(n)-1} \frac{2i-1}{2i} > 1 - 2\delta \geq 1 - 2\frac{\varepsilon}{2} = 1 - \varepsilon.$$

Таким образом, мы доказали, что при наших $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$ и $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0} \exists N' \in \mathbb{N}_0, \delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{2}, \frac{1}{2}\right) \in (0, 1) : \forall n \in \mathbb{N}_0, v \in \mathbb{YF} : n \geq N', v \in P(w, n, \delta)$

$$1 - \varepsilon < \prod_{i=a(n)}^{a(n)+b(n)-1} \frac{2i-1}{2i} = \prod_{i=1}^{\left\lceil \frac{\delta n}{2} \right\rceil} \frac{g\left(2^{\left\lceil \frac{\delta n}{2} \right\rceil} 1^{2^{\left\lfloor \frac{(1-\delta)n}{2} \right\rfloor - 1}}, i\right) - 1}{g\left(2^{\left\lceil \frac{\delta n}{2} \right\rceil} 1^{2^{\left\lfloor \frac{(1-\delta)n}{2} \right\rfloor - 1}}, i\right)} \leq \frac{\pi(v)}{\pi(w)},$$

что и требовалось.

Лемма доказана. \square

Таким образом, по Утверждению 8 и Лемме 3 при наших $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$ и $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ существуют $N = \max(N', N'') \in \mathbb{N}_0$ и $\delta \in (0, 1) : \forall n \in \mathbb{N}_0, v \in \mathbb{YF} : n \geq N, v \in P(w, n, \delta)$

$$1 - \varepsilon < \frac{\pi(v)}{\pi(w)} < 1 + \varepsilon,$$

то есть

$$\pi(v) \in (\pi(w)(1 - \varepsilon), \pi(w)(1 + \varepsilon)),$$

то есть

$$v \in R(w, n, \varepsilon).$$

Таким образом, мы доказали, что при наших $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$ и $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ существуют такие $N \in \mathbb{N}_0$ и $\delta \in (0, 1) : \forall n \in \mathbb{N}_0 : n \geq N$

$$R(w, n, \varepsilon) \supseteq P(w, n, \delta).$$

Зафиксируем данные $N \in \mathbb{N}_0$ и $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$.

По Теореме 2 при нашем $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$ и только что зафиксированном $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in P(w, n, \delta)} \mu_w(v) = 1.$$

Кроме того, ясно что

- $\forall w \in \mathbb{YF}_\infty$ и $v \in \mathbb{YF}$

$$\mu_w(v) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{d(\varepsilon, v)d(v, w_m)}{d(\varepsilon, w_m)} \geq 0;$$

- $\forall w \in \mathbb{YF}_\infty$, $n \in \mathbb{N}_0$ и $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$

$$R(w, n, \varepsilon) = \{v \in \mathbb{YF}_n : \pi(v) \in (\pi(w)(1 - \varepsilon), \pi(w)(1 + \varepsilon))\} \subseteq \mathbb{YF}_n;$$

- (Следствие 2) $\forall w \in \mathbb{YF}_\infty$ и $n \in \mathbb{N}_0$

$$\sum_{v \in \mathbb{YF}_n} \mu_w(v) = 1.$$

А значит, при наших $w \in \mathbb{YF}_\infty^+$, $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0} \forall n \in \mathbb{N}_0 : n \geq N$

$$\sum_{v \in P(w, n, \delta)} \mu_w(v) \leq \sum_{v \in R(w, n, \varepsilon)} \mu_w(v) \leq \sum_{v \in \mathbb{YF}_n} \mu_w(v) = 1.$$

А значит, по Лемме о двух полицейских,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in R(w, n, \varepsilon)} \mu_w(v) = 1,$$

что доказывает второй пункт.

Также заметим, что

-

$$\begin{aligned} & \overline{R}(w, n, \varepsilon) \cup R(w, n, \varepsilon) = \\ & = \{v \in \mathbb{YF}_n : \pi(v) \notin (\pi(w)(1 - \varepsilon), \pi(w)(1 + \varepsilon))\} \cup \{v \in \mathbb{YF}_n : \pi(v) \in (\pi(w)(1 - \varepsilon), \pi(w)(1 + \varepsilon))\} = \mathbb{YF}_n; \end{aligned}$$

-

$$\begin{aligned} & \overline{R}(w, n, \varepsilon) \cap R(w, n, \varepsilon) = \\ & = \{v \in \mathbb{YF}_n : \pi(v) \notin (\pi(w)(1 - \varepsilon), \pi(w)(1 + \varepsilon))\} \cap \{v \in \mathbb{YF}_n : \pi(v) \in (\pi(w)(1 - \varepsilon), \pi(w)(1 + \varepsilon))\} = \emptyset; \end{aligned}$$

- (Следствие 2) $\forall w \in \mathbb{YF}_\infty$ и $n \in \mathbb{N}_0$

$$\sum_{v \in \mathbb{YF}_n} \mu_w(v) = 1.$$

Таким образом, можно сделать вывод, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v \in \bar{R}(w, n, \varepsilon)} \mu_w(v) = 0,$$

что доказывает первый пункт.

Таким образом, оба пункта доказаны.

Следствие доказано.

□

6 Благодарности

- Работа поддержана грантом в форме субсидий из федерального бюджета на создание и развитие международных математических центров мирового уровня, соглашение между МОН и ПОМИ РАН № 075-15-2019-1620 от 8 ноября 2019 г., а также грантом фонда поддержки теоретической физики и математики "БАЗИС договор No 19-7-2-39-1 от 1 сентября 2019 г.
- Мы признательны Фёдору Владимировичу Петрову за постановку задачи, помощь в публикации статьи и моральную поддержку на протяжении всего периода работы, а также Павлу Андреевичу Ходунову за проявленное при проверке доказательства терпение.

Список литературы

- [1] Евтушевский В. Ю. *Перечисление путей в графе Юнга–Фибоначчи*, arXiv:2012.06379 (2020), 1-105.
- [2] Евтушевский В. Ю. *Перечисление путей в графе Юнга–Фибоначчи*. Зап. научн. сем. ПОМИ, 481 (2019), 39-62.
- [3] A. Gnedin and S. Kerov. *The Plancherel measure of the Young–Fibonacci graph*. Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 129 (2000), 433-446.
- [4] A. M. Vershik. *Asymptotic theory of path spaces of graded graphs and its applications*. Japanese J. Math. 11 (2016), no. 2, 151-218.
- [5] F. M. Goodman, S. V. Kerov. *The Martin Boundary of the Young–Fibonacci Lattice*. J. Algebr. Comb. 11 (2000), no. 1, 17-48.
- [6] S. Okada. *Algebras associated to the Young–Fibonacci lattice*. Trans. Amer. Math. Soc. 346 (1994), 549-568.
- [7] С. В. Фомин. *Обобщенное соответствие Робинсона – Шенстеда – Кнута*. Зап. научн. сем. ЛОМИ, 155 (1986), 156-175.
- [8] S. Fomin. *Duality of Graded Graphs*. Journal of Alg. Comb. 3 (1994), 357-404.
- [9] R. P. Stanley. *Differential posets*. J. Amer. Math. Soc. 1 (1988), 919-961.