

Модификация конструкции Пуанкаре и её применение в CR -геометрии гиперповерхностей в \mathbb{C}^4

Белошاپка В.К.

Аннотация

Обобщение гомологического оператора Пуанкаре – модифицированная конструкция Пуанкаре – была использована для оценки размерности локальных автоморфизмов произвольного роста вещественно аналитической гиперповерхности пространства \mathbb{C}^4 . В работе доказана следующая альтернатива: либо эта размерность бесконечна, либо она не превосходит 24-х. При этом 24 реализуется лишь для невырожденной гиперквадрики (одной из двух). Если гиперповерхность 2-невырождена в точке общего положения, то оценку можно улучшить до 17, а если 3-невырождена, то до 20.

1

Введение

Ведущим элементом метода модельной поверхности является конструкция Пуанкаре, которую он применял как в небесной механике, так и в CR -геометрии (гомологический оператор Пуанкаре или Пуанкаре-Дюлака). Применение в CR -геометрии дано в работе 1907-го года [1]. Эта конструкция, по существу, представляет собой версию теоремы о неявном отображении в классе формальных степенных рядов.

Обычно в CR -геометрии эта конструкция используется так. Пусть имеется некторое нелинейное дифференциальное или функциональное

¹Механико-математический факультет Московского университета им.Ломоносова, Воробьевы горы, 119992 Москва, Россия, vkb@strogino.ru

соотношение $F(x, \phi(x)) = 0$. Пусть в кольце формальных степенных рядов от x введена некоторая градуировка (вес), причем μ -я компонента нашего соотношения имеет вид

$$L(x, \phi_\mu(x)) = \text{выражению, зависящему от } \phi_\nu \text{ при } \nu \leq \mu - 1,$$

где $L(x, y)$ линейно зависит от y . Тогда, очевидно, размерность линейного пространства решений уравнения $L(x, \phi(x)) = 0$ мажорирует размерность семейства решений исходного уравнения $F(x, \phi(x)) = 0$.

В работе [2] для оценки размерности алгебры Ли инфинитезимальных автоморфизмов произвольной голоморфно невырожденной вещественной гиперповерхности пространства \mathbf{C}^3 была использована некоторая модификация этой конструкции (редукция на глубину два). А именно, пусть μ -я компонента нашего соотношения $F(x, \phi(x)) = 0$ имеет вид

$$L_1(x, \phi_\mu(x)) + L_2(x, \phi_{\mu-1}(x)) = \text{выражению, зависящему от } \phi_\nu \text{ при } \nu \leq \mu - 2,$$

где $L_1(x, y)$ и $L_2(x, y)$ линейно зависят от y . Тогда, очевидно, размерность линейного пространства решений уравнения $L_1(x, \phi(x)) + L_2(x, \phi(x)) = 0$ мажорирует размерность семейства решений исходного уравнения $F(x, \phi(x)) = 0$. Аналогично определяется обобщение этой конструкции – редукция на произвольную глубину k .

В данной работе мы даем еще одну демонстрацию применения редукции на глубину два и три. С помощью этой модификации конструкции Пуанкаре дается оценка сверху на размерность алгебры Ли инфинитезимальных автоморфизмов произвольной голоморфно невырожденной вещественной гиперповерхности пространства \mathbf{C}^4 (теорема 16).

Этот результат подтверждает старую гипотезу [6]: либо размерность группы автоморфизмов произвольного ростка вещественно аналитической гиперповерхности не превышает размерности для любой невырожденной стандартной гиперквадрики (в \mathbf{C}^4 она равна 24), либо она бесконечна.

Отметим, что для получения известной оценки для гиперповерхностей пространства \mathbf{C}^2 достаточно обычной (однократной) конструкции Пуанкаре. Для получения же такой оценки в пространстве размерности $(n + 1)$ потребуется использование всех вариантов редукции на глубину от 1 до n .

Поскольку k -кратная конструкция Пуанкаре отличается от класси-

ческой, изложим схему её применения в общем виде. Пусть V - линейное пространство бесконечных последовательностей вещественных чисел, пусть $x \in V$. Пусть, далее, эта последовательность разбита на конечные отрезки, которые мы будем обозначать x_j . Соответственно $x = (x_1, x_2, \dots)$, при этом x_j - элемент некоторого конечномерного вещественного линейного пространства. Фиксируем некоторое натуральное число k . Вот общая формулировка, которую естественно назвать схемой рекурсии на глубину k .

Теорема 1: Пусть имеется бесконечная система полиномиальных соотношений вида

$$\Theta_j(x_1, \dots, x_j) = L_{j1}(x_j) + \dots + L_{jk}(x_{j-k+1}) + \theta_j(x_{j-k}, x_{j-k-1}, \dots, x_1) = 0, \quad (1)$$

$$j = k, (k+1), \dots, \quad \text{где } (L_{j1}, \dots, L_{jk}) \text{ - линейны, причем}$$

$$L_j(x) = L_{j1}(x_j) + L_{j2}(x_{j-1}) + \dots + L_{jk}(x_{j-k+1}) \text{ и } L(x) = (L_1(x), L_2(x), \dots).$$

И пусть известно, что $\text{Ker } L$ содержится в конечномерном подпространстве пространства V вида $\tilde{V}_l = \{(x_1, \dots, x_l, 0, 0, \dots)\}$. Тогда число параметров, от которых зависит общее решение (1), не превосходит размерности $\text{Ker } L$.

Доказательство: Пусть W - прямое дополнение $\text{Ker } L$ до V . Это дополнение можно определить так. В конечномерном пространстве \tilde{V}_l произвольно выберем прямое дополнение \tilde{W} к $\text{Ker } L$ и дополним его подпространством $V_l = \{(0, \dots, 0, x_{l+1}, x_{l+2}, \dots)\}$. Таким образом, уравнение $L(x) = 0$ имеет в пространстве W единственное решение $x = 0$. Просматривая последовательно уравнения $\Theta_j(x) = L_j(x) + \theta_j(x) = 0$, убеждаемся, что эта система также имеет в W не более одного решения. Произвольный вектор $x \in V$ имеет вид $x+a$, где $x \in W$, $a \in \text{Ker } L$. Рассмотрим нашу систему при фиксированном a . Получаем $\Theta_j(x+a) = L_j(x) + \theta_j(x+a) = 0$. Также видим, что эта система имеет не более одного решения. Таким образом, совокупность решений (1) параметризуется некоторым подмножеством $\text{Ker } L$. Теорема доказана.

Пусть Γ - вещественно аналитическая гиперповерхность в области пространства \mathbf{C}^4 , Γ_ξ - росток этой гиперповерхности в точке ξ . Пусть, далее, $\text{aut } \Gamma_\xi$ - алгебра Ли, состоящая из ростков вещественных вещественно аналитических векторных полей в точке ξ , касательных к Γ_ξ . Если Γ вне собственного аналитического подмножества Леви-невырождена,

то в рамках стандартного подхода (однократная редукция) мы получаем стандартную оценку: $\dim \operatorname{aut} \Gamma_\xi$ не превосходит размерности алгебры автоморфизмов касательной невырожденной гиперквадрики, которая, независимо от сигнатуры, равна 24.

Рассчитывать на получение оценки мы можем только в случае, если Γ – голоморфно невырождена. Для гиперповерхности в \mathbb{C}^4 голоморфная невырожденность эквивалентна l -невырожденности вне собственного аналитического подмножества, причем $l \leq 3$ (см.[3]). Таким образом, для получения общей оценки нам необходимо рассмотреть две разных ситуации. Первая: Γ равномерно 2-невырождена в окрестности ξ . Вторая: Γ равномерно 3-невырождена в окрестности ξ .

Примеров равномерно 2-невырожденных гиперповерхностей в \mathbb{C}^4 достаточно много. Например, они содержатся в известной работе Г.Фелса и В.Каупа [16]. В частности, там описаны трубчатые гиперповерхности над вещественными конусами и их голоморфные автоморфизмы. В \mathbb{C}^4 группы таких конусов имеют размерность 15. Примеров равномерно 3-невырожденных гиперповерхностей в \mathbb{C}^4 нам известно два. Один от В.Каупа [16] и один от А.Санги [15]. Оба – голоморфно однородные, причем в примере Санги известна размерность автоморфизмов, которая равна 8.

Рассмотрим оба случая – 3-невырожденный и 2-невырожденный – последовательно. Отметим, что для получения оценки нам пришлось не только использовать гомологический оператор на глубину больше чем один. Также для анализа 2-невырожденных мы использовали двухкратную процедуру. А именно, рекуррентная процедура с одним весом, затем – смена веса и анализ ядра старого гомологического оператора с точки зрения новой весовой рекурсии, что ведет к новому гомологическому оператору. Затем для анализа специального случая (большое ядро) – еще одна смена веса и новая рекурсия.

В итоге мы получим две оценки размерности. Для 2-невырожденных – 17, а для 3-невырожденных – 20. При этом для 2-невырожденных наша техника дает оценку 18, но использование недавнего результата И.Зеленко и Д.Сайкса [12] позволило улучшить ее до 17.

3-невырожденные гиперповерхности

Обозначим координаты в \mathbf{C}^4 через $(z, \zeta, \eta, w = u + iv)$. Пусть Γ – равномерно 3-невырождена в окрестности $\xi \in \Gamma$. Имея ввиду нашу цель – получение оценки на размерность группы автоморфизмов, – мы можем ограничиться так называемыми "жесткими" гиперповерхностями. Действительно, если алгебра автоморфизмов содержит поле, трансверсальное комплексной касательной, то после локального распрямления мы можем полагать, что группа содержит сдвиги вдоль оси u и, тем самым, локальное уравнение Γ имеет вид

$$v = F(z, \bar{z}, \zeta, \bar{\zeta}, \eta, \bar{\eta}),$$

т.е. правая часть не зависит от u . В силу 3-невырожденности ранг формы Леви в общей точке равен 1, и мы можем записать локальное уравнение Γ в виде $v = |z|^2 + F_3 + F_4 + \dots$, где $F_j(z, \bar{z}, \zeta, \bar{\zeta}, \eta, \bar{\eta})$ – это однородный полином степени j . При этом простыми преобразованиями мы можем удалить все плюригармонические компоненты правой части уравнения, а также все члены, линейные по z и \bar{z} , за исключением $|z|^2$.

Необходимым условием равномерной 3-невырожденности является условие, что ранг комплексного гессиана $F(z, \bar{z}, \zeta, \bar{\zeta}, \eta, \bar{\eta})$ всюду не превосходит единицы. Это условие, учитывая, что $F_{z\bar{z}}$ в нуле равна единице, можно записать как условие равенства нулю трех миноров второго порядка. А именно

$$\begin{aligned} \delta_1(F) &= F_{z\bar{z}} F_{\zeta\bar{\zeta}} - |F_{z\zeta}|^2 = 0, \\ \delta_2(F) &= F_{z\bar{z}} F_{\zeta\bar{\eta}} - F_{\zeta\bar{z}} F_{z\bar{\eta}} = 0, \\ \delta_3(F) &= F_{z\bar{z}} F_{\eta\bar{\eta}} - |F_{z\eta}|^2 = 0. \end{aligned} \tag{2}$$

Лемма 2: Если Γ равномерно 3-невырождена, то уравнение этой гиперповерхности после линейной замены можно записать в виде

$$\begin{aligned} v &= |z|^2 + F_3 + F_4 + F_5 + F_6 + O(7), \tag{3} \\ \text{где } F_3 &= 2 \operatorname{Re}(z^2 \bar{\zeta}), \quad F_4 = 2 \operatorname{Re}(z^3 \bar{\eta}) + 4 |z|^2 |\zeta|^2, \\ F_5 &= 2 \operatorname{Re}(r_1 \bar{z}^4 \zeta + r_2 \bar{z}^4 \eta + r_3 z \bar{\zeta}^2 \bar{\eta}^2 + r_4 z \bar{\eta}^4 + 4 z^2 \zeta \bar{\zeta}^2 + 6 z^2 \bar{z} \zeta \bar{\eta}), \\ F_6 &= 2 \operatorname{Re}(8 \bar{r}_1 z^3 \bar{z} \zeta \bar{\zeta} + 8 \bar{r}_2 z^3 \bar{z} \zeta \bar{\eta} + 2 r_3 z \eta^2 \bar{\zeta} \zeta^2 + 2 r_4 z \eta^4 \bar{\zeta} + \\ & s_1 z \bar{z}^4 \zeta + s_2 \bar{z}^5 \zeta + s_3 z \bar{z}^4 \eta + s_4 \bar{z}^5 \eta + s_5 \bar{z}^4 \zeta^2 + s_6 \bar{z}^4 \zeta \eta + s_7 \bar{z}^4 \eta^2 + s_8 \bar{z} \eta^5 + \\ & 12 \bar{z}^3 \zeta \bar{\zeta} \eta + 12 z \bar{z}^2 \zeta^2 \bar{\eta}) + 16 |z|^2 |\zeta|^4 + 9 |z|^4 |\eta|^2 \end{aligned}$$

Доказательство: Запишем общий вид F_3 с учетом наших упрощений. Выделяя в соотношениях (2) компоненту степени один, получаем, что $F_3 = 2 \operatorname{Re}(a_1 \zeta + a_2 \eta) \bar{z}^2$. Поскольку F_3 не есть тождественный ноль, то $(a_1, a_2) \neq 0$ и мы можем заменить $a_1 \zeta + a_2 \eta$ на новую переменную ζ . Теперь простым преобразованием мы можем удалить из всех последующих компонент F слагаемые вида $2 \operatorname{Re}(A(z, \zeta, \eta) \bar{z}^2)$ с голоморфным коэффициентом A .

Запишем общий вид F_4 с учетом наших упрощений. Выделяя в соотношениях (2) компоненту степени два, получаем, что $F_4 = 2 \operatorname{Re} \bar{z}^3 (a_3 \eta + a_4 \zeta) + 4 |z|^2 |\zeta|^2$. Из равномерной 3-невырожденности следует, что $(a_3, a_4) \neq 0$ и мы можем заменить $a_3 \eta + a_4 \zeta$ на новую переменную η . Простым преобразованием удаляем из всех последующих компонент F слагаемые вида $2 \operatorname{Re}(B(z, \zeta, \eta) \bar{z}^3)$ с голоморфным коэффициентом B . Выделяя компоненту степени три, получаем указанный вид F_5 . А затем из компоненты степени четыре – вид F_6 . Лемма доказана.

Рассмотрим отображение ростка одной гиперповерхности Γ в начале координат вида (3) на другую такую гиперповерхность $\tilde{\Gamma}$. Пусть координаты ростка отображения в начале координат имеют вид

$$\Phi = (z \rightarrow f(z, \zeta, \eta, w), \zeta \rightarrow g(z, \zeta, \eta, w), \eta \rightarrow h(z, \zeta, \eta, w), w \rightarrow e(z, \zeta, \eta, w)).$$

Будем считать эти гиперповерхности фиксированными. Введем в пространстве степенных рядов от $(z, \bar{z}, \zeta, \bar{\zeta}, \eta, \bar{\eta}, u)$, а также от $(z, \bar{z}, \zeta, \bar{\zeta}, \eta, \bar{\eta}, w, \bar{w})$ градуировку, назначая веса переменным

$$[z] = [\bar{z}] = [\zeta] = [\bar{\zeta}] = [\eta] = [\bar{\eta}] = 1, [w] = [\bar{w}] = [u] = 2.$$

Набор весовых компонент $(f_{\mu-1}, g_{\mu-2}, h_{\mu-3}, e_{\mu})$ обозначим через ϕ_{μ} (μ -я весовая компонента Φ). Запишем соотношение, отражающее тот факт, что Φ отображает Γ на $\tilde{\Gamma}$.

$$\begin{aligned} \Theta(z, \bar{z}, \zeta, \bar{\zeta}, u) = & -2 \operatorname{Im} e(z, \zeta, \eta, w) + 2 |f|^2 + 4 \operatorname{Re}(f^2 \bar{g}) + 4 \operatorname{Re}(f^3 \bar{h}) + 8 |f|^2 |g|^2 + \\ & 2 F_4(f, \bar{f}, g, \bar{g}, h, \bar{h}) + 2 F_5(f, \bar{f}, g, \bar{g}, h, \bar{h}) + 2 F_6(f, \bar{f}, g, \bar{g}, h, \bar{h}) + \dots \\ & \text{при } w = u + i(|z|^2 + 2 \operatorname{Re}(z^2 \bar{\zeta}) + 2 \operatorname{Re}(z^3 \bar{\eta}) + 4 |z|^2 |\zeta|^2 + \dots) \end{aligned} \quad (4)$$

Среди всех голоморфных в начале координат отображений выделим класс отображений вида

$$\mathcal{V}_5 = \{\Phi = Id + \phi_5 + \dots = (z + O(4), \zeta + O(3), \eta + O(2), w + O(5))\} \quad (5)$$

Оценку размерности семейства таких отображений Γ на $\tilde{\Gamma}$ проведем по схеме кратной рекурсии глубины $k = 3$ (см. теорему 1). Для этого выделим в $\Theta_\mu - \mu$ -й весовой компоненте (4) – члены, зависящие от $(\phi_\mu, \phi_{\mu-1}, \phi_{\mu-2})$, т.е. от

$$(e_\mu, e_{\mu-1}, e_{\mu-2}, f_{\mu-1}, f_{\mu-2}, f_{\mu-3}, g_{\mu-2}, g_{\mu-3}, g_{\mu-4}, h_{\mu-3}, h_{\mu-4}, h_{\mu-5}).$$

Введем обозначения $\Delta_1 \psi(u) = i F_3 \psi'(u)$, $\Delta_2 \psi(u) = i F_4 \psi'(u)$. Выделим последовательно в слагаемых выражения Θ , начиная от $-2 \operatorname{Im} e$ до F_6 , члены указанного вида, получим следующий результат.

Лемма 3: Для всех $\mu \geq 5$ μ -я компонента Θ имеет вид

$$\begin{aligned} \Theta_\mu &= L_1(\phi_\mu) + L_2(\phi_{\mu-1}) + L_3(\phi_{\mu-2}) + \theta_\mu(\phi_{\nu < \mu-2}), \text{ где } w = u + i|z|^2, \\ L_1(\phi) &= 2 \operatorname{Re}(i e + 2 \bar{z} f + 2 \bar{z}^2 g + 2 \bar{z}^3 h), \\ L_2(\phi) &= \Delta_1(L_1(\phi)) + l_2(\phi), \quad L_3(\phi) = \Delta_1(L_2(\phi)) + \Delta_2(L_1(\phi)) + \Delta_1^2(L_1(\phi)) + l_3(\phi), \\ l_2(\phi) &= 2 \operatorname{Re}\{4 z \bar{\zeta} f + 8 z \bar{z} \bar{\zeta} \eta g + (4 \bar{z}^4 r_2 + 4 \bar{z} \zeta^2 \eta r_3 + 8 \bar{z} \eta^3 r_4 + 12 \bar{\zeta} \bar{z}^2 z) h\}, \\ l_3(\phi) &= 2 \operatorname{Re}\{(8 \bar{\zeta} \bar{z} \zeta + 6 \bar{\eta} z^2) f + (4 \bar{z}^4 r_1 + 4 \bar{z} \zeta^2 \eta r_3 + 12 \bar{\eta} \bar{z} z^2 + \\ &8 \bar{\zeta}^2 z + 16 \bar{\zeta} \bar{z} \zeta) g + (16 \bar{\zeta} \bar{z}^3 z r_2 + 8 \bar{\zeta} \zeta^2 \eta z r_3 + 16 \bar{\zeta} \eta^3 z r_4 + 2 \bar{z}^5 s_4 + 2 \bar{z}^4 \zeta s_6 + \\ &4 \bar{z}^4 \eta s_7 + 2 \bar{z}^4 z s_3 + 10 \bar{z} \eta^4 s_8 + 24 \bar{\zeta}^2 c z^2 z + 24 \bar{\zeta} \bar{z}^3 \zeta + 18 \bar{\eta} \bar{z}^2 z^2) h\}. \end{aligned}$$

Отметим, что выражение $L(\phi) = L_1(\phi) + L_2(\phi) + L_3(\phi)$ линейно по ϕ и не зависит от μ .

Пусть V_5 - линейное пространство, состоящее из ростков формальных степенных рядов в начале координат вида

$$\Phi = \phi_5 + \phi_6 + \dots = (f_4 + f_5 + \dots, g_3 + g_4 + \dots, h_2 + h_3 + \dots, e_5 + e_6 + \dots)$$

Тогда, в соответствии с теоремой 1, размерность семейства отображений Γ на $\tilde{\Gamma}$ из \mathcal{V}_5 не превосходит размерности ядра L на V_5 .

Перейдем к оценке размерности ядра оператора L , т.е. пространства решений соотношения

$$L(\phi) = 0, \quad \text{где } \phi \in V_5 \tag{6}$$

Обозначим

$$f(0, 0, 0, u) = a(u), \quad g(0, 0, 0, u) = b(u), \quad h(0, 0, 0, u) = c(u), \quad e(0, 0, 0, u) = d(u).$$

Положим в (6) $\bar{z} = \bar{\zeta} = \bar{\eta} = 0$, получим соотношение, из которого сразу находим

$$e(z, \zeta, \eta, u) = d(u) + 2iz\bar{a}(u) + 2iz^2\bar{b}(u) + 2iz^3\bar{c}(u) + 4iz^4(\bar{r}_2\bar{c}(u) + \bar{r}_1\bar{b}(u)) + 2i\bar{s}_4z^5\bar{c}(u), \quad (7)$$

причем $d(u)$ – вещественна.

Обозначим

$$\begin{aligned} f'_z(0, 0, 0, u) &= k_1(u), \quad g'_z(0, 0, 0, u) = k_2(u), \quad h'_z(0, 0, 0, u) = k_3(u), \\ f'_\zeta(0, 0, 0, u) &= m_1(u), \quad g'_\zeta(0, 0, 0, u) = m_2(u), \quad h'_\zeta(0, 0, 0, u) = m_3(u), \\ f'_\eta(0, 0, 0, u) &= n_1(u), \quad g'_\eta(0, 0, 0, u) = n_2(u), \quad h'_\eta(0, 0, 0, u) = n_3(u). \end{aligned}$$

Подставляем полученное значение e в L (обозначение L сохраняем). Подставим $\bar{z} = \bar{\zeta} = \bar{\eta} = 0$ в $L_{\bar{z}}, L_{\bar{\zeta}}, L_{\bar{\eta}}$, получаем

$$\begin{aligned} & 2z^2\bar{k}_2(u) + 2z^3\bar{k}_3(u) + 10\eta^4s_8h(z, \zeta, \eta, u) + 24\bar{c}(u)\zeta^2z^2 + \\ & 2z^5\bar{s}_4\bar{k}_3(u) + 8h(z, \zeta, \eta, u)\eta^3\bar{r}_4 + 4z^4\bar{r}_2\bar{k}_3(u) + 2\bar{c}(u)z^4\bar{s}_3 + \\ & 4z^4\bar{r}_1\bar{k}_2(u) - 2a(u) + 2z\bar{k}_1(u) + 8\zeta^2\bar{b}(u) + 4\zeta\bar{a}(u) - \\ & 2d'(u)z + 2f(z, \zeta, \eta, u) + 12\zeta z^2\bar{c}(u) - 4iz^2a'(u) - \\ & (4i)z^4\bar{c}'(u) - 4iz^3\bar{b}'(u) + 4h(z, \zeta, \eta, u)\zeta^2\eta r_3 + 16\bar{c}(u)\zeta z^3\bar{r}_2 - \\ & 8iz^5\bar{r}_2\bar{c}'(u) - 8i\bar{r}_1z^5\bar{b}'(u) - 4i\bar{s}_4z^6\bar{c}'(u) + 4\zeta^2\eta r_3g(z, \zeta, \eta, u) = 0 \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{aligned} & 16h(z, \zeta, \eta, u)\eta^3zr_4 - 4iz^5\bar{c}'(u) - 2iz^7\bar{s}_4\bar{c}'(u) - 4iz^6\bar{r}_1\bar{b}'(u) + \\ & 2z^2\bar{m}_2(u) + 2z^3\bar{m}_3(u) + 2z\bar{m}_1(u) - 2z^2e'(u) + \\ & 4zf(z, \zeta, \eta, u) + 8h(z, \zeta, \eta, u)\zeta^2\eta zr_3 + 2\bar{c}(u)z^4\bar{s}_6 + 24\bar{c}(u)\zeta z^3 - \\ & 4iz^4\bar{b}'(u) - 4iz^3a'(u) - 8iz^6\bar{r}_2\bar{c}'(u) + 4z^4\bar{r}_2\bar{m}_3(u) + 2z^5\bar{s}_4\bar{m}_3(u) + \\ & 8\zeta z\bar{a}(u) + 16\zeta z\bar{b}(u) + 4z^4\bar{r}_1\bar{m}_2(u) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 4z^4\bar{r}_1\bar{n}_2(u) + 4z^4\bar{s}_7\bar{c}(u) + 2z^5\bar{s}_4\bar{n}_3(u) + 6z^2f(z, \zeta, \eta, u) + \\ & 4z^4\bar{r}_2\bar{n}_3(u) - 4iz^5\bar{b}'(u) - 4iz^4a'(u) - 4iz^7\bar{r}_2\bar{c}(u) - \\ & 2z^3e'(u) - 4iz^7\bar{r}_1\bar{b}'(u) - 2iz^8\bar{s}_4\bar{c}'(u) - 4iz^6\bar{c}'(u) + \\ & 2z\bar{n}_1(u) + 2z^2\bar{n}_2(u) + 2z^3\bar{n}_3(u) = 0. \end{aligned}$$

Из третьего соотношения (8) следует, что $n_1(u) = 0$ и что

$$\begin{aligned} 3 f(z, \zeta, \eta, u) = & -\bar{n}_2(u) + z(e'(u) - \bar{n}_3(u)) + \\ & 2 z^2 (-\bar{r}_1 \bar{n}_2(u) - \bar{s}_7 \bar{c}(u) - \bar{r}_2 \bar{n}_3(u) + i \bar{a}'(u)) + \\ & z^3 (2 i \bar{b}'(u) - \bar{s}_4 \bar{n}_3(u)) + 2 i z^4 \bar{c}'(u) \\ & + 2 i z^5 (\bar{r}_2 \bar{c}'(u) + \bar{r}_1 \bar{b}'(u)) + i z^6 \bar{s}_4 \bar{c}'(u). \end{aligned} \quad (9)$$

Подставляя полученное значение f в первое и второе из соотношений (8) и выделяя старшую компоненту по η , получаем, что

$$\begin{aligned} 2 r_3 \zeta^2 g(z, \zeta, \eta, u) + (2 r_3 \zeta^2 + 5 s_8 \eta^2) h(z, \zeta, \eta, u) = 0, \\ (r_3 \zeta^2 + 2 r_4 \eta^2) h(z, \zeta, \eta, u) = 0. \end{aligned} \quad (10)$$

Оставшиеся после выполнения (10) условия, обеспечивающие выполнение (8), сводятся к следующей системе соотношений

$$\begin{aligned} a = b = c = n_1 = n_2 = k_3 = 0, \\ d' = -2 \operatorname{Re} n_3, \quad k_2 = \frac{2}{3} r_2 n_3, \quad m_2 = \frac{1}{3} (n_3 - \bar{n}_3), \quad m_3 = \frac{4}{3} r_2 n_3, \\ r_1 r_2 n_3 = 0, \quad s_4 n_3 = 0, \quad (r_1 - s_4 + 4 r_2^2) n_3 = r_1 \bar{n}_3. \end{aligned} \quad (11)$$

Отметим, что при этом

$$e(z, \zeta, \eta, u) = d(u), \quad f(z, \zeta, \eta, u) = \frac{d'(u) - \bar{n}_3(u)}{3} z - \frac{2}{3} \bar{r}_2 \bar{n}_3(u) z^2 - \frac{\bar{s}_4 \bar{n}_3(u)}{3} z^4.$$

Рассмотрим несколько случаев.

Случай 1: Пусть $r_3 \neq 0$, тогда из (10) сразу следует, что $g = h = 0$. Оставшиеся соотношения позволяют заключить, что $f = 0$ и что d - это вещественная константа. Итак, в этом случае $\operatorname{Ker} L = V^0 = \{(0, 0, 0, d_0)\}$, причём $d_0 \in \mathbf{R}$.

Случай 2: Пусть $r_3 = 0$. Пусть $(r_4, s_8) \neq 0$, (*случай 2.1*), тогда из (10) следует, что $h = 0$. Возвращаясь к соотношениям (8), получаем $n_3 = n_2 = d' = 0$. Откуда $f = 0$, а e - вещественная константа. Обозначим $g''_{zz}(0, 0, 0, u)$ через $k_{22}(u)$. Вычисляя теперь $L''_{\bar{z}\bar{z}}$ при $\bar{z} = \bar{\zeta} = \bar{\eta} = 0$, получаем

$$g(z, \zeta, \eta, u) = 2 i z^5 \bar{r}_1 \bar{k}'_2(u) - z^4 \bar{r}_1 \bar{k}_{22}(u) + i z^3 \bar{k}'_2(u) - (1/2) z^2 \bar{k}_{22}(u) - 4 \zeta^2 \bar{k}_2(u).$$

Подставляя это значение g в L и приравнивая к нулю коэффициенты при $z^2 \bar{\zeta}^2$ и $z^2 \bar{z} |\zeta|^2$, получаем, что $k_2 = k_{22} = 0$, т.е. $g = 0$. Т.е. $\operatorname{Ker} L = V^0$.

Пусть $r_4 = s_8 = 0$, (случай 2.2). Обозначим

$$h''_{zz}(0, 0, 0, u) = k_{32}(u), \quad h'''_{zzz}(0, 0, 0, u) = k_{33}(u).$$

Вычисляя $L''_{\bar{z}\bar{z}}$ при $\bar{z} = \bar{\zeta} = \bar{\eta} = 0$, как и ранее, получаем выражение для g , вычисляя $L'''_{\bar{z}\bar{z}\bar{z}}$ при $\bar{z} = \bar{\zeta} = \bar{\eta} = 0$, получаем выражение для h . После чего анализ младших коэффициентов L даёт $n_3 = d' = k_2 = k_{22} = k_{32} = k_{33} = 0$, откуда получаем $f = g = h = 0$, e - вещественная константа. Т.е. $\text{Ker } L = V^0$.

Таким образом нами доказана следующая лемма.

Лемма 4: Если $L(\phi) = 0$, то $\phi = (0, 0, 0, d_0)$, где d_0 - вещественная постоянная. В частности, на пространстве V_5 ядро тривиально.

Выясним, как устроены младшие струи отображения Γ на $\tilde{\Gamma}$, сохраняющего ноль на месте. Выделяя компоненты (4) веса один и два, сразу получаем, что

$$e_1 = 0, \quad e_2 = |\lambda|^2 w, \quad f_1 = \lambda z, \quad \lambda \in \mathbf{C}^*.$$

Пусть, далее,

$$e_3 = |\lambda|^2 (d_3 + d_1 w), \quad f_2 = \lambda (a w + a_2), \quad g_1 = b_1,$$

где d_3, d_1, a_2, b_1 - однородные голоморфные формы от (z, ζ, η) соответствующих степеней, a - постоянная. Третья весовая компонента (4) имеет вид

$$\begin{aligned} & |\lambda|^2 \text{Im}[i 2 \text{Re}(z^2 \bar{\zeta} + d_1(z, \zeta, \eta)(u + i|z|^2))] = \\ & |\lambda|^2 2 \text{Re}[(a(u + i|z|^2) + a_2(z, \zeta, \eta)) \bar{z}] + 2 \text{Re}[\lambda^2 z^2 \bar{b}_1(\bar{z}, \bar{\zeta}, \bar{\eta})]. \end{aligned}$$

Выделяя члены, линейные по u , получаем $d_1 = 2i\bar{a}z$. Теперь среди членов бистепени $(2, 1)$ выпишем по отдельности компоненты, линейные по \bar{z} , по $\bar{\zeta}$ и по $\bar{\eta}$. Получим

$$a_2(z, \zeta, \eta) = (2i\bar{a} - \frac{\lambda}{\bar{\lambda}} \bar{b}_1^1) z^2, \quad b_1^2 = \frac{\lambda}{\bar{\lambda}}, \quad b_1^3 = 0,$$

где $b_1 = b_1^1 z + b_1^2 \zeta + b_1^3 \eta$. Здесь и далее верхними индексами указываем на связь коэффициентов и переменных. Пусть $b_1^1 = \alpha \lambda / \bar{\lambda}$, получаем

$$e_3 = 2i|\lambda|^2 \bar{a} z w, \quad f_2 = \lambda (a w + (2i\bar{a} - \bar{\alpha}) z^2), \quad g_1 = \frac{\lambda}{\bar{\lambda}} (\alpha z + \zeta).$$

Пусть, далее,

$$e_4 = |\lambda|^2 (d_4 + d_2 w + d_0 w^2), \quad f_3 = \lambda (a_3 + a_1 w),$$

$$g_2 = \frac{\lambda}{\lambda} (b_2 + b_0 w), \quad h_1 = \frac{\lambda}{\lambda^2} c_1,$$

где коэффициенты – это голоморфные однородные формы от (z, ζ, η) соответствующих степеней. Выпишем компоненту (4) веса четыре (общий множитель $|\lambda|^2$ убираем).

$$\begin{aligned} & \operatorname{Im}[d_4(z, \zeta, \eta) + d_2(z, \zeta, \eta) (u + i |z|^2) + d_0 (u^2 + 2i |z|^2 u - |z|^4) + \\ & \quad - 2\bar{a} z (z^2 \bar{\zeta} + \bar{z}^2 \zeta) + i (z^3 \bar{\eta} + \bar{z}^3 \eta) + 4 |z|^2 |\zeta|^2] = \\ & \quad 2 \operatorname{Re}[(a_3(z, \zeta, \eta) + a_1(z, \zeta, \eta) (u + i |z|^2)) \bar{z}] + (12) \\ & \quad |a|^2 (u^2 + |z|^4) - 2 \operatorname{Re}[(a (u + i |z|^2) (2i a + \alpha) \bar{z}^2)] + |2i a + \alpha|^2 |z|^4 + \\ & \quad 2 \operatorname{Re}[a (2i \operatorname{Re}(z^2 \bar{\zeta}))] + 2 \operatorname{Re}[2 (a (u + i |z|^2) + (2i \bar{a} - \bar{\alpha}) z^2) z (\bar{\alpha} \bar{z} + \bar{\zeta})] + \\ & \quad 2 \operatorname{Re}[(b_2(z, \zeta, \eta) + b_0 (u + i |z|^2)) \bar{z}^2] + 2 \operatorname{Re}[c_1(z, \zeta, \eta) \bar{z}^3] + 4 |z|^2 |\alpha z + \zeta|^2. \end{aligned}$$

Отделяя в (12) коэффициент при u^2 , получаем $\operatorname{Im} d_0 = |a|^2$. Положим $d_0 = \gamma + i |a|^2$. Отделяя в (12) коэффициент при u , получаем

$$\begin{aligned} & \operatorname{Im}[d_2(z, \zeta, \eta)] + |a|^2 |z|^2 = 2 \operatorname{Re}[a_1(z, \zeta, \eta) \bar{z}] - \\ & \quad 2 \operatorname{Re}[a (2i a + \alpha) \bar{z}^2] + 2 \operatorname{Re}[a z (\bar{\alpha} \bar{z} + \bar{\zeta})] + 2 \operatorname{Re}[b_0 \bar{z}^2] \end{aligned}$$

Откуда получаем

$$\begin{aligned} d_2 &= (2i \bar{a}^2 - \bar{a} \bar{\alpha} + \bar{\beta}) z^2, \\ a_1 &= ((|a|^2 - 2 \operatorname{Re}(a \bar{\alpha})) + i \delta) z + \bar{a} \zeta, \end{aligned}$$

где $\beta = b_0$, $\delta = \operatorname{Im} a_1^1$. Компонента бистепени $(4, 0)$ сразу дает $d_4 = 0$. В бистепени $(3, 1)$ получаем

$$\begin{aligned} & i d_2(z, \zeta, \eta) |z|^2 - \bar{a} z^3 \bar{\zeta} + z^3 \bar{\zeta} = a_3(z, \zeta, \eta) \bar{z} + \\ & \quad i \bar{a} (-2i \bar{a} + \bar{\alpha}) z^3 \bar{z} - i \bar{\beta} z^3 \bar{z} + z^3 \overline{c_1(z, \zeta, \eta)}. \end{aligned}$$

Откуда получаем

$$\begin{aligned} a_3 &= (-4 \bar{a}^2 - 2i \bar{a} \bar{\alpha} + 2 \bar{\beta} - \bar{\nu}) z^3, \\ c_1 &= \nu z - a \zeta + \eta, \end{aligned}$$

где $\nu = c_1^1$. В бистепени $(2, 2)$ имеем

$$2 \operatorname{Re}[-i \bar{a} z \zeta \bar{z}^2 + i a_1 z \bar{z}^2 + 2 i a z^2 \bar{z} (\bar{\alpha} \bar{z} + \bar{\zeta}) + b_2 \bar{z}^2 + 4 \alpha z^2 \bar{z} \bar{\zeta}] + (|a|^2 + 4 |\alpha|^2 + |2 i a + \alpha|^2) |z|^4 = 0.$$

Откуда получаем

$$b_2 = (\delta - 2 |\alpha|^2 - \frac{|a|^2}{2} - \frac{1}{2} |2 i a + \alpha|^2 - 2 \operatorname{Re}(i a \bar{\alpha} + i \kappa)) z^2 + (i a + 2 \alpha) z \zeta, \\ c_1 = \nu z - a \zeta + \eta,$$

где $\kappa = \operatorname{Im} b_2^{11}$.

Итак, нами доказана следующая лемма.

Лемма 5:(а) Всякое локально обратимое отображение Γ на $\tilde{\Gamma}$, сохраняющее начало координат, представимо в виде композиции отображения вида

$$z \rightarrow \lambda (z + a w + (2 i \bar{a} - \bar{\alpha}) z^2 + (-4 \bar{a}^2 + 2 i \bar{a} \bar{\alpha} + 2 \bar{\beta} - \bar{\nu}) z^3 + ((|a|^2 - 2 \operatorname{Re}(a \bar{\alpha}) + i \delta) z + \bar{a} \zeta) w), \\ \zeta \rightarrow \frac{\lambda}{\lambda} (\zeta + \alpha z + \tau z^2 + (i a + 2 \alpha) z \zeta + \beta w), \\ \eta \rightarrow \frac{\lambda}{\lambda^2} (\eta + \nu z - a \zeta), \\ w \rightarrow |\lambda|^2 (w + 2 i \bar{a} z w + (2 i \bar{a}^2 - \bar{a} \bar{\alpha} + \bar{\beta}) z^2 w + (\gamma + i |a|^2) w^2), \\ \text{где } \tau = (\delta - 2 |\alpha|^2 - \frac{|a|^2}{2} - \frac{1}{2} |2 i a + \alpha|^2 - 2 \operatorname{Re}(i a \bar{\alpha} + i \kappa))$$

и отображения

$$z \rightarrow z + O(4), \quad \zeta \rightarrow \zeta + O(3), \quad \eta \rightarrow \eta + O(2), \quad w \rightarrow w + O(5).$$

(b) Причём

$$\lambda \in \mathbf{C}^*, \quad a, \alpha, \beta, \nu \in \mathbf{C}, \quad \gamma, \delta, \kappa \in \mathbf{R}.$$

Что дает 13 вещественных параметров.

(с) Такое отображение однозначно определяется заданием 3-струи в начале координат.

Теперь мы готовы доказать следующее утверждение.

Утверждение 6: Если Γ – вещественно аналитическая гиперповерхность пространства \mathbf{C}^4 , которая в точке общего положения является 3-невырожденной, то размерность группы локальных голоморфных автоморфизмов в любой точке не превосходит 20.

Доказательство: Размерность группы в произвольной точке не превосходит суммы размерности гиперповерхности и размерности стабилизатора в точке общего положения. Размерность гиперповерхности равна 7. Размерность стабилизатора, в силу теоремы 1 и лемм 2,3,4 и 5 не превосходит 13. Поскольку $7 + 13 = 20$, утверждение доказано.

Общие 2-невырожденные гиперповерхности

Обозначим координаты в \mathbf{C}^4 через $(z = (z_1, z_2), \zeta, w = u + iv)$ и перейдем к рассмотрению 2-невырожденного случая. Так же как и выше, мы можем ограничиться "жесткими" гиперповерхностями. Пусть Γ – равномерно 2-невырождена в окрестности $\xi \in \Gamma$. Форма Леви равномерно 2-невырожденной гиперповерхности повсюду имеет минимальное вырождение, а именно, ее ранг равен 2. Таким образом мы можем записать локальное уравнение Γ в виде

$$v = \langle z, \bar{z} \rangle + F_3(z, \bar{z}, \zeta, \bar{\zeta}) + F_4(z, \bar{z}, \zeta, \bar{\zeta}) + \dots \quad (13)$$

где F_j – однородный вещественный полином степени j , а $\langle z, \bar{z} \rangle$ – невырожденная эрмитова форма от переменного $z \in \mathbf{C}^2$. Простыми треугольно-полиномиальными заменами переменных z и w можно добиться того, что правая часть уравнения Γ

$$F = \langle z, \bar{z} \rangle + F_3 + F_4 + \dots$$

не будет содержать плюригармонических слагаемых (т.е. слагаемых бистепеней $(m, 0)$ и $(0, m)$) и слагаемых, линейно зависящих от z и \bar{z} , за исключением формы $\langle z, \bar{z} \rangle$. Выпишем слагаемые, которые после этого останутся в F_3 и F_4 . Имеем

$$\begin{aligned} F_3 &= 2 \operatorname{Re}(K(z, z) \bar{\zeta} + A_1(z) |\zeta|^2 + A_2 \zeta^2 \bar{\zeta}), \\ F_4 &= 2 \operatorname{Re}((P(z, z, \bar{z}) + Q(z, z, z)) \bar{\zeta} + R(z, z) \bar{\zeta}^2) + S(z, \bar{z}) |\zeta|^2 + T(z, z, \bar{z}, \bar{z}) + \\ &\quad 2 \operatorname{Re}(B_1(z, z) |\zeta|^2 + B_2(z) \zeta^2 \bar{\zeta} + B_3(z) \zeta \bar{\zeta}^2). \end{aligned} \quad (14)$$

Отметим, что из условия 2-невыврожденности Γ следует, что форма $K(z, z)$ не равна нулю тождественно. Для дальнейших вычислений нам потребуется приведение пары форм $(\langle z, \bar{z} \rangle, K(z, z))$ на \mathbf{C}^2 комплексно линейными заменами к виду, содержащему минимум параметров. Имеет место следующая классификация.

Лемма 7: Пусть $\langle z, \bar{z} \rangle$ невырождена, а $K(z, z)$ отлична от тождественного нуля, тогда невырожденным комплексно линейным преобразованием можно привести эту пару к одной из следующего списка:

- (1.) $(|z_1|^2 + |z_2|^2, k z_1^2 + m z_2^2), \quad k, m > 0, k \neq m,$
- (2.) $(|z_1|^2 + |z_2|^2, k(z_1^2 + z_2^2)), \quad k > 0,$
- (3.) $(|z_1|^2 + |z_2|^2, k z_1^2), \quad k > 0,$
- (4.) $(|z_1|^2 - |z_2|^2, k z_1^2 + m z_2^2), \quad k, m > 0, k \neq m,$
- (5.) $(|z_1|^2 - |z_2|^2, k(z_1^2 + z_2^2)), \quad k > 0,$
- (6.) $(|z_1|^2 - |z_2|^2, k z_1^2), \quad k > 0,$
- (7.) $(2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2), z_1^2 + m z_2^2), \quad m \notin \mathbf{R},$
- (8.) $(2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2), z_1^2 + m z_2^2), \quad m \in \mathbf{R}^*,$
- (9.) $(2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2), z_1^2).$

Доказательство: Пусть $\langle z, \bar{z} \rangle$ положительно определена и ν – собственный вектор оператора, заданного матрицей

$$\begin{bmatrix} k & l \\ l & m \end{bmatrix}.$$

Выбирая в качестве первого вектора нового базиса вектор

$$\frac{\nu}{\sqrt{\langle \nu, \bar{\nu} \rangle}}$$

и, подбирая второй из условия ортонормированности, получаем в зависимости от ранга K пары (1.), (2.) и (3.). Положительности параметров k и m можно добиться поворотами в плоскостях z_1 и z_2 .

Пусть $\langle z, \bar{z} \rangle$ – имеет сигнатуру $(1, 1)$. Если оператор имеет собственный вектор ν , т.ч. $\langle \nu, \bar{\nu} \rangle \neq 0$, то годится то же самое рассуждение и

это дает пары (4.), (5.) и (6.).

Пусть (e_1, e_2) – базис \mathbf{C}^2 , в котором $K(z, z)$ – диагональна, т.е. $K(z, z) = k z_1^2 + m z_2^2$ причем $\langle e_1, \bar{e}_1 \rangle = \langle e_2, \bar{e}_2 \rangle = 0$. Тогда если $z = z_1 e_1 + z_2 e_2$, то

$$\langle z, \bar{z} \rangle = 2 \operatorname{Re}(\langle e_1, \bar{e}_2 \rangle z_1 \bar{z}_2).$$

После растяжения по z_1 эрмитова форма принимает вид $\langle z, \bar{z} \rangle = 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$. Используя преобразование

$$z_1 \rightarrow \lambda z_1, \quad z_2 \rightarrow \frac{z_2}{\lambda}, \quad \lambda \in \mathbf{C}^*,$$

которое не меняет эрмитовой формы получаем пары (7.), (8.) и (9.). Лемма доказана.

Лемма 8: Если форма Леви гиперповерхности Γ , заданной уравнением (13), тождественно вырождена, то F_3 и F_4 можно записать в виде (14), причем $A_1 = A_2 = B_1 = B_2 = B_3 = 0$, а форма S в зависимости от номера пары из леммы 2 имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} (1.) S &= 4(k^2 |z_1|^2 + m^2 |z_2|^2), \quad (2.) S = 4k^2(|z_1|^2 + |z_2|^2), \quad (3.) S = 4k^2 |z_1|^2, \\ (4.) S &= 4(k^2 |z_1|^2 - m^2 |z_2|^2), \quad (5.) S = 4k^2(|z_1|^2 - |z_2|^2), \quad (6.) S = 4k^2 |z_1|^2, \\ (7.) S &= 4(\bar{m} z_1 \bar{z}_2 + m z_2 \bar{z}_1), \quad (8.) S = 4m(z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1), \quad (9.) S = 0. \end{aligned}$$

Доказательство: Вычисляя определитель матрицы комплексного гессиана по переменным (z_1, z_2, ζ) и отделяя в нем компоненты степени один, получаем, что $A_1 = A_2 = 0$. Отделяя, далее, компоненты степени два, получаем, что $B_1 = B_2 = B_3 = 0$ и указанный вид формы S . Лемма доказана.

Теперь можем написать

$$\begin{aligned} F_3 &= 2 \operatorname{Re}[K(z, z) \bar{\zeta}], \\ F_4 &= 2 \operatorname{Re}[(P(z, z, \bar{z}) + Q(z, z, z)) \bar{\zeta} + R(z, z) \bar{\zeta}^2] + S(z, \bar{z}) |\zeta|^2 + T(z, z, \bar{z}, \bar{z}). \end{aligned}$$

т.е. уравнение гиперповерхности имеет вид

$$v = \langle z, \bar{z} \rangle + 2 \operatorname{Re}[K(z, z) \bar{\zeta}] + 2 \operatorname{Re}[(P(z, z, \bar{z}) + Q(z, z, z)) \bar{\zeta} + R(z, z) \bar{\zeta}^2] + S(z, \bar{z}) |\zeta|^2 + T(z, z, \bar{z}, \bar{z}) + O(5). \quad (15)$$

Введем в пространстве степенных рядов от $(z, \bar{z}, \zeta, \bar{\zeta}, u)$, а также от $(z, \bar{z}, \zeta, \bar{\zeta}, w, \bar{w})$, градуировку, назначая веса переменным

$$[z] = [\bar{z}] = [\zeta] = [\bar{\zeta}] = 1, [w] = [\bar{w}] = [u] = 2.$$

Пусть Γ и $\tilde{\Gamma}$ – гиперповерхности, заданные уравнениями

$$\begin{aligned} v = \langle z, \bar{z} \rangle + 2 \operatorname{Re}(K(z, z) \bar{\zeta}) + O(4), \\ v = \langle z, \bar{z} \rangle + 2 \operatorname{Re}(\tilde{K}(z, z) \bar{\zeta}) + O(4) \end{aligned} \quad (16)$$

и

$$\phi = (z \rightarrow f = f_1 + f_2 + O(3), \zeta \rightarrow g = g_1 + O(2), w \rightarrow h = h_1 + h_2 + h_3 + O(4))$$

– локально обратимое голоморфное отображение первой на вторую, оставляющее начало координат на месте. Причем компоненты координат отображения – это компоненты фиксированного веса и $O(j)$ – это сумма слагаемых веса не ниже j .

То, что это отображение переводит Γ в $\tilde{\Gamma}$, аналитически можно записать в виде следующего соотношения

$$\begin{aligned} \Theta = -2 \operatorname{Im} h + 2 \langle f, \bar{f} \rangle + 4 \operatorname{Re}(\tilde{K}(f, f) \bar{g}) + \tilde{F}_4 + \dots \\ \text{при } w = u + i(\langle z, \bar{z} \rangle + 2 \operatorname{Re}(K(z, z) \bar{\zeta}) + F_4 + O(5)). \end{aligned} \quad (17)$$

Отделяя в этом соотношении компоненту веса 1, получаем $h_1 = A(z) + B\zeta = 0$.

Пусть $h_2 = \Phi_2(z, \zeta) + \rho w$, $f_1 = Cz + d\zeta$, где Φ_2 – форма степени два от (z, ζ) . Отделяя в (17) компоненту веса 2, получаем $\Phi_2(z, \zeta) = 0$, $\langle Cz, \overline{Cz} \rangle = \rho \langle z, \bar{z} \rangle$. Т.е. $f_1 = Cz$, $h_2 = \rho w$. Отметим, что в силу обратимости отображения матрица C – невырождена и $\rho \neq 0$.

Пусть, далее,

$$\begin{aligned} h_3 = \rho(\Phi_3 + (A(z) + B\zeta)w), \quad f_2 = C(aw + b(z, z) + c(z)\zeta + d\zeta^2), \\ g_1 = \langle z, \bar{\alpha} \rangle + \beta\zeta, \end{aligned}$$

где Φ_3 – форма степени три от (z, ζ) . Тогда, отделяя в (17) компоненту веса 3, получаем

$$\begin{aligned} h_3 = 2i\rho \langle z, \bar{\alpha} \rangle w, \quad f_2 = C(aw + 2i \langle z, \bar{\alpha} \rangle z - K(z, z)\mu), \\ g_1 = \langle z, \bar{\alpha} \rangle + \beta\zeta, \end{aligned}$$

причем в силу обратимости отображения $\beta \neq 0$.

Из наших вычислений видно, что при определении весовой j -струи удобно принять следующую точку зрения.

$$\phi = \sum \phi_j, \quad \phi_j = (f_{j-1}, g_{j-2}, h_j)$$

Т.е. весовая j -струя отображения понимается как набор струй координат, где у h берем j -ю весовую струю, у $f - (j - 1)$ -ю, у g берем $(j - 2)$ -ю. Проведенное выше вычисление дает описание действия голоморфных отображений на 3-струю уравнения гиперповерхности вида (16).

Лемма 9:

(а) На совокупности весовых 3-струй 2-невырожденных гиперповерхностей вида (16) псевдогруппа локально обратимых голоморфных отображений, сохраняющих начало координат, действует следующим образом:

$$\begin{aligned} z &\rightarrow C(z + aw + 2i \langle z, \bar{a} \rangle z - K(z, z) \alpha) + O(3), \\ \zeta &\rightarrow \langle z, \bar{\alpha} \rangle + \beta \zeta + O(2), \\ w &\rightarrow \rho(w + 2i \langle z, \bar{a} \rangle w) + O(4), \end{aligned}$$

причем $C \in \text{GL}(2, \mathbf{C})$, $\rho \in \mathbf{R}^*$, $a, \alpha \in \mathbf{C}^2$, $\beta \in \mathbf{C}^*$, а также

$$\langle z, \bar{z} \rangle = \rho \langle C^{-1}z, \overline{C^{-1}z} \rangle, \quad \tilde{K}(z, z) = \frac{\rho}{\beta} K(C^{-1}z, C^{-1}z) \quad (18)$$

(б) Любое обратимое голоморфное отображение Γ на $\tilde{\Gamma}$, сохраняющее начало координат, с точностью до этого действия имеет вид

$$z \rightarrow z + O(3), \quad \zeta \rightarrow \zeta + O(2), \quad w \rightarrow w + O(4). \quad (19)$$

Пусть речь идет об отображении гиперповерхности Γ на себя. Тогда рассмотрим подгруппу группы автоморфизмов Γ , состоящую из линейных автоморфизмов вида

$$\begin{aligned} G_0 = \{ &(z \rightarrow Cz, \zeta \rightarrow \beta \zeta, w \rightarrow \rho w) \} \text{ с условием} \\ &\langle Cz, \overline{Cz} \rangle = \rho \langle z, \bar{z} \rangle, \quad K(Cz, Cz) = \frac{\rho}{\beta} K(z, z). \end{aligned} \quad (20)$$

Вычислим размерность этой группы для каждой из шести пар форм, перечисленных в лемме 8.

Лемма 10: Пусть G_0^j – это группа G_0 для j -й пары из списка леммы 8. Тогда

$$\dim G_0^1 = 2, \dim G_0^2 = 3, \dim G_0^3 = 3, \dim G_0^4 = 2, \dim G_0^5 = 3, \\ \dim G_0^6 = 3, \dim G_0^7 = 3, \dim G_0^8 = 3, \dim G_0^9 = 3,$$

т.е. в любом случае $\dim G_0 \leq 3$.

Доказательство: Пары (1.), (2.), (3.). $\langle z, \bar{z} \rangle = |z_1|^2 + |z_2|^2$, тогда $C = \lambda U$, $\rho = |\lambda|^2$, где $U \in SU(2)$, а $\lambda \in \mathbf{C}^*$. Записывая U в виде

$$\begin{bmatrix} p & q \\ -\bar{q} & \bar{p} \end{bmatrix}, \quad \text{где } |p|^2 + |q|^2 = 1.$$

и подставляя это во второе соотношение, получаем, что

$$(k p^2 + m \bar{q}^2, -4 i \operatorname{Im} p q, k q^2 + m \bar{p}^2) = \frac{|\lambda|^2}{\beta} (k, 0, m).$$

Откуда $\operatorname{Im} p q = 0$, т.е. $q = \sigma \bar{p}$, где σ вещественно, при этом $|p|^2 (1 + \sigma^2) = 1$. Пусть $p = \exp(i \phi) / \sqrt{1 + \sigma^2}$, тогда имеем

$$\exp(4 i \phi) = \frac{k \sigma^2 + m}{k + m \sigma^2} \frac{k}{m}.$$

Откуда следует, что для U из малой окрестности единицы $\phi = 0$. Далее имеем: либо $k = m$, либо $\sigma = 0$. Так же получаем ответ для третьей пары. Для пары (1.) свободный параметр – это λ , для (2.) – (λ, σ) , для (3.) – (λ, ϕ) .

Пары (4.), (5.), (6.) Рассматриваются вполне аналогично с учетом того, что U – псевдоунитарная матрица вида

$$\begin{bmatrix} p & q \\ \bar{q} & \bar{p} \end{bmatrix}, \quad \text{где } |p|^2 - |q|^2 = 1.$$

Свободные параметры – те же.

Пары (7.), (8.), (9.). Для этой эрмитовой формы псевдоунитарная матрица с единичным определителем, близкая к единичной, имеет вид

$$\begin{bmatrix} p & i \sigma p \\ \frac{i r}{(1+r\sigma)p} & \frac{1}{(1+r\sigma)p} \end{bmatrix}, \quad \text{где } r, \sigma \in \mathbf{R}, p > 0.$$

Откуда получаем значения размерностей. Для пары (7.) свободные параметры – это (λ, p) , для (8.) – (λ, r) , для (9.) – (λ, p) . Лемма доказана.

Зафиксируем гиперповерхности Γ и $\tilde{\Gamma}$ вида (16) и дадим оценку числа параметров, от которых зависит отображение одной на другую вида (19) в соответствии со схемой рекурсии глубины $k = 2$ (теорема 1). С этой целью опишем вид μ -й компоненты соотношения (17). При этом явно выпишем слагаемые, зависящие от ϕ_μ и $\phi_{\mu-1}$, игнорируя члены, зависящие от ϕ_ν при $\nu \leq \mu - 2$. Пусть $f = (f^1, f^2)$. Введем также следующее обозначение: $\Delta \psi(u) = 2i \operatorname{Re}(K(z, z) \bar{\zeta}) \psi'(u)$.

Лемма 11: μ -я весовая компонента выражения (17) Θ_μ имеет вид

$$\begin{aligned} \Theta_\mu &= L_1(\phi_\mu) + L_2(\phi_{\mu-1}) + \theta_\mu(\phi_{\nu < \mu-1}), \quad \text{причем} \\ L_1(\phi) &= 2 \operatorname{Re}(i h + 2 \langle f, \bar{z} \rangle + 2 \bar{K}(\bar{z}, \bar{z}) g), \quad L_2(\phi) = \Delta L_1(\phi) + \\ &+ 2 \operatorname{Re}\{4 K(f, z) \bar{\zeta} + 2 (\bar{P}(\bar{z}, \bar{z}, z) + \bar{Q}(\bar{z}, \bar{z}, \bar{z}) + 2 \bar{R}(\bar{z}, \bar{z}) \zeta + S(z, \bar{z}) \bar{\zeta}) g\}, \\ &\text{где } w = u + i \langle z, \bar{z} \rangle. \end{aligned} \tag{21}$$

Отметим, что выражение $L(\phi) = L_1(\phi) + L_2(\phi)$ линейно по ϕ и не зависит от μ . Пусть V_4 – линейное пространство, состоящее из ростков формальных степенных рядов в начале координат вида

$$\Phi = \phi_4 + \phi_5 + \dots = (f_3 + f_4 + \dots, g_2 + g_3 + \dots, h_4 + h_5 + \dots)$$

В соответствии с теоремой 1 число параметров, от которых может зависеть отображение вида (19) Γ на $\tilde{\Gamma}$ не превосходит размерности $\operatorname{Ker} L$ на пространстве V_4 . Это, вместе с оценкой числа параметров в 3-струе, даст общую оценку числа параметров, от которых может зависеть отображение и, в частности, оценку размерности группы локальных автоморфизмов гиперповерхности Γ . Таким образом, для получения оценки размерности автоморфизмов 2-невырожденной гиперповерхности нам осталось дать оценку размерности $\operatorname{Ker} L$ на V_4 .

Оператор L содержит большое число произвольных постоянных. Для того, чтобы упростить работу по оценке размерности ядра применим к уравнению $L(f, g, h) = 0$ тот же самый прием, т.е. рекурсию на глубину

два, но предварительно поменяв веса основных переменных. Зададим новые веса так:

$$[z] = [\bar{z}] = 2, [\zeta] = [\bar{\zeta}] = 1, [w] = [u] = 4.$$

Если теперь, используя новое весовое разложение $\phi = (f, g, h)$, положить $\phi_\mu = (f_{\mu-2}, g_{\mu-4}, h_\mu)$, то μ -я весовая компонента $L(\phi) = 0$ имеет вид

$$\begin{aligned} L_\mu = & 2 \operatorname{Re}[i h_\mu + i \Delta(h_{\mu-1})] + \\ & 2 \operatorname{Re}[2 \langle f_{\mu-2}, \bar{z} \rangle + 2 \langle \Delta(f_{\mu-3}), \bar{z} \rangle + 4 K(f_{\mu-3}, z) \bar{\zeta}] + \\ & 2 \operatorname{Re}[2 \bar{K}(\bar{z}, \bar{z}) g_{\mu-4} + 2 \bar{K}(\bar{z}, \bar{z}) \Delta(g_{\mu-5}) + (2 \bar{R}(\bar{z}, \bar{z}) \zeta + S(z, \bar{z}) \bar{\zeta}) g_{\mu-5} + \\ & (2 \bar{P}(\bar{z}, \bar{z}, z) + \bar{Q}(\bar{z}, \bar{z}, \bar{z})) g_{\mu-6}], \quad \text{где } w = u + i \langle z, \bar{z} \rangle = 0. \end{aligned} \quad (22)$$

Лемма 12: Размерность пространства решений (22) не превосходит размерности пространства решений $\mathcal{L}(f, g, h) = 0$, где

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f, g, h) = & 2 \operatorname{Re}[i h + i \Delta(h)] + 2 \operatorname{Re}[2 \langle f, \bar{z} \rangle + 2 \langle \Delta f, \bar{z} \rangle + 4 K(f, z) \bar{\zeta}] + \\ & 2 \operatorname{Re}[2 \bar{K}(\bar{z}, \bar{z}) g + 2 \bar{K}(\bar{z}, \bar{z}) \Delta(g) + 2 \bar{R}(\bar{z}, \bar{z}) \zeta g + S(z, \bar{z}) \bar{\zeta} g], \\ & \text{где } w = u + i \langle z, \bar{z} \rangle = 0. \end{aligned} \quad (23)$$

Доказательство: Это сразу следует из теоремы 1.

Отметим при этом, что рекурсия, описанная оператором \mathcal{L} , стартует с $\mu = 5$. При этом нас интересует размерность ядра L на пространстве V_4 в старой весовой градуировке. Поэтому лемма 12 нуждается в небольшой коррекции. Пусть \tilde{V}_5 состоит из наборов (f, g, h) , где $f = \tilde{O}(3)$, $g = \tilde{O}(2)$, $h = \tilde{O}(5)$ в соответствии с новым весом. Непосредственно убеждаемся в справедливости следующей леммы.

Лемма 13: Если $\phi = (f, g, h) \in V_4 \cap \operatorname{Ker} \mathcal{L}$, то $\phi \in \tilde{V}_5$.

Доказательство: Если $\phi \in V_4$, то $\phi = \chi + \psi$, где $\psi \in \tilde{V}_5$, а $\chi = (0, 0, \gamma \zeta^4)$. Отделяя в соотношении $\mathcal{L}(\chi + \psi) = 0$ компоненту веса четыре, получаем $\mathcal{L}(\chi) = 0$. Откуда сразу следует, что $\chi = 0$.

Переходя к оценке размерности ядра оператора \mathcal{L} , отметим, что оператор зависит от параметров (k, m) , ограничения на которые содержатся в лемме 5 (допустимые значения), и от трех коэффициентов квадратичной формы $R(z, z) = r_1 z_1^2 + r_2 z_1 z_2 + r_3 z_2^2$, которые не связаны никакими

ограничениями. Также отметим, что независимо от значений параметров $\text{Ker } \mathcal{L}$ содержит двумерное подпространство (тривиальные решения), которое, впрочем, не пересекается с \tilde{V}_5 .

$$\begin{aligned} (f_1 = f_2 = g = 0, \quad h = t_1), \quad t_1 \in \mathbf{R}, \\ (f_1 = t_2 z_1, \quad f_2 = t_2 z_2, \quad g = 0, \quad h = t_2^2 w), \quad t_2 \in \mathbf{R}. \end{aligned} \quad (24)$$

Лемма 14: Пусть $\phi = (f, g, h) \in \phi \in \tilde{V}_5 \cap \text{Ker } \mathcal{L}$.

(а) Если $(k = 1, m = 0)$ (пара номер 9 из леммы 8) и $R(z, z) = r_1 z_1^2$, то

$$\begin{aligned} f_1 = i \bar{n}_1 z_1^1, \quad f_2 = 2i \bar{n}_1 z_1 z_2 - \bar{n}_2 z_1^2 + n_1 w, \\ g = \frac{n_2 z_1 - i n_1 z_2 + 2i \bar{n}_1 z_1 \zeta}{1 + 2\bar{r}_1 \zeta}, \quad h = 2i \bar{n}_1 z_1 w, \end{aligned}$$

где n_1 и n_2 – комплексные числа. Соответственно $\dim(\tilde{V}_5 \cap \text{Ker } \mathcal{L}) = 4$.

(б) Во всех остальных случаях $\phi = 0$. Соответственно $\dim(\tilde{V}_5 \cap \text{Ker } \mathcal{L}) = 0$.

Доказательство: Доказательство представляет собой рутинное, но объемное вычисление, которое осуществляется средствами компьютерной алгебры (Maple). Это вычисление проводится отдельно для пар с номерами (1,2,3,4,5,6). И отдельно для номеров (7,8,9). Для единообразного рассмотрения пар (1,2,3) и (4,5,6) вводится параметр $\varepsilon = \pm 1$, учитывающий сигнатуру формы Леви. Введем также обозначения

$$\begin{aligned} (f_1(0, 0, 0, u), f_2(0, 0, 0, u)) &= (a_1(u), a_2(u)) = a(u), \\ g(0, 0, 0, u) &= b(u), \quad h(0, 0, 0, u) = c(u), \\ \frac{\partial f_1}{\partial z_1}(0, 0, 0, u) &= a_{11}(u), \quad \frac{\partial f_2}{\partial z_1}(0, 0, 0, u) = a_{21}(u), \\ \frac{\partial f_1}{\partial z_2}(0, 0, 0, u) &= a_{12}(u), \quad \frac{\partial f_2}{\partial z_2}(0, 0, 0, u) = a_{22}(u), \\ \frac{\partial g}{\partial z_1}(0, 0, 0, u) &= b_1(u), \quad \frac{\partial g}{\partial z_2}(0, 0, 0, u) = b_2(u), \quad \frac{\partial^2 g}{\partial z_1^2}(0, 0, 0, u) = B(u). \end{aligned}$$

Схема вычисления в первом и втором случаях отличается мелкими деталями. Опишем её на примере второго случая – пар (7,8,9). *Шаг первый.* Положим в соотношении

$$\mathcal{L}(f_1, f_2, g, h) = 0 \quad (25)$$

$\bar{z} = 0, \bar{\zeta} = 0$, получим выражение $h(z_1, z_2, \zeta, u)$ через $(a_1(u), a_2(u), b(u), c(u))$. Это выражение имеет вид

$$h(z_1, z_2, \zeta, u) = \bar{c}(u) + 2i \langle z, \bar{a}(u) \rangle + 2i \bar{b}(u) K(z, z)$$

При этом, подставляя $(z = 0, \zeta = 0)$, убеждаемся, что $\bar{c}(u) = c(u)$.

Шаг второй. Подставляем полученное значение h в (25), вычисляем $\mathcal{L}'_{\bar{z}_1}$ и $\mathcal{L}'_{\bar{z}_2}$, подставляем $\bar{z} = 0, \bar{\zeta} = 0$ и из этих соотношений получаем выражения для f_1 и f_2 через $(a_1(u), a_2(u), b(u), c(u), a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})$. Они имеют вид

$$\begin{aligned} f_1 &= a_1(u) + 2i \bar{b}'(u) m z_1 z_2^2 + 2i \bar{b}'(u) z_1^3 - 4 \bar{m} z_1 \zeta \bar{b}(u) + c'(u) z_1 + \\ &\quad 2i \bar{a}'_2(u) z_1^2 + 2i \bar{a}'_1(u) z_1 z_2 - \bar{b}_2(u) m z_2^2 - 2 \zeta \bar{a}_2(u) \bar{m} - \\ &\quad \bar{b}_2(u) z_1^2 - \bar{a}_{22}(u) z_1 - \bar{a}_{12}(u) z_2, \\ f_2 &= a_2(u) + 2i \bar{b}'(u) m z_2^3 + 2i \bar{b}'(u) z_1^2 z_2 - \bar{b}_1(u) m z_2^2 - 4 m z_2 \zeta \bar{b}(u) + \\ &\quad c'(u) z_2 + 2i \bar{a}'_2(u) z_1 z_2 + 2i \bar{a}'_1(u) z_2^2 - \bar{b}_1(u) z_1^2 - \\ &\quad \bar{a}_{11}(u) z_2 - \bar{a}_{21}(u) z_1 - 2 \zeta \bar{a}_1(u). \end{aligned}$$

Подставляя $(z = 0, \zeta = 0)$, получаем

$$a_{22}(u) = c'(u) - \bar{a}_{11}(u), \quad \operatorname{Re} a_{12}(u) = \operatorname{Re} a_{21}(u) = 0.$$

Шаг третий. Подставим полученные значения f_1 и f_2 в (25), вычислим $\mathcal{L}''_{\bar{z}_1}$, подставим $\bar{z} = 0, \bar{\zeta} = 0$ и из этого соотношения получим выражение для g через $(a_1(u), a_2(u), b(u), c(u), a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, b_1(u), b_2(u), B(u))$.

$$\begin{aligned} g &= \frac{1}{2(2\bar{r}_1\zeta + 1)} (2b(u) + 4i \bar{b}'_1(u) z_2 z_1^2 - \bar{B}(u) m z_2^2 + 12i \zeta \bar{a}'_1(u) z_2 - 2c'(u) \zeta + \\ &\quad 4a_{22}(u) \zeta + 2b_1(u) z_1 - \bar{B}(u) z_1^2 + 2b_2(u) z_2 - 8\bar{b}_1(u) m \zeta z_2 - \\ &\quad 2i \bar{a}'_{12}(u) z_2 z_1 + 2i \bar{a}'_{12}(u) z_1 z_2 + 4i \bar{a}'_2(u) \zeta z_1 + 20im z_2^2 \zeta \bar{b}'(u) - 2ia_{22}(u) z_2^2 + \\ &\quad 4i \bar{b}'(u) \zeta z_1^2 + 4\bar{b}''(u) z_2^4 m + 4\bar{b}''(u) z_2^2 z_1^2 + 4\bar{a}'_2(u) z_2^2 z_1 + \\ &\quad 2i \bar{a}'_{11}(u) z_2^2 + 4i \bar{b}'_1(u) z_2^3 m + 2\bar{a}''_1(u) z_2^3) \end{aligned}$$

Подставляя $(z = 0, \zeta = 0)$, получаем $B = -\frac{1}{2} \bar{B}$, откуда следует, что $B = 0$.

Шаг четвертый. После подстановки в (25) полученного выражения для g мы получаем соотношение, которое имеет вид вещественного полинома

по $(z, \bar{z}, \zeta, \bar{\zeta})$, коэффициенты которого суть дифференциальные полиномы от введенных функций переменного u и их производных. Приравниваем к нулю все коэффициенты. Анализ полученной системы обыкновенных дифференциальных уравнений позволяет завершить доказательство леммы.

2-невырожденные гиперповерхности специального вида

В соответствии с леммой 14 нетривиальное ядро имеется только для некоторого специального класса 2-невырожденных гиперповерхностей. Т.е. таких, что в каждой своей точке они могут быть заданы уравнением вида

$$v = 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) + 2 \operatorname{Re}(z_1^2 \bar{\zeta}) + 2 \operatorname{Re}(r_1 z_1^2 \bar{\zeta}^2) + \dots$$

После замены $\zeta \rightarrow \zeta + \bar{r}_1 \zeta^2$ уравнение принимает вид

$$v = 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) + 2 \operatorname{Re}(z_1^2 \bar{\zeta}) + \text{мономы нового веса 7 и выше} \quad (26)$$

Для изучения таких гиперповерхностей нам будет удобно сделать перестановку координат и еще раз поменять веса. Пусть теперь

$$[z_1] = 2, [z_2] = [\zeta] = 1, [w] = [u] = 3.$$

Тогда гиперповерхность (взвешенная модельная поверхность) задаётся соотношением

$$Q = \{v = 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{\zeta} + z_2 \bar{\zeta}^2)\} \quad (27)$$

при таком выборе весов Q – это график квазиоднородного вещественного полинома веса 3. Это позволяет применить рекурсию на глубину один и получить исчерпывающий ответ. Отметим также, что использование взвешенных модельных поверхностей применяется достаточно давно ([6], [9], [10]) и эта техника вполне стандартна.

Подгруппа \mathcal{Q} автоморфизмов гиперповерхности Q , которая обеспечивает голоморфную однородность Q , состоит из преобразований вида

$$\begin{aligned} z_1 &\rightarrow a + z_1, & z_2 &\rightarrow b + 2\bar{a}\zeta + z_2, & \zeta &\rightarrow c + \zeta, \\ w &\rightarrow d + 2i(a\bar{b} + a^2\bar{c} + (\bar{b} + 2a\bar{c})z_1 + \bar{a}z_2 + \bar{a}^2\zeta + \bar{c}z_1^2) + w, \end{aligned} \quad (28)$$

где (a, b, c, d) – произвольная точка Q .

Пусть Γ_0 – росток гиперповерхности в начале координат вида

$$v = 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{\zeta} + z_2 \bar{\zeta}^2) + O(4), \quad (29)$$

где $O(4)$ - это слагаемые веса четыре и выше. Рассмотрим отображение $\phi = (f, g, h, e)$ этого ростка на другой росток такого же вида. Причем

$$f = z_1 + f_3 + \dots, \quad g = z_2 + g_2 + \dots, \quad h = \zeta + h_2 + \dots, \quad e = w + e_4 + \dots \quad (30)$$

(нижние индексы обозначают веса компонент). Тогда, записывая в виде аналитического соотношения тот факт, что это отображение переводит первую гиперповерхность во вторую и отделяя в нем μ -ю весовую компоненту, получаем

$$-\operatorname{Im} e_\mu + 2 \operatorname{Re}(f_{\mu-1} \bar{\zeta} + g_{\mu-2} \bar{\zeta}^2 + h_{\mu-2} (\bar{z}_1 + 2 \bar{z}_2 \zeta)) = \dots$$

где $w = u + 2i \operatorname{Re}(z_1 \bar{\zeta} + z_2 \bar{\zeta}^2)$, а многоточие означает выражение, зависящее от компонент с меньших весов (т.е. для f – меньше $\mu - 1$, для g и h – меньше $\mu - 2$, для e – меньше μ).

Таким образом мы видим, что размерность семейства отображений вида (30) контролируется размерностью ядра гомологического оператора.

$$L(f, g, h, e) = 2 \operatorname{Re}(i h + 2 f \bar{\zeta} + 2 g \bar{\zeta}^2 + 2 h (\bar{z}_1 + 2 \bar{z}_2 \zeta)) \quad (31)$$

при $w = u + 2i \operatorname{Re}(z_1 \bar{\zeta} + z_2 \bar{\zeta}^2)$.

С другой стороны, если

$$X = 2 \operatorname{Re} \left(f \frac{\partial}{\partial z_1} + g \frac{\partial}{\partial z_2} + h \frac{\partial}{\partial \zeta} + e \frac{\partial}{\partial w} \right)$$

– росток векторного поля в начале координат, т.ч. (f, g, h, e) – голоморфно в нуле, тогда равенство $L(f, g, h, e) = 0$ равносильно тому, что X – элемент алгебры Ли инфинитезимальных автоморфизмов Q в начале координат – $\operatorname{aut} Q$.

Веса, введенные нами для координат пространства, естественно продолжают и на дифференцирование по этим координатам. Дифференцирование по z_1 имеет вес (-2) , по z_2 и по ζ – вес (-1) , по w – вес (-3) . Это превращает $\operatorname{aut} Q$ в градуированную алгебру Ли вида $g_{-3} + g_{-2} + \dots$. Подалгебра g_0 содержит градуирующее поле

$$X_0 = 2 \operatorname{Re} \left(2 \frac{\partial}{\partial z_1} + 1 \frac{\partial}{\partial z_2} + 1 \frac{\partial}{\partial \zeta} + 3 \frac{\partial}{\partial w} \right).$$

В такой ситуации если некоторое поле есть элемент алгебры, то каждая его градуированная компонента – тоже. Рассуждение из работы В.Каупа [11], позволяет утверждать, что алгебра $\text{aut } Q$, в таком случае, обязана быть конечно градуированной (полиномиальной). Но мы не будем использовать это утверждение, а вычислим алгебру явно.

Переходим к вычислению алгебры $\text{aut } Q$, которая совпадает с ядром оператора (31). Процедура вычисления аналогична той, что описана в доказательстве леммы 14. Однако само вычисление проще.

Введем обозначения

$$\begin{aligned} f(0, 0, 0, u) &= a(u), \quad g(0, 0, 0, u) = b(u), \quad h(0, 0, 0, u) = c(u), \\ e(0, 0, 0, u) &= d(u), \quad \frac{\partial f}{\partial z_1}(0, 0, 0, u) = a_1(u), \quad \frac{\partial f}{\partial \zeta}(0, 0, 0, u) = a_3(u), \\ \frac{\partial g}{\partial z_1}(0, 0, 0, u) &= b_1(u), \quad \frac{\partial g}{\partial \zeta}(0, 0, 0, u) = b_3(u), \\ \frac{\partial h}{\partial z_1}(0, 0, 0, u) &= c_1(u), \quad \frac{\partial h}{\partial \zeta}(0, 0, 0, u) = c_3(u), \quad \frac{\partial^2 g}{\partial z_1^2}(0, 0, 0, u) = B(u). \end{aligned}$$

Положим в соотношении

$$\mathcal{L}(f, g, h, e) = 0 \tag{32}$$

$\bar{z}_1 = 0$, $\bar{z}_2 = 0$, $\bar{\zeta} = 0$, получим выражение для h . Это полином степени два от (z_1, z_2, ζ) с коэффициентами, зависящими от $(a(u), b(u), c(u), d(u))$. Подставляя это значение h в (32), вычисляем $\mathcal{L}'_{\bar{\zeta}}$, подставляем $\bar{z} = 0$, $\bar{\zeta} = 0$ и из найденного соотношения получаем выражение для f , которое является полиномом степени три с коэффициентами, зависящими от $(a, a', b', c', d, a_3, b_3, c_3)$. Вычисляем $\mathcal{L}'_{\bar{z}_1}$, подставляем $\bar{z} = 0$, $\bar{\zeta} = 0$ и из этого соотношения получаем выражение для h , которое является полиномом степени два с коэффициентами, зависящими от $(a, a', b', c, c', a_1, b_1, c_1)$. Подставляя эти значения f и h в (32), вычисляем $\mathcal{L}''_{\bar{\zeta}^2}$, положим $\bar{z} = 0$, $\bar{\zeta} = 0$ и из найденного соотношения получим выражение для g , которое является полиномом степени четыре с коэффициентами, зависящими от $(a', a'', b, b', b'', c', c'', d', a'_1, b_1, b_3, b'_1, c'_1, c'_3, B)$.

Дальнейший анализ соотношения (32) дает

$$\begin{aligned} \text{Im } d = \text{Re } c_1 = \text{Re } B = 0, \quad b_3 = i c', \quad c_3 = d' - \bar{a}_1, \\ a' = b' = c'' = d'' = a'_1 = a_3 = b'_1 = c'_1 = B' = 0. \end{aligned}$$

Подсчитаем число свободных вещественных параметров

$$a - 2, b - 2, c - 4, d - 2, a_1 - 2, a_3 - 0, b_1 - 2, b_3 - 0, c_1 - 1, c_3 - 0, B - 1.$$

Таким образом, получаем, что размерность $\text{aut } Q$ не превосходит 16.

С другой стороны не трудно выписать несколько младших весовых компонент $\text{aut } Q$. Вот эти компоненты:

$$\begin{aligned} g_{-3} &= \{(0, 0, 0, d)\}, \quad d \in \mathbf{R}, \\ g_{-2} &= \{(a, 0, 0, 2i\bar{a}\zeta)\}, \quad a \in \mathbf{C}, \\ g_{-1} &= \{(-2\bar{c}z_2 + ik\zeta, b, c, 2i\bar{c}z_1 + 2i\bar{b}\zeta^2)\}, \quad b, c \in \mathbf{C}, k \in \mathbf{R}, \\ g_0 &= \{(Mz_1 + m\zeta^2(2M - 3l)z_2 - \bar{m}\zeta(3l - \bar{M})\zeta, 3lw)\}, \quad M, m \in \mathbf{C}, l \in \mathbf{R}, \\ g_1 &= \{(2i\bar{N}z_1\zeta + Nw, 2i\bar{N}z_2\zeta - iNz_1 + in\zeta^2, i\bar{N}\zeta^2, 2i\bar{N}\zeta w)\}, \quad N \in \mathbf{C}, n \in \mathbf{R}. \end{aligned} \tag{33}$$

И мы видим, что размерность суммы этих пяти компонент равна 16. Таким образом алгебра вычислена. Для дальнейшего нам будет удобно представить g_{-1} в виде прямой суммы $g'_{-1} + g''_{-1}$, где

$$\begin{aligned} g'_{-1} &= \{(-2\bar{c}z_2, b, c, 2i\bar{c}z_1 + 2i\bar{b}\zeta^2)\}, \\ g''_{-1} &= \{(ik\zeta, 0, 0, 0)\}. \end{aligned}$$

Сформулируем полученный результат.

Теорема 15:

- (a) Алгебра $\text{aut } Q$ – это сумма пяти градуированных компонент $g_{-3} + g_{-2} + g_{-1} + g_0 + g_1$, сами компоненты выписаны выше (33). $\dim \text{aut } Q = 16$.
- (b) При этом $\text{aut}_0 Q$, стабилизатор начала координат в $\text{aut } Q$ (т.е. поля из алгебры, обращающиеся в ноль в начале координат) – это $g''_{-1} + g_0 + g_1$, его размерность равна 9.
- (c) Подалгебра $g_{-3} + g_{-2} + g'_{-1}$ – это алгебра Ли подгруппы \mathcal{Q} – группы "сдвигов". Причем Q находится в естественном взаимно-однозначном соответствии с \mathcal{Q} . Это позволяет перенести на \mathcal{Q} структуру вложенной гиперповерхности.
- (d) Если Γ_0 – росток гиперповерхности вида (33), имеет место оценка как для всей алгебры, так и отдельно для стабилизатора начала координат .

$$\dim \text{aut } \Gamma_0 \leq 16, \quad \dim \text{aut}_0 \Gamma_0 \leq 9.$$

Для полноты картины выпишем автоморфизмы, порожденные этими полями. Как было отмечено, поля из $g''_{-1} + g_0 + g_1$ порождают \mathcal{Q} .

Поле $(i\zeta, 0, 0, 0)$ из g'_{-1} порождает преобразование

$$z_1 \rightarrow z_1 + it\zeta, \quad z_2 \rightarrow z_2, \quad \zeta \rightarrow \zeta, \quad w \rightarrow w.$$

Аналогично поле $(0, i\zeta^2, 0, 0)$ из g_1 порождает преобразование

$$z_1 \rightarrow z_1, \quad z_2 \rightarrow z_2 + it\zeta^2, \quad \zeta \rightarrow \zeta, \quad w \rightarrow w.$$

Для вычисления преобразований, порожденных g_0 , положим $M = 2 - \mu/3$. Тогда получаем

$$\begin{aligned} z_1 &\rightarrow \left(z_1 + m \left(\frac{e^{\mu t} - 1}{\mu} \right) \zeta^2 \right) e^{(2l - \mu/3)t}, \\ z_2 &\rightarrow \left(z_2 - \bar{m} \left(\frac{e^{\mu t} - 1}{\mu} \right) \zeta \right) e^{(l - 2\mu/3)t}, \\ \zeta &\rightarrow \zeta e^{(l + \mu/3)t}, \quad w \rightarrow w e^{3lt}. \end{aligned}$$

И, наконец преобразования из g_1 при $n = 0$ имеют вид

$$\begin{aligned} z_1 &\rightarrow \frac{z_1}{(1 - i\bar{N}\zeta t)^2}, \quad z_2 \rightarrow \frac{z_2 - iNz_1 t}{(1 - i\bar{N}\zeta t)^2}, \\ \zeta &\rightarrow \frac{\zeta}{1 - i\bar{N}\zeta t}, \quad w \rightarrow \frac{w}{(1 - i\bar{N}\zeta t)^2}. \end{aligned}$$

Гиперповерхность Q замечательна во многих отношениях. Она представляет собой общее начало двух последовательностей гиперповерхностей пространства \mathbf{C}^N при $N \geq 4$ (больше у них пересечений нет). Первая последовательность была рассмотрена в работе А.Лабовского ([8], 1997) как пример голоморфно однородных l -невырожденных гиперповерхностей с произвольным l . Если эта гиперповерхность расположена в \mathbf{C}^N , то она равномерно $(N - 2)$ -невырождена.

С другой стороны, в недавней работе И.Зеленко и Д.Сайкса [12] была описана серия голоморфно однородных 2-невырожденных гиперповерхностей пространства \mathbf{C}^N с алгеброй голоморфных автоморфизмов размерности $(N - 1)^2 + 7$ и доказано, что эти гиперповерхности оптимальны в классе голоморфно однородных. Т.е. никакая голоморфно однородная

гиперповерхность не может иметь автоморфизмы большей размерности. Отметим, что эта работа использует технику, весьма далекую от нашей. Это дифференциальная геометрия в стиле Э.Картана и Н.Танаки.

Утверждение 16: (а) Если вещественная гиперповерхность Γ всюду, кроме собственного аналитического подмножества, является 2-невырожденной, то для любой ее точки ξ размерность алгебры автоморфизмов ростка гиперповерхности в этой точке $\text{aut } \Gamma_\xi$ не превосходит 17.

(б) Если же эта гиперповерхность в точке общего положения принадлежит специальному классу (26) (или более широкому классу (29)), то $\dim \text{aut } \Gamma_\xi \leq 16$.

Доказательство: Размерность $\text{aut } \Gamma$ не превосходит размерности гиперповерхности, которая равна 7 плюс размерность стабилизатора точки. Для оценки стабилизатора в произвольной точке достаточно провести оценку в точке 2-невырожденности. В соответствии с теоремой 1 и всеми последующими леммами размерность стабилизатора оценивается через размерность младшей струи (леммы 4 и 8) и размерность ядра \mathcal{L} на \tilde{V}_5 (которая равна нулю). Размерность группы параметров (C, ρ, β) не превышает 3. Параметры (a, α) дают еще 8. Итого $7 + 3 + 8 = 18$. Однако, что бы получить 18 надо, чтобы орбита начала координат была 7-мерной. Это означает голоморфную однородность. Но тогда, в соответствии с [12], размерность не выше 16-ти. Поэтому мы можем считать, что размерность орбиты меньше 7. Откуда получаем оценку $6 + 3 + 8 = 17$. В случае (б) мы можем воспользоваться теоремой 15 (d). Утверждение доказано.

Теорема 17: Пусть Γ – голоморфно невырожденная вещественно аналитическая гиперповерхность в \mathbb{C}^4 , точка $\xi \in \Gamma$ и Γ_ξ – росток Γ в точке ξ . Пусть $\text{aut } \Gamma_\xi$ – алгебра Ли инфинитезимальных голоморфных автоморфизмов ростка. Тогда:

(1)

$$\dim \text{aut } \Gamma_\xi \leq 24.$$

(2) Если известно, что Γ 2-невырождена всюду, кроме собственного аналитического подмножества, то можно утверждать, что

$$\dim \text{aut } \Gamma_\xi \leq 17.$$

(3) Если известно, что Γ 3-невырождена всюду, кроме собственного ана-

литического подмножества, то можно утверждать, что

$$\dim \operatorname{aut} \Gamma_\xi \leq 20.$$

Теорема 18: Пусть Γ_ξ – росток произвольной вещественно аналитической гиперповерхности в \mathbf{C}^4 т.ч. $\dim \operatorname{aut} \Gamma_\xi = 24$, тогда Γ_ξ эквивалентен одной из двух стандартных невырожденных гиперквадрик (т.е. Леви-невырожден и сферичен).

Доказательство: Если Γ_ξ не является Леви-невырожденной в общей точке, то, как следует из теоремы 17, размерность не превосходит 20. Таким образом, Γ_ξ Леви-невырождена в общей точке. Если она там не сферична, то, как доказано в [14], размерность не превосходит 13-ти. Поэтому она сферична. Но тогда, в соответствии с другим результатом Б.Кругликова [13], если Γ_ξ не эквивалентна гиперквадрике (произвольной сигнатуры), то размерность не выше 17. Теорема доказана.

Аналогичные оценки для \mathbf{C}^2 и \mathbf{C}^3 – это 8 и 15. Они также достигаются только на гиперквадриках. Проблемными, как и в \mathbf{C}^4 , являются гиперповерхности, которые в общей точке являются сферическими. Результат для \mathbf{C}^2 – это работа И.Коссовского и Р.Шафикова [4], а для \mathbf{C}^3 – А.Исаева и Б.Кругликова [5].

Эти результаты вместе с известным критерием конечномерности дают следующий список возможностей. Пусть $d = \dim \operatorname{aut} \Gamma_\xi$. Тогда

- (1) $d = \infty$ тогда и только тогда, когда Γ голоморфно вырождена.
- (2) $d = 24$ тогда и только тогда, когда Γ эквивалентна одной из двух невырожденных стандартных гиперквадрик.
- (3) Если Γ_ξ несферичен, но Γ сферична в точке общего положения, то $d \leq 17$.
- (4) Если Γ в точке общего положения 1-невырождена (Леви-невырождена) и несферична, то $d \leq 13$.
- (5) Если Γ – 2-невырождена в точке общего положения, то $d \leq 17$.
- (6) Если Γ – 2-невырождена в точке общего положения и однородна (в окрестности ξ), то $d \leq 16$.
- (7) Если Γ – 3-невырождена в точке общего положения, то $d \leq 20$.

В этом списке пункты (1) и (2) вполне конкретны. То же следует сказать и о пункте (3). Действительно, в работе [13] имеется пример гиперповерхности такого типа, для которой оценка 17 реализуется. То же самое касается и пункта (4). В [14] имеется пример такой гиперповерхности, у которой размерность алгебры автоморфизмов равна 13. Пункт (6) также точен. Как было показано, он подкреплён примером. Поэтому для точной оценки из пункта (5) есть ровно две возможности – 16 и 17. Последний пункт (7) самый неопределённый. Пока можно сказать только, что максимум не меньше 8 и не больше 20.

Вопрос 19: Каковы точные значения максимумов из пунктов (5) и (7)?

Вопрос 20: Верно ли, что альтернатива остается верной для гиперповерхностей в размерности выше, чем 4? Т.е. либо бесконечность, либо не больше, чем у гиперквадрики, у которой в \mathbf{C}^N размерность $(N+1)^2-1$.

У этого довольно старого вопроса [6] есть более свежая версия ([7], conjecture (5.a),(5.b)).

Список литературы

- [1] H.Poincare, Les fonctions analytiques de deux variables et la representation conforme, Rend. Circ. Mat., Palermo, 1907, pp.185 – 220.
- [2] В.К.Белошарпа, “Симметрии вещественных гиперповерхностей трехмерного комплексного пространства”, Матем. заметки, т.78, № 2 (2005), сс.171–179.
- [3] M.S.Baouendi, P.Ebenfelt, L.P.Rothschild, CR automorphisms of real analytic manifolds in complex space, Comm. Anal. Geom. 6 (1998), no. 2, 291–315.
- [4] I.Kossovskiy, R.Shafikov, Analytic differential equations and spherical real hypersurfaces. J. Differential Geom. 102 (2016), no. 1, pp.67 –126.
- [5] A.Isaev, B. Kruglikov, On the symmetry algebras of 5-dimensional CR-manifolds. Adv. Math. 322 (2017), 530–564.

- [6] V.K.Beloshapka, Automorphisms of Degenerate Hypersurfaces in \mathbf{C}^2 and a Dimension Conjecture // Russian Journal of Mathematical Physics, 1996, vol.4, no.3, p.393 – 396.
- [7] V.K.Beloshapka, CR-Manifolds of Finite Bloom–Graham Type: the Method of Model Surface // Russian Journal of Mathematical Physics vol. 27, no.2, pp.155–174 (2020).
- [8] А.С.Лабовский, О размерности группы биголоморфных автоморфизмов вещественно-аналитических гиперповерхностей, Матем. заметки, 61:3 (1997), 349–358.
- [9] А.Е.Ершова, Автоморфизмы 2-невырожденных гиперповерхностей в \mathbf{C}^3 , Матем. заметки, 69:2 (2001), 214–222.
- [10] Kolar, M., Meylan, F., Zaitsev, D., Chern-Moser operators and polynomial models in CR geometry, Adv. Math. 263 (2014), 321–356.
- [11] W. Kaup, Einige Bemerkungen uber polynomiale Vektorfelder, Jordanalgebren und die Automorphismen von Siegelschen Gebieten, Math. Ann. 204, 131 –144 (1973).
- [12] D. Sykes and I. Zelenko, Maximal Dimension of Groups of Symmetries of Homogeneous 2-nondegenerate CR-structures of Hypersurface Type with a 1-dimensional Levi Kernel, 2021, <https://arxiv.org/abs/2102.08599>.
- [13] B. Kruglikov, Blow-ups and infinitesimal automorphisms of CR-manifolds. Math. Z. 296 (2020), no. 3-4, 1701–1724.
- [14] B. Kruglikov, Submaximally symmetric CR-structures. J. Geom. Anal. 26, 3090–3097 (2016).
- [15] A.Santi, Homogeneous models for Levi-degenerate CR manifolds, Kyoto J.Math. 60(1), 291–334 (2020).
- [16] G.Fels, W.Kaup, Classification of Levi degenerate homogeneous CR-manifolds in dimension 5, Acta Math., 201 (2008), 1–82.