

Непрерывность в право полутопологических группах

Евгений Резниченко

*Department of General Topology and Geometry, Mechanics and Mathematics Faculty,
M. V. Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory 1, Moscow, 199991 Russia*

Abstract

Рассматриваются группы с топологией, которая тем или иным способом согласованна с алгебраической структурой. Классические группы с топологией — топологические, паратопологические, полутопологические, квазитопологические группы. В работе изучаются также и другие способы согласования топологии и алгебраической структуры. Минимальное требование в этой работе — группа является право полутопологической группой (такие группы часто называются right topological groups). Изучаются когда группа с топологией является топологической группой, исследование в этом направлении началось с работ Deane Montgomery и Robert Ellis. В качестве средства изучения используются (инвариантные) полукрестности диагонали.

Continuity in right semitopological groups.

Groups with a topology that is in one way or another consistent with the algebraic structure are considered. Classical groups with topology — topological, paratopological, semitopological, quasitopological groups. We also study other ways of matching topology and algebraic structure. The minimum requirement in this paper is that the group is a right semitopological group (such groups are often called right topological groups). Are studied when a group with topology is a topological group, research in this direction began with the work of Deane Montgomery and Robert Ellis. The (invariant) semi-neighborhoods of the diagonal are used as a means of study.

Keywords: Baire space, nonmeagre space, topological group, semitopological group, paratopological group, quasitopological group, feebly continuous map, quasi continuous map, generalization of Baire space,

2010 MSC: 54B10, 54C30, 54C05, 54C20, 22A05, 54H11

1. Введение

Начиная с работ Монтгомери 1936 года [1] и Элиса 1957 года [2], изучается следующая проблема:

Email address: erezn@inbox.ru (Евгений Резниченко)

Проблема 1. Пусть на группе G задана топология, которая согласованна с групповой структурой G . При каких условиях на топологию и алгебраическую структуру согласованность увеличивается? Когда G является топологической группой?

Перечислим связи топологии с групповой структурой.

- (O_p) умножение $(g, h) \mapsto gh$ в группе непрерывно;
- (O_s) умножение в группе раздельно непрерывно;
- (O_i) операция взятия обратного элемента $g \mapsto g^{-1}$ непрерывна;
- (O_l) левые сдвиги $\lambda_g : G \rightarrow G, x \mapsto gx$ непрерывны для любого $g \in G$;
- (O_r) правые сдвиги $\rho_g : G \rightarrow G, x \mapsto xg$ непрерывны для любого $g \in G$.

Напомним, группа G называется

- *полутопологической* если выполняется O_s ;
- *право полутопологической* если выполняется O_r ;
- *лево полутопологической* если выполняется O_l ;
- *паратопологической* если выполняется O_p
- *квазитопологической* если выполняется O_s и O_i ;
- *топологической* если выполняется O_p и O_i .

В некоторых работах лево (право) полутопологические группы также называются лево (право) топологическими.

Монтгомери [1] доказал, что (локально) полная метризуемая полутопологическая группа является паратопологической группой и польская полутопологическая группа является топологической группой. Элиса [2] доказал, что локально компактная хаусдорфова паратопологическая группа является топологической группой.

В дальнейшем исследование непрерывности операций в группах продолжились во многих работах.

Наиболее важный класс из перечисленных, это класс топологических групп. Основной вопрос в этой области — когда группа с топологией является топологической группой?

Для усиления непрерывности в группах необходимое условие это беровость. Существует счетная метризуемая паратопологическая не топологическая группа, например, счетная плотная подгруппа прямой Зонгенфрея. В этой работе исследуется, как усиления Беровости из работ [3] и [4] влияют на непрерывность в группах с топологией.

В работе [4] вводятся и изучаются свойства типа беровости с помощью полукрестностей диагонали, смотри раздел 5. В право полутопологических группах существует инвариантные полукрестностей диагонали, с помощью которых определяется алгебро-топологические свойства право полутопологических групп.

2. Определения и обозначения

Знак $:=$ будем использовать для равенства по определению.

Как правило, единицу группы мы будем обозначать как e . Для $g \in G$ обозначим

$$\begin{aligned}\lambda_g : G &\rightarrow G, x \mapsto gx \\ \rho_g : G &\rightarrow G, x \mapsto xg\end{aligned}$$

левые и правые сдвиги в G . Обозначим через \mathfrak{m} и \mathfrak{i} операции произведения и операцию взятия обратного в группе:

$$\begin{aligned}\mathfrak{m} : G \times G &\rightarrow G, (g, h) \mapsto gh \\ \mathfrak{i} : G &\rightarrow G, g \mapsto g^{-1}\end{aligned}$$

Как правило, предполагается что на группе G есть некоторая топология. В этом случае обозначим через \mathcal{N}_e семейство открытых окрестностей единицы e .

Семейство всех подмножеств множества X обозначим через $\text{Exp}(X)$. Семейство всех непустых подмножеств множества X обозначим через $\text{Exp}_*(X)$: $\text{Exp}_*(X) := \text{Exp}(X) \setminus \{\emptyset\}$.

Если B есть подмножество множества A то будем обозначать $B^c = A \setminus B$ — дополнение к A . Мы применяем это обозначение в тех ситуациях, когда из контекста ясно, какое множество A имеется в виду.

Будем обозначать *индексированное множество* $x = (x_\alpha)_{\alpha \in A}$, x есть функция на A , такое что $x(\alpha) = x_\alpha$ для $\alpha \in A$. Если элементы индексированного множества $\mathcal{X} = (X_\alpha)_{\alpha \in A}$ сами являются множествами, то \mathcal{X} также называется *индексированное семейством множеств*, \mathcal{X} есть функция на A : $\mathcal{X}(\alpha) = X_\alpha$ для $\alpha \in A$.

Обозначим через $\text{Aut}(X)$ множество всех гомеоморфизмов пространства X на себя.

Подмножество M топологического пространства X называется *локально плотным* (*locally dense* или *nearly open* или *preopen*) если $M \subset \text{Int } \overline{M}$.

Пусть $M \subset X$. Если M есть объединение счетного числа нигде не плотных множеств, то M называется *тощим* множеством (*meagre set*). Не тощие множества называются *второй категории Бэра* или *нетощими* или *тучными* множествами (*nonmeagre set*). Подмножество M называется *остаточным* (*comeagre set* or *residual set*) если $X \setminus M$ является тощим множеством.

Пространство X называются *пространствами первой категории Бэра* или *тощими пространствами* (*meagre space*) если множество X первой категории в пространстве X . Пространство X называется *пространствами второй категории Бэра* или *нетощими пространствами* или *тучными пространствами* (*nonmeagre space*) если X не тощее пространство. Пространства, в котором всякое остаточное множество плотно, называется *бэровским пространством*. Пространство тучное если и только если его некоторое открытое подпространство является бэровским пространством.

Семейство ν непустых подмножеств пространства X называется π -сетью, если для любого открытого непустого $U \subset X$ существует $M \in \nu$, так что $M \subset U$.

Состоящая из открытых множеств π -сеть называется π -базой.

Подмножество $U \subset X$ называется *каноническим открытым* если $U = \text{Int } \overline{U}$.

Пространство X называется *квази регулярным* (quasi-regular) если для каждого непустого открытого $U \subset X$ существует непустое открытое $V \subset X$, так что $\overline{V} \subset U$.

Пространство X называется *полурегулярным* (semiregular) если у X есть база состоящая из канонически открытых множеств.

Пространство X называется *π -полурегулярным* (π -semiregular) [5] (или почти регулярным [6] (nearly regular)) если у X есть π -база состоящая из канонически открытых множеств.

Для кардинала τ , множество $G \subset X$ называется *множеством типа G_τ* если G есть пересечения τ открытых множеств. Пространство X называется *абсолютным G_τ* , если X типа G_τ в некотором компактном расширении.

Пространство X *регулярно в точке $x \in X$* , если для любой окрестности U точки x существует окрестность $V \ni x$, так что $\overline{V} \subset U$.

Пространство X *полурегулярно в точке $x \in X$* , если в точке x есть база, состоящая из канонически открытых множеств.

Пространство X является *слабо компактным пространством* (feebly compact space), если любое локально конечное семейство открытых множеств конечно.

Пространство X является *слабо компактным пространством* (feebly compact space), если любое локально конечное семейство открытых множеств конечно.

Для $\gamma \subset \text{Exp}(X)$ и $x \in X$ обозначим

$$\text{St}(x, \gamma) := \{U \in \gamma : x \in U\}, \quad \text{st}(x, \gamma) := \bigcup \text{St}(x, \gamma).$$

Пространство X называется *разлагаемым* (developable), если существует последовательность открытых покрытий $(\gamma_n)_{n \in \omega}$, так что для любого $x \in X$ семейство $\text{st}(x, \gamma_n)$ является базой в точке x .

Семейство \mathcal{B} открытых непустых множеств пространства X называется *внешней базой множества $M \subset X$* если $M \subset U$ для каждого $U \in \mathcal{B}$ и для каждого открытого $W \supset M$ существует $U \in \mathcal{B}$ так что $M \subset U \subset W$.

Через $\beta \omega$ обозначим пространство ультрафильтров на ω , Стоун-Чеховское расширение дискретного пространства ω . Обозначим $\omega^* = \beta \omega \setminus \omega$ — множество неглавных ультрафильтров.

Пусть $(x_n)_{n \in \omega}$ последовательность точек в пространстве X , $p \in \omega^*$ неглавный ультрафильтр. Точка $x \in X$ называется *p -пределом* последовательности $(x_n)_{n \in \omega}$, если $\{n \in \omega : x_n \in U\} \in p$ для любой окрестности U точки x . Будем писать $x = \lim_p x_n = \lim_p (x_n)_{n \in \omega}$ для p -предела x .

Говорят, что у пространства X *счетный псевдохарактер* если каждая точка X является множеством типа G_δ .

Пространство X *субметризуемо* если существует непрерывное инъективное отображение X в метризуемое пространство.

3. Разновидности непрерывности

Мы будем использовать несколько ослаблений непрерывности, следуя работе [7]. Отображение топологических пространств $f : X \rightarrow Y$ называется

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{непрерывным (continuous)} \\ \text{почти непрерывным (nearly continuous)} \\ \text{квази непрерывным (quasi-continuous)} \\ \text{полу преднепрерывным (semi-precontinuous)} \\ \text{слабо непрерывным (feebly continuous)} \end{array} \right\} \text{ в } x \in X \text{ если } \left\{ \begin{array}{l} x \in \text{Int } f^{-1}(V) \\ x \in \overline{\text{Int } f^{-1}(V)} \\ x \in \overline{\overline{\text{Int } f^{-1}(V)}} \\ x \in \overline{\text{Int } f^{-1}(V)} \\ \text{Int } f^{-1}(V) \neq \emptyset \end{array} \right\}$$

для любой окрестности V точки $f(x)$. Если рассматриваемые свойства выполняются в каждой точке, то получаем определение: отображение f называется

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{непрерывным (continuous)} \\ \text{почти непрерывным (nearly continuous)} \\ \text{квази непрерывным (quasi-continuous)} \\ \text{полу преднепрерывным (semi-precontinuous)} \\ \text{слабо непрерывным (feebly continuous)} \end{array} \right\} \text{ если } \left\{ \begin{array}{l} f^{-1}(V) \subset \text{Int } f^{-1}(V) \\ f^{-1}(V) \subset \overline{\text{Int } f^{-1}(V)} \\ f^{-1}(V) \subset \overline{\overline{\text{Int } f^{-1}(V)}} \\ f^{-1}(V) \subset \overline{\text{Int } f^{-1}(V)} \\ \text{Int } f^{-1}(V) \neq \emptyset \end{array} \right\}$$

для любого открытого непустого $V \subset X$.

Назовем отображение f *слабым гомеоморфизмом* (feebly homeomorphism) если f есть биекция и отображения f и f^{-1} являются слабо непрерывными.

Let X, Y, Z be three topological spaces, and let $f : X \times Y \rightarrow Z$ be a function from $X \times Y$ into Z . Recall that f is called *quasi-continuous with respect to the second variable* [8] at (x, y) if for every open neighborhood W of $f(x, y)$ and every open neighborhood $U \times V$ of (x, y) , there are an open neighborhood V' of y and a nonempty open set $U' \subset U$ such that $f(U' \times V') \subset W$. Quasi-continuity with respect to the second variable plays an important role in the theory of separate vs. joint continuity. It is called *strong quasi-continuity* in [9] and [10], where it is applied to the study of the problem when a semitopological group is a topological group.

Аналогично, определим that f is called *quasi-continuous with respect to the first variable* at (x, y) if for every open neighborhood W of $f(x, y)$ and every open neighborhood $U \times V$ of (x, y) , there are an open neighborhood U' of x and a nonempty open set $V' \subset V$ such that $f(U' \times V') \subset W$.

Перечислим связи топологии с групповой структурой группы G .

- (O_t) выполняется (O_p) и (O_i) , то есть G является топологической группой;
- (O_{pe}) умножение \mathfrak{m} в группе непрерывно в (e, e) ;

- (O_{qpe}) \mathfrak{m} квази непрерывно по первой координате в (e, e) ;
- (O_{fpe}) \mathfrak{m} слабо непрерывно в (e, e) ;
- (O_{fi}) операция взятия обратного элемента i слабо непрерывна;
- (O_{ie}) i непрерывна в единице e ;
- (O_{nie}) i почти непрерывна в e ;
- (O_{qie}) i квази непрерывна в e ;
- (O_{sie}) i полу преднепрерывна в e ;
- (O_{fie}) i слабо непрерывна в e ;
- (O_{fl}) левые сдвиги λ_g слабо непрерывны для любого $g \in G$;
- (O_{fr}) правые сдвиги ρ_g слабо непрерывны для любого $g \in G$;
- (O_{dfl}) существует плотное $H \subset G$, так что λ_g является слабо гомеоморфизмами для любого $g \in H$;
- (O_{dfr}) существует плотное $H \subset G$, так что ρ_g является слабо гомеоморфизмами для любого $g \in H$;
- (O_{dl}) существует плотное $H \subset G$, так что λ_g является гомеоморфизмами для любого $g \in H$;
- (O_{dr}) существует плотное $H \subset G$, так что ρ_g является гомеоморфизмами для любого $g \in H$.

Положим

$$\begin{aligned}
 H_{fl} &:= \{g \in G : \lambda_g \text{ является слабым гомеоморфизмом}\}, \\
 H_{fr} &:= \{g \in G : \rho_g \text{ является слабым гомеоморфизмом}\}, \\
 H_l &:= \{g \in G : \lambda_g \text{ является гомеоморфизмом}\}, \\
 H_r &:= \{g \in G : \rho_g \text{ является гомеоморфизмом}\}.
 \end{aligned}$$

Несложно проверяется

Утверждение 1. Множества H_{fl} , H_{fr} , H_l , H_r являются подгруппами группы G . Верны следующие альтернативные определения перечисленных свойств.

- (O_{dfl}) H_{fl} плотно в G ;
- (O_{dfr}) H_{fr} плотно в G ;
- (O_{dl}) H_l плотно в G ;
- (O_{dr}) H_r плотно в G .

Дадим альтернативное определение перечисленных свойств. Пусть \mathcal{T}^* есть все непустые открытые подмножества G .

- (O_{pe}) для любого $U \in \mathcal{N}_e$ существует $V \in \mathcal{N}_e$ так что $V^2 \subset U$;
- (O_{qpe}) для любого $U \in \mathcal{N}_e$ существует $V \in \mathcal{N}_e$ и $W \in \mathcal{T}^*$ так что $VW \subset U$;
- (O_{fpe}) для любого $U \in \mathcal{N}_e$ существует $V \in \mathcal{T}^*$ и $W \in \mathcal{T}^*$ так что $VW \subset U$;
- (O_{fi}) $\text{Int } U^{-1} \neq \emptyset$ для любого $U \in \mathcal{T}^*$;
- (O_{ie}) $e \in \text{Int } U^{-1}$ для любого $U \in \mathcal{N}_e$;
- (O_{nie}) $e \in \text{Int } \overline{U^{-1}}$ для любого $U \in \mathcal{N}_e$;
- (O_{qie}) $e \in \overline{\text{Int } U^{-1}}$ для любого $U \in \mathcal{N}_e$;
- (O_{sie}) $e \in \overline{\overline{\text{Int } U^{-1}}}$ для любого $U \in \mathcal{N}_e$;
- (O_{fie}) $\text{Int } U^{-1} \neq \emptyset$ для любого $U \in \mathcal{N}_e$;
- (O_l) $gU \in \mathcal{N}_e$ для любого $U \in \mathcal{T}^*$ и $g \in G$;
- (O_r) $Ug \in \mathcal{N}_e$ для любого $U \in \mathcal{T}^*$ и $g \in G$;
- (O_{fl}) $\text{Int } gU \neq \emptyset$ для любого $U \in \mathcal{T}^*$ и $g \in G$;
- (O_{fr}) $\text{Int } Ug \neq \emptyset$ для любого $U \in \mathcal{T}^*$ и $g \in G$;
- (O_{dfl}) существует плотная подгруппа $H \subset G$, так что $\text{Int } gU \neq \emptyset$ для любого $U \in \mathcal{T}^*$ и $g \in H$;
- (O_{dfr}) существует плотная подгруппа $H \subset G$, так что $\text{Int } Ug \neq \emptyset$ для любого $U \in \mathcal{T}^*$ и $g \in H$;
- (O_{dl}) существует плотная подгруппа $H \subset G$, так что $gU \in \mathcal{T}^*$ для любого $U \in \mathcal{T}^*$ и $g \in H$;
- (O_{dr}) существует плотная подгруппа $H \subset G$, так что $Ug \in \mathcal{T}^*$ для любого $U \in \mathcal{T}^*$ и $g \in H$.

Определение 1. Для

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \{p, s, i, l, r, pe, qpe, fpe, ie, nie, fie, qie, sie, fl, fr, dfl, dfr, dl, dr\}$$

будем говорить, что группа G является $O(x_1, x_2, \dots, x_n)$ -топологической если выполняется условие (O_{x_i}) для всех $i = 1, 2, \dots, n$.

Топологические группы, это $O(p, i)$ -топологические группы, подобным образом можно определить и другие введенные классы групп с топологией.

Предложение 1. *Ниже, запись $(A) \rightarrow (B)$ означает, что $O(A)$ -топологическая группа является $O(B)$ -топологической группой и запись $(A) \leftrightarrow (B)$ означает, что группа G является $O(A)$ -топологической если и только если G является $O(B)$ -топологической группой.*

$$\begin{aligned}
(p, i) \leftrightarrow (t) \quad (l, r) \leftrightarrow (s) \quad (s, pe) \leftrightarrow (p) \quad (s, ie) \leftrightarrow (s, i) \\
(l, i) \leftrightarrow (r, i) \leftrightarrow (s, i) \quad (fl, fi) \leftrightarrow (fr, fi) \\
(p) \rightarrow (s) \quad (p) \rightarrow (pe) \rightarrow (qpe) \quad (i) \rightarrow (ie) \rightarrow (fie) \\
(l) \rightarrow (fl) \rightarrow (dfl) \quad (r) \rightarrow (fr) \rightarrow (dfr) \\
(ie) \rightarrow (nie) \rightarrow (sie) \quad (ie) \rightarrow (qie) \rightarrow (sie) \quad (qie) \rightarrow (fie) \\
(dfl, fie, r) \rightarrow (fl, fi) \quad (dfl, fpe, r) \rightarrow (qpe) \\
(p, sie) \rightarrow (t) \quad (dfl, ie, pe, r) \rightarrow (t)
\end{aligned}$$

Доказательство. Большая часть перечисленных утверждений тривиальна или широко известны (смотри [7] и [11]). Докажем новые нетривиальные утверждения.

$(p, sie) \rightarrow (t)$. Теорема 2.3 из [7], Лемма 1.2 из [12].

$(fl, fi) \leftrightarrow (fr, fi)$. Покажем $(fr, fi) \rightarrow (fl, fi)$. Пусть $g \in G$ и $U \in \mathcal{T}^*$. Из

$$gU = (U^{-1}g^{-1})^{-1}$$

вытекает $\text{Int } gU \neq \emptyset$. Аналогично доказывается $(fl, fi) \rightarrow (fr)$.

$(dfl, fie, r) \rightarrow (fl, fi)$. Покажем, что $(dfl, fie, r) \rightarrow (fi)$. Пусть $U \in \mathcal{T}^*$. Возьмем $g \in H_{fl} \cap U$. Из

$$U^{-1} = g^{-1}(Ug^{-1})^{-1}$$

вытекает, что $\text{Int } U^{-1} \neq \emptyset$. Из $(fr, fi) \rightarrow (fl)$ вытекает, что G является $O(fl)$ -топологической.

$(dfl, ie, pe, r) \rightarrow (t)$. Из предыдущего пункта вытекает, что G является $O(fl)$ -топологической группой. В силу $(s, pe) \leftrightarrow (p)$ и $(s, ie) \leftrightarrow (s, i)$, достаточно доказать, что G является $O(l)$ -топологической группой. Пусть $g \in G$ и $U \in \mathcal{T}^*$. Необходимо проверить, что gU открыто. Пусть $q \in U$. Достаточно проверить, что $gq \in \text{Int } gU$, что эквивалентно $g \in \text{Int } gV$, где $V = Uq^{-1} \in \mathcal{N}_e$. Существует $W \in \mathcal{N}_e$, для которого $WW^{-1} \subset V$. Пусть $s \in \text{Int } gW$ и $w = g^{-1}s \in W$. Существует $S \in \mathcal{N}_e$ так что $Ss \subset gW$. Тогда $s = gw$, $g = sw^{-1}$ и

$$Sg = Ssw^{-1} \subset gWw^{-1} \subset gWW^{-1} \subset gV.$$

Следовательно, $g \in \text{Int } gV$.

$(dfl, fpe, r) \rightarrow (qpe)$. Пусть $U \in \mathcal{N}_e$. Тогда $WVx \subset U$ для некоторых $x \in G$, $W \in \mathcal{T}^*$ и $V \in \mathcal{N}_e$. Пусть $y \in H_{fl} \cap W$. Тогда $Sy \subset W$ для некоторого $S \in \mathcal{N}_e$. Для некоторых $z \in \text{Int } yV$ и $Q \in \mathcal{N}_e$, $Qz \subset yV$. Получаем $SQzx \subset U$. \square

4. R -топологические группы

Назовем группу G

- R -полутопологической если G является $O(r)$ -топологической группой, то есть G является право полутопологической группой;
- R -паратопологической если G является $O(pe, r)$ -топологической группой;
- R -квазитопологической если G является $O(ie, r)$ -топологической группой;
- R -топологической если G является $O(ie, pe, r)$ -топологической группой.

Let N be a real-valued function on G . We shall call N a *prenorm* ([11], Section 3.3) on G if the following conditions are satisfied for all $x, y \in G$:

(PN1) $N(e) = 0$;

(PN2) $N(xy) \leq N(x) + N(y)$;

(PN3) $N(x^{-1}) = N(x)$.

Если, дополнительно, выполняется условие

(PN4) $N(x) \neq 0$ для $x \neq e$,

то N называется *нормой* (norm). В [13] пренорма называется псевдонормой (pseudo-norm).

Утверждение 2 (Proposition 3.3.1 и Proposition 3.3.2 из [11]). Пусть N есть пренорма на группе G . Тогда для $x, y \in G$

- $N(x) \geq 0$;
- $|N(x) - N(y)| \leq N(xy^{-1})$.

Утверждение 3. Пусть $(U_n)_{n \in \omega}$ есть последовательность подмножеств группы G , так что $U_n = U_n^{-1}$ и $U_{n+1}^2 \subset U_n$ для $n \in \omega$.

(1) Существует такая пренорма N на G , что

$$\{x \in G : N(x) < 1/2^n\} \subset U_n \subset \{x \in G : N(x) \leq 2/2^n\}$$

для $n \in \omega$.

(2) Если G есть R -полутопологическая группа и $e \in \text{Int } U_n$ для $n \in \omega$, то пренорма N непрерывна.

Доказательство. Пункт (1) фактически доказан в Лемма 3.3.10 из [11]. Докажем (2). Пусть $y \in G$ и $\varepsilon > 0$. Существует $n \in \omega$, для которого $2/2^n < \varepsilon$. Тогда $y \in \text{Int } U_n y$. Пусть $x \in U_n y$. Тогда $xy^{-1} \in U_n$ и

$$|N(x) - N(y)| \leq N(xy^{-1}) \leq 2/2^n < \varepsilon.$$

□

Для преднормы N обозначим

$$B_N := \{g \in G : N(g) < 1\}.$$

Предложение 2. Пусть G есть R -топологическая группа и $U \in \mathcal{N}_e$. Тогда $e \in B_N \subset U$ для некоторой непрерывной преднормы N на G .

Доказательство. Существует $(U_n)_{n \in \omega}$ есть последовательность подмножеств группы G , так что $U = V_0$, $V_n \in \mathcal{N}_e$ и $V_{n+1}^2 \subset V_n$ для $n \in \omega$. Положим $U_n = V_n \cap V_n^{-1}$. Преднорма N из утверждения 3 искомая. □

Обозначим

$$d_N(x, y) := N(xy^{-1}) \text{ и } B_N(x, r) := \{y \in G : d_N(x, y) < r\}$$

для $x, y \in G$ и $r > 0$. Функция d_N является правоинвариантной псевдометрикой на G и d_N непрерывна, если непрерывна преднорма N . Правоинвариантная метрика d определяет преднорму N_d : $N_d(x) = d(e, x)$. Отметим, что $d = d_{N_d}$. Таким образом между преднормами и правоинвариантными метриками на G есть естественное взаимнооднозначное соответствие, непрерывным преднормам соответствуют непрерывные правоинвариантные псевдометрики.

Семейство $\{d_\alpha : \alpha \in A\}$ псевдометрик на пространстве X задают топологию пространства X если семейство открытых относительно d_α множеств для $\alpha \in A$ образуют предбазу X .

Предложение 3. Пусть G есть группа с топологией. Группа G является R -топологической группой если и только если топология G задается семейством правоинвариантных псевдометрик.

Доказательство. Пусть G является R -топологической группой. Из предложения 2 вытекает, что для $U \in \mathcal{N}_e$ существует N_U непрерывная преднорма, для которой $B_{N_U} \subset U$. Пусть $d_U = d_{N_U}$. Семейство $\{d_U : U \in \mathcal{N}_e\}$ непрерывных правоинвариантных метрик задают топологию G .

Пусть $\{N_\alpha : \alpha \in A\}$ есть семейство непрерывных преднорм так что $\{d_{N_\alpha} : \alpha \in A\}$ есть семейство правоинвариантных метрик, задающих топологию G . Правые сдвиги ρ_g непрерывны в G . Пусть $U \in \mathcal{N}_e$. Существует $\varepsilon > 0$ и конечное $B \subset A$ так что $\bigcap_{\alpha \in B} B_{N_\alpha}(e, \varepsilon) \subset U$. Положим $V = \bigcap_{\alpha \in B} B_{N_\alpha}(e, \varepsilon/2)$. Тогда $V \in \mathcal{N}_e$, $V = V^{-1}$ и $V^2 \subset U$. □

Предложение 4. Пусть G есть отделимая R -топологическая группа.

- (1) Если G пространство с первой аксиомой счетности, то существует непрерывная правоинвариантная метрика d на G , которая задает топологию на G .
- (2) Если G пространство счетного псевдохарактера, то существует непрерывная правоинвариантная метрика d .

Доказательство. Пусть $(W_n)_{n \in \omega}$ есть последовательность окрестностей единицы, которая в случае (1) образует базу в e и $\{e\} = \bigcap_{n \in \omega} W_n$ в случае (2). Существует последовательность $(V_n)_{n \in \omega}$ окрестностей единицы, так что $V_{n+1}^2 \subset V_n \subset W_n$ для $n \in \omega$. Положим $U_n = V_n \cap U_n^{-1}$ для $n \in \omega$. Пусть N есть пренорма как в утверждении 3 и $d = d_N$. \square

Теорема 1. Пусть G есть отделимая R -топологическая группа.

- (1) Группа G метризуема если и только если G с первой аксиомой счетности.
- (2) Группа G субметризуема если и только если G со счетным псевдохарактером.

Теорема 1 является обобщением теоремы Birkhoff-Какутани, смотри Theorem 3.3.12 и Theorem 3.3.16 из [11].

Из предложения 1 вытекает

Теорема 2. Пусть G есть R -топологическая группа. Если множество

$$H_{fl} = \{g \in G : \lambda_g \text{ является слабым гомеоморфизмом}\}$$

плотно в G , то G является топологической группой.

Пример 1. Опишем Example (d) из [14]. Пусть $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, $\varphi : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ разрывный автоморфизм группы \mathbb{T} , для которого $\varphi^2 = \text{id}_{\mathbb{T}}$. Положим $H = \{\text{id}_{\mathbb{T}}, \varphi\}$ с дискретной топологией, $G = \mathbb{T} \rtimes H$, G как множество и пространство гомеоморфно $\mathbb{T} \times H$. Напомним определение умножения в полупрямом произведении G :

$$(t_1, h_1) \cdot (t_2, h_2) = (t_1 h_1(t_2), h_1 h_2).$$

Группа G является компактной метризуемой право полутопологической группой. Подгруппа \mathbb{T} нормальна и открыто замкнута в G . Так как \mathbb{T} является топологической группой, то G является $O(ie, pe)$ -топологической группой. Окончательно, G есть метризуемая компактная R -топологическая группа, которая не является топологической группой.

5. Свойства пространств, определяемые с помощью полуокрестностей диагонали

5.1. Полуокрестности диагонали

Пусть X множество, $P, Q \subset X \times X$. Обозначим

$$P(x) := \{y \in X : (x, y) \in P\},$$

$$P(M) := \{y \in X : \text{существует } x \in M, \text{ так что } (x, y) \in P\} = \bigcup_{x \in M} P(x),$$

$$P|_M := P \cap (M \times M),$$

$$P^{-1} := \{(x, y) : (y, x) \in P\},$$

$$P \circ Q := \{(x, y) : \text{существует } z \in X \text{ так что } (x, z) \in P \text{ и } (z, y) \in Q\}$$

для $x \in X$ и $M \subset X$.

Определение 2. Пусть X пространство, $P \subset X \times X$. Назовем множество P *полуоткрытым* (semiopen) если каждое $P(x)$ открыто. Назовем P *полуокрестностью диагонали*, если $x \in \text{Int } P(x)$ для всех $x \in X$. Обозначим через $\mathfrak{S}(X)$ семейство всех полуокрестностей диагонали пространства X .

Замечание 1. В работе [15] в определении полуокрестности диагонали предполагалось, что множество $P(x)$ открыто, то есть предполагалось что P полуоткрыто. Понятие полуоткрытой полуокрестности диагонали по сути совпадает с понятием соответствия окрестности [16]: отображение $P : X \rightarrow \mathcal{T}$ называется *соответствием окрестности* (neighbourhood assignment) если $x \in P(x)$ и $P(x)$ открыто для $x \in X$.

Множество P является полуокрестностью диагонали если и только если в P лежит некоторая полуоткрытая полуокрестность диагонали.

Если X топологическое пространство, то обозначим

$$\overline{P}^v := \{(x, y) \in X \times X : y \in \overline{P(x)}\}.$$

Ясно, что $\overline{P}^v(x) = \overline{P(x)}$ для $x \in X$.

Введем на $\text{Exp}(\mathfrak{S}(X))$ отношение порядка и связанное с ним отношение эквивалентности. Для $\mathcal{P}, \mathcal{Q} \subset \mathfrak{S}(X)$ положим

- $\mathcal{P} \preceq \mathcal{Q}$ если и только если для любого $Q \in \mathcal{Q}$ существует $P \in \mathcal{P}$, так что $P \subset Q$;
- $\mathcal{P} \sim \mathcal{Q}$ если и только если $\mathcal{P} \preceq \mathcal{Q}$ и $\mathcal{Q} \preceq \mathcal{P}$.

Отметим, что если $\mathcal{P} \supset \mathcal{Q}$, то $\mathcal{P} \preceq \mathcal{Q}$. Для $\mathcal{P} \subset \mathfrak{S}(X)$ обозначим

$$\mathcal{P}^e := \{R \in \mathfrak{S}(X) : P \subset R, \text{ для некоторого } P \in \mathcal{P}\}.$$

Для $\mathcal{P} \subset \mathfrak{S}(X)$ обозначим

$$\begin{aligned} \mathsf{P}(\mathcal{P}) &:= \mathcal{P}, \\ \mathsf{P}_+(\mathcal{P}) &:= \{Q \circ P : Q \in \mathfrak{S}(X) \text{ и } P \in \mathcal{P}\}, \\ \mathsf{P}^v(\mathcal{P}) &:= \{\overline{P}^v : P \in \mathcal{P}\}, \\ \mathsf{P}^c(\mathcal{P}) &:= \{\overline{P} : P \in \mathcal{P}\}, \\ \mathsf{P}_+^c(\mathcal{P}) &:= \mathsf{P}^v(\mathsf{P}_+(\mathcal{P})). \end{aligned}$$

Предложение 5 (Proposition 11 [4]). Пусть X пространство. Для $\mathcal{P} \subset \mathfrak{S}(X)$

- $\mathcal{P} \preceq \mathsf{P}_+(\mathcal{P}) \preceq \mathsf{P}_+^c(\mathcal{P})$
- $\mathcal{P} \preceq \mathsf{P}^v(\mathcal{P}) \preceq \mathsf{P}^c(\mathcal{P}) \preceq \mathsf{P}_+^c(\mathcal{P})$

Пусть λ есть ординал, $P_\alpha \subset X \times X$ для $\alpha < \lambda$. Индукцией по $\beta < \gamma$ определим множества $\mathfrak{p}_\beta(\mathcal{S}_\beta), \mathfrak{p}_\beta^c(\mathcal{S}_\beta) \subset X \times X$, где $\mathcal{S}_\beta = (P_\alpha)_{\alpha < \beta}$.

$\beta = 0$. Положим

$$\mathfrak{p}_0(\mathcal{S}_0) := \mathfrak{p}_0^c(\mathcal{S}_0) := \{\emptyset\}.$$

$\beta = 1$. Положим

$$\mathfrak{p}_1(\mathcal{S}_1) := P_0, \quad \mathfrak{p}_1^c(\mathcal{S}_1) := \overline{P_0}.$$

$1 < \beta \leq \gamma$. Положим

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_\beta(\mathcal{S}_\beta) &:= \begin{cases} Q_\beta, & \text{если } \beta \text{ предельный кардинал} \\ Q_\beta \circ P_{\beta'}, & \text{если } \beta = \beta' + 1 \end{cases} \\ \mathfrak{p}_\beta^c(\mathcal{S}_\beta) &:= \begin{cases} \overline{Q_\beta}, & \text{если } \beta \text{ предельный кардинал} \\ \overline{Q_\beta \circ P_{\beta'}}, & \text{если } \beta = \beta' + 1 \end{cases} \end{aligned}$$

где

$$Q_\beta = \bigcup_{\alpha < \beta} \mathfrak{p}_\alpha(\mathcal{S}_\alpha) \quad \text{и} \quad Q_\beta^c = \bigcup_{\alpha < \beta} \mathfrak{p}_\alpha^c(\mathcal{S}_\alpha).$$

Для $\mathcal{P} \subset \mathfrak{S}(X)$ обозначим

$$\begin{aligned} \mathsf{P}_\gamma(\mathcal{P}) &:= \{\mathfrak{p}_\gamma(\mathcal{S}) : \mathcal{S} \in \mathcal{P}^\gamma\}, \\ \mathsf{P}_\gamma^c(\mathcal{P}) &:= \{\mathfrak{p}_\gamma^c(\mathcal{S}) : \mathcal{S} \in \mathcal{P}^\gamma\}, \\ \mathcal{P}|_Y &:= \{P|_Y : P \in \mathcal{P}\} \end{aligned}$$

для $Y \subset X$.

Предложение 6 (Proposition 12 [4]). Пусть X пространство, $\mathcal{P} \subset \mathfrak{S}(X)$ и $1 < \alpha < \beta$ ординалы. Тогда

$$\begin{aligned} \mathsf{P}_+(\mathcal{P}) &\preceq \mathsf{P}_2(\mathcal{P}) \preceq \mathsf{P}_\alpha(\mathcal{P}) \preceq \mathsf{P}_\beta(\mathcal{P}) \preceq \mathsf{P}_\beta^c(\mathcal{P}) \\ \mathsf{P}^c(\mathcal{P}) &= \mathsf{P}_1^c(\mathcal{P}) \preceq \mathsf{P}_\alpha^c(\mathcal{P}) \preceq \mathsf{P}_\beta^c(\mathcal{P}) \\ \mathsf{P}^c(\mathcal{P}) &\preceq \mathsf{P}_+^c(\mathcal{P}) \preceq \mathsf{P}_2^c(\mathcal{P}) \end{aligned}$$

5.2. Нормальные функторы квадрата

Функтор \mathfrak{Q} , который топологическому пространству X ставит в соответствие семейство $\mathfrak{Q}(X) \subset \text{Exp}_*(X \times X)$ непустых подмножеств $X \times X$, назовем *функтором квадрата*. Функтор квадрата \mathfrak{Q} назовем *нормальным функтором квадрата* (NFS), если выполняются условия:

(Q_1) если $f : X \rightarrow Y$ есть гомеоморфизм, то

$$\mathfrak{Q}(Y) = \{(f \times f)(P) : P \in \mathfrak{Q}(X)\};$$

(Q_2) если U есть открытое непустое подмножество X , то

$$\mathfrak{Q}(U) = \mathfrak{Q}(X)|_U;$$

(Q_3) если $S \in \mathfrak{Q}(X)$, $S \subset Q \subset X \times X$, то $Q \in \mathfrak{Q}(X)$;

(Q_4) если $S \in \mathfrak{Q}(X)$ то $\overline{S} = X \times X$.

На нормальных функторах квадрата введем отношение порядка. Для NFS \mathfrak{Q} и \mathfrak{R} выполняется $\mathfrak{Q} \preceq \mathfrak{R}$ если и только если $\mathfrak{Q}(X) \supset \mathfrak{R}(X)$ для любого пространства X .

Определим NFS, которые мы будем использовать. Пусть $k \in \{d, h, v, s, a\}$, X есть пространство, $S \in \text{Exp}_*(X \times X)$. Тогда $S \in \mathfrak{Q}_k(X)$ если и только если выполняется условие (L_k):

$$(L_d) \overline{S} = X \times X;$$

$$(L_v) \overline{S(x)} = X \text{ для любого } x \in X;$$

$$(L_h) \overline{S^{-1}(x)} = X \text{ для любого } x \in X;$$

$$(L_s) M \times X \subset S \text{ для некоторого } M \subset X = \overline{M};$$

$$(L_a) S = X.$$

Предложение 7 (Proposition 21 [4]). Пусть $k \in \{d, h, v, s, a\}$, X есть пространство и $S \in \text{Exp}_*(X \times X)$. Тогда $S \in \mathfrak{Q}_k(X)$ если и только если для любого $x \in X$ и любой окрестности $U \subset X$ точки x выполняется условие (L'_k):

$$(L'_d) \overline{S(U)} = X;$$

$$(L'_v) \overline{S(x)} = X;$$

$$(L'_h) S(U) = X;$$

$$(L'_s) S(z) = X \text{ для некоторого } z \in U;$$

$$(L'_a) S(x) = X.$$

Предложение 8 (Proposition 22 [4]). *Для любого NFS Ω*

$$\begin{aligned}\Omega_d &\preceq \Omega \preceq \Omega_a, \\ \Omega_h &\preceq \Omega_s.\end{aligned}$$

Введем на NFS операцию инкрементирования: для NFS Ω определим NFS Ω^+ . Пусть X есть пространство, $Q \in \text{Exp}_*(X \times X)$. Тогда $Q \in \Omega^+(X)$ если и только если $P \circ S \subset Q$ для некоторых $P \in \mathfrak{S}(X)$ и $S \in \Omega(X)$.

Предложение 9 (Proposition 23 [4]).

$$\begin{aligned}\Omega_v &\preceq \Omega_d^+ \\ \Omega_a &= \Omega_s^+ = \Omega_h^+\end{aligned}$$

5.3. $\Delta(\mathcal{P}; \Omega)$ -беровские пространства

Определение 3. Пусть Ω есть нормальный функтор квадрата, (X, \mathcal{T}) пространство, $\mathcal{T}^* = \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\}$, $\mathcal{P} \subset \mathfrak{S}(X)$. Назовем X

- $\Delta(\mathcal{P}; \Omega)$ -тучным ($\Delta(\mathcal{P}; \Omega)$ -попмеагре) пространством, если для любого $P \in \mathcal{P}$ существует $V \in \mathcal{T}^*$, так что $P|_V \in \Omega(V)$;
- $\Delta(\mathcal{P}; \Omega)$ -беровским ($\Delta(\mathcal{P}; \Omega)$ -Baire space) пространством, если для любого $P \in \mathcal{P}$ и любого $U \in \mathcal{T}^*$ существует открытое непустое $V \subset U$, так что выполняется условие $P|_V \in \Omega(V)$.


Предложение 10 (Proposition 30 [4]). *Пусть X пространство, $\mathcal{P} \subset \mathfrak{S}(X)$. В диаграммах ниже, стрелка*

$$(F)_k \rightarrow (G)_l$$

означает, что $F, G : \text{Exp}(\mathfrak{S}(X)) \rightarrow \text{Exp}(\mathfrak{S}(X))$ есть отображения, $k, l \in \{d, v, h, s, a\}$ и выполняются условия


- (1) Если X является $\Delta(F(\mathcal{P}); \Omega_k)$ -тучным пространством, то X является $\Delta(G(\mathcal{P}); \Omega_l)$ -тучным пространством и
- (2) если X является $\Delta(F(\mathcal{P}); \Omega_k)$ -беровским пространством, то X является $\Delta(G(\mathcal{P}); \Omega_l)$ -беровским пространством.

$$(P^c)_v \longleftarrow (P^c)_a \longleftarrow (P^c)_s \longleftarrow (P^c)_h \longleftarrow (P^c)_d$$



Пусть $1 < \alpha < \beta$ ординалы.

$$(P_\alpha^c)_v \longleftrightarrow (P_\alpha^c)_a \longleftrightarrow (P_\alpha^c)_s \longleftrightarrow (P_\alpha^c)_h \longleftrightarrow (P_\alpha^c)_d$$



5.4. $\Delta(\Omega)$ -беровские пространства

Определение 4. Пусть Ω есть нормальный функтор квадрата, X есть пространство, γ есть ординал, $\mathcal{P} = \mathfrak{S}(X)$. Пусть $P_l^k : \text{Exp}(\mathfrak{S}(X)) \rightarrow \text{Exp}(\mathfrak{S}(X))$ есть одно из отображений, рассматриваемых в разделе 5.1:

$$P_l^k \in \{P, P^e, P^v, P^c, P_+, P_+^c, P_\gamma, P_\gamma^c\}.$$

Будем говорить, X является ${}^k\Delta^l(\Omega)$ -беровским (${}^k\Delta^l(\Omega)$ -тучным) пространством, если X является $\Delta(P_l^k(\mathfrak{S}(X)); \Omega)$ -беровским ($\Delta(P_l^k(\mathfrak{S}(X)); \Omega)$ -тучным) пространством. Для

$$\tilde{\Delta} \in \{\Delta, {}^e\Delta, {}^v\Delta, {}^c\Delta, \Delta^+, {}^c\Delta^+, \Delta^\gamma, {}^c\Delta^\gamma\}$$

мы определили $\tilde{\Delta}(\Omega)$ -беровские ($\tilde{\Delta}(\Omega)$ -тучные) пространства. Для

$$k \in \{d, h, v, s, a\}$$

будем говорить, X является $\tilde{\Delta}_k$ -беровским ($\tilde{\Delta}_k$ -тучным) пространством, если X является $\tilde{\Delta}(\Omega_k)$ -беровским ($\tilde{\Delta}(\Omega_k)$ -тучным) пространством. Для

$$\tilde{\Delta} \in \{\Delta_k, {}^e\Delta_k, {}^v\Delta_k, {}^c\Delta_k, \Delta_k^+, {}^c\Delta_k^+, \Delta_k^\gamma, {}^c\Delta_k^\gamma\}$$

мы определили $\tilde{\Delta}$ -беровские ($\tilde{\Delta}$ -тучные) пространства. Также, если нижний индекс не написан, подразумевается d : ${}^k\Delta^l$ -тучность (${}^k\Delta^l$ -беровость) это ${}^k\Delta_d^l$ -тучность (${}^k\Delta_d^l$ -беровость). Отдельное непосредственное определение для наиболее важных классов пространств: пространство X называется

- (1) Δ -тучным (Δ -беровским) если X является $\Delta(\mathfrak{S}(X); \Omega_d)$ -тучным ($\Delta(\mathfrak{S}(X); \Omega_d)$ -беровским);
- (2) Δ_h -тучным (Δ_h -беровским) если X является $\Delta(\mathfrak{S}(X); \Omega_h)$ -тучным ($\Delta(\mathfrak{S}(X); \Omega_h)$ -беровским);
- (3) Δ_s -тучным (Δ_s -беровским) если X является $\Delta(\mathfrak{S}(X); \Omega_s)$ -тучным ($\Delta(\mathfrak{S}(X); \Omega_s)$ -беровским);
- (4) Δ^γ -тучным (Δ^γ -беровским) если X является $\Delta(\mathcal{P}_\gamma(\mathfrak{S}(X)); \Omega_d)$ -тучным ($\Delta(\mathcal{P}_\gamma(\mathfrak{S}(X)); \Omega_d)$ -беровским);
- (5) ${}^c\Delta^\gamma$ -тучным (${}^c\Delta^\gamma$ -беровским) если X является $\Delta(\mathcal{P}_\gamma^c(\mathfrak{S}(X)); \Omega_d)$ -тучным ($\Delta(\mathcal{P}_\gamma^c(\mathfrak{S}(X)); \Omega_d)$ -беровским);

Замечание 2. Пространства, которые здесь называются " Δ -тучными" в работах [15, 17, 18] назывались " Δ -беровскими".

Предложение 11 (Proposition 33 [4]). *Пусть X есть пространство, Ω есть NFS и $n \in \omega$. Рассмотрим условие*

- (*) 1. *Пространство X является $\tilde{\Delta}(\Omega)$ -тучным если и только если некоторое непустое открытое $U \subset X$ является $\tilde{\Delta}(\Omega)$ -беровским.*
2. *Если пространство X однородно, то X является $\tilde{\Delta}(\Omega)$ -тучным если и только если X является $\tilde{\Delta}(\Omega)$ -беровским.*

- (1) *Если $\tilde{\Delta} \in \{\Delta, \Delta^n\}$, то выполняется (*).*
- (2) *Если пространство X квазирегулярно и $\tilde{\Delta} \in \{\Delta, \Delta^n, {}^v\Delta, {}^c\Delta, {}^c\Delta^+, {}^c\Delta^n\}$, то выполняется (*).*

Теорема 3 (Theorem 4 [4]). *Пусть \mathcal{P}_k (\mathcal{P}_c) есть наименьший класс пространств, который*

- *содержит p -пространства и сильно Σ -пространства;*

- замкнут относительно произвольных (счетных) произведений;
- переходу к открытым подпространствам.

Для $\tilde{\Delta} \in \{\Delta_s, \Delta_h, \Delta\}$, если регулярное беровское (тучное) пространство X принадлежит классу пространств, описанных в пункте $(\tilde{\Delta})$, то X является $\tilde{\Delta}$ -беровским (-тучным).

(Δ_s) σ -пространства.

(Δ_h) наименьший класс пространств, который

- содержит Σ -пространства и $w\Delta$ -пространства;
- замкнут относительно произведений на пространства из класса \mathcal{P}_c ;
- переходу к открытым подпространствам.

(Δ) наименьший класс пространств, который

- содержит Σ -пространства, $w\Delta$ -пространства и слабо компактные пространства;
- замкнут относительно произведений на пространства из класса \mathcal{P}_k ;
- переходу к открытым подпространствам.

5.5. CDP-беровские пространства

Пусть X пространство, \mathcal{G} семейство открытых подмножеств X . Обозначим

$$B(X, \mathcal{G}) := \{x \in X : \text{семейство} \\ \{st(x, \gamma) : \gamma \in \mathcal{G} \text{ и } x \in \bigcup \gamma\} \\ \text{является базой в точке } x\}$$

$$dev(X) := \min\{|\mathcal{G}| : \mathcal{G} \text{ семейство открытое покрытие } X \\ \text{и } X = B(X, \mathcal{G}), \}$$

Пусть $Y \subset X$, \mathcal{N} есть семейство всех нигде не плотных подмножеств X . Если $Y \not\subset \bigcup \mathcal{N}$, то положим $Nov(Y, X) := \infty$, в противном случае

$$Nov(Y, X) := \min\{|\mathcal{L}| : \mathcal{L} \subset \mathcal{N} \text{ и } Y \subset \bigcup \mathcal{L}\},$$

$$Nov(X) := Nov(X, X).$$

Определение 5. Пусть X пространство.

- Назовем пространство *CDP-пространством*, если $dev(X) < Nov(X)$, то есть если существует семейство \mathcal{P} открытых покрытий пространства X , так что $|\mathcal{P}| < Nov(X)$ и $B(X, \mathcal{P}) = X$.

- Назовем пространство CDP_0 -пространством, если существует семейство \mathcal{P} открытых разбиений пространства X , так что $|\mathcal{P}| < \text{Nov}(X)$ и $B(X, \mathcal{P}) = X$.
- Назовем пространство X CDP -тучным, если существует семейство \mathcal{G} открытых семейств пространства X , так что $|\mathcal{G}| < \text{Nov}(Y, X)$ для $Y = B(X, \mathcal{P})$.
- Назовем пространство X CDP -беровским, если каждое непустое открытое подмножество X является CDP -тучным пространством.

В статье [7] изучают пространства, для которых $\text{dev}(X) < \text{Nov}(X)$, то есть CDP -пространства. Метризуемые тучные пространства являются CDP -пространствами. Примеры неметризуемых CDP -пространств можно получить используя аксиому Мартина (МА).

Предложение 12 (Proposition 38 [4]). (МА) Пусть $\tau < 2^\omega$ бесконечный кардинал, X есть абсолютное G_τ пространство со счетным числом Суслина и $\text{dev}(X) \leq \tau$, например $X = \mathbb{R}^\tau$. Тогда X является CDP -пространством.

Ясно, CDP -пространство является CDP_0 -пространством.

Теорема 4 (Theorem 5 [4]). Пусть X есть полурегулярное пространство. Следующие условия эквивалентны

- (1) X есть CDP -беровское пространство;
- (2) некоторое непустое открытое подмножество $U \subset X$ содержит плотное CDP -пространство $Y \subset U \subset \bar{Y}$;
- (2) некоторое непустое открытое подмножество $U \subset X$ содержит плотное CDP_0 -пространство $Y \subset U \subset \bar{Y}$;

Из теоремы 4 вытекает

Предложение 13 (Proposition 41 [4]). Пусть X есть полурегулярное пространство. Если в X есть метризуемое тучное подпространство, то X CDP -тучное пространство.

5.6. Δ_s -беровские пространства

Известные примеры Δ_s -беровских пространств получаются с помощью следующего предложения

Предложение 14 (Proposition 42 [4]). Пусть X есть пространство. Если X является CDP -тучным (беровским), то X является Δ_s -тучным (беровским).

В [4] приводятся другие подклассы Δ_s -тучных пространств, но неизвестно, есть в этих классах не CDP -тучные пространства.

Из предложений 13 и 14 вытекает

Предложение 15. Пусть X есть пространство. Если X содержит тучное метризуемое подпространство, то X является Δ_s -тучным.

В предположении $\text{MA} + \neg \text{CH}$ существует Δ_s -тучное пространство без точек с первой аксиомой счетности: из предложений 14 и 12 вытекает что пространство \mathbb{R}^{ω_1} является Δ_s -тучным.

Предложение 16. Пусть (X, \mathcal{T}) есть пространство, $\mathcal{T}^* = \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\}$. Следующие условия эквивалентны:

- (1) X есть Δ_s -тучное пространство.
- (2) Пусть $W : \mathcal{T}^* \rightarrow \mathcal{T}^*$ есть такое отображение, что

$$W(V) \subset W(U) \subset U$$

для $V, U \in \mathcal{T}^*$, $V \subset U$. Тогда существует такое $x \in X$, так что $x \in W(U)$ для каждого $U \in \text{St}(x, \mathcal{T}^*)$.

Доказательство. (1) \implies (2). Предположим противное. Тогда существует такая полукрытая окрестность P диагонали, так что $x \notin W(P(x))$ для всех $x \in X$. Так как X есть Δ_s -тучное пространство, то существует $U \in \mathcal{T}^*$, для которого $M = \{x \in U : U \subset P(x)\}$ плотно в U . Пусть $x \in W(U) \cap M$. Тогда $x \in U \subset W(P(x))$. Противоречие.

(2) \implies (1). Предположим противное. Тогда существует такая полукрытая окрестность P диагонали, так что $M(U) = \{x \in U : U \subset P(x)\}$ не плотно в U для всех $U \in \mathcal{T}^*$. Положим $W(U) = U \setminus \overline{M(U)}$. Для W выполняются условия (2). Тогда существует $x \in X$, для которого $x \in W(U)$ для каждого $U \in \text{St}(x, \mathcal{T}^*)$. Тогда $x \in W(U)$ для $U = P(x)$. Следовательно $x \notin M(U)$ и $U \not\subset P(x)$. Противоречие, так как $U = P(x)$. \square

Теорема 5. Пусть X есть Δ_s -тучное пространство и отображение $f : X \rightarrow X$ является слабым гомеоморфизмом. Тогда для некоторого $x \in X$ отображение f непрерывно в x и f^{-1} непрерывно в $f(x)$.

Доказательство. Пусть \mathcal{T}^* есть все открытые непустые подмножества X . Положим

$$W(U) = \text{Int } f^{-1}(\text{Int } f(U))$$

для $U \in \mathcal{T}^*$. Так как f является слабым гомеоморфизмом, то $W(U) \neq \emptyset$ и для W выполняются условия предложения 16. Тогда существует такое $x \in X$, так что $x \in W(U)$ для каждого $U \in \text{St}(x, \mathcal{T}^*)$. Точка x является искомой. \square

6. Свойства групп, определяемые с помощью инвариантных полукрестностей диагонали

В этом разделе (G, \mathcal{T}) право топологическая группа, $\mathcal{T}^* = \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\}$, \mathcal{N}_e семейство открытых окрестностей единицы, $\tilde{\mathcal{N}}_e$ семейство окрестностей единицы, не обязательно открытых.

6.1. Полуокрестности диагонали в группах

Множество $P \subset G \times G$ назовем *правоинвариантным*, если

$$\{(xg, yg) : (x, y) \in P\} = P$$

для всех $g \in G$. Для $M \subset G$ положим

$$\mathfrak{N}(M) := \{(x, gx) : g \in M \text{ и } x \in G\}.$$

Если $P = \mathfrak{N}(M)$, то $P(g) = Mg$. Множество $\mathfrak{N}(M)$ правоинвариантно. Отображение \mathfrak{N} устанавливает взаимно однозначное соответствие между подмножествами G и правоинвариантными подмножествами $G \times G$. Если $P \subset G \times G$ правоинвариантное подмножество, то $P = \mathfrak{N}(P(e))$. Обозначим

$$\begin{aligned}\overline{M}^d &:= \bigcap \{\overline{MV} : V \in \mathcal{N}_e\}, \\ \overline{M}^h &:= \bigcap \{MV : V \in \mathcal{N}_e\}.\end{aligned}$$

Утверждение 4. Пусть $L, M \subset G$. Тогда

- (1) $(x, y) \in \mathfrak{N}(M)$ если и только если $yx^{-1} \in M$;
- (2) $(\mathfrak{N}(M))^{-1} = \mathfrak{N}(M^{-1})$;
- (3) $\overline{\mathfrak{N}(M)} = \mathfrak{N}(\overline{M}^d)$;
- (4) $\mathfrak{N}(M) \circ \mathfrak{N}(L) = \mathfrak{N}(LM)$.

Доказательство. (1) $(x, y) \in \mathfrak{N}(M) \iff y = gx$ для некоторого $g \in M \iff yx^{-1} \in M$.

(2) $(x, y) \in (\mathfrak{N}(M))^{-1} \iff (y, x) \in \mathfrak{N}(M) \iff xy^{-1} \in M \iff (x, y) \in \mathfrak{N}(M^{-1})$.

(3) $(x, y) \in \overline{\mathfrak{N}(M)} \iff (Vx \times Uy) \cap \mathfrak{N}(M) \neq \emptyset$ для любых $V, U \in \mathcal{N}_e \iff MUx \cap Vy \neq \emptyset$ для любых $V, U \in \mathcal{N}_e \iff y \in \overline{MUx}$ для любого $U \in \mathcal{N}_e \iff y \in \overline{M}^d x$.

(4) $(x, y) \in \mathfrak{N}(M) \circ \mathfrak{N}(L) \iff (x, z) \in \mathfrak{N}(M)$ и $(z, y) \in \mathfrak{N}(L)$ для некоторого $z \in G \iff z \in Mx$ и $y \in Lz$ для некоторого $z \in G \iff y \in LMx$. \square

Обозначим

$$\mathfrak{S}_g(G) := \{P \in \mathfrak{S}(G) : G \text{ есть правоинвариантное подмножество}\}.$$

Отображение \mathfrak{N} устанавливает биекцию между $\tilde{\mathcal{N}}_e$ и $\mathfrak{S}_g(G)$.

Введем на $\text{Exp}(\tilde{\mathcal{N}}_e)$ отношение порядка и связанное с ним отношение эквивалентности. Для $\mathcal{U}, \mathcal{V} \subset \tilde{\mathcal{N}}_e$ положим

- $\mathcal{U} \preceq \mathcal{V}$ если и только если для любого $V \in \mathcal{V}$ существует $U \in \mathcal{U}$, так что $U \subset V$;

- $\mathcal{U} \sim \mathcal{V}$ если и только если $\mathcal{U} \preceq \mathcal{V}$ и $\mathcal{V} \preceq \mathcal{U}$.

Отметим, что если $\mathcal{U} \supset \mathcal{V}$, то $\mathcal{U} \preceq \mathcal{V}$. Для $\mathcal{U} \subset \tilde{\mathcal{N}}_e$ обозначим

$$\mathbf{N}^e(\mathcal{U}) := \{W \in \tilde{\mathcal{N}}_e : U \subset W, \text{ для некоторого } U \in \mathcal{U}\}.$$

Предложение 17. Для $\mathcal{U}, \mathcal{V} \subset \tilde{\mathcal{N}}_e$

- $\mathcal{U} \preceq \mathcal{V}$ если и только если $\mathbf{N}^e(\mathcal{U}) \supset \mathbf{N}^e(\mathcal{V})$;
- $\mathcal{U} \sim \mathcal{V}$ если и только если $\mathbf{N}^e(\mathcal{U}) = \mathbf{N}^e(\mathcal{V})$.

Для $\mathcal{U} \subset \tilde{\mathcal{N}}_e$ обозначим

$$\begin{aligned} \mathbf{N}(\mathcal{U}) &:= \mathcal{U}, \\ \mathbf{N}_+(\mathcal{U}) &:= \{UV : V \in \tilde{\mathcal{N}}_e \text{ и } U \in \mathcal{U}\}, \\ \mathbf{N}^v(\mathcal{U}) &:= \{\bar{U} : U \in \mathcal{U}\}, \\ \mathbf{N}^c(\mathcal{U}) &:= \{\bar{U}^d : U \in \mathcal{U}\}, \\ \mathbf{N}_+^c(\mathcal{U}) &:= \mathbf{N}^v(\mathbf{N}_+(\mathcal{U})). \end{aligned}$$

Из определений вытекает

Предложение 18. Пусть X пространство. Для $\mathcal{U} \subset \tilde{\mathcal{N}}_e$

- $\mathcal{U} \preceq \mathbf{N}_+(\mathcal{U}) \preceq \mathbf{N}_+^c(\mathcal{U})$
- $\mathcal{U} \preceq \mathbf{N}^v(\mathcal{U}) \preceq \mathbf{N}^c(\mathcal{U}) \preceq \mathbf{N}_+^c(\mathcal{U})$

Пусть λ есть ординал, $M_\alpha \subset G$ для $\alpha < \lambda$. Индукцией по $\beta < \gamma$ определим множества $\mathfrak{n}_\beta(\mathcal{S}_\beta), \mathfrak{n}_\beta^c(\mathcal{S}_\beta) \subset G$, где $\mathcal{S}_\beta = (M_\alpha)_{\alpha < \beta}$.

$\beta = 0$. Положим

$$\mathfrak{n}_0(\mathcal{S}_0) := \mathfrak{n}_0^c(\mathcal{S}_0) := \{\emptyset\}.$$

$\beta = 1$. Положим

$$\mathfrak{n}_1(\mathcal{S}_1) := M_0, \quad \mathfrak{n}_1^c(\mathcal{S}_1) := \overline{M_0}^d.$$

$1 < \beta \leq \gamma$. Положим

$$\mathfrak{n}_\beta(\mathcal{S}_\beta) := \begin{cases} Q_\beta, & \text{если } \beta \text{ предельный кардинал} \\ M_{\beta'} Q_\beta, & \text{если } \beta = \beta' + 1 \end{cases}$$

$$\mathfrak{n}_\beta^c(\mathcal{S}_\beta) := \begin{cases} \overline{Q_\beta}^d, & \text{если } \beta \text{ предельный кардинал} \\ \overline{M_{\beta'} Q_\beta}^d, & \text{если } \beta = \beta' + 1 \end{cases}$$

где

$$Q_\beta = \bigcup_{\alpha < \beta} \mathfrak{n}_\alpha(\mathcal{S}_\alpha) \quad \text{и} \quad Q_\beta^c = \bigcup_{\alpha < \beta} \mathfrak{n}_\alpha^c(\mathcal{S}_\alpha).$$

Для $\mathcal{U} \subset \tilde{\mathcal{N}}_e$ обозначим

$$\begin{aligned} \mathbf{N}_\gamma(\mathcal{U}) &:= \{\mathfrak{n}_\gamma(\mathcal{S}) : \mathcal{S} \in \mathcal{U}^\gamma\}, \\ \mathbf{N}_\gamma^c(\mathcal{U}) &:= \{\mathfrak{n}_\gamma^c(\mathcal{S}) : \mathcal{S} \in \mathcal{U}^\gamma\}. \end{aligned}$$

Из предложения 18 и определений вытекает

Предложение 19. Пусть $\mathcal{U} \subset \tilde{\mathcal{N}}_e$ и $1 < \alpha < \beta$ ординалы. Тогда

$$\begin{aligned} \mathbf{N}_+(\mathcal{U}) &\preceq \mathbf{N}_2(\mathcal{U}) \preceq \mathbf{N}_\alpha(\mathcal{U}) \preceq \mathbf{N}_\beta(\mathcal{U}) \preceq \mathbf{N}_\beta^c(\mathcal{U}) \\ \mathbf{N}^c(\mathcal{U}) &= \mathbf{N}_1^c(\mathcal{U}) \preceq \mathbf{N}_\alpha^c(\mathcal{U}) \preceq \mathbf{N}_\beta^c(\mathcal{U}) \\ \mathbf{N}^c(\mathcal{U}) &\preceq \mathbf{N}_+^c(\mathcal{U}) \preceq \mathbf{N}_2^c(\mathcal{U}) \end{aligned}$$

Для $\mathcal{B} \subset \tilde{\mathcal{N}}_e$, $\mathcal{B} \sim \tilde{\mathcal{N}}_e$ если и только если \mathcal{B} является базой в e .

Утверждение 5. Пусть G есть R -паратопологическая группа.

- (1) $\mathbf{N}_\gamma(\tilde{\mathcal{N}}_e) \sim \tilde{\mathcal{N}}_e$ для $0 < \gamma \leq \omega$.
- (2) Если G есть регулярное пространство, то $\mathbf{N}_\gamma^c(\tilde{\mathcal{N}}_e) \sim \tilde{\mathcal{N}}_e$ для $0 < \gamma < \omega$.

Доказательство. (1) Пусть $U \in \tilde{\mathcal{N}}_e$. Существует $\mathcal{S} = (U_n)_{n < \lambda} \subset \tilde{\mathcal{N}}_e$, так что $U_0^2 \subset U$ и $U_{n+1}^2 \subset U_n$ для $n < \lambda$. Тогда $V = \mathfrak{n}_\gamma(\mathcal{S}) \in \mathbf{N}_\gamma(\tilde{\mathcal{N}}_e)$ и $V \subset U$.

(2) Докажем индукцией по γ . Для $\gamma = 1$ утверждение очевидно. Пусть $\gamma = n + 1$ и $U \in \tilde{\mathcal{N}}_e$. Тогда $\overline{V^2}^d \subset \overline{V^3} \subset U$ для некоторого $V \in \tilde{\mathcal{N}}_e$. По предположению индукции $S \subset V$ для некоторого $S \in \mathbf{N}_n^c(\tilde{\mathcal{N}}_e)$. Тогда $Q = \overline{VS}^d \in \mathbf{N}_\gamma^c(\tilde{\mathcal{N}}_e)$ и $Q \subset U$. \square

Из определений и утверждения 4 вытекает

Предложение 20. Пусть $\mathcal{U} \subset \tilde{\mathcal{N}}_e$, $\mathcal{P} = \mathfrak{N}(\mathcal{U})$ и γ ординал. Тогда

$$\begin{aligned} \mathbf{P}^v(\mathcal{P}) &= \mathfrak{N}(\mathbf{N}^v(\mathcal{U})), & \mathbf{P}^c(\mathcal{P}) &= \mathfrak{N}(\mathbf{N}^c(\mathcal{U})), \\ \mathbf{P}_+(\mathcal{P}) &\preceq \mathfrak{N}(\mathbf{N}_+(\mathcal{U})), & \mathbf{P}_+^c(\mathcal{P}) &\preceq \mathfrak{N}(\mathbf{N}_+^c(\mathcal{U})), \\ \mathbf{P}_\gamma(\mathcal{P}) &= \mathfrak{N}(\mathbf{N}_\gamma(\mathcal{U})), & \mathbf{P}_\gamma^c(\mathcal{P}) &= \mathfrak{N}(\mathbf{N}_\gamma^c(\mathcal{U})). \end{aligned}$$

6.2. $g\Delta(\mathcal{U}; \mathfrak{Q})$ -беровские группы

Определение 6. Пусть \mathfrak{Q} есть нормальный функтор квадрата, $\mathcal{U} \subset \tilde{\mathcal{N}}_e$. Назовем группу G $g\Delta(\mathcal{U}; \mathfrak{Q})$ -беровской ($g\Delta(\mathcal{U}; \mathfrak{Q})$ -Baire) группой, если G является $\Delta(\mathfrak{N}(\mathcal{U}); \mathfrak{Q})$ -беровским пространством.

Любой элемент $P \in \mathfrak{N}(\mathcal{U})$ является правоинвариантным подмножеством и $\rho_g \times \rho_g(P|_W) = P|_{\rho_g(W)}$ для $g \in G$ и $W \in \mathcal{T}^*$. Поэтому, если $P|_W \in \mathfrak{Q}(W)$, то $P|_{Wg} \in \mathfrak{Q}(Wg)$. Получаем, что G является $\Delta(\mathfrak{N}(\mathcal{U}); \mathfrak{Q})$ -беровским пространством если и только если G является $\Delta(\mathfrak{N}(\mathcal{U}); \mathfrak{Q})$ -тучным пространством.

Из определений вытекает

Предложение 21. Пусть $\mathfrak{Q}, \mathfrak{R}$ есть NFS, $\mathcal{U}, \mathcal{V} \subset \tilde{\mathcal{N}}_e$. Предположим, что $\mathfrak{Q} \succ \mathfrak{R}$ и $\mathcal{U} \preccurlyeq \mathcal{V}$. Если G $g\Delta(\mathcal{U}; \mathfrak{Q})$ -беровская группа, то G $g\Delta(\mathcal{V}; \mathfrak{R})$ -беровская группа.

Аналогично предложению 10 проверяется

Предложение 22. Пусть $\mathcal{U} \subset \tilde{\mathcal{N}}_e$. Если в диаграмме из предложения 10 заменить \mathbb{P} на \mathbb{N} , то стрелка

$$(F)_k \rightarrow (G)_l$$

означает, что $F, G : \text{Exp}(\tilde{\mathcal{N}}_e) \rightarrow \text{Exp}(\tilde{\mathcal{N}}_e)$ есть отображения, $k, l \in \{d, v, h, s, a\}$ и выполняются условие:

если G является $g\Delta(F(\mathcal{U}); \mathfrak{Q}_k)$ -беровской группой, то G является $g\Delta(G(\mathcal{U}); \mathfrak{Q}_l)$ -беровской группой.

Предложение 23. Пусть G есть R -полутопологическая группа, $M \subset G$. Тогда

$$\overline{M}^h = \overline{M^{-1}}^{-1}.$$

Доказательство. Пусть $x \in G$. Тогда $x \in \overline{M}^h$ если и только если для любого $V \in \mathcal{N}_e$ выполняется $x \in MV \iff x^{-1} \in V^{-1}M^{-1} \iff Vx^{-1} \cap M^{-1} \neq \emptyset$, то есть $x^{-1} \in \overline{M^{-1}}$ и $x \in \overline{M^{-1}}^{-1}$. \square

Предложение 24. Пусть $U \in \tilde{\mathcal{N}}_e$ и $W \in \mathcal{T}^*$. Для $k \in \{d, v, h, s, a\}$, $\mathfrak{N}(U)|_W \in \mathfrak{Q}_k(W)$ если и только если выполняется условие (L_k^g) :

$$(L_d^g) \quad WW^{-1} \subset \overline{U}^d;$$

$$(L_v^g) \quad WW^{-1} \subset \overline{U};$$

$$(L_h^g) \quad WW^{-1} \subset \overline{U^{-1}} \text{ или, эквивалентно, } WW^{-1} \subset \overline{U}^h;$$

$$(L_s^g) \quad WM^{-1} \subset U \text{ для некоторого } M \subset W \subset \overline{M};$$

$$(L_a^g) \quad WW^{-1} \subset U.$$

Доказательство. (L_a^g) Для $x, y \in W$, $(x, y) \in \mathfrak{N}(U)$ если и только если $yx^{-1} \in U$.

$$(L_s^g) \quad \text{Для } x \in M, \{x\} \times W \subset \mathfrak{N}(U) \text{ если и только если } Wx^{-1} \in U.$$

$$(L_h^g) \quad W \subset \overline{U^{-1}x} \text{ для всех } x \in W \text{ если и только если } WW^{-1} \subset \overline{U^{-1}}. \text{ Из предложения 23 вытекает, что условие } WW^{-1} \subset \overline{U^{-1}} \text{ эквивалентно тому что } WW^{-1} \subset \overline{U}^h.$$

$$(L_v^g) \quad W \subset \overline{Ux} \text{ для всех } x \in W \text{ если и только если } WW^{-1} \subset \overline{U}.$$

$$(L_d^g) \quad \text{Вытекает из } \overline{\mathfrak{N}(U)} = \mathfrak{N}(\overline{U}^d) \text{ и } (L_a^g).$$

\square

6.3. $g\Delta(\Omega)$ -беровские группы

Определение 7. Пусть Ω есть нормальный функтор квадрата, G есть R -топологическая группа, γ есть ординал, $\mathcal{U} = \tilde{\mathcal{N}}_e$. Пусть $\mathbf{N}_l^k : \text{Exp}(\tilde{\mathcal{N}}_e) \rightarrow \text{Exp}(\tilde{\mathcal{N}}_e)$ есть одно из отображений, рассматриваемых в разделе 6.1:

$$\mathbf{N}_l^k \in \{\mathbf{N}, \mathbf{N}^e, \mathbf{N}^v, \mathbf{N}^c, \mathbf{N}_+, \mathbf{N}_+^c, \mathbf{N}_\gamma, \mathbf{N}_\gamma^c\}.$$

Будем говорить, G является ${}^k g\Delta^l(\Omega)$ -беровской группой, если G является $g\Delta(\mathbf{N}_l^k(\tilde{\mathcal{N}}_e); \Omega)$ -беровской группой. Для

$$\tilde{\Delta} \in \{g\Delta, {}^e g\Delta, {}^v g\Delta, {}^c g\Delta, g\Delta^+, {}^c g\Delta^+, g\Delta^\gamma, {}^c g\Delta^\gamma\}$$

мы определили $\tilde{\Delta}(\Omega)$ -беровские группы. Для

$$k \in \{d, h, v, s, a\}$$

будем говорить, G является $\tilde{\Delta}_k$ -беровской группой, если G является $\tilde{\Delta}(\Omega_k)$ -беровской группой. Для

$$\tilde{\tilde{\Delta}} \in \{g\Delta_k, {}^e g\Delta_k, {}^v g\Delta_k, {}^c g\Delta_k, g\Delta_k^+, {}^c g\Delta_k^+, g\Delta_k^\gamma, {}^c g\Delta_k^\gamma\}$$

мы определили $\tilde{\tilde{\Delta}}$ -беровские группы. Также, если нижний индекс не написан, подразумевается d : ${}^k g\Delta^l$ -беровость это ${}^k g\Delta_d^l$ -беровость. Отдельное непосредственное определение для наиболее важных классов групп: группа G называется

- $g\Delta$ -беровской если G является $g\Delta(\tilde{\mathcal{N}}_e; \Omega_d)$ -беровской;
- $g\Delta_h$ -беровской если G является $g\Delta(\tilde{\mathcal{N}}_e; \Omega_h)$ -беровской;
- $g\Delta_s$ -беровской если G является $g\Delta(\tilde{\mathcal{N}}_e; \Omega_s)$ -беровской;
- $g\Delta_v$ -беровской если G является $g\Delta(\tilde{\mathcal{N}}_e; \Omega_v)$ -беровской;
- $g\Delta_a$ -беровской если G является $g\Delta(\tilde{\mathcal{N}}_e; \Omega_a)$ -беровской;
- $g\Delta^\gamma$ -беровской если G является $g\Delta(\mathbf{N}_\gamma(\tilde{\mathcal{N}}_e); \Omega_d)$ -беровской;
- ${}^c g\Delta^\gamma$ -беровской если G является $g\Delta(\mathbf{N}_\gamma^c(\tilde{\mathcal{N}}_e); \Omega_d)$ -беровской.
- $g\Delta_a^\gamma$ -беровской если G является $g\Delta(\mathbf{N}_\gamma(\tilde{\mathcal{N}}_e); \Omega_a)$ -беровской;

Так как $\mathbf{N}_+(\tilde{\mathcal{N}}_e) = \mathbf{N}_2(\tilde{\mathcal{N}}_e)$, то классы $g\Delta^+(\Omega)$ -беровских и $g\Delta^2(\Omega)$ -беровских групп совпадают.

Так как $\mathfrak{N}(\tilde{\mathcal{N}}_e) = \mathfrak{S}_g(G) \subset \mathfrak{S}(G)$, то из предложения 20 вытекает

Предложение 25. Пусть \mathfrak{Q} есть нормальный функтор квадрата, G есть R -топологическая группа, γ есть ординал,

$$N_m^l \in \{N, N^e, N^v, N^c, N_+, N_+^c, N_\gamma, N_\gamma^c\}.$$

Если G является ${}^l\Delta^m(\mathfrak{Q})$ -беровским пространством, то G является ${}^l g\Delta^m(\mathfrak{Q})$ -беровской группой.

Пусть

$${}^l g\Delta_k^m \in \{g\Delta_k, {}^e g\Delta_k, {}^v g\Delta_k, {}^c g\Delta_k, g\Delta_k^+, {}^c g\Delta_k^+, g\Delta_k^\gamma, {}^c g\Delta_k^\gamma\}$$

где $k \in \{d, h, v, s, a\}$. Если G является ${}^l\Delta_k^m$ -беровским пространством, то G является ${}^l g\Delta_k^m$ -беровской группой.

Из предложения 24 вытекает

Предложение 26. Пусть

$$\tilde{\Delta} \in \{g\Delta, g\Delta_h, g\Delta_s, g\Delta_v, g\Delta_a\}.$$

Группа G является $\tilde{\Delta}$ -беровской, если для любого $U \in \mathcal{N}_e$ существует $W \in \mathcal{N}_e$, так что выполняется условие $(\tilde{\Delta})$:

$$(g\Delta) \quad WW^{-1} \subset \overline{U}^d;$$

$$(g\Delta_h) \quad WW^{-1} \subset \overline{U}^{-1} \text{ или, эквивалентно, } WW^{-1} \subset \overline{U}^h;$$

$$(g\Delta_s) \quad WM^{-1} \subset U \text{ для некоторого } M \subset W \subset \overline{M};$$

$$(g\Delta_v) \quad WW^{-1} \subset \overline{U};$$

$$(g\Delta_a) \quad WW^{-1} \subset U.$$

Предложение 27. Пусть γ есть ординал и

$$\tilde{\Delta} \in \{g\Delta^\gamma, {}^c g\Delta^\gamma, g\Delta_a^\gamma\}.$$

Группа G является $\tilde{\Delta}$ -беровской, если для любого $\mathcal{S} = (W_\alpha)_{\alpha < \gamma} \in \mathcal{N}_e^\gamma$ существует $W \in \mathcal{N}_e$, так что выполняется условие $(\tilde{\Delta})$:

$$(g\Delta^\gamma) \quad WW^{-1} \subset \overline{n_\gamma(\mathcal{S})}^d;$$

$$({}^c g\Delta^\gamma) \quad WW^{-1} \subset n_\gamma^c(\mathcal{S});$$


$$(g\Delta_a^\gamma) \quad WW^{-1} \subset n_\gamma(\mathcal{S}).$$

Из предложения 10 вытекает

Предложение 28. В диаграммах ниже, стрелка

$$A \rightarrow B$$

означает, что если G является A -беровской группой, то G является B -беровской группой.



7. Непрерывность в R -полутопологических группах

Теорема 6.

- (1) R -полутопологическая группа G является R -топологической группой если и только если G является $g\Delta_a$ -беровской.
- (2) R -квазитопологическая группа G является $g\Delta_v$ -беровской если и только если G является $g\Delta_h$ -беровской.
- (3) Полурегулярная R -полутопологическая группа G является R -топологической группой если и только если G является $g\Delta_v$ -беровской.
- (4) Полурегулярная R -квазитопологическая группа G является R -топологической группой если и только если G является $g\Delta_h$ -беровской.
- (5) Полурегулярная R -паратопологическая группа G является R -топологической группой если и только если G является $g\Delta$ -беровской.
- (6) Пусть $\gamma \leq \omega$. R -паратопологическая группа G является R -топологической группой если и только если G является $g\Delta_a^\gamma$ -беровской.
- (7) Пусть $\gamma < \omega$. Регулярная R -паратопологическая группа G является R -топологической группой если и только если G является ${}^c g\Delta^\gamma$ -беровской.

Доказательство. (1) Вытекает из предложения 26 ($g\Delta_a$).

(2) Вытекает из предложения 26 ($g\Delta_v$) и ($g\Delta_h$).

(3) Пусть $U \in \mathcal{N}_e$ есть канонически открытое множество. Из предложения 26 ($g\Delta_v$) вытекает, что $WW^{-1} \subset \bar{U}$ для некоторого $W \in \mathcal{N}_e$. Так как WW^{-1} открыто, то $WW^{-1} \subset \text{Int } \bar{U} = U$.

(4) Вытекает из (2) и (3).

(5) Пусть $U \in \mathcal{N}_e$ есть канонически открытое множество. Для некоторого $V \in \mathcal{N}_e$, $V^2 \subset U$. Из предложения 26 ($g\Delta$) вытекает, что $WW^{-1} \subset \bar{V}^d \subset \bar{V}^2 \subset \bar{U}$ для некоторого $W \in \mathcal{N}_e$. Тогда $WW^{-1} \subset \text{Int } \bar{U} = U$.

- (6) Вытекает из предложения 27 ($g\Delta_a$) и утверждения 5 (1).
(7) Вытекает из предложения 27 (${}^c g\Delta^\gamma$) и утверждения 5 (2). \square

Теорема 7. Пусть G есть R -полутопологическая $g\Delta_s$ -беровская группа,

$$H = \{g \in G : \lambda_g \text{ является слабым гомеоморфизмом}\}.$$

Тогда H является топологической группой и λ_g является гомеоморфизмом для всех $g \in H$.

Доказательство. Множество H есть подгруппа в G . Пусть $g \in H$. Покажем, что λ_g является гомеоморфизмом. Для $U \in \mathcal{T}^*$ обозначим

$$\tilde{U} = \text{Int } g^{-1} \text{Int } gU = \text{Int } \lambda_g^{-1}(\text{Int } \lambda_g(U)).$$

Отметим, что $\tilde{U} \in \mathcal{T}^*$, $\tilde{U} \subset U \subset \widetilde{\tilde{U}}$, $\widetilde{\tilde{U}}x = \tilde{U}x$ для $x \in G$ и $\tilde{V} \subset \widetilde{\tilde{V}}$ для $V \subset U$, $V \in \mathcal{T}^*$. Предположим, что λ_g не является гомеоморфизмом. Тогда $x \notin \widetilde{\tilde{U}}x = \tilde{U}x$ для некоторого $x \in G$ и $U \in \mathcal{T}^*$. Тогда $e \notin \tilde{U}$.

Лемма 1. Пусть $U \in \mathcal{N}_e$. Тогда $WM^{-1} \subset U$ для некоторого $W \in \mathcal{T}^*$ и $M \subset W \subset \overline{M}$ так что $e \in M$ и $W \subset U$.

Доказательство. Так как G есть $g\Delta_s$ -беровская группа, то из предложения 24 вытекает, что $W_*M_*^{-1} \subset U$ для некоторого $W_* \in \mathcal{N}_e$ и $M_* \subset W \subset \overline{M}_*$. Положим $W = W_* \cap U$ и $M = M_* \cup \{e\}$. \square

Из леммы 1 вытекает, что $WM^{-1} \subset U$ для некоторого $W \in \mathcal{N}_e$, $W \subset U$ и $M \subset W \subset \overline{M}$. Так как \widetilde{W} открыто и плотно в W и M плотно в W , то существует $y \in \widetilde{W} \cap M$. Так как $Wy^{-1} \subset U$, то

$$e \in \widetilde{Wy}^{-1} \subset \widetilde{\widetilde{Wy}^{-1}} \subset \tilde{U}.$$

Противоречие с тем что $e \notin \tilde{U}$.

Группа H является полутопологической группой.

Лемма 2. Пусть $M \subset G$, $W \in \mathcal{N}_e$. Тогда $H \cap \overline{M} \subset MW^{-1}$.

Доказательство. Пусть $x \in H \cap \overline{M}$. Тогда $xW \cap M \neq \emptyset$. Следовательно, $x \in MW^{-1}$. \square

Покажем, что H является квазитопологической группой, то есть для $U \in \mathcal{N}_e$ существует такое $W \in \mathcal{N}_e$, для которого $H \cap W \subset U^{-1}$. Из леммы 1 вытекает, что $WM^{-1} \subset U$ для некоторого $W \in \mathcal{N}_e$ и $M \subset W \subset \overline{M}$. Из леммы 2 вытекает, что

$$H \cap W \subset H \cap \overline{M} \subset MW^{-1} \subset U^{-1}.$$

Покажем, что H является паратопологической группой, то есть для $U \in \mathcal{N}_e$ существует такое $S \in \mathcal{N}_e$, для которого $(H \cap S)^2 \subset U$. Из леммы 1 вытекает, что $WM^{-1} \subset U$ для некоторого $W \in \mathcal{N}_e$ и $M \subset W \subset \overline{M}$

так что $e \in M$ и $W \subset U$. Также $VL^{-1} \subset W$ для некоторого $V \in \mathcal{N}_e$ и $L \subset V \subset \bar{V}$ так что $e \in L$ и $V \subset W$. Тогда $MLV^{-1} \subset U^{-1}$. Из леммы 2 вытекает, что $H \cap \bar{M}\bar{L} \subset MLV^{-1} \subset U^{-1}$. Положим $W_* = W \cap H$ и $V_* = V \cap H$. Так как $\bar{M}\bar{L} \subset \bar{M}\bar{L}$ и $W_* \subset \bar{M}$, то $W_*L \subset \bar{M}\bar{L}$. Так как $V_* \subset \bar{L}$ и $W_* \subset H$, то $W_*V_* \subset W_*\bar{L} \subset \bar{M}\bar{L}$. Получаем $W_*V_* \subset U^1$. Так как $V_* \subset W_*$, то $(V \cap H)^2 \subset U^{-1}$. Так как H квазитопологическая группа, то $S \cap H \subset V^{-1}$ для некоторого $S \in \mathcal{N}_e$. Тогда $(H \cap S)^2 \subset U$. \square

Из теоремы 7 вытекает

Теорема 8. Пусть G есть R -полутопологическая $O(fl)$ -топологическая $g\Delta_s$ -беровская группа. Тогда G является топологической группой.

Лемма 3. Пусть G есть R -топологическая группа, $M \subset G$, $W \in \mathcal{N}_e$. Тогда $\bar{M} \subset W^{-1}M$.

Доказательство. Пусть $x \in \bar{M}$. Тогда $Wx \cap M \neq \emptyset$. Следовательно, $x \in W^{-1}M$. \square

Теорема 9. Пусть G есть R -полутопологическая $O(dfl)$ -топологическая $g\Delta_s$ -беровская группа. Тогда

- (1) G является $g\Delta_v$ -беровской группой;
- (2) если G полурегулярна, то G является топологической группой.

Доказательство. Пункт (2) вытекает из пункта (1), теоремы 6 (3) и теоремы 2. Докажем (1). Пусть

$$H = \{g \in G : \lambda_g \text{ является гомеоморфизмом}\}.$$

Из теоремы 7 вытекает, что H плотно в G и H является топологической группой.

Лемма 4. Пусть $U \in \mathcal{N}_e$. Существует такое $V \in \mathcal{N}_e$, что $\bar{V}^2 \subset \bar{U}$.

Доказательство. Существует такое $V \in \mathcal{N}_e$, что $V_* = V_*^{-1}$ и $V_*^2 \subset U$, где $V_* = V \cap H$. Тогда $V_*\bar{V}_* \subset \bar{U}$ и $\bar{V}_*\bar{V}_* \subset \bar{U}$. Так как $\bar{V}_* = \bar{V}$, то $\bar{V}^2 \subset \bar{U}$. \square

В силу предложения 26 ($g\Delta_s$), достаточно показать, что для $U \in \mathcal{N}_e$ существует такое $W \in \mathcal{N}_e$, что $WW^{-1} \subset \bar{U}$. Из леммы 4 вытекает, что существуют такие $V, S \in \mathcal{N}_e$ что $\bar{V}^2 \subset \bar{U}$ и $\bar{S}^2 \subset \bar{V}$. Тогда $S^{-1}S^{-1} \subset \bar{V}^{-1}$. Из леммы 3 вытекает $\bar{S}^{-1} \subset \bar{V}^{-1}$. Так как H плотно в G и H является топологической группой, то $e \in \text{Int } \bar{S}^{-1}$. Положим $W = V \cap \text{Int } \bar{S}^{-1}$. Тогда $W \in \mathcal{N}_e$, $W^{-1} \subset \bar{V}$ и $W \subset V$. Получаем $WW^{-1} \subset \bar{V}^2 \subset \bar{U}$. \square

Лемма 5. Пусть G есть R -полутопологическая $O(qre)$ -топологическая группа, $U \in \mathcal{T}^*$ и $M \subset G = \bar{M}$. Для любого положительного $n \in \omega$ существует $x \in M$ и $V \in \mathcal{N}_e$, так что $V^n x \subset U$.

Доказательство. Докажем индукцией по n .

$n = 1$. Пусть $x \in U \cap M$ и $V = Ux^{-1}$.

$n > 1$. По предположению индукции, существует $x_* \in U \cap M$ и $V_* \in \mathcal{N}_e$, для которых $V_*^{n-1}x_* \subset U$. Пусть $h \in V_*x_*$. Так как G есть $O(qpe)$ -топологическая группа, то существует $g \in V_*x_*h^{-1}$ и $S \in \mathcal{N}_e$, так что $S^2g \subset V_*x_*h^{-1}$. Пусть $x \in Sgh \cap M$ и

$$V = Sghx^{-1} \cap S \cap V_*.$$

Тогда $V^2x \subset SSgh \subset V_*x_*$ и $V^n x \subset V_*^{n-1}x_* \subset U$. \square

Теорема 10. Пусть G есть R -полутопологическая $O(dfl, fpe)$ -топологическая $g\Delta$ -беровская группа.

- (1) Если G π -полурегулярное пространство, то G является $g\Delta_v$ -беровской группой;
- (2) Если G полурегулярное пространство, то G является топологической группой.

Доказательство. Пусть

$$H = \{g \in G : \lambda_g \text{ является слабым гомеоморфизмом}\}.$$

Группа H плотна в G . Из предложения 1 $((dfl, fpe, r) \rightarrow (qpe))$ вытекает, что G является $O(qpe)$ -топологической группой, то есть умножение в G квази непрерывно по первой координате в (e, e) .

Лемма 6. $\text{Int } S^{-1} \neq \emptyset$ для любого канонически открытого $S \in \mathcal{T}^*$.

Доказательство. Из леммы 5 вытекает, что существует $g \in S \cap H$ и $U \in \mathcal{N}_e$, так что $U^2g \subset S$. Из предложения 26 $(g\Delta)$ вытекает, что $WW^{-1} \subset \bar{U}^d$ для некоторого $W \in \mathcal{N}_e$. Так как $\bar{U}^d \subset \bar{U}^2$, то

$$WW^{-1}g \subset \bar{U}^d g \subset \bar{U}^2g \subset \bar{S}.$$

Так как S канонически открытое подмножество G и $WW^{-1}g$ открыто, то $WW^{-1}g \subset S$. Тогда $g^{-1}WW^{-1} \subset S^{-1}$. Так как $g \in H$, то $\text{Int } g^{-1}WW^{-1} \neq \emptyset$. Следовательно, $\text{Int } S^{-1} \neq \emptyset$. \square

Пункт (2) вытекает из пункта (1) и теоремы 6. Докажем (1). Так как G π -полурегулярное пространство, то из леммы 6 вытекает, что G является $O(fie)$ -топологической группой. Из предложения 1 $((dfl, fie, r) \rightarrow (fl, fi))$ вытекает, что G является $O(fl, fi)$ -топологической группой. Итак, группа G является $O(fl, qpe, fi, r)$ -топологической группой. Пусть $U \in \mathcal{N}_e$. Покажем, что $\text{Int } \bar{U}^d \subset \bar{U}$. Предположим противное. Тогда $S = \text{Int } \bar{U}^d \setminus \bar{U} \neq \emptyset$. Из леммы 5 вытекает, что существует $q \in S$ и $Q \in \mathcal{N}_e$, так что $Q^2q \subset S$. Так как G является $O(fi)$ -топологической группой, то $\text{Int}(Qq)^{-1} \neq \emptyset$ и $Vg^{-1} \subset \text{Int}(Qq)^{-1}$ для некоторых $g \in Qq$ и $V \in \mathcal{N}_e$. Получаем $gV^{-1} \subset Qq$ и

$QgV^{-1} \subset Q^2q \subset S$. Так как $QgV^{-1} \cap U = \emptyset$, то $Qg \cap UV = \emptyset$ и $g \notin \overline{UV} \supset \overline{U}^d$. Противоречие с тем, что $g \in S \subset \overline{U}^d$.

Мы показали, что $\text{Int } \overline{U}^d \subset \overline{U}$. Из предложения 26 ($g\Delta$) вытекает, что $WW^{-1} \subset \overline{U}^d$ для некоторого $W \in \mathcal{N}_e$. Так как $WW^{-1} \in \mathcal{T}^*$, то $WW^{-1} \subset \text{Int } \overline{U}^d \subset \overline{U}$. \square

Предложение 29. Пусть G есть R -полутопологическая $O(qre)$ -топологической $g\Delta_h$ -беровская группа. Тогда G является квазирегулярным пространством.

Доказательство. Пусть $U \in \mathcal{T}^*$. Из леммы 5 вытекает, что $V^3g \subset U$ для некоторых $g \in U$ и $V \in \mathcal{T}^*$. Так как $\overline{V}^h \subset V^2$, то из предложения 26 ($g\Delta_h$) вытекает, что $WW^{-1} \subset \overline{V}^h \subset V^2$ для некоторого $W \in \mathcal{N}_e$. Тогда $SVg \subset U$, где $S = WW^{-1}$. Так как $S = S^{-1}$, то из леммы 3 вытекает, что $\overline{V} \subset SV$. Следовательно, $\overline{V}g \subset U$. \square

Теорема 11. Пусть G есть R -полутопологическая $O(dfl, fpe)$ -топологическая $g\Delta_h$ -беровская группа. Тогда

- (1) G является $g\Delta_v$ -беровской группой;
- (2) если G полурегулярное пространство, то G является топологической группой.

Доказательство. Пункт (1) вытекает из теоремы 10 (1) и предложения 29. Пункт (2) вытекает из пункта (1) и теоремы 6. Также, пункт (2) вытекает из теоремы 10 (2). \square

Теорема 12. Пусть G есть полутопологическая $O(dl, fie)$ -топологическая $g\Delta_h$ -беровская группа. Тогда

- (1) G является $g\Delta_v$ -беровской группой;
- (2) если G полурегулярное пространство, то G является топологической группой.

Доказательство. Пункт (2) вытекает из пункта (1) и теоремы 6. Докажем (1). Из предложения 1 ($(dfl, fie, r) \rightarrow (fl, fi)$) вытекает, что G является $O(fi)$ -топологической группой. Обозначим

$$H = \{g \in G : \lambda_g \text{ является гомеоморфизмом}\}.$$

Группа H плотна в G . Пусть $U \in \mathcal{N}_e$.

Лемма 7. $\text{Int } \overline{U}^h \subset \overline{U}$.

Доказательство. Предположим противное. Тогда $S = \text{Int } \overline{U}^h \setminus \overline{U} \neq \emptyset$. Так как G является $O(fi)$ -топологической группой, то $\text{Int } S^{-1} \neq \emptyset$. Тогда $Qg^{-1} \subset \text{Int } S^{-1}$ для некоторого $g \in H \cap S$ и $Q \in \mathcal{N}_e$. Тогда $gQ^{-1} \subset S$ и $\overline{Q^{-1}} \subset g^{-1}\overline{S}$. Из предложения 26 ($g\Delta_h$) вытекает, что $V = WW^{-1} \subset \overline{Q^{-1}}$ для некоторого $W \in \mathcal{N}_e$. Тогда $gV \subset \overline{S}$ и $gV \cap U = \emptyset$. Следовательно, $g \notin UV \supset \overline{U}^h$. Противоречие с $g \in S \subset \overline{U}^h$. \square

Из предложения 26 ($g\Delta_h$) вытекает, что $WW^{-1} \subset \bar{U}^h$ для некоторого $W \in \mathcal{N}_e$. Тогда $WW^{-1} \subset \text{Int } \bar{U}^h \subset \bar{U}$. \square

8. Основные результаты

В этом разделе мы сформулируем следствия из раздела 7.

Пусть \mathcal{P}_k (\mathcal{P}_c) есть наименьший класс пространств, который

- содержит p -пространства и сильно Σ -пространства;
- замкнут относительно произвольных (счетных) произведений;
- переходу к открытым подпространствам.

Пусть \mathcal{D}_d наименьший класс пространств, который

- содержит Σ -пространства, $w\Delta$ -пространства и слабо компактные пространства;
- замкнут относительно произведений на пространства из класса \mathcal{P}_k ;
- переходу к открытым подпространствам.

Пусть \mathcal{D}_h наименьший класс пространств, который

- содержит Σ -пространства и $w\Delta$ -пространства;
- замкнут относительно произведений на пространства из класса \mathcal{P}_c ;
- переходу к открытым подпространствам.

Пусть \mathcal{D}_s есть класс полурегулярных пространств, которые содержат метризуемое тучное подмножество. К этому классу принадлежат беровские полурегулярные пространства из следующих классов:

- σ -пространства, пространства со счетной сетью;
- моровские, разлагаемые пространства.

В [4] вводятся и изучаются $\Gamma_{o,l}^{\widehat{\sigma D}}$ -тучные, $\Gamma_{p,l}^{\widehat{\sigma D}}$ -тучные и $\Gamma_f^{\widehat{BM}}$ -тучные пространства. Напомним, отображение $f : X \rightarrow Y$ называется слабым непрерывным в точке $x \in X$, если $\text{Int } f^{-1}(V) \neq \emptyset$ для любой непустых окрестности $V \subset Y$ точки $f(x)$. Отображение, слабо непрерывное в каждой точке, называется слабо непрерывным. Для группы G и $g \in G$

$$\lambda_g : G \rightarrow G, \quad x \mapsto gx.$$

Теорема 13 (Теорема 2). *Пусть G есть R -топологическая группа. Если множество*

$$H_{fl} = \{g \in G : \lambda_g \text{ и } \lambda_{g^{-1}} \text{ слабо непрерывно}\}$$

плотно в G , то G является топологической группой.

Теорема 14. Пусть G есть $g\Delta$ -беровская R -полутопологическая группа. R -полутопологическая группа является $g\Delta$ -беровской если G является Δ -тучным пространством. Класс Δ -тучных пространств содержит $\Gamma_{o,l}^{\widehat{\sigma D}}$ -тучные пространства, которые содержат регулярные беровские пространства из класса \mathcal{D}_d .

- (1) Если G является R -паратопологической группой, то G является R -топологической группой.
- (2) Если G полурегулярное пространство, множество

$$H_{fl} = \{g \in G : \lambda_g \text{ и } \lambda_{g^{-1}} \text{ слабо непрерывно}\},$$

плотно в G и умножение $\mathfrak{m} : G \times G \rightarrow G, (g, h) \mapsto gh$ слабо непрерывно в (e, e) , то G является топологической группой.

Доказательство. Из предложения 26 вытекает, что R -полутопологическая группа является $g\Delta$ -беровской если G является Δ -тучным пространством. Из предложения 36 (1) [4] вытекает, что $\Gamma_{o,l}^{\widehat{\sigma D}}$ -тучные пространство является Δ -тучным. Из теоремы 4 [4] вытекает, что класс $\Gamma_{o,l}^{\widehat{\sigma D}}$ -тучных пространств содержит регулярные беровские пространства из класса \mathcal{D}_d .

Пункт (1) вытекает из теоремы 6 (5). Пункт (2) вытекает из теоремы 10. \square

Теорема 15. Пусть G есть полурегулярная $g\Delta_h$ -беровская R -полутопологическая группа. R -полутопологическая группа является $g\Delta_h$ -беровской если G является Δ_h -тучным пространством. Класс Δ_h -тучных пространств содержит $\Gamma_{p,l}^{\widehat{\sigma D}}$ -тучные пространства, которые содержат регулярные беровские пространства из класса \mathcal{D}_h .

- (1) Если G R -квазитопологическая группа, то G является R -топологической группой.
- (2) Если множество

$$H_l := \{g \in G : \lambda_g \text{ и } \lambda_{g^{-1}} \text{ непрерывно}\},$$

плотно в G и отображение взятия обратного элемента $i : G \rightarrow G, g \mapsto g^{-1}$ слабо непрерывно в e , то G является топологической группой.

Доказательство. Из предложения 26 вытекает, что R -полутопологическая группа является $g\Delta_h$ -беровской если G является Δ_h -тучным пространством. Из предложения 36 (2) [4] вытекает, что $\Gamma_{p,l}^{\widehat{\sigma D}}$ -тучные пространство является Δ_h -тучным. Из теоремы 4 [4] вытекает, что класс $\Gamma_{p,l}^{\widehat{\sigma D}}$ -тучных пространств содержит регулярные беровские пространства из класса \mathcal{D}_h .

Пункт (1) вытекает из теоремы 6 (2) и (4). Пункт (2) вытекает из теоремы 12. \square

Теорема 16. Пусть G есть $g\Delta_s$ -беровская R -полутопологическая группа. R -полутопологическая группа является $g\Delta_s$ -беровской если G является Δ_s -тучным или CDP-тучным пространством. Класс Δ_s -тучных пространств содержит $\Gamma_f^{\widehat{B}^M}$ -тучные пространства. Классы Δ_s -тучных и CDP-тучных пространств содержат класс \mathcal{D}_s .

- (1) Если λ_g слабо непрерывно для любого $g \in G$, то G является топологической группой.
- (2) Если G полурегулярное пространство и множество

$$H_{fl} = \{g \in G : \lambda_g \text{ и } \lambda_{g^{-1}} \text{ слабо непрерывно}\},$$

плотно в G , то G является топологической группой.

Доказательство. Из предложения 26 вытекает, что R -полутопологическая группа является $g\Delta_s$ -беровской если G является Δ_s -тучным пространством. Из предложения 36 (3) [4] вытекает, что $\Gamma_f^{\widehat{B}^M}$ -тучные пространство является Δ_s -тучным. Из теоремы 4 [4] вытекает, что класс $\Gamma_f^{\widehat{B}^M}$ -тучных пространств содержит регулярные беровские пространства из класса \mathcal{D}_s . Из предложения 14 вытекает, что CDP-тучные пространства являются Δ_s -тучными пространствами. Из предложения 13 вытекает, что пространства из класса \mathcal{D}_s являются CDP-тучными.

Пункт (1) вытекает из теоремы 8. Пункт (2) вытекает из теоремы 9. \square

9. Примеры и вопросы

Пример 2 (Пример 1). Метризуемая компактная R -топологическая не топологическая группа.

Пример 3. Пусть $G = \mathbb{R}$ с топологией, открытые множества которой имеют вид $U \setminus P$, где U открыто в \mathbb{R} и P нигде не плотно в \mathbb{R} . Группа G является квазитопологической $O(qpe)$ -топологической квазирегулярной хаусдорфовой $g\Delta_v$ -беровской $g\Delta_h$ -беровской Δ -беровской не Δ_h -тучной группой, которая не является топологической группой.

Пример 4. Пусть $G = \mathbb{R}^2$ с топологией, у которой база точки $(x_*, y_*) \in G$ образуют множества вида

$$(U \cap \{(x, y) \in G : y > y_*\}) \cup \{(x_*, y_*)\},$$

где U есть открытая окрестность (x_*, y_*) в стандартной топологии \mathbb{R}^2 [7]. Группа G является хаусдорфовой квазирегулярной не регулярной паратопологической группой.

Пример 5 (Example 2.13 [7]). There exists a Baire and metric left semitopological group G which is not a right semitopological group, and whose inversion is nearly continuous but not feebly continuous. Группа G является Δ_s -беровской.

Пример 6. Пусть G есть псевдокомпактная булева квазитопологическая группа, которая не является топологической группой (Пример 3 [4]). Группа G является тихоновской Δ -беровской не $g\Delta_h$ -беровской группой.

Проблема 2. Пусть G есть (полу) регулярная R -полутопологическая группа. Какие из перечисленных ниже условий влекут, что G есть R -топологическая группа?

- (1) Группа G является $g\Delta$ -беровской (Δ -беровской, псевдокомпактной) и умножение \mathfrak{m} в G квази (слабо) непрерывно (в (e, e)).
- (2) Группа G является $g\Delta_h$ -беровской (Δ_h -беровской, счетнокомпактной, компактной) и умножение \mathfrak{m} в G квази (слабо) непрерывно (в (e, e)).
- (3) Группа G является $g\Delta_s$ -беровской (Δ_s -беровской, метризуемой беровской) и умножение \mathfrak{m} в G квази (слабо) непрерывно (в (e, e)).
- (4) Группа G является $g\Delta_h$ -беровской (Δ_h -беровской, счетнокомпактной, компактной) и операция взятия обратного i в G квази (слабо) непрерывна (в e).
- (5) Группа G является $g\Delta_s$ -беровской (Δ_s -беровской, метризуемой беровской) и операция взятия обратного i в G квази (слабо) непрерывна (в e).

Проблема 3. Пусть G есть (полу) регулярная $g\Delta_h$ -беровская (Δ_h -беровская, счетнокомпактная, компактная) R -полутопологическая группа,

$$H_{fl} = \{g \in G : \lambda_g \text{ и } \lambda_{g^{-1}} \text{ слабо непрерывно}\},$$

$$H_l = \{g \in G : \lambda_g \text{ и } \lambda_{g^{-1}} \text{ непрерывно}\}.$$

Какие из перечисленных ниже условий влекут, что G есть топологическая группа?

- (1) $G = \overline{H_{fl}}$.
- (2) $G = \overline{H_l}$.
- (3) $G = H_{fl}$.

Пространство X называется *слабо псевдокомпактным* если существует компактное хаусдорфово расширение bX пространства X , в котором пространство X G_δ -плотно, то есть X пересекается с любым непустым G_δ подмножеством bX [12]. Ясно, произведение слабо псевдокомпактных пространств слабо псевдокомпактно, в частности, произведение псевдокомпактных пространств слабо псевдокомпактно.

Проблема 4. Пусть G есть (полу) регулярная полутопологическая группа. Какие из перечисленных ниже условий влекут, что G есть топологическая группа?

- (1) Группа G является $g\Delta_h$ -беровской (Δ_h -беровской).
- (2) Группа G является паратопологической и G слабо псевдокомпактна (произведение псевдокомпактных пространств, произведение двух псевдокомпактных пространств) (Вопрос 1 [4]).
- (3) Группа G слабо компактна и принадлежит одному из следующих классов пространств: сепарабельна; счетной тесноты; k -пространство (Problem 3.5 [17]).

Список литературы

- [1] D. Montgomery, Continuity in topological groups, Bull. Am. Math. Soc. 42 (1936) 879–882. doi:10.1090/S0002-9904-1936-06456-6.
- [2] R. Ellis, A note on the continuity of the inverse, Proc. Am. Math. Soc. 8 (1957) 372–373. doi:10.2307/2033747.
- [3] E. Reznichenko, Generalization of baire spaces using games, arXiv preprint arXiv:2203.02937 (2022) 35doi:https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.02937.
- [4] E. Reznichenko, Generalization of Bair spaces using diagonal, arXiv e-prints (2022) 35arXiv:2203.09389, doi:https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.09389.
- [5] O. Ravsky, Paratopological groups ii, Matematychni Studii 16 (1) (2001) 93–101.
- [6] Z. A. Ameen, Almost somewhat near continuity and near regularity, Moroccan Journal of Pure and Applied Analysis 7 (1) (2021) 88–99. doi:doi:10.2478/mjpa-2021-0009. URL https://doi.org/10.2478/mjpa-2021-0009
- [7] J. Cao, R. Drozdowski, Z. Piotrowski, Weak continuity properties of topologized groups, Czechoslovak Mathematical Journal 60 (1) (2010) 133–148. URL http://eudml.org/doc/37996
- [8] Z. Piotrowski, Quasi-continuity and product spaces, Geometric topology, Proc. int. Conf., Warszawa 1978, 349–352 (1980). (1980).
- [9] A. Bouziad, Continuity of separately continuous group actions in p -spaces, Topology Appl. 71 (2) (1996) 119–124. doi:10.1016/0166-8641(95)00039-9.
- [10] P. S. Kenderov, I. S. Kortezov, W. B. Moors, Topological games and topological groups, Topology Appl. 109 (2) (2001) 157–165. doi:10.1016/S0166-8641(99)00152-2.

- [11] A. Arhangel'skii, M. Tkachenko, *Topological Groups and Related Structures*, Atlantis Press, 2008. doi:10.2991/978-94-91216-35-0.
URL <https://doi.org/10.2991/978-94-91216-35-0>
- [12] A. Arhangel'skii, E. Reznichenko, Paratopological and semitopological groups versus topological groups, *Topology and its Applications* 151 (1-3) (2005) 107–119.
- [13] N. Bingham, A. Ostaszewski, Normed versus topological groups: Dichotomy and duality, *Dissertationes Mathematicae* 472 (2008) 151. doi:10.4064/dm472-0-1.
- [14] P. Milnes, Representations of compact right topological groups, *Canadian Mathematical Bulletin* 36 (3) (1993) 314–323. doi:10.4153/CMB-1993-044-1.
- [15] E. Reznichenko, Continuity of the inverse, in russian (2008). arXiv:2106.01803.
URL <http://gtopology.math.msu.su/erezn-ci>
- [16] J. van Mill, V. Tkachuk, R. Wilson, Classes defined by stars and neighbourhood assignments, *Topology and its Applications* 154 (10) (2007) 2127–2134, special Issue: The 6th Iberoamerican Conference on Topology and its Applications (VI-CITA). doi:<https://doi.org/10.1016/j.topol.2006.03.029>.
URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166864107000193>
- [17] M. Tkachenko, Paratopological and semitopological groups vs topological groups, *Recent Progress in General Topology* 3 (2014) 825–872.
- [18] W. B. Moors, Some baire semitopological groups that are topological groups, *Topology and its Applications* 230 (2017) 381–392. doi:<https://doi.org/10.1016/j.topol.2017.08.042>.
URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166864117304273>