

EIN SATZ ÜBER DIE DIOPHANTISCHE GLEICHUNG $Ax^2 - By^4 = C$ ($C = 1, 2, 4$)

WILHELM LJUNGGREN

CONTENTS

1. Introduction	1
2. Original German text	2
References	8
3. English translation	9
References	16
4. Translators' Addendum	17

1. INTRODUCTION

In this document, we provide both the original German version of Ljunggren's article, "Ein Satz über die Diophantische Gleichung $Ax^2 - By^4 = C$ ($C = 1, 2, 4$)", Tolfte Skand. Matematikerkongressen, Lund, 1953, pp. 188–194 (1954), as well as our English translation.

In the English translation, some footnotes clarifying a few things in the proof of his Hilfssatz 2 are also provided, along with a correction to the statement of his Satz IV. A justification of this correction is provided in Section 4. Our next revision of this document will also contain a more detailed explanation of his proofs.

As this paper of Ljunggren is difficult to obtain, even in its native German, we hope that this is also of interest and benefit to researchers in this area.

¹typeset into L^AT_EX by N. Tzanakis and P. Voutier

2. ORIGINAL GERMAN TEXT

Es seien A , B und C ganz-rationale, positive Zahlen und $C = 1, 2$ oder 4 . Ist C gerade, dann soll AB ungerade sein. Es sei weiter A quadratfrei, AB keine Quadratzahl und $C = 2$ für $A = 1$. In einer früheren Arbeit [1] habe ich den folgenden Satz bewiesen:

Satz I. *Die Gleichung*

$$(1) \quad Ax^2 - By^4 = C$$

hat im Falle $C = 1$ höchstens eine Lösung in positiven ganz-rationalen Zahlen x, y . Ist $B \equiv -1 \pmod{4}$, so gilt dies auch für $C = 4$. In allen anderen Fällen gibt es höchstens zwei Lösungen.

In der citierten Arbeit wurde auch eine Methode angegeben, um die möglichen Lösungen wirklich zu bestimmen. Diese erfordert die Berechnung der Grundeinheiten in zwei Zahlkörpern vierten Grades. Der Zweck dieser kleinen Abhandlung ist es eine einfachere Lösungsmethode nebst eine Verschärfung des obenerwähnten Satzes anzugeben.

Man braucht nur solche Werte von A , B und C zu betrachten, für welche eine Gleichung der Form

$$(2) \quad Az_1^2 - Bz_2^2 = C$$

in natürlichen Zahlen z_1 und z_2 lösbar ist. Dies kann immer einfach entschieden werden [2].

Zuerst werden wir zwei Hilfssätze beweisen, die auch für andere Fragen in der Theorie der diophantischen Gleichungen vierten Grades von Bedeutung sind.

Es sei $\varepsilon > 1$ eine Einheit mit der Norm $+1$ im Körper $K(\sqrt{D})$, $D > 0$, und es sei weiter ε' die konjugierte Einheit, also $\varepsilon\varepsilon' = +1$. Sei n eine ungerade natürliche Zahl. Wir führen folgende Bezeichnungen ein:

End of page 188

$$P_n(\varepsilon) = \varepsilon'^{\frac{n-1}{2}} \frac{\varepsilon^n - 1}{\varepsilon - 1} = \frac{\varepsilon^{\frac{n+1}{2}} - \varepsilon'^{\frac{n+1}{2}}}{\varepsilon - \varepsilon'} + \frac{\varepsilon^{\frac{n-1}{2}} - \varepsilon'^{\frac{n-1}{2}}}{\varepsilon - \varepsilon'},$$

$$Q_n(\varepsilon) = \varepsilon'^{\frac{n-1}{2}} \frac{\varepsilon^n + 1}{\varepsilon + 1} = \frac{\varepsilon^{\frac{n+1}{2}} - \varepsilon'^{\frac{n+1}{2}}}{\varepsilon - \varepsilon'} - \frac{\varepsilon^{\frac{n-1}{2}} - \varepsilon'^{\frac{n-1}{2}}}{\varepsilon - \varepsilon'}.$$

Man bestätigt leicht die folgende Relation

$$(3) \quad P_n(\varepsilon) \cdot Q_n(\varepsilon) = \frac{\varepsilon^n - \varepsilon'^n}{\varepsilon - \varepsilon'}.$$

Hilfssatz 1. $P_n(\varepsilon)$ ist keine Quadratzahl für $n > 3$.

BEWEIS: Wir müssen zwei Fälle unterscheiden:

ERSTER FÄLL: $n = 4t + 1$.

Die Gleichung

$$\varepsilon'^{\frac{n-1}{2}} \frac{\varepsilon^n - 1}{\varepsilon - 1} = z^2$$

kann so geschrieben werden

$$(\varepsilon^{2t})^2 \varepsilon - z^2 \varepsilon^{2t} (\varepsilon - 1) = 1$$

Hieraus folgt dass die Zahl

$$(\varepsilon^{2t} \sqrt{\varepsilon} + z \varepsilon^t \sqrt{\varepsilon - 1})^2 = -1 + 2\varepsilon^{4t+1} + 2z \varepsilon^{3t} \theta, \quad \theta = \sqrt{\varepsilon(\varepsilon - 1)},$$

eine Einheit im Ringe $R(1, \varepsilon, \theta, \theta\varepsilon)$ mit der Relativnorm $+1$ ist. Nach *Dirichlet* haben wir hier in R zwei Grundeinheiten, und die Einheiten mit der Relativnorm $+1$ sind durch die Potenzen von $(\sqrt{\varepsilon} + \sqrt{\varepsilon + 1})$ gegeben. Vgl [3] S.8, 12. Dann haben wir

$$\varepsilon^{2t} \sqrt{\varepsilon} + z \varepsilon^t \sqrt{\varepsilon - 1} = (\sqrt{\varepsilon} + \sqrt{\varepsilon + 1})^m = \lambda^m, \quad (m > 0 \text{ und ungerade}).$$
 Mit

den Bezeichnungen

$$\lambda' = \sqrt{\varepsilon} - \sqrt{\varepsilon - 1}, \quad \lambda'' = \sqrt{\varepsilon'} + \sqrt{\varepsilon' + 1}, \quad \text{und} \quad \lambda''' = \sqrt{\varepsilon'} - \sqrt{\varepsilon' - 1},$$

finden wir leicht

$$(4) \quad (\lambda^m + \lambda'^m) (\lambda''^m + \lambda'''^m) = 4, \quad (\lambda + \lambda') (\lambda'' + \lambda''') = 4.$$

Hieraus schließen wir

$$(\lambda \lambda'')^m + (\lambda' \lambda''')^m - 2 = 2x^2 i \sqrt{N}$$

$$\lambda \lambda'' + \lambda' \lambda''' - 2 = 2i \sqrt{N}, \quad N = \varepsilon + \varepsilon' - 2 > 0.$$

End of page 189

Aus der Formel

$$\frac{p^m + q^m - 2}{p + q - 2} = \sum_{h=0}^{m-1} \frac{m}{h+1} \binom{m+h}{2h+1} (p+q-2)^h, \quad pq = 1,$$

[3], S. 15, erhält man für $p = \lambda\lambda''$, $q = \lambda'\lambda'''$

$$(5) \quad x^2 = m^2 + \frac{m^2(m^2-1^2)}{4!} 2 \left(2i\sqrt{N}\right) + \frac{m^2(m^2-1^2)(m^2-2^2)}{6!} 2 \left(2i\sqrt{N}\right)^2 + \dots + \\ + \frac{m^2(m^2-1^2)(m^2-2^2)\dots(m^2-k^2)}{(2k+2)!} 2 \left(2i\sqrt{N}\right)^k + \dots + \left(2i\sqrt{N}\right)^{m-1}.$$

Weil x^2 reell ist, muss der imaginäre Teil der rechten Seite dieser Gleichung verschwinden. Nach Kürzung mit $4\sqrt{N}$ findet sich dann

$$0 = \frac{m^2(m^2-1^2)}{4!} - \frac{m^2(m^2-1^2)(m^2-2^2)(m^2-3^2)}{8!} 4N + \dots.$$

In [3], S. 20 ist gezeigt worden, dass eine solche Gleichung nur für $m = 1$, ($m > 0$), erfüllt ist. Also ist $t = 0$ und $n = 1$.

ZWEITER FÄLL: $n = 4t + 3$.

Die oben erwähnte Methode kann hier nicht angewandt werden um eine obere Schranke für n zu bestimmen, weil wir in diesem Falle im Ringe $R(1, \varepsilon, \theta_1, \varepsilon\theta_1)$, $\theta_1 = \sqrt{\varepsilon - 1}$, arbeiten müssen, wo die Grundeinheit mit der Relativnorm $+1$ nicht bekannt ist. Doch können wir auch in diesem Falle beweisen, dass es höchstens eine Lösung gibt. Wir bekommen nämlich auch hier ein System der Form (4), wo aber die zweite Gleichung aus der ersten hergeleitet werden kann.

Aus der Gleichung $P_n(\varepsilon) = z^2$ ergibt sich

$$(6) \quad \frac{\varepsilon^{2t+2} - \varepsilon'^{2t+2}}{\varepsilon - \varepsilon'} + \frac{\varepsilon^{t+1} - \varepsilon'^{t+1}}{\varepsilon - \varepsilon'} \left(\varepsilon^t + \varepsilon'^t\right) = z^2 + 1, \text{ oder} \\ \frac{\varepsilon^{t+1} - \varepsilon'^{t+1}}{\varepsilon - \varepsilon'} \left(\varepsilon^{t+1} + \varepsilon'^{t+1} + \varepsilon^t + \varepsilon'^t\right) = z^2 + 1.$$

Zuerst zeigen wir, dass wir $t \equiv 0 \pmod{3}$ haben müssen. Im Falle $t \equiv 2 \pmod{3}$ ist der erste Faktor der linken Seite von (6) teilbar durch $\frac{\varepsilon^3 - \varepsilon'^3}{\varepsilon - \varepsilon'} = (\varepsilon + \varepsilon')^2 - 1 \equiv 0$ oder $-1 \pmod{4}$. Dies ist aber unmöglich, weil die rechte Seite nur ungerade Primfaktoren der Form $4k + 1$ enthält und durch 4 nicht teilbar ist. Im Falle $t \equiv 1 \pmod{3}$ verschwindet die Klammer für $\varepsilon = \varepsilon' = -1$ und für $\varepsilon = -\varrho$, $\varepsilon' = -\varrho^2$, wo ϱ eine primitive dritte Einheitswurzel

End of page 190

dedeutet. Die Klammer ist folglich teilbar durch $\varepsilon + \varepsilon' + 2$ und durch $\varepsilon + \varepsilon' - 1$. Hieraus ergibt sich $\varepsilon + \varepsilon' \equiv 3 \pmod{8}$ als einzige Möglichkeit. Die Zahl t muss gerade sein; sonst tritt nämlich auch $\varepsilon + \varepsilon'$ als Teiler auf. Der erste Faktor kann dann so geschrieben werden, $t = 2h$,

$$\frac{\varepsilon^{t+1} - \varepsilon'^{t+1}}{\varepsilon - \varepsilon'} = -1 + \frac{\varepsilon^{h+1} - \varepsilon'^{h+1}}{\varepsilon - \varepsilon'} (\varepsilon^h - \varepsilon'^h) \equiv -1 \pmod{4},$$

weil $\frac{\varepsilon^{h+1} - \varepsilon'^{h+1}}{\varepsilon - \varepsilon'}$ durch $\frac{\varepsilon^3 - \varepsilon'^3}{\varepsilon - \varepsilon'} = (\varepsilon + \varepsilon')^2 - 1, \equiv 0 \pmod{4}$, teilbar ist, Der Fall $t \equiv 1 \pmod{3}$ ist folglich auch ausgeschlossen.

Wir können nun setzen $n = 3^r m$, $(m, 3) = 1$. Die Gleichung $P_n(\varepsilon) = z^2$ gibt dann

$$(7) \quad P_m(\varepsilon)P_{3^r}(\varepsilon^m) = z^2.$$

Der grösste gemeinsame Teiler der beiden Faktoren ist ein Teiler von 3^r , $P_m(\varepsilon)$ ist aber nicht durch 3 teilbar. In [3], S.58 ist nämlich gezeigt worden, dass dies für $\frac{\varepsilon^m - \varepsilon'^m}{\varepsilon - \varepsilon'}$ und $\frac{(\varepsilon^m)^{3^r} - (\varepsilon'^m)^{3^r}}{\varepsilon^m - \varepsilon'^m}$ gilt, und unsere Behauptung folgt dann aus (3). Aus (7) ergibt sich folglich

$$P_m(\varepsilon) = w_1^2, \quad P_{3^r}(\varepsilon^m) = w^2.$$

Ist r gerade, so muss $m \equiv 3 \pmod{4}$ sein. Die Gleichung $P_m(\varepsilon) = w_1^2$ ist aber unmöglich für $m \not\equiv 0 \pmod{3}$. Folglich ist r ungerade und $m \equiv 1 \pmod{4}$. Dies gibt $m = 1$ und

$$(8) \quad P_{3^r}(\varepsilon) = w^2.$$

Aus (8) folgt

$$\prod_{i=0}^{r-1} P_3(\varepsilon^{3^i}) = w^2.$$

Wie in [3] S.59 schließt man so

$$P_3(\varepsilon^{3^i}) = w_i^2, \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, r-1.$$

Im Falle $r > 1$ ist dann $P_3(\varepsilon^3) = w_1^2$ oder $\varepsilon^3 + \varepsilon'^3 + 1 = w_1^2$. Diese letzte Gleichung kann auch in der folgenden Weise geschrieben werden

$$(9) \quad (\varepsilon + \varepsilon' + 2)(\varepsilon + \varepsilon' - 1)^2 = w_1^2 + 1.$$

Dies ist aber unmöglich, weil die rechte Seite entweder $\equiv 0 \pmod{4}$ ist oder einen Primfaktor der Form $4k - 1$ enthält. Also ist $r = 1$ und $n = 3$. Unser Hilfssatz 1 ist damit bewiesen.

End of page 191

Hilfssatz 2. $Q_n(\varepsilon)$ ist keine Quadratzahl für $n > 3$ falls $\varepsilon + \varepsilon'$ ungerade ist.

BEWEIS: Wir unterscheiden auch hier zwei Fälle.

ERSTER FÄLL: $n = 4t + 1$. Die Gleichung $Q_n(\varepsilon) = z^2$ gibt

$$(10) \quad (\varepsilon^t + \varepsilon'^t) \left(\frac{\varepsilon^{t+1} - \varepsilon'^{t+1}}{\varepsilon - \varepsilon'} - \frac{\varepsilon^t - \varepsilon'^t}{\varepsilon - \varepsilon'} \right) = z^2 + 1.$$

Diese Gleichung ist erfüllt für $t = 0$ ($n = 1$). Ist $t > 0$ und gerade, so setzen wir $t = 2^p t_1$, $(2, t_1) = 1$, $p \geq 1$. Dann ist $\varepsilon^{2^p} + \varepsilon'^{2^p} \equiv -2 \pmod{8}$ ein Teiler von $\varepsilon^t + \varepsilon'^t$, was aber unmöglich ist. Also muss t ungerade sein. Im Fälle $t \equiv 0 \pmod{3}$ ist dann $\frac{\varepsilon^3 + \varepsilon'^3}{\varepsilon + \varepsilon'} = (\varepsilon + \varepsilon')^2 - 3 \equiv -2 \pmod{8}$ ein Teiler von $z^2 + 1$. Dies ist aber auch unmöglich. Ist $t \equiv 1 \pmod{3}$ so sind $\varepsilon + \varepsilon'$ und $\varepsilon + \varepsilon' - 1$ gleichzeitig Teiler von $z^2 + 1$, was wieder unmöglich ist. Also muss $t \equiv 2 \pmod{3}$, d.h. $n \equiv 0 \pmod{3}$.

ZWEITER FÄLL: $n = 4t + 3$. Die Gleichung $Q_n(\varepsilon) = z^2$ gibt nun

$$(11) \quad (\varepsilon^{t+1} + \varepsilon'^{t+1}) \left(\frac{\varepsilon^{t+1} - \varepsilon'^{t+1}}{\varepsilon - \varepsilon'} - \frac{\varepsilon^t - \varepsilon'^t}{\varepsilon - \varepsilon'} \right) = z^2 + 1.$$

Wie im ersten Fälle ergibt sich auch hier $n \equiv 0 \pmod{3}$.

In beiden Fällen¹ haben wir somit $n = 3^r m$, $(m, 3) = 1$, $r \geq 1$ für $n > 1$. Ist $r \geq 1$ und ungerade, so bekommt man, genau wie früher, $n = 3$. Ist $r > 1$ und gerade, so muss man auch die Gleichung $\varepsilon^3 + \varepsilon'^3 - 1 = 3w_1^2$ untersuchen. Schreiben wir aber diese Gleichung in der Form

$$(\varepsilon + \varepsilon')^3 - 3(\varepsilon + \varepsilon') - 1 = 3w_1^2,$$

so sehen wir leicht, dass sie mod 9 unmöglich ist. Unser Hilfssatz 2 ist damit bewiesen.

Nun betrachten wir unsere Gleichung (1). Sind $z_1 = a$, $z_2 = b$ die kleinsten positiven Lösungen von (2), und setzen wir ferner

$$\varepsilon = \left(\frac{a\sqrt{A} + b\sqrt{B}}{\sqrt{C}} \right)^2 = \frac{2Bb^2 + C + 2ab\sqrt{AB}}{C},$$

so haben wir

$$(12) \quad \frac{x\sqrt{A} + y^2\sqrt{B}}{\sqrt{C}} = \left(\frac{a\sqrt{A} + b\sqrt{B}}{\sqrt{C}} \right)^n, \quad n > 0 \text{ und ungerade, d.h.}$$

$$(13) \quad y^2 = b \frac{\varepsilon^{\frac{n}{2}} - \varepsilon'^{\frac{n}{2}}}{\varepsilon^{\frac{1}{2}} - \varepsilon'^{\frac{1}{2}}} = bP_n(\varepsilon).$$

End of page 192

¹PV correction: “Fälle” and “Fällen” are used throughout. Sometimes in the collected works, the first one appeared incorrectly as “Falle”.

Wir können nun $b = rk^2$ setzen, wo r ohne quadratische Factoren ist. Aus (13) folgt

$$(14) \quad P_n(\varepsilon) = rh^2.$$

Es ist weiter leicht einzusehen, dass r ein Teiler von n ist, d.h. $n = rn_1$ und r ungerade. Der Gleichung (14) können wir dann die folgende Gestalt geben

$$(15) \quad P_{n_1}(\varepsilon)P_r(\varepsilon^{n_1}) = rh^2.$$

Hieraus ergibt sich

$$(16) \quad P_{n_1}(\varepsilon) = h_1^2 \quad \text{und} \quad P_r(\varepsilon^{n_1}) = rh_2^2.$$

Der grösste gemeinsame Teiler der beiden Faktoren der linken Seite von (15) geht nämlich in r auf, und ferner ist der zweite dieser Faktoren $\equiv r \pmod{r^2}$.

Aus (16) ergibt sich $n_1 = 1$ oder $n_1 = 3$, dem Hilfssatze 1 zufolge. Für den Exponenten n in (12) haben wir also höchstens zwei Möglichkeiten: $n = r$ oder $= 3r$. Die Gleichung (1) hat folglich höchstens zwei ganzzahlige Lösungen x, y . Aus (16) folgt die notwendige Bedingung

$\varepsilon + \varepsilon' + 1 = h_1^2 = \frac{4}{C}Bb^2 + 3$ für die Existenz von zwei Lösungen. Diese Bedingung ist nie erfüllt für $C = 1$ oder für $C = 4$ mit $B \equiv -1 \pmod{4}$ oder für $C = 2$ mit $B \equiv 1 \pmod{4}$. Damit haben wir Satz I aufs neue bewiesen, und gleichzeitig ist eine einfachere Methode angegeben, um die möglichen Lösungen wirklich zu bestimmen. Ausserdem folgt

Satz II. *Ist die Grösse $\frac{4}{C}Bb^2 + 3$ keine Quadratzahl, dann hat $Ax^2 - By^4 = C$ höchstens eine Lösung in ganzen positiven Zahlen x und y .*

Satz III. *Die Gleichung $Ax^2 - By^4 = 4$ hat höchstens eine Lösung in ganzen positiven und teilerfremden Zahlen x und y .*

Auf ähnliche Weise finden wir, unter Benutzung des zweiten Hilfssatzes ²:

Satz IV. *Die Gleichung $Ax^4 - By^2 = 4$ hat höchstens zwei Lösungen in ganzen positiven Zahlen x und y . Ist die Grösse $Bb^2 + 1$ keine Quadratzahl, dann gibt es höchstens eine solche Lösung. Dies gilt auch für Lösungen in teilerfremden Zahlen x und y .*

End of page 193

²PV correction: was Hilssatzes

REFERENCES

- [1] Ljunggren, W.: Über die unbestimmte Gleichung $Ax^2 - By^4 = C$. Archiv for Math. og Naturv. B. XLI. Nr. 10, Oslo 1938.
- [2] Arnft, F.: Untersuchungen über einige unbestimmte Gleichungen zweiten Grades, und über die Verwandlung der Quadratwurzel aus einem Bruche in einen Kettenbruch. Archiv der Math. und Physik, Th. 12, 1849.
- [3] Ljunggren, W.: Einige Eigenschaften der Einheiten reeller quadratischer und rein-biquadratischer Zahlkörper mit Anwendung auf die Lösung einer Klasse unbestimmter Gleichungen vierten Grades. Vid.-Akad. Skrifter, I No. 12, Oslo 1936.

3. ENGLISH TRANSLATION

3

Let A , B and C be rational, positive integers and $C = 1, 2$ or 4 . If C is even, then AB should be odd. Further, let A be square-free, AB not a square and $C = 2$ for $A = 1$. In an earlier work [1], I have proven the following theorem:

Theorem I. *The equation*

$$(1) \quad Ax^2 - By^4 = C$$

in the case of $C = 1$ has at most one solution in positive, rational integers x, y . If $B \equiv -1 \pmod{4}$, this also applies to $C = 4$. In all other cases there are at most two solutions.

In the work cited, a method was also given to actually determine the possible solutions. This requires the calculation of the basic units in two number fields of the fourth degree. The purpose of this little treatise is to provide a simpler solution method, along with a tightening of the above-mentioned theorem.

One only needs to consider values of A , B and C for which an equation of the form

$$(2) \quad Az_1^2 - Bz_2^2 = C$$

can be solved in natural numbers z_1 and z_2 . This can always be easily decided [2].

First we shall prove two lemmas that are also relevant to other questions in the theory of Diophantine equations of the fourth degree.

Let $\varepsilon > 1$ be a unit with norm $+1$ in the field $K(\sqrt{D})$, $D > 0$, and further let ε' be the conjugate unit, so $\varepsilon\varepsilon' = +1$. Let n be an odd natural number. We introduce the following terms:

End of page 188

³translated by N. Tzanakis and P. Voutier

$$P_n(\varepsilon) = \varepsilon'^{\frac{n-1}{2}} \frac{\varepsilon^n - 1}{\varepsilon - 1} = \frac{\varepsilon^{\frac{n+1}{2}} - \varepsilon'^{\frac{n+1}{2}}}{\varepsilon - \varepsilon'} + \frac{\varepsilon^{\frac{n-1}{2}} - \varepsilon'^{\frac{n-1}{2}}}{\varepsilon - \varepsilon'},$$

$$Q_n(\varepsilon) = \varepsilon'^{\frac{n-1}{2}} \frac{\varepsilon^n + 1}{\varepsilon + 1} = \frac{\varepsilon^{\frac{n+1}{2}} - \varepsilon'^{\frac{n+1}{2}}}{\varepsilon - \varepsilon'} - \frac{\varepsilon^{\frac{n-1}{2}} - \varepsilon'^{\frac{n-1}{2}}}{\varepsilon - \varepsilon'}.$$

It is easy to confirm the following relation

$$(3) \quad P_n(\varepsilon) \cdot Q_n(\varepsilon) = \frac{\varepsilon^n - \varepsilon'^n}{\varepsilon - \varepsilon'}.$$

Lemma 1. $P_n(\varepsilon)$ is not a square for $n > 3$.

PROOF: We have to distinguish two cases:

FIRST CASE: $n = 4t + 1$.

The equation

$$\varepsilon'^{\frac{n-1}{2}} \frac{\varepsilon^n - 1}{\varepsilon - 1} = z^2$$

can be written as

$$(\varepsilon^{2t})^2 \varepsilon - z^2 \varepsilon^{2t} (\varepsilon - 1) = 1$$

From this, it follows that the number

$$(\varepsilon^{2t} \sqrt{\varepsilon} + z \varepsilon^t \sqrt{\varepsilon - 1})^2 = -1 + 2\varepsilon^{4t+1} + 2z \varepsilon^{3t} \theta, \quad \theta = \sqrt{\varepsilon(\varepsilon - 1)},$$

is a unit in the ring $R(1, \varepsilon, \theta, \theta\varepsilon)$ with relative norm $+1$. According to *Dirichlet* we have two fundamental units in R , and the units with relative norm $+1$ are given by the powers of $(\sqrt{\varepsilon} + \sqrt{\varepsilon + 1})$. Cf. [3] p.8, 12. Then we have

$$\varepsilon^{2t} \sqrt{\varepsilon} + z \varepsilon^t \sqrt{\varepsilon - 1} = (\sqrt{\varepsilon} + \sqrt{\varepsilon + 1})^m = \lambda^m, \quad (m > 0 \text{ and odd}).$$
 With

the notation

$$\lambda' = \sqrt{\varepsilon} - \sqrt{\varepsilon - 1}, \quad \lambda'' = \sqrt{\varepsilon'} + \sqrt{\varepsilon' + 1} \quad \text{and} \quad \lambda''' = \sqrt{\varepsilon'} - \sqrt{\varepsilon' - 1},$$

we easily find that

$$(4) \quad (\lambda^m + \lambda'^m) (\lambda''^m + \lambda'''^m) = 4, \quad (\lambda + \lambda') (\lambda'' + \lambda''') = 4.$$

We conclude from this that

$$(\lambda \lambda'')^m + (\lambda' \lambda''')^m - 2 = 2x^2 i \sqrt{N}$$

$$\lambda \lambda'' + \lambda' \lambda''' - 2 = 2i \sqrt{N}, \quad N = \varepsilon + \varepsilon' - 2 > 0.$$

End of page 189

From the formula

$$\frac{p^m + q^m - 2}{p + q - 2} = \sum_{h=0}^{m-1} \frac{m}{h+1} \binom{m+h}{2h+1} (p+q-2)^h, \quad pq = 1,$$

[3], S. 15, is obtained for $p = \lambda\lambda''$, $q = \lambda'\lambda'''$

$$(5) \quad x^2 = m^2 + \frac{m^2(m^2-1^2)}{4!} 2 \left(2i\sqrt{N}\right) + \frac{m^2(m^2-1^2)(m^2-2^2)}{6!} 2 \left(2i\sqrt{N}\right)^2 + \dots + \\ + \frac{m^2(m^2-1^2)(m^2-2^2)\dots(m^2-k^2)}{(2k+2)!} 2 \left(2i\sqrt{N}\right)^k + \dots + \left(2i\sqrt{N}\right)^{m-1}.$$

Because x^2 is real, the imaginary part of the right hand side of this equation must vanish. After shortening with $4\sqrt{N}$ you will find

$$0 = \frac{m^2(m^2-1^2)}{4!} - \frac{m^2(m^2-1^2)(m^2-2^2)(m^2-3^2)}{8!} 4N + \dots.$$

In [3], S. 20 it was shown that such an equation is only satisfied for $m = 1$, ($m > 0$). So $t = 0$ and $n = 1$.

SECOND CASE: $n = 4t + 3$.

The above-mentioned method cannot be used here to determine an upper bound for n , because in this case we have to work in the ring $R(1, \varepsilon, \theta_1, \varepsilon\theta_1)$, $\theta_1 = \sqrt{\varepsilon-1}$, where the fundamental unit with the relative norm $+1$ is not known. But even in this case we can prove that there is at most one solution. Here too we get a system of the form (4), but where the second equation can be derived from the first.

From the equation $P_n(\varepsilon) = z^2$ results

$$(6) \quad \frac{\varepsilon^{2t+2} - \varepsilon'^{2t+2}}{\varepsilon - \varepsilon'} + \frac{\varepsilon^{t+1} - \varepsilon'^{t+1}}{\varepsilon - \varepsilon'} \left(\varepsilon^t + \varepsilon'^t\right) = z^2 + 1, \text{ or} \\ \frac{\varepsilon^{t+1} - \varepsilon'^{t+1}}{\varepsilon - \varepsilon'} \left(\varepsilon^{t+1} + \varepsilon'^{t+1} + \varepsilon^t + \varepsilon'^t\right) = z^2 + 1.$$

First we must show that we have $t \equiv 0 \pmod{3}$. In the case of $t \equiv 2 \pmod{3}$, the first factor on the left-hand side of (6) is divisible by $\frac{\varepsilon^3 - \varepsilon'^3}{\varepsilon - \varepsilon'} = (\varepsilon + \varepsilon')^2 - 1 \equiv 0 \text{ or } -1 \pmod{4}$. But this is impossible because the right hand side only contains odd prime factors of the form $4k+1$ and is not divisible by 4. In the case of $t \equiv 1 \pmod{3}$ the bracket(right word?) $\varepsilon + \varepsilon' = -1$ disappears and for $\varepsilon = -\varrho$, $\varepsilon' = -\varrho^2$, we deduce that ϱ root is a primitive third root of unity.

End of page 190

The bracket(right word?) is therefore divisible by $\varepsilon + \varepsilon' + 2$ and $\varepsilon + \varepsilon' - 1$. This results in $\varepsilon + \varepsilon' \equiv 3 \pmod{8}$ as the only possibility. The number t must be even; otherwise $\varepsilon + \varepsilon'$ also appears as a divisor. The first factor can then be written as $t = 2h$,

$$\frac{\varepsilon^{t+1} - \varepsilon'^{t+1}}{\varepsilon - \varepsilon'} = -1 + \frac{\varepsilon^{h+1} - \varepsilon'^{h+1}}{\varepsilon - \varepsilon'} (\varepsilon^h - \varepsilon'^h) \equiv -1 \pmod{4},$$

because $\frac{\varepsilon^{h+1} - \varepsilon'^{h+1}}{\varepsilon - \varepsilon'}$ is divisible by $\frac{\varepsilon^3 - \varepsilon'^3}{\varepsilon - \varepsilon'} = (\varepsilon + \varepsilon')^2 - 1, \equiv 0 \pmod{4}$, the case $t \equiv 1 \pmod{3}$ is consequently also excluded.

We can now set $n = 3^r m$, $(m, 3) = 1$. The equation $P_n(\varepsilon) = z^2$ then gives

$$(7) \quad P_m(\varepsilon)P_{3^r}(\varepsilon^m) = z^2.$$

The greatest common divisor of the two factors is a divisor of 3^r , but $P_m(\varepsilon)$ is not divisible by 3. In [3], S.58 it has been shown that this is true for $\frac{\varepsilon^m - \varepsilon'^m}{\varepsilon - \varepsilon'}$ and $\frac{(\varepsilon^m)^{3^r} - (\varepsilon'^m)^{3^r}}{\varepsilon^m - \varepsilon'^m}$, and our assertion then follows from (3). It follows from (7) that

$$P_m(\varepsilon) = w_1^2, \quad P_{3^r}(\varepsilon^m) = w^2.$$

If r is even, then $m \equiv 3 \pmod{4}$. However, the equation $P_m(\varepsilon) = w_1^2$ is impossible for $m \not\equiv 0 \pmod{3}$. Hence r is odd and $m \equiv 1 \pmod{4}$. This gives $m = 1$ and

$$(8) \quad P_{3^r}(\varepsilon) = w^2.$$

From (8) follows

$$\prod_{i=0}^{r-1} P_3(\varepsilon^{3^i}) = w^2.$$

As in [3] S.59, one concludes that

$$P_3(\varepsilon^{3^i}) = w_i^2, \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, r-1.$$

If $r > 1$ then $P_3(\varepsilon^3) = w_1^2$ or $\varepsilon^3 + \varepsilon'^3 + 1 = w_1^2$. This last equation can also be written in the following way

$$(9) \quad (\varepsilon + \varepsilon' + 2)(\varepsilon + \varepsilon' - 1)^2 = w_1^2 + 1.$$

But this is impossible because the right-hand side is either $\equiv 0 \pmod{4}$ or contains a prime factor of the form $4k - 1$. So $r = 1$ and $n = 3$. Our Lemma 1 is thus proven.

End of page 191

Lemma 2. $Q_n(\varepsilon)$ is not a square for $n > 3$ if $\varepsilon + \varepsilon'$ is odd.

PROOF: Here, too, we distinguish between two cases.

FIRST CASE: $n = 4t + 1$. The equation $Q_n(\varepsilon) = z^2$ gives

$$(10) \quad (\varepsilon^t + \varepsilon'^t) \left(\frac{\varepsilon^{t+1} - \varepsilon'^{t+1}}{\varepsilon - \varepsilon'} - \frac{\varepsilon^t - \varepsilon'^t}{\varepsilon - \varepsilon'} \right) = z^2 + 1.$$

This equation is satisfied for $t = 0$ ($n = 1$). If $t > 0$ and even, we set $t = 2^p t_1$, $(2, t_1) = 1$, $p \geq 1$. Then $\varepsilon^{2^p} + \varepsilon'^{2^p} \equiv -2 \pmod{8}$ ⁴ is a divisor of $\varepsilon^t + \varepsilon'^t$,⁵ which is impossible. So t has to be odd. In the case of $t \equiv 0 \pmod{3}$ then $\frac{\varepsilon^3 + \varepsilon'^3}{\varepsilon + \varepsilon'} = (\varepsilon + \varepsilon')^2 - 3 \equiv -2 \pmod{8}$ is a divisor of $z^2 + 1$. But this is also impossible. If $t \equiv 1 \pmod{3}$ then $\varepsilon + \varepsilon'$ and $\varepsilon + \varepsilon' - 1$ are simultaneously divisors of $z^2 + 1$, which is again impossible. So $t \equiv 2 \pmod{3}$, i.e. $n \equiv 0 \pmod{3}$.

SECOND CASE: $n = 4t + 3$. The equation $Q_n(\varepsilon) = z^2$ now gives

$$(11) \quad (\varepsilon^{t+1} + \varepsilon'^{t+1}) \left(\frac{\varepsilon^{t+1} - \varepsilon'^{t+1}}{\varepsilon - \varepsilon'} - \frac{\varepsilon^t - \varepsilon'^t}{\varepsilon - \varepsilon'} \right) = z^2 + 1.$$

As in the first case, $n \equiv 0 \pmod{3}$ also results here.

In both cases we have $n = 3^r m$, $(m, 3) = 1$, $r \geq 1$ for $n > 1$. If $r \geq 1$ and is odd, then one gets, just as before, $n = 3$. If $r > 1$ and even, then one must also examine equation $\varepsilon^3 + \varepsilon'^3 - 1 = 3w_1^2$. But if we write this equation in the form

$$(\varepsilon + \varepsilon')^3 - 3(\varepsilon + \varepsilon') - 1 = 3w_1^2,$$

we can easily see that it is impossible mod 9. Our Lemma 2 is thus proven.

Now let's look at our equation (1). If $z_1 = a$, $z_2 = b$ are the smallest positive solutions of (2), and we further set

$$\varepsilon = \left(\frac{a\sqrt{A} + b\sqrt{B}}{\sqrt{C}} \right)^2 = \frac{2Bb^2 + C + 2ab\sqrt{AB}}{C},$$

so we have

$$(12) \quad \frac{x\sqrt{A} + y^2\sqrt{B}}{\sqrt{C}} = \left(\frac{a\sqrt{A} + b\sqrt{B}}{\sqrt{C}} \right)^n, \quad n > 0 \text{ and odd, i.e.,}$$

⁴trans.: This is not correct. We get $\varepsilon^{2^p} + \varepsilon'^{2^p} \equiv 7 \pmod{8}$ when $\varepsilon + \varepsilon'$ is odd. We will prove it inductively. For $p = 1$, we have $\varepsilon^2 + \varepsilon'^2 = (\varepsilon + \varepsilon')^2 - 2\varepsilon\varepsilon' = (\varepsilon + \varepsilon')^2 - 2$. Since $\varepsilon + \varepsilon'$ is odd, it follows that $(\varepsilon + \varepsilon')^2 \equiv 1 \pmod{8}$ and so our result holds for $p = 1$.

Supposing that the result holds for $p - 1$, we consider $(\varepsilon^{2^{p-1}} + \varepsilon'^{2^{p-1}})^2 = \varepsilon^{2^p} + \varepsilon'^{2^p} + 2\varepsilon^{2^{p-1}}\varepsilon'^{2^{p-1}}$. Since $\varepsilon\varepsilon' = 1$, we have $(\varepsilon^{2^{p-1}} + \varepsilon'^{2^{p-1}})^2 = \varepsilon^{2^p} + \varepsilon'^{2^p} + 2$. By our inductive hypothesis, $\varepsilon^{2^{p-1}} + \varepsilon'^{2^{p-1}} \equiv 7 \pmod{8}$, so $1 \equiv 7^2 \equiv \varepsilon^{2^p} + \varepsilon'^{2^p} + 2 \pmod{8}$. Hence $\varepsilon^{2^p} + \varepsilon'^{2^p} \equiv 7 \pmod{8}$ follows.

⁵trans.: not sure if that is true, but the proof that t cannot be even can be completed as follows: $\varepsilon^{2^p} + \varepsilon'^{2^p}$ is a divisor of $z^2 + 1$ by (10), but that means that -1 is a square mod a number congruent to 3 (mod 4) (since we just saw that $\varepsilon^{2^p} + \varepsilon'^{2^p} \equiv 7 \pmod{8}$), which is impossible.

Note: this fails if $\varepsilon + \varepsilon'$ is even. Then $\varepsilon^{2^p} + \varepsilon'^{2^p} \equiv 2 \pmod{8}$ and -1 can be a square mod such numbers.

$$(13) \quad y^2 = b \frac{\varepsilon^{\frac{n}{2}} - \varepsilon'^{\frac{n}{2}}}{\varepsilon^{\frac{1}{2}} - \varepsilon'^{\frac{1}{2}}} = bP_n(\varepsilon).$$

End of page 192

We can now set $b = rk^2$, where r has no square factors. From (13) follows

$$(14) \quad P_n(\varepsilon) = rh^2.$$

It is also easy to see that r is a divisor of n , i.e. $n = rn_1$ and r is odd. We can then give equation (14) the following form

$$(15) \quad P_{n_1}(\varepsilon)P_r(\varepsilon^{n_1}) = rh^2.$$

From this it follows that

$$(16) \quad P_{n_1}(\varepsilon) = h_1^2 \quad \text{and} \quad P_r(\varepsilon^{n_1}) = rh_2^2.$$

The greatest common divisor of the two factors on the left-hand side of (15) is divided into r , and furthermore the second of these factors is $\equiv r \pmod{r^2}$.

From (16) we get $n_1 = 1$ or $n_1 = 3$, from Lemma 1. For the exponent n in (12) we have at most two options: $n = r$ or $n = 3r$. The equation (1) consequently has at most two integer solutions x, y . From (16) follows the necessary condition $\varepsilon + \varepsilon' + 1 = h_1^2 = \frac{4}{C}Bb^2 + 3$ for the existence of two solutions. This condition is never fulfilled for $C = 1$ or for $C = 4$ with $B \equiv -1 \pmod{4}$ or for $C = 2$ with $B \equiv 1 \pmod{4}$. With this we have proven Theorem I anew, and at the same time a simpler method is given to actually determine the possible solutions. Also follows

Theorem II. *If the quantity $\frac{4}{C}Bb^2 + 3$ is not a square, then $Ax^2 - By^4 = C$ has at most one solution in positive integers x and y .*

Theorem III. *The equation $Ax^2 - By^4 = 4$ has at most one solution in positive and relatively prime integers x and y .*

We find in a similar way, using the second lemma.

Theorem IV. *The equation $Ax^4 - By^2 = 4$ has at most two solutions in positive integers x and y . If the quantity $Bb^2 + 1$ is not a square, then there is at most one such solution. This also applies to solutions in coprime numbers x and y .⁶*

End of page 193

⁶trans.: working through the proof (see the next pages), we need that b in the minimal solution of (2) is odd here too.

REFERENCES

- [1] Ljunggren, W.: Über die unbestimmte Gleichung $Ax^2 - By^4 = C$. Archiv for Math. og Naturv. B. XLI. Nr. 10, Oslo 1938.
- [2] Arnft, F.: Untersuchungen über einige unbestimmte Gleichungen zweiten Grades, und über die Verwandlung der Quadratwurzel aus einem Bruche in einen Kettenbruch. Archiv der Math. und Physik, Th. 12, 1849.
- [3] Ljunggren, W.: Einige Eigenschaften der Einheiten reeller quadratischer und rein-biquadratischer Zahlkörper mit Anwendung auf die Lösung einer Klasse unbestimmter Gleichungen vierten Grades. Vid.-Akad. Skrifter, I No. 12, Oslo 1936
(also found at https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010110806015?page=69).

4. TRANSLATORS' ADDENDUM

Here we work through the proof of Theorem [IV](#) and demonstrate why we require the additional assumption that b is odd.

Now let's look at the equation

$$(trans-1) \quad Ax^4 - By^2 = C$$

If $z_1 = a$, $z_2 = b$ is the smallest solution in positive integers of [\(2\)](#), and we further set

$$\varepsilon = \left(\frac{a\sqrt{A} + b\sqrt{B}}{\sqrt{C}} \right)^2 = \frac{2Bb^2 + C + 2ab\sqrt{AB}}{C},$$

so we have

$$(trans-2) \quad \frac{x^2\sqrt{A} + y\sqrt{B}}{\sqrt{C}} = \left(\frac{a\sqrt{A} + b\sqrt{B}}{\sqrt{C}} \right)^n, \quad n > 0 \text{ and odd.}$$

So we have

$$(trans-3) \quad x^2 = a \frac{\varepsilon^{\frac{n}{2}} + \varepsilon'^{\frac{n}{2}}}{\varepsilon^{\frac{1}{2}} + \varepsilon'^{\frac{1}{2}}} = aQ_n(\varepsilon),$$

the last equality holding by multiplying the top and bottom of the middle expression by $\varepsilon^{n/2}$ and using $\varepsilon\varepsilon' = 1$.

We can now set $a = rk^2$, where r is square-free. From [\(trans-3\)](#) follows that

$$(trans-4) \quad Q_n(\varepsilon) = rh^2,$$

for some integer h .

It is also easy to see that r is a divisor of n , i.e. $n = rn_1$ and r is odd (recall that n is odd, see [\(trans-2\)](#)). We can then give equation [\(trans-4\)](#) the following form

$$(trans-5) \quad Q_{n_1}(\varepsilon)Q_r(\varepsilon^{n_1}) = rh^2.$$

From this it follows that

$$(trans-6) \quad Q_{n_1}(\varepsilon) = h_1^2 \quad \text{and} \quad Q_r(\varepsilon^{n_1}) = rh_2^2.$$

The greatest common divisor of the two factors on the left-hand side of [\(trans-5\)](#) is a divisor of r , and furthermore the second of these factors is $\equiv r \pmod{r^2}$.

From [\(trans-6\)](#) we get $n_1 = 1$ or $n_1 = 3$, from Lemma [2](#), provided that $\varepsilon + \varepsilon'$ is odd (i.e., $4Bb^2/C + 2$ is odd, so $4Bb^2/C$ is odd. This means $C = 4$ and that Bb^2 is odd. We know that B is odd from our initial assumption that when C is even, like here, then AB is odd. Thus we need b to be odd.).

For the exponent n in [\(trans-2\)](#) we have at most two options: $n = r$ or $n = 3r$. The equation [\(trans-2\)](#) consequently has at most two integer solutions x, y . From [\(trans-6\)](#) follows the necessary condition $\varepsilon + \varepsilon' - 1 = h_1^2 = \frac{4}{C}Bb^2 + 1$ for the existence of two solutions.